

Е $\frac{29}{271}$

На ответ

БУДЬТЕ ЗДОР

801-25
10923-6

И

ЛѢЧИТЕСЬ САМИ, КОГДА НѢТЪ ВРАЧА,

ИЛИ

САМОУЧИТЕЛЬ

СЕЛЬСКАГО ЛѢЧЕНІЯ. 81 1/2-3480

Преимущественно лицамъ духовнаго званія, какъ для предохраненія здоровья надежнѣйшими предупредительными мѣрами, такъ и для подаенія врачебной помощи своимъ прихожанамъ, за отсутствіемъ врачей, во всѣхъ чаще случающихся у нихъ болѣзняхъ, съ показаніемъ: 1) каждой изъ нихъ: опредѣленія, видовъ и признаковъ, причинъ, мѣстопробыванія, сущности, распознаванія, предсказанія, исхода, лѣченія предохранительнаго, діететическаго, посредствомъ соблюденія надлежащихъ правилъ, и существеннаго, состоящаго въ употребленіи самыхъ обыкновенныхъ, домашнихъ, народныхъ, болѣе простыхъ и менѣе сложныхъ лѣкарствъ; 2) случаевъ къ назначенію кровопусканія рожковаго, пиявочнаго и жильнаго, усложняемыхъ строгимъ осторожностію; 3) примѣненія къ быту, образу жизни и разномыслию крестьянъ; 4) правилъ о попеченіи и ходженіи за роженицами, роженицами и новорожденными и пр. 5) наставленія объ оживленіи скоропостижно мною умершихъ и т. п.

Штабъ-Лѣкаря и Акушера

Надворнаго Совѣтника К. Бенедиктова.

ЧАСТЬ I

БОЛѢЗНИ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ печатнѣ В. Головкина, у Владимирской церкви, домъ барона Фредерикса № 15, кв. № 3.

1866.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во вступленіи въ этотъ Самоучитель лѣченія помѣщены свѣдѣнія, необходимыя для сохраненія здоровья поселянамъ, обитающимъ въ разныхъ частяхъ нашего обширнаго отечества, какъ вообще, такъ и въ особенности, т. е. соотвѣтственно ихъ быту, званію и разнообразному мѣстожительству. Свѣдѣнія эти выражены голосомъ врачебной науки, выработанной вѣками со временъ Пппократа, отца медицины, и хотя кратки, за то положительны и вѣрны, основаны на опытѣ и очень достаточны къ выясненію того, въ чемъ состоитъ вся суть радужнаго привѣтствія: *«Будьте здоровы»*.

Цѣлительная сила природы, какъ внутренній, пребывающій во всякомъ человѣкѣ врачъ, на дѣйствіяхъ котораго основанъ весь нашъ Самоучитель, представлена, на сколько это возможно, ясно и понятно для каждаго любознательнаго читателя. Ненарушимая связь между жизнедѣятельностью нашего организма и условіями внѣшней природы, связь какъ во взаимодѣйствіи души и тѣла, такъ и въ отношеніяхъ послѣдняго къ непреложнымъ законамъ внѣшней природы, составляетъ прямой путь нашей жизни ко храму цвѣтущаго здоровья. Всякое уклоненіе отъ этой связи, какъ отъ прямого пути въ жизни, порождаетъ разстройство здоровья и служитъ источникомъ болѣзней, а возвращеніе къ ней снова приводитъ человѣка въ нормальное состояніе и лѣчитъ болѣзни какъ всѣхъ орудныхъ тѣлъ вообще, такъ и нашего организма въ частности. Въ этомъ-то и состоитъ ея предназначеніе. Но какъ она одна сама по себѣ нѣма,

гельна, подобно плывущему судну для завѣдыванія ею сложилась и об-
но развивающаяся врачебная наука,
представителей въ лицѣ врачей, почему
язанъ быть полезнымъ и наукѣ, и страж-
у человѣчеству. Въ видахъ такой пользы, желая
и съ своей стороны принести посильную лепту въ со-
кровищницу науки врачеванія, я рѣшился представить
въ этомъ Самоучителѣ лѣченія плодъ своихъ трудовъ
на долговременномъ поприщѣ уѣздной и сельской вра-
чебной практики. Состоявъ на службѣ сперва уѣзднымъ,
а въ послѣдствіи старшимъ окружнымъ врачомъ въ уѣз-
дахъ: Царевококшайскомъ, Чистопольскомъ, Мамадыш-
скомъ и Спаскомъ Казанской губерніи, я въ теченіе
своихъ двадцатипятилѣтнихъ служебныхъ занятій то и
дѣло былъ призываемъ больными поселянами для пода-
нія имъ врачебной помощи, и по необходимости долженъ
былъ изыскивать средства лѣчить ихъ способами самы-
ми простыми, соотвѣтственными цѣлебной силѣ ихъ при-
роды, и наставлять каждого изъ нихъ лѣчиться въ мое
отсутствіе. Незабвенный московскій профессоръ нашъ
Іустинъ Евдокимовичъ Дядьковскій къ счастію научилъ
насъ назначать и брать лѣкарства не изъ однихъ аптекъ,
а изъ всей природы, въ которой предусмотрительная по-
печительность Всемогущаго Зиждителя вселенной сосре-
доточила все нужное для нашей пользы и къ нашему
удовольствію.

Порядокъ (система) болѣзней и ихъ патологическое
описаніе въ этомъ Самоучителѣ лѣченія, собственно при-
надлежащіе названному мною профессору, но вошедшіе,
что называется, въ плоть и кровь каждого изъ учени-
ковъ его, представлены мною ясно и удобопонятно для
каждого, съ незначительною обработкою, исправленіемъ
и пополненіемъ въ примѣненіи къ быту поселянъ, какъ
наприм. въ истерикѣ и ипохондріи, которыя въ сельскомъ
простомъ народѣ также имѣютъ свое особое проявленіе

и несправедливо приписываются исключительно кругу городских жителей. Таким образом, доступнаго и безошибочнаго распознаванія болѣзней и соотвѣстнаго имъ врачебнаго пособія въ томъ крайнемъ случаѣ, когда нѣтъ врача, я счелъ наилучшимъ расположить свой простой и согласный съ природою способъ лѣченія по системѣ болѣзней Дядьковского, которая была для меня яркимъ свѣтиломъ при составленіи этой книги.

На первомъ планѣ изложеннаго въ моемъ Самоучителѣ діететическаго и существеннаго лѣченія болѣзней выставлены средства, въ цѣлебности которыхъ я былъ убѣжденъ на дѣлѣ (de facto) изъ ихъ логическаго, нравственнаго и физическаго употребленія. Немаловажными пособіями при выборѣ означенныхъ средствъ служили мнѣ сельскій лѣчебникъ, Бухана, болѣе столѣтія съ пользою употребляемый въ селахъ нашего отечества, за неимѣніемъ по близости врачей, народно-врачебная газета «Другъ Здравія», въ которой врачи со всѣхъ сторонъ обширной Россіи, болѣе чѣмъ въ теченіе 20-ти лѣтъ, сообщали о своихъ успѣхахъ въ мѣстномъ и специальномъ лѣченіи болѣзней по быту и званію простонароднаго люда. Не менѣе того способствовала мнѣ въ этомъ отношеніи и народная медицина доктора Чаруковскаго. На второмъ и болѣе отдаленныхъ планахъ въ отдѣлахъ существеннаго лѣченія болѣзней приведены и всѣ прочія цѣлебныя средства, предложенныя разными врачами, какъ простонародныя въ родѣ яичной перепонки В. Даля отъ перемежающейся лихорадки, такъ и обычныя народныя для дальнѣйшихъ надъ ними наблюденій и повѣрокъ, въ какой степени они своею пользою могутъ оказать услугу врачебной наукѣ и страждущему человечеству.

Зная изъ опыта, какъ на себѣ такъ и на другихъ, до какой степени затруднительно положеніе больного при рѣдкихъ посѣщеніяхъ его врачомъ, а тѣмъ болѣе боль-

, страдающаго, за неимѣніемъ по близости врача, безъ всякаго врачебнаго пособія, я старался облегчить это затрудненіе, чтобы по мѣрѣ возможности быть полезнымъ и такимъ больнымъ, и наукѣ. Такова главная цѣль моя. Но разрѣшилъ ли я свою задачу и въ какой степени — представляю это на судъ образованныхъ врачей и просвѣщенной публики. По современному состоянію врачебной науки, я многое собралъ въ одно цѣлое и привелъ къ одному знаменателю въ настоящемъ Самоучителѣ спеціальнаго сельскаго лѣченія, открывающемъ, между прочимъ, полную возможность лицамъ духовнаго званія, въ крайнихъ случаяхъ, подавать, за отсутствіемъ врачей, простую врачебную помощь своимъ прихожанамъ.

Сочинитель.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПРЕДМЕТОВЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ВСТУПЛЕНІЕ

| | страницы. |
|--|-----------|
| Народное опредѣленіе сельскаго лѣчебника | 1 |
| Неправильность этого опредѣленія и важность предмета, условливающая сельскихъ священниковъ подавать простую врачебную помощь своимъ прихожанамъ. | 2—3 |
| Внутренняя жизнь человѣка, какъ главный источникъ его здоровья и болѣзней, и значеніе священника, какъ врача и совѣтника, для сохраненія здоровья его прихожанъ и предотвращенія болѣзней въ этомъ ихъ источникѣ | 3—6 |
| Внѣшняя жизнь человѣка, состоящая въ безусловныхъ отношеніяхъ къ обрुшающей его природѣ. | — |
| Главные отношенія поселяннина къ внѣшней природѣ или его потребности | 6—7 |
| Пища, ея раздѣленіе на животную и растительную и показанія къ назначенію употребленія той и другой. | 8 |
| Раздѣленіе пищи растительной. | — |
| Крахмальная пища и значеніе ржаного и пшеничнаго хлѣба. | 8—9 |
| Вредное дѣйствіе мягкой, теплой и горячей крахмальной пищи на наше тѣло. | — |
| Сахарная и кислая растительная пища — плоды. | 11 |
| Полезное и вредное дѣйствіе плодовъ на наше тѣло. | — |
| Медъ и выжатая масла, ихъ употребленіе и дѣйствіе на наше тѣло въ простомъ быту. | 11—12 |
| Зависимость доброты и прочности, какъ растительной такъ и животной пищи. | 12—13 |
| Причины, по которымъ растительная пища дѣлается вредною. | — |
| Болѣзни хлѣбныхъ, преимущественно ржаныхъ, зеренъ и зеленаго вредное дѣйствіе ихъ на здоровье и происходящія оттого болѣзни. | — |
| Порча хлѣбныхъ зеренъ, очищенныхъ и хранимыхъ въ амбарахъ; вредное дѣйствіе хлѣба изъ такихъ зеренъ и происходящія оттого болѣзни | 14 |
| Причины, по которымъ мука дѣлается вредною. | — |
| Причины, по которымъ испеченный хлѣбъ можетъ быть вреденъ. | 15 |

| | |
|---|---------|
| огородная зелень, хранимая въ пог- | 15 |
| | 16 |
| состояніи тѣла и случаи къ назначе- болѣзненнымъ. | — |
| студени на наше тѣло и болѣзненные случаи, въ вредна и въ какихъ полезна. | — |
| Дѣйствіе мясной пищи вообще и въ особенности баранины, дикихъ козъ, зайца, оленя, серны, сухопутныхъ дикихъ птицъ и случаи назна- ченія къ употребленію ихъ. | 17 |
| Дѣйствіе рыбы вообще и въ особенности окуня, ерша, судака, со- леныхъ селедокъ и килекъ. | — |
| Причины, по которымъ мясо дѣлается вреднымъ. | ✓ 18—19 |
| Приготовленная и приправленная пища, какъ то: щи, супъ, вареное мясо, соусы, каша, мясо жареное, душеное, копченое и соленое, вет- чина, солонина, копченая и соленая рыба, особенно сырая и соленая бѣлужина, масло, жиръ, свиное сало; ихъ полезное и вредное дѣйствіе на здоровье и совѣтъ осторожности противъ послѣдняго. | 19—21 |
| Питье — вода, какъ преимущественный напитокъ. | — |
| Измѣненіе и порча воды, вредное дѣйствіе на здоровье отъ дурной испорченной теплой воды и мѣры предосторожности отъ онаго. | — |
| Вліяніе температуры воды на ея дѣйствіе и преимущество воды хо- лодной передъ теплою. | 22 |
| Вода въ соединеніи съ кислотами, какъ то: лимонадъ, оржадъ, морсъ, квасъ и сыровецъ. | ✓ — |
| Чай и дѣйствіе его на здоровье. | ✓ — |
| Диететическія правила, которыми священникъ можетъ руководствовать своихъ прихожанъ въ употребленіи пищи. | 23—24 |
| Воздухъ, его живительное и разрушительное дѣйствіе на насъ во- обще и въ частности. | 24—26 |
| Мѣры и средства, — въ предосторожность отъ вреднаго дѣйствія различныхъ воздушныхъ вліяній. | ✓ — |
| Способъ пропитанія и причины, по которымъ рабочіе люди подвер- гаются болѣзнямъ со стороны этой потребности. | ✓ — |
| Вредъ отъ сидячей жизни и польза отъ дѣятельной сельской жизни вообще, и въ частности по роду занятій поселянъ. | 27—28 |
| Мѣстопробываніе въ разныхъ частяхъ Россіи; дѣйствіе холоднаго климата на вологодскихъ русскихъ, осѣдлыхъ поселянъ, и дѣйствіе жаркаго климата на крымцевъ, астраханцевъ, грузиновъ и закавказцевъ. | ✓ 29—30 |
| Супружество, благотворное вліяніе его и гибельное дѣйствіе холостой жизни. | — |
| Вредъ отъ супружества между близкими родными и польза отъ раз- ноплеменности. | ✓ 31 |
| Возможно-близкій возрастъ, какъ условіе счастливаго брака. | — |

| | |
|---|---------|
| Правила для здоровыхъ, но слабыхъ супруговъ, желающихъ имѣть крѣпкихъ и здоровыхъ дѣтей. | 32 |
| Внѣшняя жизнь человѣка, какъ источникъ его здоровья и болѣзней, смотря по тому, будетъ ли она правильна, или неправильна. | 33 |
| Чувствительность, раздражительность, цѣлебная сила природы и зависимость ихъ разности. | 34 |
| Тѣлосложеніе, вредное дѣйствіе крѣпкого и слабаго сложенія; болѣзни, происходящія въ томъ и другомъ тѣлосложеніи. | — |
| Мѣры во избѣжаніе болѣзней, происходящихъ въ крѣпкомъ и слабомъ тѣлосложеніи и діететическое назначеніе слабымъ людямъ. | 34—36 ✓ |
| Руководство для родителей въ выборѣ ремесла своимъ дѣтямъ. | 36—37 |
| Возрастъ, его разности и особыя мѣры къ сохраненію здоровья въ дѣтскомъ возрастѣ. | ✓ — |
| Возмужалый возрастъ. | 38—39 |
| Старческий возрастъ. | 40 |
| Полъ, его разности и особые періоды женщины. | 41 |
| Появленіе мѣсячныхъ кровей, перемѣны при этомъ въ тѣлѣ и со- вѣтъ въ предотвращеніе преждевременности ихъ. | 41—42 |
| Беременность и перемѣны при ней въ тѣлѣ женщины. | 43 |
| Важность положенія беременной женщины. | — |
| Предразсудокъ больше кормить беременную и замѣчаніе относительно болѣзней во второй половинѣ беременности. | ✓ — |
| Бритическій возрастъ женщины и причины опасности въ это время. | 44 |
| Темпераментъ, его опредѣленіе и раздѣленіе. | — |
| Сангвиническій темпераментъ и его качества. | — |
| Холерическій темпераментъ и его свойства. | 45 |
| Болѣзни, которымъ подверженъ холерикъ. | 46 |
| Мѣры, состоящія въ ограниченіи развитія холерическаго темперамента и въ предотвращеніи воспалительныхъ болѣзней. | ✓ 47 |
| Меланхолическій темпераментъ и его свойства. | — |
| Болѣзни, которымъ подверженъ меланхоликъ. | 48 |
| Предохраненіе меланхолика отъ его болѣзней. | 49 |
| Флегматическій темпераментъ и его свойства. | 49—50 |
| Болѣзни, которымъ подверженъ флегматикъ. | 51 |
| Предохраненіе флегматика отъ его болѣзней. | — |
| Невыгоды чистыхъ темпераментовъ, польза смѣшенія ихъ и мѣра въ достиженію последней. | 51—52 ✓ |
| Содержаніе себя относительно предразсудковъ и проч. | 53 ✓ |
| Потребность для священника особыхъ свѣдѣній для оказыванія врачебной помощи въ болѣзняхъ, намчаще случающихся между поселянами изъ его прихожанъ, преимущественно въ простомъ быту. | 55 |
| Опредѣленіе Самоучителя сельскаго леченія. | 56 |
| Предметъ его. | — |
| Цѣль. | 56—62 |

| | |
|--|----|
| Порядокъ или система. | 62 |
| Раздѣленіе всехъ вообще болѣзней | — |

ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

| | |
|--------------------------------|-------|
| Болѣзни лихорадочныя | 63—64 |
|--------------------------------|-------|

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ

| | |
|--|----------|
| Воспаленія (Phlegmasiae). | 65 |
| Чирей, вѣредъ (Furunculus). | ✓66—70 |
| Одинокій и стадовой (solitarius et gregarius). | |
| Огневикъ (Anthrax). | 70—78 |
| Частный, народный и повальный (sporadicus, endemicus et epidemicus). | |
| Нарывъ (Abscessus). | 78—82 |
| Горячій и холодный (calidus et frigidus). | |
| Въ легкихъ (A. pulmonum). | ✓82—85 |
| Ноготѣда (Paronychia). | 85—91 |
| истинная и ложная (P. vera et spuria). | |
| Рожа красная (Erysipelas). | 91—102 |
| первоначальная и послѣдовательная (Prothopaticum et deuteropaticum). | |
| гладкая, пузырьчатая и нарывная (Laevigatum, vesiculatum et apostematosum). | |
| постоянная и ползучая (fixum et serpens). | |
| воспалительная и гнилостная (synochale et typhosum). | |
| у новорожденныхъ (neonatorum). | ✓100—102 |
| Рожа бѣлая (Leucophlegmone). | 102—109 |
| лѣтняя (aestivum). | |
| ядовитая (venenatum). | |
| венерическая (venereum). | |
| нахлѣчка (Phymosis). | |
| удавка (Paraphymosis). | |
| Околоушница (Parotis). | ✓109—113 |
| тѣльная (P. sarcosa). | |
| первообразная, отложительная и переносная (Prothopatica, apostatica et metastatica). | |
| нервная (P. nervosa). | |
| Ушное воспаление (otitis). | ✓113—117 |
| наружное и внутреннее (O. externa et interna). | |
| Внутреннее головное воспаление (Phrenitis). | 117—130 |
| лихорадочное (острое) (Ph. acuta). | |
| нелихорадочное (хроническое) Phr. chronica, mania. | |

| | |
|--|---------|
| Внутреннее спинное воспаление (Phrenitis dorsalis). | 130—131 |
| Жаба зѣва (Antiaditis). | 131—140 |
| Воспаление дыхательнаго горла, перепончатая жаба, крупинъ. (Tracheitis, angina membranacea). | 140—149 |
| легкихъ (Pneumonitis). | 149—157 |
| истинное (P. vera). | |
| ложное (P. notha). | 157—159 |
| подреберной плевы, колотье (Pleuritis). | 159—167 |
| бoboвое — правое и лѣвое, переднее и заднее или спинное. | |
| сердца и его сумочки (carditis et pericarditis). | 167—170 |
| грудобрюшной преграды (Diaphragmitis). | 170—171 |
| печени (Hepatitis). | 171—178 |
| лихорадочное (H. acuta). | |
| наружное, или верхнее и внутреннее, или нлжнее. | |
| неллхорадочное (H. chronica). | |
| явственное и скрытное (aperta et occulta). | |
| селезенки (Lienitis). | 178—179 |
| желудка (Gastritis). | 179—184 |
| кишечъ (Enteritis). | 184—191 |
| лихорадочное и неллхорадочное (E. acuta et chronica). | |
| брюшины (Peritonitis). | 191—194 |
| матки (Metritis). | 194—199 |
| лихорадочное и неллхорадочное (M. acuta et chronica). | |
| мочеваго пузыря (urocisticis). | 199—203 |
| лихорадочное и неллхорадочное (acuta et chronica). | |
| почекъ (Nephritis). | 203—206 |
| лихорадочное и неллхорадочное (N. acuta et chronica). | |
| Ревматизмъ (Rheumatismus). | 206—222 |
| лихорадочный, — ревматическая, ломотная горячка (Fbris Rheumatica). | |
| неллхорадочный (R. chronicus). | |
| затылочпо-шейный. | |
| лпчной (Proosopalgia). | |
| зубной и челюстный (Odontalgia). | |
| межреберный (R. intercostalis). | |
| спинной (R. dorsalis). | |
| ладонный и подошвенный. | |
| поясничника и вертлужника (Psoitis et Ischias). | |
| Глазовоспаление (Ophthalmia). | 222—232 |
| обыкновенное (O. communis). | |
| первоначальное (O. Idiopatica). | |
| последовательное (Symptomatica). | |

КЛАССЪ ВТОРОЙ.

| | |
|---|-----------|
| Лихорадочные сыпи | 233—234 |
| Молочница (Aphthae) | ✓ 234—239 |
| первоначальная и последовательная (idiopatica et symptomatica). | |
| Крапивная сыпь (urticaria) | ✓ 239—242 |
| Пузырчатая сыпь (Pemphigus) | ✓ 242—245 |
| Простая сыпь (Miliaria) | 245—248 |
| Оспа натуральная настоящая (variola) | 248—258 |
| > натуральная ложная внутренняя (varicella) | 258—259 |
| > натуральная, видоизмененная (varioloidea) | 260—261 |
| > предохранительная настоящая (vaccina) | 261—266 |
| > предохранительная ложная | 266—269 |
| > предохранительная видоизмененная | ✓ 269—270 |
| Борь (Morbilli) | ✓ 270—277 |
| Краснуха (Rubeola) | 277—278 |
| Скарлатина (Scarlatina) | ✓ 278—286 |
| > простая и съ жабою (S. simplex et anginosa). | |

КЛАССЪ ТРЕТІЙ.

| | |
|---|-----------|
| Лихорадки вообще (Pyrexiae) | 286 |
| Горячки (F. continuae) | 287 |
| > воспалительная (F. Inflammatoria) | ✓ 288—296 |
| > чистовоспалительная (F. Mere-inflammatoria). | |
| > желчно-воспалительная (F. bilioso-inflammatoria) | 296—299 |
| > мокротно-воспалительная (F. mucoso-inflammatoria) | ✓ 299—302 |
| > гнилая (Febris putrida) | 302—311 |
| > желчно-гнилая (F. Bilioso-putrida). | |
| > мокротно-гнилая (F. mucoso-putrida). | |
| > нервно-гнилая (F. nervoso-putrida). | |
| > нервная (Febris nervosa) | 311—323 |
| > чисто-нервная (F. mere-nervosa). | |
| > воспалительно-нервная (F. inflammatorio-nervosa). | |
| > гнило-нервная (F. Putrido-nervosa). | |
| Лихорадки (Febres) | — |
| > Припадочные (F. symptomaticae) | 323—326 |
| > нервная медленная (Febris nervosa lenta). | |
| > чахоточная (F. phthisica). | |
| > изнурительная (F. Hectica). | |
| > Перебегающая (F. intermittentes) | 326—347 |
| > ежедневная (Quotidiana). | |
| > трехдневная (Tertiana). | |

- Лихорадки четырехдневная (Quartana).
 > еженедельная (Septimana, Hebdomana).
 > двойная (Duplex, duplicata).
 > неправильная и маскированная (irregularis et Larvata).
 > южно-крымская.

КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

- Слизетечения (Phlegmorrhagiae). 347
 Катарры (Catarrhus).
 > носовой — насморкъ (C. nasalis). 347—351
 > грудной — простудной кашель (Tussis catharrhalis). 351—359
 > дыхательного горла (C. Trachealis).
 > легочный (C. Bronchialis).
 > простой (simplex).
 > заразительный (contagiosus).
 > Гриппъ (influenza) 359—360
 > коклюшь (Tuss. convulsiva) 360—367
 Натужный кровавый поносъ (Dysenteria). 367—375
 частный (D. sporadica).
 народный (D. Pandemica).
 > простой и заразительный (simplex et contagiosa).
 > дѣтскій 375—377



ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

| Стр. | Стр. | Напечатано: | Должно читать: |
|------|------|----------------------|----------------|
| 112 | 5-я | снизу 72 | 74 |
| 116 | 4-я | » 91 | 92 |
| 117 | 7-я | » 90 | 91 |
| 156 | 22-я | сверху 163 | 143 |
| 169 | 12-я | снизу 90 | 91 |
| 177 | 2-я | сверху 79 | 74 |
| 231 | 20-я | снизу 153 | 156 |
| » | » | » 156 | 153 |
| 239 | 9-я | сверху 178 | 176 |
| 244 | 16-я | снизу 144 | 149 |
| 253 | 14-я | » 94 | 84 |
| 254 | 11-я | » 72 | 7 |
| 311 | 12-я | сверху 88 | 38 |
| 319 | 2-я | снизу 185 | 186 |
| 320 | 19-я | сверху 186 | 187 |
| 332 | 10-я | » 188 | 189 |
| » | 16-я | » 189 | 190 |
| » | 17-я | » 190 | 191 |
| » | 18-я | » 191 | 192 |
| » | 5-я | снизу 192 | 193 |
| 333 | 1-я | сверху 193 | 194 |
| » | 3-я | » 198 | 199 |
| 341 | 7-я | » 188 | 189 |
| » | 11-я | » 193 | 195 |
| » | 14-я | » 194 | 196 |
| 343 | 21-я | » 188 | 189 |
| 345 | 19-я | » 197 | 199 |
| » | 10-я | снизу 198 | 201 |
| 350 | 18-я | сверху 199 | 202 |
| 351 | 21-я | снизу 199 | 202 |
| 356 | 17-я | » 199 | 202 |
| 364 | 22-я | снизу 200 | 203 |
| 367 | 9-я | » 195 | 197 |
| 374 | 5-я | сверху 121 | 122 |

ВСТУПЛЕНИЕ.

Благослови душе моя Госда и не забывай всихъ воздающихъ Егѡ, исцѣляющаго вса недѣги твоа, избавляющаго ѡ истиннѣи жибѡтъ твоѣ, вѣнчающаго тѣ мѣлостію и щедрѡтами, исполняющаго бо благихъ желаніе твоѣ.

(Пс. 102, 1. 3. 4—5.)

Лѣчебникомъ называютъ собраніе способовъ лѣчить болѣзни, и поэтому Сельскій Лѣчебникъ учитъ лѣчить болѣзни собственно поселянъ.

Такъ, большею частію, обыкновенно понимаютъ и опредѣляютъ люди попросту, безъ затѣй, смотря на этотъ предметъ поверхностно и не входя въ разбирательство его существеннаго значенія. Точно также, какъ попросту и безъ затѣй почти каждый добольный человѣкъ, изъ состраданія, страждущему ближнему своему охотно отерывааетъ, а часто и даетъ свои средства, чтобы помочь ему въ болѣзни, съ внутреннимъ чувствованіемъ и христіанскимъ убѣжденіемъ, что дѣлаетъ доброе дѣло, не зная и не размышляя о томъ, дѣйствительно ли это доброе его, повидимому, дѣло есть существенно доброе. То ли онъ даетъ ему, что слѣдуетъ, и такъ ли даетъ, какъ бы слѣдовало давать? Безъ этого существеннаго свѣдѣнія человѣкъ ближнему своему вмѣсто пользы дѣлаетъ вредъ; вмѣсто добра, большею частію — зло; вмѣсто помощи и облегченія въ страданіяхъ нерѣдко ускоряетъ его кончину, и ускоряетъ невинно, собственно по незнанію этого дѣла. Обоюдное

радушнѣ, съ какимъ одинъ даетъ, а другой принимаетъ средства въ мнимое облегченіе, основанное на чистой христіанской готовности (рѣдко изъ видовъ) помогать другъ другу, и самыя явныя убійственныя дѣйствія по часту прикрываютъ снисходительнымъ молчаніемъ. Роптать не на кого, была добрая воля. Надѣялись лучшаго, вышло иначе. Что дѣлать, видно Богу такъ угодно, знать конецъ пришелъ его жизни, говорятъ обыкновенно послѣ того въ утѣшеніе себѣ и стараются успокоить себя этою мыслию.

Но это безразсудно и достойно сожалѣнія. Лѣчить болѣзни не такъ легко, какъ думаютъ. Предметъ этотъ не такъ простъ, какъ его представляютъ. Если въ ремесло, какое бы то ни было, хотя бы самое простое, ремесленникъ вступаетъ не иначе, какъ по предварительномъ его изученіи, и никто самоучкой ничего такъ не сдѣлаетъ, какъ самъ ремесленникъ, а скорѣе испортитъ, чѣмъ сдѣлаетъ; то тѣмъ болѣе потребно существенное знаніе въ медицинѣ, въ составъ коей входятъ всѣ почти науки, частію для приготовленія, частію для вспоможенія, частію для существеннаго ея назначенія, такъ что едвали есть хотя одна изъ нихъ, которая бы для познанія врачу могла быть излишнею. Въ ремеслѣ взяться за что нибудь и дурно сдѣлать, либо совсѣмъ испортить, отвѣтъ не важенъ, одиѣ издержки; но въ медицинѣ подобная попытка вводитъ въ ущербъ, ничѣмъ вознаградимый. Это важное преступленіе и тяжкій грѣхъ. Намъ могутъ возразить, что ремесленное мастерство совсѣмъ другое дѣло, чѣмъ врачебное искусство, и нельзя сравнивать послѣднее съ первымъ; въ ремеслѣ все непосредственно зависитъ отъ мастера, а во врачебномъ искусствѣ цѣлительная сила природы есть главный мастеръ, врачи же суть ея управляющіе. Съ этимъ нельзя не согласиться; но завсѣмъ тѣмъ сравненіе у мѣста. Цѣлительная сила природы есть одна и та же, что и сила ея разрушительная. Она и облегчаетъ, она же въ случаѣ и затрудняетъ. Она и поправляетъ, она же въ случаѣ и портитъ. Она и оживляетъ, она же въ случаѣ и умерщвляетъ, такъ что все зависитъ отъ условій, въ какихъ находятся подчиненныя ея вліянію тѣла. Для управленія этими условіями нужны знаніе и опытность точно также, какъ на суднѣ, плывущемъ по силѣ вѣтра, парусомъ, нуженъ знающій и опытный кормчій съ правиломъ, подѣ управленіемъ

котораго судно скоро и благополучно достигнетъ пристани, а безъ него оно будетъ въ опасности: его разстронть и разобьетъ та-же сила природы, которая при хорошемъ кормчѣмъ бываетъ столь полезна и благотѣльна. Слѣдовательно цѣлительная сила природы въ болѣзни для страждущаго есть то же, что сила вѣтра для плывущаго судна съ парусомъ по вліянію самой природы: врачъ же у постели больного есть то же для него, что кормчій на кормѣ для плывущаго судна во всякомъ случаѣ, такъ что ввѣрившагося его попеченію больного онъ (врачъ) долженъ беречь, охранять, поправлять, какъ кормчій своего пассажира въ плывущемъ суднѣ на водѣ, какъ женщина, зачавшая и носящая во чревѣ плодъ свой, какъ священный залогъ, ввѣренный ему Богомъ и правительствомъ. Въ противномъ случаѣ совѣсть — внутренний судья, и презрѣніе свѣта будутъ всюду его преслѣдовать. По этому лѣченію, какъ предметомъ особой важности, должны заниматься люди избранные, знающіе, посвященные въ таинства наукъ медицины, собственно врачи. Они только могутъ, надлежащимъ образомъ, постигать сущность болѣзни, причины и способъ ея лѣченія. Съ этою цѣлію въ царствованіе Августѣйшаго Монарха Николая Павловича благотѣльное правительство, сердобольно пекущееся о благосостояніи своего отечества, умножило число врачей въ Россіи, такъ что для образованной публики и жителей городскихъ вездѣ въ городахъ ихъ достаточно; а для поселянъ въ новѣйшее время, по тщательномъ соображеніи всѣхъ мѣстныхъ обстоятельствъ, не отвергло оказывать врачебную помощь со стороны приходскихъ священниковъ, какъ пастырей словеснаго стада Христова, какъ врачей, и безъ того духовныхъ и тѣлесныхъ, и не отвергло оказывать оную способомъ, болѣе или менѣе для нихъ возможнымъ, удобнымъ и доступнымъ за неимѣніемъ по близости врача, или если врачъ не можетъ часто навѣщать больныхъ ихъ прихожанъ.

Образованіе священника достаточно въ удовлетворенію этой цѣли. Онъ, изучивъ природу и человѣка болѣе нравственно, психически (a priori), довольно знаетъ ихъ и физически изъ наукъ естественныхъ (a posteriori). Ему извѣстно, что человѣкъ есть символъ природы, что въ немъ живо отражается весь міръ: въ одномъ его существѣ сосредоточиваются всѣ силы и совершенства различ-

ныхъ царствъ природы: что онъ есть цвѣтъ Творенія и поставленъ на пограничной чертѣ дѣйствительнаго, чтобы изыскивать начало, первое основаніе всѣхъ существъ и возвышаться къ созерцанію вѣчнаго; что въ немъ два начала: нравственное и физическое, душа и тѣло. Первая, какъ духовная, мыслящая, свободная, идеально-дѣятельная, безсмертная, вѣчная сила, есть главная (принципъ его); а послѣднее, какъ подлежащій органъ (субстрактъ), есть его орудіе, которымъ онъ владѣетъ и посредствомъ котораго онъ имѣетъ самобытное вліяніе на природу и чрезъ то входитъ въ соотношеніе съ внѣшними предметами, такъ что человѣкъ занимаетъ средину между вещественнымъ и духовнымъ мірами. Но тѣло приковываетъ его къ землѣ, отъ тѣла происходятъ всѣ несовершенства и слабости, и въ этомъ смыслѣ онъ, подобно растеніямъ и животнымъ, есть чадо земли, зависящее отъ владычества стихій и силъ физическихъ, связанное безконечными отношеніями, недолговѣчное, всегда близкое къ разрушенію. Душа напротивъ открываетъ ему новый совершеннѣйшій міръ, расширяетъ предѣлы его бытія, свободно переноситъ его во всѣ времена и пространства и сближаетъ съ Божествомъ. Словомъ: душа влечетъ его къ идеальному, тѣло приковываетъ къ вещественному; и въ этомъ-то взаимно дѣйствіи, въ этомъ-то сопряженіи безконечнаго съ конечнымъ, небснаго съ земнымъ, состоитъ сущность человѣка. И такъ сущность человѣка священнику совершенно извѣстна. Не менѣе того ему извѣстенъ и самый образъ проявленія внутренней жизни его. Это непрерывное бореніе между душою и тѣломъ. Изъ преодоленія или перевѣса той или другой силы легко ему объяснить всѣ его наклонности, все, что унижаетъ, или возвышаетъ его природу, всё, что возбуждаетъ въ немъ отвращеніе или пріязнь, ненависть или любовь, презрѣніе или удивленіе. Отъ преобладанія тѣла надъ душою происходятъ укориженные привязанности, пагубныя страсти, заблужденія, безразсудства, низости, пороки и злодѣянія, словомъ: всѣ несовершенства человѣческаго рода. Отъ владычества души надъ тѣломъ всѣ лучшія привязанности, высокія страсти, какъ подвиги добродѣтели и совершенства, все благородное, достойное, великое, Божественное. Полное бытіе человѣка, достойная и правильная жизнь его, состоитъ въ гармоническомъ соединеніи

этихъ двухъ началъ, т. е. когда умъ даетъ законы, а тѣло добровольно повинуется имъ: тогда человѣкъ не погружается слишкомъ въ чувственность, однакожь и не отказываетъ совершенно ея потребностямъ, не подавляетъ всѣхъ ощущений. но радостно, повергаясь на лоно міра вишняго, съ любовію взиреть на каждое твореніе, сплю уму обуздываетъ неукротимые порывы гнусныхъ страстей и такимъ образомъ представляетъ развитіе изящнаго человечества и въ отношеніи къ здоровью. Въ противномъ случаѣ, т. е. когда нѣтъ гармоническаго соединенія двухъ началъ въ жизни человѣка, — когда именно душа съ тѣломъ находятся въ дисгармоніи между собою, бытіе человѣка не полно, жизнь его при этомъ неправильна, и въ этомъ-то состоитъ главный источникъ болѣзней человѣка. Будетъ ли эта дисгармонія происходить отъ преобладанія тѣла надъ душою, что бываетъ чаще, происходятъ свои болѣзни. Будетъ ли душа излишне строго владычествовать надъ тѣломъ, что бываетъ рѣже, происходятъ свои болѣзни. Въ предотвращеніе этихъ болѣзней приличнѣе, достойнѣе и удобнѣе всего сельскимъ священникамъ, какъ врачамъ душъ и тѣлесъ, быть совѣтниками для своихъ прихожанъ въ томъ именно, дабы они старались жить полнымъ бытіемъ человѣка, — вели жизнь правильную, — въ гармоническомъ соединеніи силъ душевныхъ и тѣлесныхъ; дабы каждый прихожанинъ былъ воздерженъ, умѣренъ, блюстителемъ относительно діететическихъ правилъ и, какъ христіанинъ, подобно нѣжному благовонному растенію, обращенному къ чистому, священному свѣтилу, крѣтко устремляя взоры свои горѣ къ святой, блистающей чудною красою, странѣ, узнавалъ бы въ ней свое истинное отечество и мѣсто своего назначенія; дабы онъ помнилъ, что вся настоящая жизнь есть ничто иное, какъ странствіе путника къ святому гробу, испытаніе, приготовленіе, школа для высшаго бытія, — царство мрака и ночи, а тѣло — темница, могила души. Только при смерти она свергаетъ его съ себя, какъ бранный покровъ, чтобы воспріять его болѣе просвѣтленнымъ; свободно парить въ высшія сферы, и тамъ, за рубежомъ земныхъ трудовъ и бореній, для нея восходитъ новый торжественный день; все здѣшнее счастье кратковременно, скоропреходяще; всякое наслажденіе — одно обольщеніе чувствъ, одинъ обманчивый призракъ, мгновенно исчезающій. Никакой ви́ш-

ній предметъ не въ состояніи совершенно наполнить нашего сердца. Оттого вѣчное колебаніе, вѣчная скорбь, борьба, унываніе, любовь, надежда и какая-то неопредѣленная грусть. Тогда душа христіанина, погрузившись въ самое себя, отказавшись отъ плотскихъ наслажденій и отъ земныхъ суетъ, на крылахъ молитвы и вдохновенія возносила бы къ Богу, мужественно боролась бы со зломъ, съ страстями и похотями житейскими, и чрезъ то удостоилась бы именоваться чадомъ Божиимъ и научилась бы достойно чтить Отца Небеснаго духомъ и истиною. Если священникъ достаточно убѣдитъ своихъ прихожанъ въ этомъ достойномъ содержаніи себя по правиламъ православной вѣры, то хорошая нравственность поведетъ ихъ къ правильной внутренней жизни, какъ главному основанію цвѣтущаго здоровья, упроченіе котораго, по предохраненію отъ болѣзней со стороны нравственности, удаленію ихъ причинъ и леченію, зависитъ отъ образованія священника и личнаго его достоинства, какъ врача собственно духовнаго во всей силѣ слова.

Но священнику достаточно извѣстна и виѣшняя физическая жизнь человѣка собственно по отношенію его къ виѣшной природѣ. Эта виѣшняя относительная жизнь наша есть постоянная борьба, колебаніе между свободою и необходимостію, между внутреннею, самобытною рѣшимостію и виѣшнею зависимостію. Человѣкъ во всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ обнаруживаетъ стремленіе мысли уничтожить границы между внутреннимъ и виѣшнимъ существомъ своимъ, водворить единство между дѣйствительнымъ и идеальнымъ и составить нѣчто нераздѣльное со вселенною, которой онъ членъ; а природа, напротивъ, какъ вѣрная постоянная и непреложная блюстительница законовъ Зиждителя вселенной, въ твореніи всего вещественнаго бытія усваиваетъ и подчиняетъ все себѣ, распоряжается, движетъ, сохраняетъ, разрушаетъ, возрождаетъ матеріальный составъ тѣлъ вообще и тѣло человѣка вчастности, такъ что виѣшняя жизнь человѣка состоитъ въ безусловныхъ отношеніяхъ къ окружающей его природѣ, и эти отношенія его такъ многочисленны, многообразны и многосложны, какъ дѣйствіе самой виѣшной природы.

Не выходя изъ границъ даннаго предмета, здѣсь нужно представить главныя отношенія человѣка къ природѣ по существу-

нымъ и непрерывнымъ потребностямъ въ сельской его жизни, которыми довольствуются поселяне и преимущественно ограниченный простой народъ, съ побазаніемъ вреднаго дѣйствія со стороны каждой изъ его потребностей и мѣръ предосторожности отъ онаго, который священникъ со свойственнымъ ему благоразуміемъ и кротостію можетъ преподавать своимъ прихожанамъ въ Предохраненіе ихъ отъ тѣлесныхъ болѣзней и быть для нихъ ближайшимъ врачомъ и совѣтникомъ. Потребности эти суть: *пища, питье, воздухъ, способъ пропитанія*, условливаемый бытомъ и образомъ жизни, *мѣстопребываніе, жилища, одежда и супружество*.

I. Пища. Извѣстно, что пищу мы получаемъ изъ растительнаго и животнаго царствъ, которыя, будучи сами органическаго состава, перевариваясь въ нашемъ желудкѣ, доставляютъ питательный сокъ, который близко подходитъ къ нашему тѣлу, и потому удобно вознаграждаетъ понесенную трату соковъ и укрѣпляетъ тѣлесныя силы. Но между растительною и животною пищею, въ отношеніи къ питанію тѣла, есть большая разница, какъ по качеству доставляемаго ею питательнаго сока, такъ и по дѣйствію этого сока на тѣло наше. *Первая ослабляетъ и прохлаждаетъ, а послѣдняя крѣпитъ и разгорячаетъ* наше тѣло, на чемъ и основана существенная разница между растительною и животною пищею. Сообразно этому первая назначается тамъ, гдѣ нужно ограничить питаніе тѣла и образованіе густой крови, умирить жаръ и прохладить тѣло, остановить накопленіе жира и тучность, т. е. въ болѣзняхъ преимущественно лихорадочныхъ (острыхъ); а послѣдняя, т. е. *животная пища, предписывается* тогда, когда нужно усилить питаніе отошалаго тѣла, пополнить потерю крови, ускорить ея образованіе, сдѣлать ее гуще и плотнѣе, умножить жаръ и возбудить развитіе внутренней теплоты тѣла, оживить силы, изнемогшія отъ тѣлеснаго или умственнаго продолжительнаго напряженія, или послѣ тяжкихъ болѣзней, сообщить ему полноту, сочность и плотность, т. е. въ холодное зимнее время и въ холодныхъ странахъ, для слабыхъ дѣтей, дряхлыхъ стариковъ, людей хилыхъ, малокровныхъ, худосочныхъ, бесильныхъ, вялыхъ духомъ и тѣломъ, флегматиковъ и частію меланхоликовъ, для золотушныхъ, выздаравливающихъ послѣ тяжкихъ лихорадочныхъ

болѣзней и во многихъ нелихорадочныхъ (хроническихъ) недугахъ.

Растительная пища, относительно главнѣйшихъ питательныхъ ея составныхъ частей, раздѣляется на *крахмальную* (мучнистую), *слизистую*, *сахарную* и *кислую*, изъ коихъ къ первой, т. е. *крахмальной* принадлежатъ: рожь, пшеница, ячмень, рисъ, овесъ, греча, просо, сарацинское пшено, горохъ, бобы, чечевица, кукуруза; къ нимъ причисляютъ еще каштаны и картофель по содержащемуся въ нихъ большому количеству крахмала, также саго, небольшія круглыя зерна, добываемыя изъ сердцевины пальмъ, и салепъ, нѣчто въ родъ мелкаго картофеля, доставляемаго корнемъ растенія кукушки; къ второй, т. е. *слизистой* пищѣ, принадлежатъ растенія: ежовникъ, козелецъ, пусторнагъ, рѣпа, рѣдька, лугъ, салатъ, цикорій, лебеда, шпинатъ, портулакъ, спаржа, сельдерей, капуста, щавель, молодая крапива, разныя породы грибовъ и пр. Сюда же причисляютъ, по преимущественному содержанію слизи предъ сахаромъ, зеленый горошекъ и бобы, цвѣтную капусту, артишоки, морковь, свеклу, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, также различныя плоды садовыхъ деревьевъ; а къ послѣдней, т. е. *сахарной* и *кислой*: плоды (фрукты) многихъ садовыхъ деревьевъ и дико произрастающихъ растеній, какъ-то: яблоки, груши, бергамоты, винныя ягоды, сливы, померанцы, апельсины, лимоны, виноградъ, абрикосы, персики, вишни, клюкву, бруснику, рябину и проч. Имѣя въ виду специальное сбереженіе здоровья частныхъ лицъ между прихожанами сельскаго священника, считаемъ нужнымъ предварительно сказать о различномъ частномъ дѣйствіи и пользѣ наиболѣе употребляемой народомъ пищи преимущественно относительно назначенія ея въ разныхъ случаяхъ, подлежащихъ описанію даннаго предмета какъ въ здоровомъ, такъ и болѣзненномъ состояніи поселанина.

Крахмальная пища. Крахмаль самая прочно-питательная часть растительной пищи и въ изобиліи находится въ вышеисчисленномъ зерновомъ хлѣбѣ. *Ржаной хлѣбъ* горячитъ болѣе пшеничнаго, и человѣкъ, утолившій имъ свой голодъ, не такъ скоро чувствуетъ новый позывъ на ѣду, какъ послѣ пшеничнаго; поэтому ржаной хлѣбъ особенно полезенъ въ зимнее время и въ холодномъ

климатъ, отчего онъ и составляетъ обыкновенную пищу сѣверныхъ жителей Россіи особенно завологодцевъ. *Хлѣбъ пшеничный* сваривается въ желудкѣ легче ржаного и даетъ жидкій питательный сокъ, который не горячитъ, но даже прохладяетъ, и особенно полезенъ въ жаркое время и въ жаркомъ климатѣ: потому онъ напротивъ составляетъ обыкновенную пищу южныхъ жителей Россіи, какъ то: малороссіянъ, новороссіянъ, бессарабцевъ, кавказцевъ, особенно южныхъ крымцевъ, астраханцевъ, грузиновъ и закавказцевъ.

Но, какъ пшеничный, такъ и ржаной хлѣбъ, мягкій теплый и даже горячій, ѣдомый съ горячимъ супомъ, щамъ, или съ масломъ, переваривается трудно въ желудкѣ, превращается въ комковатое тѣсто, которое производитъ давленіе подъ ложечкою, и потому въ нѣкоторыхъ странахъ публичная продажа горячаго, теплаго и даже мягкаго хлѣба воспрещена закономъ. Подобно мягкому и теплomu хлѣбу, но еще вреднѣе, особенно при продолжительномъ употребленіи и вмѣстѣ съ другими трудноваримыми приправами, дѣйствуютъ разные составы, приготовляемые изъ муки, какъ то: *блины, клѣцки, вареники, оладьи* и разные пироги, булебяки, всякое сдобное, слоеное и вообще тѣсто, не подвергаемое надлежащему броженію и закваскѣ.

Сахарная и кислая растительная пища. Сюда принадлежатъ плоды, какъ то: кислыя, жесткія и крупкія сливы и груши, нѣкоторыя вишни (сладкія и испанскія жесткія) и незрѣлыя персики. *Хорошій вкусный и здоровый плодъ* бываетъ мягокъ, нѣженъ и соченъ, сладокъ, немного кисловатъ и съ пріятнымъ собственнымъ ароматомъ. Менѣе вкусныя плоды, какъ для сообщенія имъ пріятнаго вкуса, такъ и для сохраненія ихъ на долгое время, *варятся въ сахаръ*, извѣстны подъ именемъ сухихъ и сиропныхъ сахарныхъ *варений, компота, мармелады, желе*, которые сохраняются довольно долго, легко свариваются въ желудкѣ и потому назначаются больнымъ и выздоравливающимъ. Вообще однако для варений, приготовляемыхъ въ прокъ на долгое время, берутся плоды крѣпкіе, полузрѣлыя, лучше немного кислыя, чѣмъ приторно-сладкіе, плотные и твердокшіе. Вишневое желе немного сарѣбливаетъ желудокъ, а яблочное, хорошо приготовленное, увлажняетъ и успо-

боиваетъ грудь; мармеладъ изъ сливъ легко слабить на низъ и умягчаетъ легкія; подобно сливъ дѣйствуетъ на грудь и винная ягода, но не слабить на низъ, а болѣе мягчитъ и питаетъ; вареная и моченая морошка дѣйствуетъ на мочу и славится противоцынготною силою. Всѣ почти плоды содержатъ растительную кислоту, но въ безконечно различномъ количествѣ, отъ котораго зависитъ ихъ прохладяющее дѣйствіе. Чѣмъ сочнѣе и кислѣе плодъ, тѣмъ болѣе онъ прохладяетъ, какъ то: клюква, смородина, брыжовникъ, виноградъ, лимоны, апельсины. Сокъ земляники и клубники имѣетъ особенный аромать, немного кисель и вязокъ; земляничный сокъ, будучи не такъ кисель, имѣя вяжущее свойство, для людей расположенныхъ къ накопленію слизи въ пищеварительномъ каналѣ можетъ быть вреденъ, перевариваясь трудно въ желудкѣ и причиняя запоръ на низъ; посему землянику полезнѣе ѣсть съ сахаромъ и со сливками, и то не очень часто. Шелковица, содержа въ себѣ много слизи и сахара и мало кислоты, болѣе питаетъ, чѣмъ прохладяетъ. Во многихъ другихъ плодахъ кислота бываетъ едва примѣтна и находится въ соединеніи, кромѣ сахара, со слизью и небольшимъ количествомъ крахмала. Отъ сахара, слизи и крахмала зависитъ питательность плодовъ, которыхъ кислота только прохладяетъ и пріятно успокоиваетъ, хотя и не всякаго; желудокъ у нѣкоторыхъ людей вовсе не можетъ переваривать плодовъ и не терпитъ никакой кислоты. *Арбузы и дыни* содержатъ въ себѣ много растительной воды и сахара, а *огурцы* воды; первые и послѣдніе сильно прохладяютъ и утоляютъ жажду, а при излишнемъ употребленіи производятъ даже чувство холода въ желудкѣ; дыни также прохладяютъ, при излшнествѣ — слабятъ на низъ, а арбузы гонятъ мочу. Во всѣхъ почти плодахъ кислота находится въ соединеніи съ сахаромъ и слизью, которые измѣняютъ ея качество, умѣряютъ острое дѣйствіе на желудокъ и бишки и дѣлаютъ ее пріятною, полезною, питательною и прохладяющею. Благодѣтельный промыслъ въ природѣ, соединивъ кислоту и сахаръ въ плодахъ, ограничилъ взаимное ихъ дѣйствіе и чрезъ то сдѣлалъ плоды существенно для насъ полезными; безъ этой предосторожности, частое и продолжительное употребленіе плодовъ въ пищу было бы для насъ очень вредно. Кромѣ того бла-

годѣтельная предусмотрительность Творца природы, имѣвъ въ виду главное дѣйствіе плодовъ — прохлаждающее и легко питательное — съ одной стороны производить ихъ во всемъ изобиліи и разнообразіи, въ жаркихъ странахъ и въ жаркое время, когда употребленіе плодовъ бываетъ особенно полезно, а съ другой — возбуждать въ насъ къ нимъ аппетитъ, который проходитъ съ наступленіемъ холоднаго и сыраго времени. Еще разительнѣе предусмотрительность промысла въ нашей матери природѣ замѣчается въ томъ, что она производитъ самые сочные, многоводянистые плоды именно въ безводныхъ странахъ и на песчаномъ грунтѣ земли, какъ бы для вознагражденія недостатка воды и вреднаго ея качества, какъ это мы видимъ на арбузахъ, дыняхъ, лимонахъ, кокосовыхъ орѣхахъ, любящихъ безводныя песчанныя степи и урожающихся обильно въ лѣтнія засухи.

Плоды вообще легко свариваются въ желудкѣ и даже облегчаютъ вареніе другой пищи, вмѣстѣ съ ними соединенной, если они будутъ только употребляемы умеренно; въ противномъ случаѣ и съѣденные натошакъ, они причиняютъ поносъ. Это дѣйствіе производитъ особенно виноградъ, употребляемый поутру, когда онъ еще покрытъ росой, и чрезъ то бываетъ очень полезенъ для людей, подверженныхъ запорамъ на низъ, неправильному отдѣленію желчи, завалу печени, почечую и проч. Вообще употребленіе плодовъ полезно поутру на тошакъ, и спустя 2—3 часа послѣ обѣда; въ первомъ случаѣ они уничтожаютъ расположеніе къ запору на низъ и легко слабятъ, а во второмъ способствуютъ варенію другой пищи и уменьшаютъ жаръ въ желудкѣ. По слабительному растворяющему и прохлаждающему дѣйствію плодовъ, они особенно полезны въ жаркое лѣтнее время: при исключительномъ же привычномъ ихъ употребленіи могутъ причинить слабость и даже истощеніе тѣла.

Медъ и выжатая масла. Медъ много походитъ на сахаръ, но по содержанію слизи питаетъ сильнѣе сахара. Медъ въ чистомъ его состояніи, безъ примѣси муки, легко переваривается, питаетъ и немного горячитъ; но употребленный въ излишествѣ производитъ рѣзь въ желудкѣ, пученіе живота и слабитъ низомъ; онъ способствуетъ отдѣленію мокроты въ легкихъ, но, по горячительному его дѣйствію, употребляется для этого только тогда, когда нѣтъ у

человѣка нѣкакого внутренняго жара. Для умѣренія горячительнаго качества меда, его соединяють съ уксуомъ (укусо-медъ) и употребляютъ для составленія полосканья рта, слабительнаго и прохладяющаго напитка; съ миндальной мукою медъ составляетъ очень вкусный прогъ. *Выжатая масла: конопляное, льняное, маковое, ореховое, оливковое, миндальное и кокосовое.* Первые два масла употребляются снаружи и въ пищу болѣе простымъ народомъ, но послѣдніе виды служатъ исключительно какъ приправы къ другой пищѣ, которую они умягчаютъ, притупляя ея острый или соленый вкусъ. Черезъ смѣшеніе масла съ уксуомъ, первое дѣлается растворимѣе, а послѣдній менѣе остеръ и ѣдокъ. *Ореховое и миндальное масла,* добываемыя посредствомъ одного выжиманія, очень полезны въ домашнемъ быту. Самые орѣхи, свѣжіе, хорошо питаютъ, но перезрѣлые и сухіе трудно перевариваются. Смѣсь миндальныхъ или орѣховыхъ ядеръ съ изюмомъ и на вкусъ пріятна и переваривается легко въ желудкѣ; по этой же причинѣ ядро кокосовыхъ орѣховъ смѣшивается съ сахаромъ въ шоколадъ, который оттого переваривается легко и сильно питаетъ, но возбуждаетъ и плотскую похоть, особенно когда къ нему прибавляютъ борицу и мускатный орѣхъ. *Выжатое масло,* какое бы то ни было, служа приправою другой пищѣ, уменьшаетъ ея остроту и ѣдкость, увлажняетъ кишки, желудокъ, усиливаетъ, облегчаетъ ихъ движеніе, ослабляетъ напряженіе ихъ волоконъ и способствуетъ испражненію низомъ, ослабляетъ кровообращеніе, умягчаетъ легкія и замедляетъ всасываніе.

Доброта и прочность растительной и животной пищи много зависятъ отъ рода жизни растенія и животнаго, ихъ правильнаго рращенія и созрѣванія, ихъ сродности или отчужденности отъ климата, почвы земли, воды, воздуха, температуры и проч. У насъ въ Россіи, хлѣбъ, выросшій въ южныхъ плодородныхъ, безъ удобренія земли, провинціяхъ, прочнѣе утоляетъ голодъ, явственнѣе подкрѣпляетъ силы и питаетъ тѣло, нежели хлѣбъ, выросшій въ сѣверной полосѣ Россіи, на землѣ ежегодно удобряемой искусственно навозомъ. Зелень, огородный овощъ, плоды выросшіе на свободѣ, на открытомъ воздухѣ, лучше и полезнѣе для здоровья чѣмъ парниковый овощъ, оранжерейные плоды и зелень. Кромѣ

того, растительная пища, которую сберегали долго въ сыромъ видѣ (картофель, капуста, морковь, свекловича и пр.), не смотря на ея здоровую наружность, не имѣетъ ни вкуса, ни прочности питанія свѣжей пищи; и потому гораздо здоровѣе употреблять свѣжую огородную зелень и овощъ только въ ~~лѣтнее и осеннее~~ время.

Растительная пища дѣлается вредною отъ болѣзненнаго состоянія растенія; отъ порчи и подмѣси хлѣбныхъ зеренъ, муки, хлѣба и зелени.

Ржанья зерна на стеблѣ въ низменныхъ мѣстахъ, не освѣщенныхъ солнцемъ (въ лѣсу, между горъ), въ дождливое и холодное время: 1) разращаются въ *рожки*, 2) получаютъ *медуницу*, которая засыхая портитъ зерно, 3) подвергаются *головнѣ*, появляющейся не столько на ржи, сколько на пшеницѣ и просѣ, иногда на овсѣ и ячменѣ; 4) *изгара*, появляясь въ видѣ желтобрасной пыли на стебляхъ и листьяхъ всѣхъ хлѣбныхъ растеній, истребляетъ въ зернахъ клей и крахмалъ какъ самыя питательныя части. Зелень, подобно хлѣбнымъ зернамъ, подвергается на стеблѣ разнымъ болѣзнямъ, какъ-то: 1) *Вялности*, зависящей отъ недостаточнаго влiянiя свѣта и теплоты и чаще всего оказывающейся на землi, растущей въ парникахъ, погребахъ и оранжереяхъ; 2) *Водяной болѣзни*, происходящей на зелени, растущей въ сыромъ и тѣнистомъ мѣстѣ; 3) *Сухоткѣ*, отъ недостаточнаго питанiя и чрезмѣрнаго цвѣта на растенiяхъ, или отъ множества насѣкомыхъ, пожирающихъ собѣ зелени; 4) *Зарожденiю животныхъ и червей*, въ сырыхъ и темныхъ мѣстахъ прозябанiя зелени; 5) *Помертвѣнiю*, отъ чрезмѣрнаго холода и жара, сырой, жирной почвы земли, вѣтшпихъ насилiй и проч.; 6) *Накипи*, въ видѣ слизистой муцистой оболочки, либо клейкаго, прозрачнаго сока. Хлѣбныя зерна, такимъ образомъ на стеблѣ испорченныя, причиняютъ свербѣжъ въ божѣ, судороги, корчи, помѣшательство ума, страшный позывъ на ѣду, сухое помертвѣнiе въ рукахъ и ногахъ, причемъ отдѣляются даже пальцы; словомъ: опасную нервную болѣзнь подъ названiемъ: злая корча, — злая судорога (см. эту болѣзнь). Впрочемъ, такое вредное дѣйствiе испорченныхъ хлѣбныхъ зеренъ зависитъ отъ ихъ большого количества и продолжи-

тельности употребленія такого хлѣба въ пищу. Большая зелень причиняетъ ослизненіе желудка, тошноту, иногда рвоту, но чаще поносъ.

Хлѣбныя зерна, очищенные и хранимыя въ амбарахъ, *порстаютъ, крѣтютъ, дѣлаются затхлыми, лишаются крахмала и клея* и состоятъ изъ одной шелухи. Эта порча происходитъ въ зрѣлыхъ зернахъ тотчасъ послѣ смолоченія сложенныхъ безъ провѣтриванія и сушенія, въ кучу, въ сыромъ и темномъ мѣстѣ, въ дождливую погоду, равно какъ и при дальнихъ перевозахъ зеренъ сухимъ путемъ или водою. Такія хлѣбныя зерна даютъ худую муку, изъ которой спеченный хлѣбъ бываетъ часто очень вреденъ, причиняя тошноту, поносъ, рѣзъ въ животѣ и проч. Незрѣлыя хлѣбныя зерна даютъ хлѣбъ, который причиняетъ ослизненіе въ желудкѣ, глисты, расстройство пищеваренія, водяную болѣзнь. Кромѣ того, въ хлѣбныхъ зернахъ заводятся насѣкомыя: *черный, красный и бѣлый* ржаной черви; они уничтожаютъ въ зернахъ крахмалъ и клей и сбиваютъ ихъ въ комки; также попадаютъ въ хлѣбныя зерна сѣмена *вредныхъ растений* полевой рѣдь-ки, мятлины, плевела, гологолома, буколя и проч., прозябающихъ на нивахъ вмѣстѣ съ хлѣбными растеніями и сообщающихъ хлѣбу трудноваримость и опьянительное дѣйствіе; они производятъ головную боль, слабость слуха и зрѣнія, дрожаніе членовъ и проч. Хлѣбныя зерна бываютъ смѣшаны *съ пылью, пескомъ, землею*: хлѣбъ изъ такихъ зеренъ трещитъ между зубами, бываетъ тяжелъ, трудноваримъ въ желудкѣ, причиняетъ запоры на низъ, отвердѣніе, продыравливанія желудка и проч.

Мука дѣлается вредною и оттого, что бываетъ смолота *очень крупно, либо слишкомъ мелко*. Брупная мука легко прѣтѣтъ, а мелкая трудно закисаетъ; первая даетъ хлѣбъ легкій и рыхлый, а послѣдняя тяжелый и комковатый. Хорошая мука смѣшивается иногда мельниками съ худой или замѣняется гороховою, ячменною; хлѣбъ изъ такой муки питаетъ мало и трудно переваривается, потому что пекаръ заквашиваетъ ее столько, сколько это нужно для хорошей муки, между тѣмъ какъ подмѣшанная мука требуетъ продолжительнѣйшей закваски. Въ муку попадаетъ песокъ, находившійся въ хлѣбныхъ зернахъ, или стершійся отъ мягкихъ,

новыхъ, туго и косо пущенныхъ мельничныхъ камней. Въ муку попадаютъ также случайно, или умышленно, *гипсъ, мѣлъ, свинцовыя или висмутовые бѣлыя* (въ крупчатку), *зола, квасцы, ялаппа* (въ сдобномъ хлѣбѣ городскихъ булочниковъ) и проч. Мука также легко можетъ отсырѣть, сдѣлаться протухлою, попрѣлою, въ ней рождается моль, истребляющая клей ея.

Испеченный хлѣбъ вреденъ, когда онъ худо испеченъ, долго лежалъ, и когда къ нему примѣшаны постороннія вещества. *Хлѣбъ* внутри *полый*, содержащій въ себѣ мало мякиша, зависитъ отъ мягкаго и жидкаго тѣста; хлѣбъ *сжатый* и плотный происходитъ отъ плотнаго и сухаго тѣста. *Хлѣбъ твердый* зависитъ отъ худаго приготовленія тѣста и не искуснаго направленія печнаго жара. *Хлѣбъ мокрый, тяжелый*, присадистый, не поднимающійся въ печи, зависитъ отъ худыхъ дрожжей. Подмѣсъ хлѣба производится тѣми же веществами, какъ и мука; кромѣ того, въ испеченный хлѣбъ попадаютъ иногда частицы мѣди и свинца, когда его хранятъ въ мѣдной или свинцовой не чистой посудѣ. Испеченный хлѣбъ, долго лежавшій, черствѣетъ, плѣснѣетъ, засыхаетъ и биснетъ. Всѣ такія хлѣбы неприятны вкусомъ, производятъ тяжесть въ желудкѣ, изжогу, отрыжку, рѣзь въ животѣ, трудно перевариваются и слабо питаютъ.

Зелень, собранная съ огорода и хранимая въ погребахъ, плѣснѣетъ, прѣетъ и гниетъ отъ несоразмѣрности теплоты и мѣста ея храненія. Холодъ вредно дѣйствуетъ на свѣжую зелень; мерзлая и растаявшая зелень тотчасъ переходитъ въ гніеніе, но умѣренная теплота предохраняетъ ее отъ порчи. Свѣжій виноградъ, вишни, сливы, яблоки и проч., хорошо закупоренные въ засмоленные бочки и погруженные на дно колодца, долго остаются безъ поврежденія. Также почти хорошо виноградъ бережется въ пшени, картофель въ пескѣ, и проч. Напротивъ того, плоды и сочные корни тѣмъ скорѣе прѣютъ и гниютъ, чѣмъ большее ихъ количество складывается въ одну кучу, въ которой они раздавливаются и согреваются. Чѣмъ цѣльнѣе сочные корни и фрукты, тѣмъ долѣе они берегаются: картофель, рѣпа, морковь, очищенные отъ зелени и почекъ, оцарапанные, подрѣзанные, теряютъ чрезъ испарину свой сокъ и скоро портятся; а хранимые въ сухомъ мѣстѣ теряютъ свѣ-

жесть, морщатся и вянуть; незрѣлые огурцы и грибы вкусны и питательны, а перезрѣлые не годятся въ пищу.

Молоко вообще питаетъ, прохладяетъ, освѣжаетъ и немного слабить низомъ. Въ этомъ отношеніи молоко доставляетъ человѣку тѣлесное здоровье. Продолжительное употребленіе молока приуготовляетъ чувствительность, умѣряетъ внутренній жаръ и кровообращеніе, обуздываетъ страсти. Молочная діета съ пользою употребляется при раздраженіи нервовъ у истеричныхъ и ипохондриковъ, при худосочіи, изнуреніи тѣла и пр. При покупкѣ молока нужно смотрѣть, чтобы оно не было подмѣшано мукою, мѣломъ, известью, или разведено водою. *Молочная сыворотка* прохладяетъ и слабить легко и безъ боли, но развиваетъ иногда много вѣтровъ, и потому ее можно употреблять съ примѣсью какой либо ароматной воды; она должна быть не окисшая, сладкая и свѣжая. Сыворотку также употребляютъ въ такъ называемомъ *сывороточномъ весеннемъ леченіи* разными свѣжими соками растений, отъ заваловъ брюшныхъ органовъ, легкихъ и пр.

Яйца составляютъ вообще хорошую пищу; питающіеся ими люди вырабатываютъ много крови и скоро полнѣютъ; яйца, свариваясь совершенно въ желудкѣ и всасываясь, отнюдь не горячатъ и не оставляютъ послѣ себя ничего для составленія кала и потому не возбуждаютъ испражненія низомъ; но, сильно питая и скоро вознаграждая потерю соковъ, они возбуждаютъ и плотскія вожделѣнія. Яйца, что называется, въ смятку сваренныя, самыя легкія и питательныя для тѣла употребляются въ слабости и изнурительномъ его состояніи, особенно въ слѣдствіе излишней утраты сѣмени; крутыя же или каленыя не столько легки и питательны и употребляются не иначе, какъ здоровыми людьми.

Животная студень соотвѣтствуетъ растительной слизи, скоро утоляетъ голодъ, хорошо переваривается, сильно питаетъ, не горячитъ, но непрочно поддерживаетъ тѣлесныя силы; съѣденная же въ изнѣшество, она разстроиваетъ пищевареніе, потому что не возбуждаетъ желудка, а напротивъ его разслабляетъ, не переваривается, а испражняется низомъ въ такомъ состояніи, въ какомъ она была съѣдена, быстро переходя чрезъ весь пищеварительный каналъ. Такъ особенно дѣйствуетъ сваренная въ водѣ сту-

денистая пища; но, будучи *ожарена*, она имѣетъ явственный свой вкусъ, переваривается легче въ желудкѣ, возбуждаетъ его болѣе, медленнѣе проходить кишки, доставляетъ болѣе питательнаго сока; подобно же дѣйствуетъ чистая студень, приправленная хрѣномъ, горчицею и уксусомъ. Студенистая пища, не дѣйствуя особенно на кровообращеніе, дыханіе и развитіе внутренней теплоты, бываетъ полезна для холериковъ, сангвиниковъ, для брѣпкихъ и раздражительныхъ особъ, обуреваемыхъ сильными страстями.

Мясная пища или собственно *мясо* въ надлежащемъ количествѣ и брѣпости находится только у взрослыхъ животныхъ, которыя доставляютъ черное мясо и которыхъ мышцы достигли уже полного своего развитія, отъ коего зависитъ сильная питательность мяса, его возбуждающее и брѣпительное дѣйствіе. Мясо домашняго (баранина), а еще лучше дикаго *барана* и въ особенности мясо *дикихъ козъ*, очень питательно и, подобно мясу *зайца, оленя, серны*, горячитъ и потому прилично для людей со слабымъ пищевареніемъ, изнуренныхъ тягостными и продолжительными трудами, слабаго тѣлосложенія, — для флегматиковъ, золотушныхъ и расположенныхъ къ водяной болѣзни, цынгѣ и проч. Мясо *рябчика, дрозда, куропатки, тетерьки, глухаря, перепелки, жаворонка, овсянки* и въ особенности *бекаса, дупельшица, гаршнепа и вальдишница*, хорошо переваривается, горячитъ и питаетъ, а потому особенно прилично для флегматиковъ, золотушныхъ, для людей довольно оправившихся послѣ трудныхъ болѣзней.

Рыбье мясо грѣетъ менѣе мяса животныхъ и не такъ прочно утоляетъ голодъ; переваривается труднѣе; при исключительномъ же его употребленіи обременяетъ желудокъ и скоро противѣтъ. Рыбье мясо особенно прилично для людей желчныхъ, полнокровныхъ и раздражительныхъ, но вредно для людей слабыхъ, съ разстроеннымъ пищевареніемъ, страдавшихъ перемежною лихорадкою, для флегматиковъ, золотушныхъ, цынготныхъ; оно примѣтно возбуждительно дѣйствуетъ на дѣтородные органы; но, не питая тѣла такъ хорошо, какъ говядина, рыба плохо вознаграждаетъ потерю дѣтороднаго сѣмени и другихъ соковъ. *Окунь, ершъ, судакъ* — очень вкусны и легковаримы; первые два и особенно ершъ, по своей малопитательности, въ видѣ ухи, полезны для горячечныхъ

и выздоравливающихъ больныхъ. Хорошо приготовленная соленая селедка не только сама легко сваривается, но и возбуждаетъ дѣятельность пищеваренія и аппетитъ, разрѣшаетъ слизи желудка и кишекъ и немного слабѣтъ низомъ; тоже должно разумѣть и о соленыхъ килькахъ.

Мясо дѣлается вреднымъ отъ болѣзненнаго состоянія животнаго, отъ способа его умерщвленія и отъ собственной порчи. 1. *Болѣзни, безусловно не позволяющія употреблять въ пищу мясо одержимаго или животнаго суть:* 1. *Чума рогатаго скота.* 2. *Овечій мытъ.* 3. *Воспаленіе и помертвѣніе селезенки.* 4. *Жаба и заушеница* у рогатаго скота и свиней. 5) *кровавое мочетеченіе овецъ.* Въ тѣлѣ овцы при этомъ замѣчается вялость, блѣдность, кровоточивость, вонь и гниль; 6) *Воспаленіе легкихъ,* дѣлающееся нерѣдко повальнымъ, 7) *Овечья оспа,* 8) *Водобоязнь,* 9) *Овечій лишай;* на поверхности кожи въ видѣ чешуи и трещинъ, съ происходящими въ носу отвратительными, водянистыми, широкими и глубокими язвами; 10) *Свиная пузырчатая проказа,* проявляющаяся бѣлыми, круглыми пупырышками на языкѣ и деснахъ, которыя потомъ чернѣютъ и причиняютъ сильнѣйшій визгъ съ удушьемъ и гнилой запахомъ изо рта. Кромѣ того мясо животныхъ, предъ смертію загнанныхъ, истомляемыхъ, разъяренныхъ, можетъ быть вредно, такъ наприм. мясо зайца, кабана, затравленныхъ собаками, и проч. Ловля рыбы оглушающею отравою (буголемъ, рвотнымъ орѣхомъ и пр.) дѣлаетъ ея мясо вреднымъ; равно вредны рыбы, пойманныя въ рѣкѣ, на берегу которой устроены разныя фабрики и пильныя мельницы, которая протекаетъ чрезъ мышьяковыя, мѣдныя и др. руды, — въ которой мочатъ ленъ, пеньгу, или въ которую проведены истоки изъ нужныхъ мѣстъ, свиного завода и проч. 11) *По способу умерщвленія животныхъ мясо бываетъ вреднымъ,* когда они незарѣзаны и не застрѣлены, но задавлены тенетами, или собаками, также мясо животныхъ утонувшихъ или замерзшихъ и вообще лишившихся жизни безъ потери крови, — какъ по измѣненію самаго мяса, такъ и потому, что вся кровь оставшаяся въ тѣлѣ, скоро загниваетъ и портитъ здоровое мясо; тоже разумѣется о животныхъ, пораженныхъ молніею, которая часто устремляется въ воду и убиваетъ

множество рыбы. III. *Собственно порчи мяса* бываетъ отъ времени года, теплоты, сухости или сырости воздуха, мѣста его сбереженія, возраста и полноты самого животнаго; мясо молодыхъ, кормленыхъ, жирныхъ животныхъ скорѣе портится, чѣмъ старыхъ, тощихъ, неокормленныхъ; особенно скоро портится жирная свинина. Мясники иногда позволяютъ людямъ парить больные ихъ члены въ полости свѣжеубитаго животнаго, или, для сообщенія полноты тощему мясу, надуваютъ воздухомъ клѣтчатую плеву послѣдняго (особенно телятины) и бромъ неопытности, сообщаютъ иногда чрезъ мясо другимъ людямъ свои заразительныя болѣзни и проч.

Приготовленная и приправленная пища. Смѣшеніе растительной и животной пищи, производимое въ *русскихъ щахъ, супахъ, соусахъ* и пр. составляетъ вообще хорошія и питательныя блюда, въ которыхъ горячительное дѣйствіе мяса ограничивается охлаждающимъ свойствомъ огородной зелени. Русскіе *щи* и Малороссійскій *борщъ*, кромѣ прочной своей питательности, отличаются разрѣшающимъ, охлаждающимъ и слабительнымъ дѣйствіемъ, зависящимъ отъ капусты, свежловицы и кваса; для изнѣженныхъ людей они составляютъ довольно трудноваримую пищу, за то нерасполагаютъ ея запорамъ на низъ и ея зава-ламъ. *Борщъ*, приготовляемый съ квашеными бураками, безъ примѣси свинаго сала и не жирный, въ этомъ отношеніи здоровѣе щей, но оба не годятся при расположеніи ея развитію кислоты и вѣтровъ въ желудкѣ, при отрыжкѣ и поносѣ. *Супъ*, по своей легковаримости и слабому питанію, нежирный, приличнѣе для слабыхъ, бездѣйственныхъ людей, для ученыхъ, служащихъ и вообще для ведущихъ сидячую жизнь. Чистый говяжій отваръ (бульонъ), или съ прибавленіемъ сочныхъ корней, либо крупъ, легковаримъ и питателенъ; хорошій твердый *бульонъ*, прибавленный ея супу, значительно усиливаетъ питательность послѣдняго; стабанъ такого бульона съ сухарями составляетъ прекрасный завтракъ для слабыхъ людей. Жирный супъ столь же трудно переваривается въ желудкѣ, какъ и жирное вареное мясо, котораго варимость облегчается жеваніемъ и прилитіемъ ея нему слюны. *Соусы* составляютъ средину между вареною и жареною пищею; въ діететическомъ смыслѣ они

совершенно излишни, а по влиянію ихъ на пищевареніе въ желудкѣ даже вредны. *Каша* полугустая и крутая, особенно гречневая, легко переваривается въ желудкѣ и хорошо питаетъ; примѣсь молока или масла увеличиваетъ ея питательность, но уменьшаетъ легковаримость. *Жареное мясо* сохраняетъ весь свой вкусъ, сочность и питательность, которыя еще увеличиваются развитіемъ на огнѣ мясного аромата и прибавленіемъ къ нему масла или жира. Жареное мясо удобоваримѣе и питательнѣе варенаго; но будучи слишкомъ напитано пригорѣлымъ масломъ или жиромъ, оно горячитъ и легко возбуждаетъ изжогу, жаръ и тягость въ желудкѣ; такъ дѣйствуетъ мясо, поджаренное на сковородѣ. Мясо *жареное на вертелѣ* особенно сочно, вкусно и питательно, если оно неслишкомъ пригорѣло. Мясо *душеное*, размягченное въ собственномъ сокѣ и водяномъ парѣ, удерживающее въ свои питательныя части, вкусно, мягко и легковаримо. *Копченое* и *соленое* мясо отличается своею трудноваримостію въ желудкѣ, слабымъ питаніемъ и горячительнымъ дѣйствіемъ; оттого *ветчина* и *солонина* особенно полезны въ зимнее время и не годятся лѣтомъ; притомъ въ ветчинѣ въ жаркое время легко развивается въ излишествѣ жирная кислота, а въ недосоленной и недокопченной могутъ быть трихины, вредныя для здоровья; солонина же подвергается гнилости, или же отъ излишества въ ней соли и селитры теряетъ вовсе свое питательное качество. *Копченая и соленая рыба* могутъ быть употребляемы только изрѣдка, какъ приправа къ обѣду, съ перцемъ, уксусомъ, лимономъ и пр. Нужно замѣтить, что *сырая соленая бѣлужина ядовита*. Но благоразуміе требуетъ, при покупкѣ всякой другой соленой рыбы, которой происхожденіе не извѣстно, подвергнуть ее предварительному испытанію, давъ нѣсколько кусковъ такой рыбы собакамъ, и если послѣдняя, съѣвъ, не извергнетъ ее скоро рвотою и не покажетъ никакихъ признаковъ ни безпокойства, ни нездоровья, то такую рыбу безопасно можно употреблять въ пищу и людямъ, и то *непрямѣнно вареную, но не сырую*. *Масло, жиръ, сало* свиное составляютъ приправу къ пищѣ, сами же употребляются въ пищу въ маломъ количествѣ, кромѣ свѣжаго масла. У малороссіянъ свиное сало замѣняетъ масло, а часто и мясо; съ такою же цѣлію коренные русскіе жители употребляютъ *жиръ гусиный, бараній, го-*

вяжій; всѣ эти три приправы перевариваются трудно и питаютъ слабо; у людей слабыхъ легко причиняютъ тяжесть въ желудкѣ, отрыжку, тошноту и поносъ. Изъ нихъ особенно масло подвергается порчѣ, горнеть и подмѣшивается саломъ, пескомъ, мѣломъ, солью, тертымъ картофелемъ и пр. Узнать такую порчу и подмѣсъ масла можетъ всякая хозяйка, стряпуха и поваръ. Для сбереженія коровьяго масла отъ порчи на долгое время его распускаютъ на огнѣ и солятъ или смѣшиваютъ, кромѣ соли, съ мелкимъ порошкомъ изъ равныхъ частей сахара и селитры.

II. Питье. Вода есть самый обыкновенный, легкій напитокъ, особенно простолюдина, назначенный для того самою природою, удобно вездѣ находимый растеніемъ и животнымъ. Человѣкъ, исключительно употребляющій одну только воду, не только не имѣетъ нужды ни въ какомъ другомъ напиткѣ, но доживаетъ до глубокой старости и минуетъ множество болѣзней, къ которымъ располагаетъ привычное употребленіе спиртныхъ и другихъ напитковъ.

Вода подвергается различному измѣненію и порчѣ. Многія страны извѣстны нездоровостью ихъ воды, которая, по содержанію въ излишествѣ различныхъ солей, у непривыкшаго человѣка причиняетъ поносъ или запоръ: послѣднее дѣйствіе производитъ вода, содержащая ѣдкую известь и желѣзо. Ключи, вытекающіе изъ флизовыхъ горъ и известковыхъ холмовъ вообще, и большая часть колодезевъ содержатъ такую воду. *Случайно помутившуюся* воду легко можно очистить, давъ ей время отстояться, особенно въ выжженномъ внутри ведрѣ, или процѣдивъ сѣвезъ слабо-рыхлый камень. *Стоячая желтая вода*, содержащая въ растворѣ и броженіи множество растений и животныхъ, кромѣ мутности, имѣетъ тяжелый, болотный, вонючій запахъ, вообще вредна, и можетъ быть употреблена въ пищу и питье только въ крайности, и то послѣ предварительнаго ея очищенія посредствомъ мелкаго песка и угольнаго порошка: кромѣ того, подобную воду нужно смѣшивать съ небольшимъ количествомъ уксуса, лимоннаго сока, кремортартара, вина или спирта. Во всякомъ случаѣ употребленіе воды все таки должно быть умеренное, а излишнее и продолжительное бываетъ вредно для здоровья, особенно теплой.

Температура воды имѣетъ сильное вліяніе на ея дѣйствіе. Неправедливо думаютъ, будто теплая или даже горячая вода сильнѣе утоляетъ жажду, чѣмъ холодная. Даже и въ болѣзняхъ совѣтъ профессора Бога въ его врачебныхъ бесѣдахъ подѣ названіемъ «Будьте здоровы» не оправдывается на дѣлѣ. Натура русскаго человѣка къ этому непривычна, даже антипатична. *Горячая вода* волнуетъ бровь и ускоряетъ ея обращеніе, усиливаетъ испарину въ кожѣ до пота, уменьшаетъ массу жидкостей въ тѣлѣ, производитъ новую жажду и расслабляетъ тѣло. Гораздо дѣйствительнѣе въ такомъ случаѣ *вода холодная* и даже со льдомъ; во рту и въ пищеварительномъ каналѣ она поглощаетъ часть внутренней теплоты, скоро и вѣрно утоляетъ жажду, укрѣпляетъ желудокъ и кишѣи, уничтожаетъ расположеніе къ ослизненію, слабитъ низомъ, уменьшаетъ испарину и замедляетъ скорость кровообращенія. Сообразно сему и самая натура усилила въ насъ жажду къ холодной, а не къ теплой водѣ, которая въ человѣкѣ, томимомъ жаждою, производитъ тошноту, отрыжку и даже рвоту.

Вода съ кислотами доставляетъ лѣтомъ пріятное, прохладительное питье, какъ напримѣръ *лимонадъ, оржадъ, морсъ* смородинный, клюквенный, смѣсь воды съ малостью легкаго кислаго вина, вода изъ грушъ, *простой и яблочный квасъ, кислые щи* или малороссійскій сыровецъ. Послѣдніе три напитка, кромѣ утоленія жажды, по содержанію въ нихъ солода, легко питаютъ и, по своей дешевизнѣ и неподдѣльности, справедливо вошли у насъ во всеобщее употребленіе.

Чай нужно пить посредственно теплый; лучше безъ посторонней примѣси сливокъ, молока, вина, рома, какаго либо сиропа, варенья или же лимона; всѣ эти примѣси заглушаютъ пріятность чая и уменьшаютъ его дѣйствіе. Неумѣренное и продолжительное употребленіе чая ослабляетъ пищевареніе, притупляетъ чувствительность нервовъ и чрезъ то бываетъ вообще вредно. Самое приличное время для употребленія чаю есть утро, на тощій желудокъ, въ которомъ онъ растворяетъ слизь, а возбуживъ въ кишкахъ червообразное движеніе, способствуетъ испражненію низомъ.

Объяснивъ такимъ образомъ значительное число питательныхъ

веществъ, употребляемыхъ поселяниномъ въ удовлетвореніе главной потребности въ пищу и питье, по безусловному отношенію его къ внѣшней природѣ, слѣдуетъ сказать и о тѣхъ особыхъ *дietetическихкихъ правилахъ*, которыми священникъ приблизительно можетъ руководствоваться своихъ прихожанъ для поддержанія ихъ здоровья въ отношеніи къ пище и питью. 1) Имѣя въ виду, что мы ѣдимъ большею частію болѣе, вдвое и даже втрое, чѣмъ сколько нужно для поддержанія нашего существованія, нужно ѣсть меньше, сообразуясь при этомъ съ внутреннимъ голодомъ нашей природы—позывомъ на ѣду, который умоляетъ по мѣрѣ того, какъ мы удовлетворили нашей потребности, если только мы его не возбуждаемъ искусственно разными приправами и спиртными напитками, при употребленіи коихъ мы ѣдимъ, непримѣтно, чаще и больше потребнаго и преждевременно истощаемъ желудокъ перевареніемъ ненужной пищи. 2) *Человѣкъ, соблюдавшій умеренность за обѣдомъ въ пищу, послѣ обѣда не долженъ чувствовать ея нахожденія въ желудкѣ*, точно также, какъ мы не слышимъ присутствія крови въ сердцѣ и ея обращенія въ сосудахъ, не слышимъ вхожденія и выходенія воздуха въ легкія при дыханіи и т. п. 3) На время употребленія пищи, т. е. на время *завтрака, обѣда, ужина* и пр. главнымъ указателемъ можетъ и долженъ служить аппетитъ, котораго появленія нужно выжидать, а не вызывать насильственно. Неосновательно и вредно обыкновеніе, для возбужденія аппетита, предъ обѣдомъ пить водку и загусывать пряностями. Мы ѣдимъ для того, чтобы жить, а не для того живемъ, чтобы ѣсть; ежели для насъ пища дѣйствительно нужна, то аппетитъ явится и безъ возбужденій; непоявленіе же его въ извѣстное время означаетъ, что тѣло наше не израсходовало и прежнихъ матеріальныхъ запасовъ, и потому не имѣетъ нужды въ новыхъ. 4) Аппетитъ возбуждать трудами, движеніемъ на чистомъ воздухѣ, но не водкою, пряною и соленою пищею; перетерпѣвъ сильный позывъ на ѣду, мы ѣдимъ меньше и съѣденное переваривается лучше. 5) Никогда не садиться за столъ прежде, нежели мы отдохнемъ отъ усталости, успокоимся отъ душевныхъ возмущеній. Предъ обѣдомъ нужно сбросить всякое безпокойное одѣяніе, которое мѣ-

шаетъ движенію челюстей, сжимаетъ шею, грудь и особенно брюхо. 6) Отдалить отъ себя во время ѣды всѣ житейскія хлопоты и непріятности, стараться быть въ веселомъ расположеніи духа, поддерживая его пріятными разговорами. Ёсть не торопясь, разжевывая твердую пищу какъ можно мельче, глотать ее мелкими кусками, не набивая ею рта; этимъ облегчается перевариваніе пищи въ желудкѣ. Употреблять ту пищу, которая наиболѣе нравится и болѣе привычна. 7) По окончаніи обѣда, если есть привычка, или съѣдено что либо жирное въ излишествѣ, можно выпить рюмку водки или ягодной наливки, либо стаканъ вина; это избавитъ отъ неосторожнаго объяденія за обѣдомъ и облегчитъ пищевареніе. Но незатѣйливый, простой поселянинъ, собственно земледѣлецъ, питающійся молокомъ, мучнистою, слизистою пищею, иногда варенымъ мясомъ, не знающій приправъ и сложныхъ блюдъ, пьющій простую воду или квасъ, живетъ тихо и спокойно, непріхотливый въ своихъ желаніяхъ, умѣренный въ страстяхъ, довольный своимъ состояніемъ; онъ и безъ того здоровъ, счастливъ и спокоенъ.

III. **Воздухъ** есть другая важнѣйшая и необходимая потребность жизни, по которой человѣкъ находится въ безусловномъ отношеніи къ внѣшней, окружающей его природѣ, котораго вліяніе на здоровье человѣка, хотя и не такъ явственно, какъ дѣйствіе пищи, но за то, происходя безпрестанно при дыханіи и соприкосновеніи его со всею поверхностію нашего тѣла, внутреннею и наружною, въ общемъ своемъ итогѣ бываетъ благотворнѣе и гибельнѣе, нежели польза и вредъ, происходящіе отъ употребленія пищи и напитковъ. Отъ накопленія въ воздухѣ различныхъ испареній при недостаточномъ дѣйствіи солнечнаго свѣта, онъ дѣлается *сырымъ*; но воздухъ въ его чистомъ состояніи, свободно движущійся и освѣщаемый солнцемъ, бываетъ *сухой*; онъ дѣлается также сухимъ искусственно, въ жилыхъ покаяхъ посредствомъ топленія печекъ, особенно чугунныхъ и каминовъ. Воздухъ лѣтомъ и зимою вообще бываетъ сухой, а весною и осенью сырой. Сухой воздухъ есть самый здоровый. Слишкомъ однако сухой воздухъ, раздражая кровяные сосуды и ускоряя кровообращеніе, сокращаетъ періодъ жизни. *Сухой и пыльный* воздухъ дѣйствуетъ вредно на легкія и глаза,

причиняетъ упорный кашель и продолжительное воспаление глазъ. Воздухъ *сырой* и *влажный* очень нездоровъ и причиняетъ множество болѣзней, располагаетъ къ накопленію влагъ въ тѣлѣ, къ заваламъ внутренностей, водяной, цынгѣ, ревматизму, мокротному кашлю, глистамъ, золотухѣ, кровавому поносу, лихорадкамъ; онъ особенно вреденъ для выздоравливающихъ, поворожденныхъ, стариковъ, родильницъ, кормилицъ. Воздухъ, продолжительно лишенный вліянія солнечнаго свѣта, теряетъ свое живительное и возбуждающее качество и дѣйствуетъ вредно на животныхъ и людей. *Горный воздухъ*, доступный солнечному свѣту и вѣтрамъ, бываетъ напротивъ сухой и чистый, оживляетъ кровообращеніе, возбуждаетъ бодрость и брѣпость въ тѣлѣ и потому особенно полезенъ для золотушныхъ, цынготныхъ, страждущихъ зобомъ и пр. Горскіе народы отличаются красотою тѣла, счастливыми способностями ума, храбростію, здоровьемъ и долголѣтіемъ. *Лѣсной* воздухъ содержится различно, по густотѣ лѣса, роду и высотѣ его деревъ; вообще онъ бываетъ влаженъ, умеренно-прохладенъ, ароматенъ и налитанъ бальзамическими испареніями деревьевъ; онъ полезенъ однаго днемъ, нежели вечеромъ и ночью. *Воздухъ глубокихъ долинъ* бываетъ сырой, рѣдко достаточно оживляется солнечнымъ свѣтомъ, почти недоступенъ для вѣтровъ, мало содержитъ электричества, не окисляетъ хорошо крови, не возбуждаетъ сердца и мышцъ, причиняетъ скопленіе вязкихъ мокротъ въ тѣлѣ, завалы внутренностей, зобъ, золотуху и проч. Жители глубокихъ долинъ отличаются блѣдностію лица, вялостію тѣла, лѣнностію къ движенію и дремотою умственныхъ способностей. Воздухъ *низменныхъ болотистыхъ странъ* съ чернымъ или глинистымъ грунтомъ земли, густообкрытымъ болотистыми растеніями, почти постоянно бываетъ налитанъ вредными испареніями, развивающимися изъ броженія растеній и гніенія животныхъ. Эти испаренія производятъ непріятное, пронзительное чувство холода и дрожь и распространяютъ собственный гнилой болотный запахъ. Воздухъ, налитанный животными изверженіями чрезъ легкія, кожу и пр., несмотря на достаточное количество его кислорода, бываетъ однако вреденъ по содержанію въ немъ воды и углекислаго газа. Такъ при многочисленномъ собраніи людей въ

церквахъ, сходныхъ избахъ, сходныхъ зрѣлищахъ, въ тѣсныхъ людскихъ и фабричныхъ многолюдныхъ помѣщеніяхъ, воздухъ вредно дѣйствуетъ на слабыхъ людей и причиняетъ тоску, круженіе головы, стѣсненіе груди, слабость, блѣдность тѣла, трептаніе сердца, обмороки и пр.

Мѣры противъ сыраго воздуха состоятъ въ осушеніи самого воздуха и въ предотвращеніи его вреднаго вліянія. Часто курить въ комнатахъ ароматными, смоляными веществами; топить печки, особенно чугунныя; отворять часто и надолго двери, форточки, вентиляторы, — если внѣшній воздухъ сухой, а сырой только въ комнатахъ. Для защищенія себя отъ вреднаго дѣйствія сыраго воздуха полезны: теплая, сухая и плотная одежда, лучше бумажная, шелковая или суконная, какъ менѣе всасывающая воздушную сырость; опрятное содержаніе тѣла; ежедневная баня; свѣжая плотнoпитательная, мясная пища, приправленная пряными кореньями, хорошее пиво, горькое вино или водка, ежедневное движеніе на открытомъ воздухѣ предъ обѣдомъ и ужиномъ; въ странѣ болотистой не выходить на воздухъ по закатѣ солнца, не садиться и не спать на голой землѣ, на ночь одѣваться тепло и плотно, по утрамъ натирать тѣло ароматнымъ спиртомъ. Воздухъ, слишкомъ насыщенный людскими испареніями послѣ многолюднаго стеченія народа въ церкви и т. п., по удаленіи людей очищается раствореніемъ дверей и оконъ, топленіемъ печей и каминовъ, и особенно уксусными или хлоровыми кислыми куреніями, которыя также очень полезны для очищенія комнатъ, въ которыхъ лежали больные и раненые, или въ которыхъ люди долго не жили. Объ очищеніи сильно испорченнаго воздуха въ особенности будетъ говорено еще въ другихъ мѣстахъ, гдѣ говорится о сохраненіи здоровья поселянъ (см. описаніе поселянъ по ихъ быту и званію); равно какъ и о предостереженіи относительно воздушныхъ перемѣнъ (см. описаніе россіянъ по разнообразному ихъ мѣстопребыванію) и свирѣпствованія поваральныхъ болѣзней (см. предохранительныя мѣры во время появленія поваральныхъ болѣзней).

IV. Способъ пропитанія есть четвертая необходимая и непрерывная потребность, по которой человѣкъ находится въ безусловномъ отношеніи съ внѣшнею окружающею его

природою. Онъ необходимо избираетъ какой нибудь родъ жизни, которымъ условливается быть, званіе и образъ его дѣйствій. Имѣя въ виду поселянъ и преимущественно простой народъ, въ пользу котораго предназначается эта книга, мы знаемъ, что между поселянами находятся люди почти всѣхъ сословій; изъ нихъ многіе, живущіе покойно и на свободѣ, какъ напр. владѣльцы, фабриканты, агенты, закупщики, управляющіе и т. п. могутъ по своимъ удобствамъ располагать собою и дѣлами по произволу, избирая образъ жизни, какой полезнѣе, смотря по ихъ здоровью. Но люди, питающіеся собственными трудами и непосредственно находящіеся въ трудахъ, по неизбѣжнымъ причинамъ подвергаются разнымъ болѣзнямъ. Главныя изъ этихъ причинъ болѣзней ихъ суть: 1) Занятія, соединенныя съ сидячимъ образомъ жизни; 2) Занятія, требующія дѣятельной, даже утомительной жизни; 3) вредное дѣйствіе во время занятій: животныхъ, растительныхъ, минеральныхъ паровъ и газовъ и сырость.

Вредъ сидячей жизни происходитъ: отъ недостатка движенія на свободномъ воздухѣ, отъ нездоровыхъ рабочихъ жилищъ, отъ занятій и отъ безпокойнаго положенія тѣла во время работы. Мастеровые, коихъ работа требуетъ бездѣйственного положенія тѣла, занимающіеся ею съ младенчества, никогда не бываютъ брѣзгаго тѣлосложенія; на блѣдныхъ лицахъ ихъ написана слабость, ихъ ноги бываютъ кривы, станъ тѣла несоразмѣрный и носитъ на себѣ отпечатокъ ихъ ремесла; въ самыхъ пріемахъ они не ловки, особенно въ тѣхъ членахъ, которые во время работы остаются въ бездѣйствіи. Сидячая жизнь вообще усиливаетъ дѣйствіе пасочныхъ сосудовъ и ослабляетъ дѣйствіе кровяныхъ, мышцъ, нервовъ; отъ этого происходитъ блѣдность крови и кожи и пр. *Ремесла, требующія продолжительнаго стоянія* на ногахъ, замедляютъ восхожденіе крови отъ ногъ къ животу. Поселяне, ведущіе дѣятельную жизнь, какъ то: земледѣльцы, садовники, огородники, поденщики, рубители строеваго лѣса, дровосѣки, столяры, плотники, слесари, кузнецы, скороходы, полотеры, охотники, бойцы, подвержены не многимъ болѣзнямъ, потому что тѣло ихъ, такъ сказать, закаленное въ трудахъ, пользующееся свободою и чистымъ воздухомъ, неподверженное особеннымъ

вреднымъ испареніямъ, а напротивъ, часто всасывающее въ себя даже пары желѣза, крѣпительно дѣйствующіе на него, легко переносятъ и труды ихъ ремесла и вредное на него дѣйствіе постороннихъ причинъ. Эти ремесла, приводя руки въ безпрестанное движеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ приводятъ въ движеніе и грудныя мышцы, которыя въ свою очередь расширяютъ грудную полость и даютъ болѣе свободы и простора дѣйствію легкихъ и сердца, а съ ними — кровообращенію и дыханію. Оттого занимающіеся ими, отъ частаго употребленія мышечной силы, бываютъ очень крѣпки и поднимаютъ огромныя тяжести. Для людей слабо-нервныхъ, чувствительныхъ и раздражительныхъ, скучныхъ гипохондриковъ, угрюмыхъ меланхоликовъ, для истеричекъ лучшій совѣтъ есть тотъ, чтобы они возвратились къ простому роду жизни мирнаго земледѣльца: пахать и засѣвать землю, обрабатывать огородъ, садъ, разводить деревья, чистить дорожки въ саду, садить цвѣты, собирать овощи и плоды. Свобода деревенской жизни, чистый и здоровый воздухъ, легкая работа, невинныя удовольствія, спокойствіе души и тѣла, простая здоровая пища, чистая вода, хорошій аппетитъ, пріятный, крѣпительный сонъ — суть средства надежнѣйшія чѣмъ всѣ аптечныя лѣкарства, для сохраненія настоящаго и возвращенія утраченнаго здоровья и для достиженія глубокой старости и настоящаго земнаго счастья. Мясники и повара вообще бываютъ здоровы и плотны; занимаясь бойнею здороваго скота и приготовленіемъ свѣжаго мяса, они напиваются парами убиваемыхъ животныхъ и свѣжаго здороваго мяса; оттого, бывая румяны, тучны и полнокровны, подвергаются болѣзнямъ преимущественно отъ излишняго здоровья. Но работники на свѣчныхъ заводахъ отъ дѣйствія на нихъ жирной и вонючей атмосферы, наполняющей ихъ рабочія комнаты, бываютъ напротивъ блѣдны, тощи, слабы и рыхлы тѣломъ.

Прим. Кто именно изъ поселянъ по роду жизни и разныхъ работъ подлежитъ разсматриванію въ этой статьѣ, какимъ именно подверженъ оттого бываетъ болѣзнямъ, какими правилами духовное лицо можетъ руководить своихъ прихожанъ, какъ врачъ и совѣтникъ въ предосторожность отъ оныхъ, а въ случаѣ болѣзни кабую лучше для больнаго назначить діету и оказать врачеб-

ную простую помощь — о томъ въ первомъ случаѣ будетъ изложено въ особомъ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. это описаніе), а во второмъ въ описаніи каждой болѣзни порознь.

V. Мѣстопробываніе, какъ безусловная потребность нашей физической жизни, ставитъ насъ въ различныя отношенія съ внѣшнею обрѣзающею насъ природою по климату. Имѣя въ виду свое отечество, мы видимъ, что Россія, по географической мѣстности раздѣляясь на три части: сѣверную, южную и среднюю, имѣетъ три главныхъ различія въ климатѣ: холодный, теплый и умеренный. Сѣверная страна, по недостатку въ ней теплоты, сурово дѣйствуетъ на питомцевъ своихъ. Завологодцы или завологодскіе русскіе осѣдлые народы, мало освѣщаемые, мало согрѣваемые и постоянно угнетаемые холодомъ, живутъ болѣе внутренней жизнью, сосредоточивающеюся въ нихъ болѣе для достаточнаго противодѣйствія спльно нападающей на нихъ внѣшней природѣ. Организмъ ихъ развивается медленнѣе, вырастаетъ продолжительнѣе, разцвѣтаетъ, созрѣваетъ и увядаетъ позднѣе. Органическая жизнь ихъ, находясь, такъ сказать, подъ гнетомъ или прессомъ холода, вяло прозябаетъ. Соки, особенно кровь, обращающаяся въ ихъ жилахъ, съ окружности стремятся болѣе къ центру, какъ къ своему главному пристанищу. Оттого сердце и близкіе къ нему глубокіе кровеносные сосуды (артеріи и вены), а равно и всѣ внутренности бываютъ полнобровны. Южная страна напротивъ по избытку въ ней тепла привѣтливо дѣйствуетъ на своихъ питомцевъ. Южные жители, какъ то: крымцы, астраханцы, грузины и закавказцы, озаряемые свѣтомъ солнца, жарко согрѣваемые благотворною теплотою климата, живутъ болѣе наружною жизнью, выступающею смѣло изъ среды центральныхъ ихъ органовъ вдалѣ къ окружности для воспріятія большихъ щедротъ отъ покровительствующей имъ природы. Оттого организмъ ихъ развивается скорѣе, вырастаетъ быстрѣе, разцвѣтаетъ, созрѣваетъ и увядаетъ ранѣе. Органическая жизнь ихъ, находясь подъ покровительствомъ тепла, живо прозябаетъ. Соки, особенно кровь, расширяясь въ обращеніи своемъ, стремятся болѣе изъ центра къ окружности все далѣе и далѣе, скорѣе и ближе къ цѣли. Оттого сердце и близкіе къ нему бровяные сосуды (артеріи и вены), а равно и всѣ внутренности

мало и рѣдко терпятъ отъ понокрівія, словомъ: жители сѣвера живутъ и дѣйствуютъ болѣе спонцентрически, а жители юга напротивъ живутъ и дѣйствуютъ болѣе эксцентрически. Но южная страна раздѣляется по климату на двѣ полосы: жаркую и теплую; вышеупомянутые южные русскіе народы суть жители жаркой ея полосы, а малороссіяне, новороссіяне, бессарабцы и кавказцы живутъ въ тепломъ климатѣ; жители же средней части Россіи, какъ то: бѣлоруссы, литовцы, великоруссы, пермяки и сибиряки и пр. принадлежать къ умѣренному климату Россіи. Но какъ вредно-дѣйствующія условія со стороны всѣхъ тѣхъ климатовъ и происходящія отъ нихъ болѣзни между русскими поселянами многочисленны, а равно и мѣры предосторожности отъ оныхъ обширны, то обо всемъ будетъ подробно изложено особо (см. росписаніе россіянъ по разноклиматному ихъ мѣстопребыванію).

VI. Супружество, или бракъ, для житейскаго счастья особенно сельскихъ жителей и для умноженія народонаселенія, есть также необходимая потребность въ физическомъ и нравственномъ отношеніяхъ, по которой каждый человѣкъ и въ особенности поселянинъ находится въ безусловномъ и различномъ отношеніи съ внѣшнею окружающею его природою. Благотворное вліяніе супружества на общественное благоденствіе и на семейное счастье человѣка вообще и поселянина въ особенности, равно какъ гибельное дѣйствіе холостой жизни на уничтоженіе семейныхъ связей такъ извѣстно, что доказательства не требуетъ. Между трудолюбивыми поселянами, холостые люди рѣдки, потому что гораздо выгоднѣе имѣть жену помощницу и дѣтей для земледѣлія и для производства работъ на фабрикахъ, а при плодородіи и простотѣ нравовъ семейство пропитать не мудрено. Бракъ побровительствуетъ и поддерживаетъ нравы, общество и его законы, но холостая жизнь развиваетъ сѣмя разврата, расторгаетъ общественныя связи и уклоняетъ отъ законовъ, потому что она необходимо влечетъ къ блуду и распутству, а распутные ищутъ разнообразія въ наслажденіяхъ и ужасаются строгихъ единообразныхъ обязанностей отцевъ семейства, отвлекаютъ людей отъ брака, лишаютъ родителей почтенія у ихъ дѣтей, и въ основаніи подрываютъ здоровье будущаго поколѣнія.

Супружество между близкими родными вредно. Напротивъ того, отъ брачнаго смѣшенія различныхъ племенъ происходятъ здоровыя и прекрасныя поколѣнія, и вѣрное средство уничтожить врожденное расположеніе къ болѣзнямъ (къ золотухѣ, чахоткѣ, дактилягрѣ) состоитъ въ смѣшеніи племенъ, чрезъ что тѣлесный недостатокъ одного вознаграждается излишнею крѣпостію тѣла другого, и происходитъ отъ этого плодъ здоровый и крѣпкій. Евреи, не смѣшивающіеся ни съ какимъ народомъ, постоянно удерживаютъ порочное расположеніе тѣла къ извѣстнымъ болѣзнямъ и собственныя жидовскія черты лица.

Имѣя въ виду главную существенную цѣль супружества, состоящую въ семейномъ счастіи и плодородіи, — нужно, чтобы сочетавшіеся бракомъ сколько можно сходствовали между собою въ физическомъ, нравственномъ, умственномъ и гражданскомъ отношеніяхъ; для этого совершенное здоровье, полная зрѣлость, возможно-близкій возрастъ, сходственность характера и темперамента, равная степень раздражительности, неукоризненная нравственность, одинокая образованность, незначительная разность умственныхъ способностей, тождество гражданскихъ состояній и равномѣрныя средства жизни — суть существенныя условія счастливыхъ и плодородныхъ браковъ, которые бываютъ тѣмъ несчастнѣе и бесплоднѣе, чѣмъ менѣе соблюдается мѣра этихъ условій. Помноженіе лѣтъ въ женскомъ полѣ на 7, а въ мужескомъ на 9 даетъ довольно вѣрный приблизительный результатъ на возможно-близкій возрастъ, по которому процессъ жизни мужескаго пола сходствуетъ съ процессомъ жизни женской. Въ физическомъ и нравственномъ развитіи дѣвочка 7-ми лѣтъ относится къ 9-ти лѣтнему мальчику точно также, какъ и въ періодъ увяданія преклонная старуха 70-ти къ преклонному старику въ 90 лѣтъ.

Періодъ времени вступленія въ бракъ у насъ въ Россіи полагается въ 16 лѣтъ для дѣвицы и въ 18 лѣтъ для мужчины. Вступленіе въ бракъ прежде этого періода времени вредно для молодыхъ родителей, а еще вреднѣе для ихъ будущихъ дѣтей, неотличающихся ни крѣпостію тѣла, ни твердостію духа. Слишкомъ молодые женщины, сдѣлавшись беременными, рѣдко дона-

шиваютъ плодъ до конца беременности, но чаще выкидышаютъ, и такіе браки вообще бываютъ бездѣтны.

Бъ опредѣленію равенства возраста обоого пола для назначенія равныхъ браговъ можетъ служить руководствомъ слѣдующая таблица.

| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ж. 7. | 14. | 21. | 28. | 35. | 42. | 49. | 56. | 63. | 70. |
| М. 9. | 18. | 27. | 36. | 45. | 54. | 63. | 72. | 81. | 90. |

Благоразумный воздержный образъ жизни, необходимый для сбереженія общаго здоровья, сохраняетъ и дѣтородную способность, сохраненіе которой состоитъ не въ употребленіи пустыхъ и часто вредныхъ, возбуждающихъ средствъ, но въ сообщеніи различнымъ дѣйствіямъ нашего тѣла ихъ естественнаго направленія и въ приличномъ употребленіи благъ, доставляемыхъ намъ природою. Самый же важный способъ долговременнаго сохраненія дѣтородной способности состоитъ въ благоразумномъ употребленіи любовныхъ наслажденій, которыя, превосходя нѣжностью и силою чувствованій всѣ другія тѣлесныя удовольствія, сильно увлекаютъ мужчину къ женщинамъ и заставляютъ ихъ легко и часто преступать границы благоразумной умѣренности. Неумѣренное удовлетвореніе плотской похоти, особенно раздраженной еще искусственно какимъ либо средствомъ, спорѣе, чѣмъ злоупотребленіе какого либо другаго дѣйствія тѣла, погашаетъ пламенникъ жизни, ослабляетъ нервы, притупляетъ чувства, дѣлаетъ человѣка угрюмымъ, дикимъ, мизантропомъ, трусомъ, преждевременнымъ старикомъ и самоубійцею, или заставляютъ его изыскивать всѣ возможные способы и средства прихоти и роскоши для возбужденія своего изнемогающаго тѣла. Супруги, желающіе надолго сохранить дѣтородную способность, должны наблюдать слѣдующія правила: 1) Имѣть плотскую связь только тогда, когда чувствуютъ къ тому необходимую потребность и когда тѣло ихъ достаточно укрѣплено; 2) по мѣрѣ того, какъ совокупленіе начинаетъ ослаблять ихъ тѣло, нужно

употреблять его рѣже, и даже совѣтъ преобразить на нѣкоторое время: 3) употреблять совокупленіе съ большою осторожностью, особенно послѣ продолжительныхъ умственныхъ и тѣлесныхъ занятій, и при недостаткѣ хорошихъ, существенныхъ жизненныхъ условий, пищи, воздуха и пр. 4) воздерживаться совѣтъ отъ него во время мѣсячныхъ кровей и послѣродового очищенія, равно какъ и въ продолженіе кормленія новорожденнаго грудью матери, беременности, болѣзни дѣтородныхъ органовъ: 5) не сходить съ женою при наполненіи желудка пищею, въ пьяномъ состояніи, во время голода и вообще при явственной слабости тѣла.

Вотъ главные потребности наши, въ простомъ сельскомъ быту. по которымъ мы, стоя въ тѣсной, безусловной связи съ внѣшнею, окружающею насъ природою, непрерывно, какъ сказано выше, боремся съ нею и чрезъ то живемъ тѣломъ, — или внѣшнею нашею жизнью. Каждый поселянинъ, особенно не затѣйливый, простой, какъ близкій къ природѣ житель, можетъ вполне довольствоваться имъ. Въ этой тѣлесной, — или внѣшней нашей жизни требуется, какъ уже видно изъ предыдущаго, такое же гармоническое равновѣсіе во взаимномъ дѣйствіи между природою и нашимъ тѣломъ, какое нужно и выше описано во внутренней жизни нашей собственно во взаимномъ дѣйствіи между тѣломъ и душою. Назначеніе тѣла человѣка для его души соотвѣтствуетъ назначенію природы для его тѣла. По первому душа господствуетъ въ органической области тѣла, по послѣднему плотской человѣкъ есть владыка на землѣ. Во всякомъ однако случаѣ для поддержанія собственнаго высокаго достоинства ему даны въ руководство законы, по которымъ онъ, говоря о внѣшней жизни, долженъ употреблять природу въ свою пользу такъ, какъ это нужно и потребно для его здоровья; въ противномъ случаѣ неправильность, какого бы рода она ни была, излишняя ли строгость въ физическомъ содержаніи себя, умерщвляющая плоть (что бываетъ рѣже), или крайнія лишения (что бываетъ чаще), или напротивъ, чувственность въ видѣ прихотей, дурныхъ привычекъ, непотребныхъ склонностей и проч. — бываетъ во вредъ ему, разстроиваетъ его, разрушаетъ и преждевременно сводитъ съ лица земли при посредствѣ разныхъ болѣзней.

Но какъ извѣстно, что внутренняя жизнь наша совершается подъ управленіемъ двухъ началъ: нравственнаго и физическаго, т. е. души и тѣла, а внѣшняя подъ управленіемъ двухъ же, по собственно тѣлесныхъ, началъ: нервнаго и мышечнаго, или двухъ животныхъ силъ *чувствительности*, которою мы чувствуемъ дѣйствіе на насъ природы, и *раздражительности*, которою мы противодействуемъ ей въ ея на насъ-вліяніяхъ, въ охраненіе или защиту своей цѣлости; — что въ этихъ двухъ послѣднихъ силахъ, при содѣйствіи внѣшнихъ благопріятствующихъ условій со стороны окружающей насъ природы посредствомъ соблюденія надлежащихъ діететическихъ правилъ, состоитъ *цѣлительная сила природы или свой у каждаго изъ насъ внутренний природный врачъ*, и что обѣ эти животныя наши силы въ дѣйствіи своемъ бываютъ различны по различному нашему тѣлосложенію, возрасту, полу, темпераменту, содержанію себя относительно предразсудковъ, чистоплотности, времени появленія поварныхъ болѣзней и проч., — то и вредъ для нашего здоровья, соотвѣтственно всѣмъ этимъ разностямъ, бываетъ болѣе или менѣе различенъ, а равно бываютъ различны и мѣры предосторожности отъ онаго и самого врачебнаго пособія въ случаѣ болѣзней. По этому каждая изъ этихъ разностей подлежитъ особому разсмотрѣнію.

I. Тѣлосложеніе. Тѣлосложеніе *крѣпкое, сильное* развивается при воспитаніи дѣтей по преимущественному вліянію со стороны животной пищи; по этому оно свойственно людямъ, употребляющимъ исключительно эту пищу и спиртные напитки. Такіе люди бываютъ расположены къ воспаленіямъ внутренностей и къ болѣзнямъ отъ напора крови, особенно къ кровавому удару и параличу. Тѣлосложеніе *слабое* во всемъ противоположно крѣпкому, развивается по преимущественному вліянію со стороны пищи растительной и, будучи свойственно людямъ, употребляющимъ исключительно эту пищу — рыбную и молочную, имѣетъ раздражительность слабую, а чувствительность возвышенную. Оттого люди слабого тѣлосложенія расположены бываютъ къ перемежающимся лихорадкамъ; нервнымъ болѣзнямъ, золотухѣ и сухоткѣ.

Въ избѣжаніе вреднаго расположенія со стороны того и другаго тѣлосложенія Святые Отцы нашей Церкви, постигая эту раз-

ность въ дѣйствии пищи, для разнообразнаго ея употребленія основали на ней разные посты, при назначеніи которыхъ они имѣли въ виду нравственность, какъ главное достоинство человѣка, сообразно догматамъ религіи, его тѣлесное здоровье и физическое благосостояніе на землѣ. Въ первомъ отношеніи наша религія учредила посты предъ важнѣйшими ея праздниками для того, чтобы умирить бурное стремленіе страстей, облегчить намъ исполненіе христіанскихъ обязанностей и погрузить насъ въ мысленное созерцаніе великости воспоминаемаго ею происшествія. Во второмъ отношеніи, постъ дѣйствительно улучшаетъ состояніе нашего здоровья, доставляя время и случай пищеварительнымъ органамъ успокоиться и отдохнуть отъ употребленія мясной пищи и спиртныхъ напитковъ, очищая ихъ отъ нечистотъ и предотвращая новое накопленіе излишнихъ пищевыхъ остатковъ, уменьшая избытокъ и разгорячительное дѣйствіе крови, и чрезъ то отвращая множество различныхъ болѣзней. Въ послѣднемъ отношеніи Святые Отцы и законодатели имѣли, повидимому, цѣлю содержаніе самихъ животныхъ, запрещая употребленіе ихъ мяса, особенно въ то время, когда они зарождаютъ своихъ дѣтенышей. Филипповъ постъ, кромѣ религіознаго значенія, по своему положенію предъ Рождествомъ Христовымъ, предохраняетъ отъ воспалительныхъ зимнихъ болѣзней. Великій постъ, строгостію и продолжительностію, ослабляя тѣло и обуздывая страсти, облегчаетъ человѣка въ принесеніи покаянія, по розговѣнью возвышаетъ цѣну наслажденія мясной пищею и даетъ возможность животнымъ, особенно теплыхъ странъ, выплодить своихъ дѣтей. Посты Петровъ и Спасовъ очень полезны тѣмъ, что много способствуютъ къ перенесенію лѣтняго жара, потому что человѣкъ мало развиваетъ внутренней теплоты. Соблюденіе постовъ по средамъ и пятницамъ пріятно разнообразить пищу, ограничиваетъ сгущеніе крови, способствуетъ къ очищенію желудка, даетъ время отдохнуть пищеварительнымъ органамъ. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ постъ нужно соблюдать не только по качеству, но и по количеству: нужно ѣсть не только постную пищу, но и въ умѣренномъ количествѣ; роскошные постные обѣды не только не выполняютъ въ религіозномъ и діететическомъ отношеніи цѣль поста, но напротивъ того причиняютъ еще

значительный вредъ. При соблюденіи постовъ *здоровый и крѣпкій человекъ*, желяя жпть долго, вовсе не имѣетъ надобности придерживаться особенной діеты; для него достаточно только избѣгать излишества въ ѣдѣ, употреблять хорошую и разнообразную пищу, соотвѣтственно его аппетиту, трудамъ и потери соковъ. Люди, ежедневно занятые продолжительными и тягостными трудами, должны употреблять въ достаточномъ количествѣ плотную пищу, которая не такъ скоро переваривается и надолго утоляетъ голодъ. Напротивъ того, *люди слабого и нѣжнаго тѣлосложенія* должны постоянно соблюдать діету, приспособленную къ ихъ хилому здоровью; только при такомъ образѣ жизни, они, несмотря на свое слабое тѣлосложеніе, рѣже подвергаются болѣзнямъ и доживаютъ до глубокой старости чаще, нежели здоровые и крѣпкіе, которые, слишкомъ полагаясь на свои силы, часто предаются невольности, поражаются различными недугами, подрывающими ихъ крѣпкое здоровье и сокращающими самую жизнь. При назначеніи діеты слабымъ людямъ нужно помнить, что ихъ здоровье болѣе страдаетъ отъ питательной, обильной и возбуждающей, чѣмъ отъ легкой, слабопитательной и жидкой пищи, которая вовсе не напрягаетъ ихъ пищеварительныхъ органовъ. Опытъ доказалъ, что такіе люди могутъ довольствоваться самымъ малымъ количествомъ пищи съ явною пользою для ихъ здоровья. Поэтому они должны остерегаться употребленія всего того, что возбуждаетъ аппетитъ: пряныхъ блюдъ, сложныхъ и горячительныхъ соусовъ, трудноваримыхъ прожженныхъ и проч.; ежедневно предъ завтракомъ, обѣдомъ и ужиномъ пользоваться на открытомъ воздухѣ прогулкою, и лучше пѣшкомъ, чѣмъ въ экипажѣ, пока не почувствуютъ влажности въ кожѣ, легкой усталости, но не утомленія; ничто такъ не возбуждаетъ нашего аппетита, какъ движеніе и свѣжій воздухъ.

Въ облегченіе участи особенно ремесленниковъ нужно руководить родителей, чтобы они не предоставляли случаю и произволу выборъ ремесла для своихъ дѣтей, а назначали бы имъ образъ жизни и занятій, сообразный ихъ тѣлосложенію и характеру; такъ напр. на свѣчные и мыловаренные заводы, бумажныя и полотняныя фабрики и т. п., нужно назначать людей крѣпкихъ, полнокровныхъ; въ мясники — слабыхъ, блѣдныхъ и пр.; основны-

ваясь на крѣпительномъ дѣйствіи желѣза, совѣтовать дѣтей золотушныхъ, людей слабыхъ, рыхлотѣлыхъ, расположенныхъ въ чахоткѣ, упорнымъ перемежающимся лихорадкамъ, назначать въ слесари, кузнецы, оружейные мастера, а слабонервныхъ, чувствительныхъ, людей сидячей жизни, мало пользующихся свободнымъ воздухомъ—въ дѣятельный образъ жизни земледѣльца, садовника, огородника, словомъ: располагать ихъ занятіями и образомъ жизни такъ, чтобы одно вредное для тѣлосложенія занятіе исправлялось другимъ ему болѣе или менѣе противоположнымъ, руководствуясь при томъ свѣдѣніями, какія будутъ подробно изложены особо въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. это описаніе).

II. *Возрастъ* нашъ имѣетъ свои особенности преимущественно въ дѣтствѣ, возмужалости и старости. Проходя всѣ эти періоды, проявленіе внѣшней или физической жизни нашей исчезаетъ.

Въ дѣтскомъ возрастѣ чѣмъ развитіе силъ и тѣла нашего совершается легче и свободнѣе, тѣмъ оно лучше совершенствуется, прочнѣе достигаетъ своей зрѣлости и долѣе живетъ, и наоборотъ. При этомъ: чѣмъ лучше дается направленіе этому развитію силъ и тѣла нашего съ дѣтства, тѣмъ мы надежнѣе, вѣрнѣе и приличнѣе совершаемъ поприще нашей жизни, и наоборотъ. Черезъ это мы въ дѣтскомъ и юношескомъ возрастахъ, составляющихъ весну нашей жизни, или полагаемъ прочное основаніе нашему здоровью, или же напротивъ разстроиваемъ его на всю жизнь. Въ случаѣ болѣзней у дѣтей назначать имъ лѣченіе діететическое, состоящее въ соблюденіи тѣхъ правилъ, какія будутъ показаны въ этомъ лѣченіи при описаніи каждой болѣзни въ частности, и къ лѣкарственнымъ средствамъ прибѣгать неначе, какъ только въ крайнихъ случаяхъ, угрожающихъ яввою опасностью жизни; цѣлительная сила природы, или у каждаго свой внутренній природный врачъ дѣйствуетъ сильно, вѣрно и надежно. Въ крайности же, требующей назначенія лѣкарствъ, имѣть въ виду, что опредѣленіе приѣма оныхъ зависитъ отъ возраста, а потому если какого либо лѣкарства можно дать подъ конецъ перваго года 1, то должно предписывать на пятомъ 2, на пятнад-

цатомъ 3, на двадцать пятомъ 4. Для большей же ясности предлагается слѣдующая таблица.

| Годъ. | пріемъ | Годъ. | пріемъ | мѣсяцъ | пріемъ |
|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| 25 | 40 | 7 | 22 | 9 | 8 |
| 20 | 35 | 6 | 21 | 8 | — |
| 15 | 30 | 5 | 20 | 7 | 7 |
| 14 | 29 | 4 | 18 | 6 | — |
| 13 | 28 | 3 | 16 | 5 | 6 |
| 12 | 27 | 2 | 13 | 4 | — |
| 11 | 26 | 1 | 10 | 3 | 5 |
| 10 | 25 | мѣсяцъ | пріемъ | 2 | 4 |
| 9 | 24 | 11 | 9 | 1 | 2 |
| 8 | — | 10 | — | 1/2 | 1 |

При этомъ должно замѣтить еще слѣдующее: а) всякое лѣкарство сначала должно давать въ меньшихъ противъ обыкновеннаго пріемахъ, потому что нельзя съ перваго взгляда, а ргіогі опредѣлить личныхъ свойствъ каждаго больного и настоящаго состоянія силъ, а потомъ уже увеличивать пріемы до тѣхъ поръ, пока обажется отъ лѣкарства желаемое дѣйствіе; б) величина пріема различествуетъ еще и по цѣли, предполагаемой врачующимъ, т. е. всю ли силу, или только часть ея онъ желаетъ употребить въ свою пользу, или можетъ быть нужны одни только послѣдовательныя дѣйствія сего лѣкарства; тагъ напр. рвотныя, данныя въ полныхъ пріемахъ, возбуждаютъ рвоту, въ малыхъ же и учащенныхъ пріемахъ они дѣйствуютъ какъ потогонныя, противусудорожныя средства и т. п. Но и самое измѣненіе силъ, производимое лѣкарствами, можетъ быть уже для врачующаго достаточнымъ показаніемъ къ назначенію различныхъ пріемовъ лѣкарства, о чемъ въ существенномъ лѣченіи каждой болѣзни въ частности будетъ изложено ясно и подробно.

Возмужалый возрастъ въ матеріальномъ значеніи, подъ управленіемъ двухъ вышеупомянутыхъ животныхъ силъ: чувствительности и раздражительности, основывается на двухъ противоположныхъ химическихъ процессахъ тѣла: плототворительномъ (синтетическомъ) и плоторазрушительномъ (аналитическомъ). По

преимущественному дѣйствію перваго со времени зачатія и рожденія до совершеннолѣтняго возмужалаго совершенства тѣло наше, не столько расходуя, сколько пріобрѣтая, увеличиваетъ капиталъ своей органической массы, изъ которой какъ вообще образуется рращеніемъ его надлежащая вышина, такъ въ особенности общее чувствлище — мозгъ. органы грудные и дѣтородные. Въ возмужаломъ возрастѣ эти два процесса синтетическій и аналитическій совершаются болѣе или менѣе равномѣрно, такъ что въ первую половину возмужалости не много болѣе имѣетъ преимущества первый, причемъ тѣло по избытку органической массы приходитъ въ болѣшій объемъ, — прибываетъ въ толщину вообще, а въ особенности чрезъ это получаетъ окончательное образованіе брюшная система; во вторую же половину возмужалости, по мѣрѣ приближенія къ старости, начинается въ дѣйствіи своемъ усиливаться процессъ послѣдній, т. е. аналитическій, который въ старости беретъ перевѣсъ болѣе и болѣе по мѣрѣ преобладающей оной, и во сколько разъ въ органической экономіи тѣла приходъ превышаетъ расходъ его съ дѣтства и льстила прибыль, — во столько разъ наоборотъ въ старости начинаетъ брать перевѣсъ въ ней расходъ надъ приходомъ и огорчать убытокъ, отъ котораго постепенно старость все болѣе и болѣе естественно изнуряетъ, истощаетъ наше тѣло, дѣлаетъ наконецъ его дряхлымъ, лишаетъ послѣднихъ силъ, превращаетъ въ бездыханный трупъ, и мы умираемъ. Законъ природы неизмѣненъ и каждому изъ насъ опредѣлено жить извѣстное время, положенъ *предѣлъ, его же не преиде*. Но это предопредѣленіе, этотъ рокъ — одинъ для всѣхъ, котораго рѣдкій избранный и достойный человекъ достигаетъ, многіе между тѣмъ перетолковываютъ по своему, что будто бы каждому человѣку назначена своя смерть и онъ ею умираетъ такъ, а не иначе, потому что суждено ему такъ умереть, включая въ это понятіе всѣ роды смерти, даже умышленныя самоубійства. Такія понятія безразсудны, унижаютъ человечество, и оскорбляютъ благость и святость Творческаго Божества; напротивъ мы этого предопредѣленнаго намъ срока жизни никогда почти не достигаемъ и умираемъ, болѣею частью, слу-

чайною и неестественною смертию, зависящею отъ пасть самихъ, отъ нашей неосторожности, слѣдовательно преждевременно.

Во всякомъ случаѣ для челоуѣка, достигшаго извѣстной зрѣлости своего возраста, когда онъ начинаетъ чувствовать упадокъ своихъ силъ и здоровья, совѣтъ для сохраненія послѣдняго очень важенъ. Юноша, какъ богатый здоровьемъ, можетъ сорить его значительными суммами, не чувствуя ущерба въ своемъ богатствѣ: но старикъ, подобно бѣдному нищему, долженъ разсчитывать послѣднюю копѣйку своего здоровья, если не хочетъ умереть отъ крайней бѣдности своихъ силъ. Старикъ, притупивъ отъ времени чувствительность, истощивъ раздражительность, при негибкости, жесткости, загрубѣлости своего тѣла, уже неспособенъ къ сильнымъ потрясеніямъ души, къ сильнымъ страстямъ, обуревающимъ юношу; изъ всего юношескаго огня страстей, ему достаются въ удѣлъ немногія искры, подъ видомъ склонности, расположенія. За то низкія, угнетающія страсти, гнѣвъ, зависть, скупость, злоба, мстительность, ненависть, эгоизмъ, какъ змѣи часто гложутъ сердце его. Гнѣвъ, иногда вспыхивая въ старикѣ какъ подземный огонь въ потухшемъ волканѣ, производитъ упорное трясеніе тѣла, или поражаетъ его, какъ молнія, кровавымъ пострѣломъ, особенно при полнотѣ желудка. Эгоизмъ, такъ часто замѣчаемый у стариковъ, иногда происходитъ оттого, что къ нимъ другіе не довольно внимательны, не столько заботливы объ нихъ и предупредительны, сколько того требуетъ ихъ старость. Скупость старика часто есть слѣдствіе трудовъ, которыхъ ему стоило пріобрѣтеніе его достаточнаго состоянія, увѣренности, что, въ случаѣ потерн его богатства, онъ уже не можетъ пріобрѣсть новаго, — сознанія, что его потребности умножаются съ увеличивающеюся слабостію его тѣла, между-тѣмъ какъ смерть давно уже похитила тѣхъ, которые заслужили его любовь и дружбу и могли бы избавить его отъ нужды и всякихъ лишеній. Умственные способности у старика достигаютъ однако высшей степени развитія: опытность, мудрость, многоразличныя свѣдѣнія дѣлаютъ его образцемъ добродѣтели, источникомъ знаній, подвижною такъ сказать библіотекою, возбуждаютъ въ немъ живѣйшее участіе къ юношамъ и желаніе быть имъ полезнымъ въ умственномъ, нравственномъ и фи-

зическомъ отношеніяхъ. Веселый и добрый старикъ, не раскаивающійся въ прошедшемъ, довольный настоящимъ и спокойный въ будущемъ, достоинъ всякаго почтенія и любви. Свѣжее и доброе тѣло старика означаетъ, что жизнь его протекла мирно, тихо и добродѣтельно въ гражданскомъ и семейномъ быту: онъ былъ благотворителемъ всѣхъ окружавшихъ его и образцемъ добродѣтели, онъ наслаждается плодами собственныхъ трудовъ въ брѣгу семейства, которое его любитъ, почитаетъ и заботится о его выгодахъ, спокойствіи и пользѣ. Такой старикъ сохраняетъ въ силѣ всѣ свои умственные способности: умъ его дѣятеленъ, характеръ мужественный, память твердая и богатая прекрасными воспоминаніями.

III. *Женщина*. Женщина вообще нѣжнѣе и слабѣе мужчины. Уму и силѣ мужчины предусмотрительность промысла въ природѣ противопоставила въ женщинѣ красоту и нѣжность, которыми она его побѣждаетъ. Сообразно существенному назначенію мужчины—кормить и защищать свое семейство, сила и умъ для него необходимы: а для женщины, сообразно назначенію ея быть центромъ семейной любви и покорять силу слабостію, необходима красота и нѣжность. Но женщина имѣетъ еще и другое, важнѣйшее назначеніе: она есть такъ сказать драгоценная почва и сосудъ, въ которомъ происходитъ зарожденіе и развитіе рода человѣческаго. Вся жизнь женщины есть только періодически повторяющееся выполненіе той великой и благородной цѣли промысла въ природѣ. Эти періоды женской жизни, обозначаясь появленіемъ мѣсячныхъ кровей, беременностію, родами, кормленіемъ младенца грудью и критическимъ временемъ женскаго возраста, требуютъ особыхъ мѣръ предосторожности для сохраненія женскаго здоровья.

Появленіе мѣсячныхъ кровей у взрослой дѣвicy пзмѣняетъ ее физически и нравственно и зависить отъ временнаго полновровія ея и приливовъ крови къ разнымъ частямъ тѣла: къ животу, груди и головѣ: пзмѣненныя черты лица и звука голоса, ускоренное дыханіе, волненіе крови, чувство полноты и давленія подъ ложечкою и увилочекъ груди, тягость, жаръ и давленіе въ нижней и передней части живота, боль въ поясницѣ, частый позывъ къ испусканію мочи, тягость въ ногахъ, шаткая походка, внутренняя тоска, неопредѣленное чувство страха и надежды, стыдливость,

наклонность къ уединенію и мечтательности — все это означает побужденіе дѣтородной силы. Эти общіе признаки перваго появленія мѣсячныхъ кровей измѣняются по тѣлосложенію. У *дѣвицы крѣпкой* и полнокровной они соединяются съ явленіемъ волненія крови, чувствомъ одеревенѣнія частей тѣла, краснотой и припухлостію лица, шумомъ въ ушахъ, красными и слезящимися глазами, головною болью, бессонницею, обмороками, біеніемъ жилъ въ вискахъ, трепетаніемъ сердца, тягостію въ груди и одышкою, кровотеченіемъ изъ носа, болью въ животѣ, тяжестію всего тѣла, скорою усталостію послѣ незначительнаго движенія и появленіемъ густыхъ, темныхъ или красныхъ кровей въ значительномъ количествѣ. Все это означаетъ излишество крови, которая ищетъ пути выйти изъ тѣла чрезъ матку. *Дѣвица слабая и нѣжная*, при появленіи мѣсячныхъ кровей, показываетъ также признаки волненія крови, но эти признаки происходятъ болѣе отъ неправильнаго кровообращенія и чувствительности нервовъ, чѣмъ отъ настоящаго полнокровія. У нея также кровь устремляется къ головѣ, но лицо бываетъ впалое, блѣдное и черты его искажаются, глаза дѣлаются мутными и томными, пульсъ скорымъ, но слабымъ, слабое, неправильное трепетаніе сердца, частые и легкіе обмороки, судороги, слабость всего тѣла, расстройство пищеваренія, аппетитъ къ неядомымъ вещамъ и появляются блѣдныя мѣсячныя крови въ небольшомъ количествѣ. Мѣсячное кровоочищеніе продолжается 3—6 дней; кровь сначала бываетъ темная, густая, подъ конецъ дѣлается свѣтлою и жидкою; въ это время и въ первые два дни послѣ мѣсячныхъ кровей, матка бываетъ особенно расположена къ зачатію. Чрезъ три недѣли скопившаяся въ излишествѣ кровь у женщины опять изливается чрезъ матку, но послѣдующія мѣсячныя очищенія крови приходятъ тише и проходятъ легче. *Время* появленія въ первый разъ мѣсячнаго кровоочищенія бываетъ различно по климату, роду жизни, тѣлосложенію, воспитанію и пр.; всѣ эти причины, смотря по ихъ качеству, то ускоряютъ, то замедляютъ развитіе женскаго тѣла и съ нимъ появленіе мѣсячныхъ кровей. Вообще нужно стараться удалять отъ молодыхъ дѣвицъ все то, что преждевременно вызываетъ у нихъ появленіе мѣсячныхъ кровей. Дѣвушка, подобно искусственному цвѣтку, тѣмъ не прочіѣе бываетъ въ своемъ

здоровья, несовершеннѣе разцвѣтаетъ, приноситъ слабѣйшій плодъ и ранѣе увядаетъ сама, чѣмъ преждевременнѣе у нее появляются мѣсячныя крови.

Беременность. Послѣ зачатія мѣсячное очищеніе прекращается, но не всегда. Оно продолжается особенно у полнокровныхъ женщинъ, въ первые 2—3 мѣсяца ихъ беременности. Со времени зачатія новаго плода, женщина *измѣняется* физически и нравственно, въ ея тѣлѣ все стремится къ сохраненію зародыша и выполненію его нуждъ. Матка дѣлается главнымъ органомъ женскаго тѣла; къ ней устремляется кровь въ значительномъ количествѣ; она же ограничиваетъ, усиливаетъ или измѣняетъ дѣйствіе другихъ органовъ, смотря по ихъ отношенію къ ней и по связи.

Очень важно положеніе беременной женщины въ гражданскомъ, семейномъ и физическомъ отношеніяхъ. Слабость и раздражительность ея тѣлосложенія въ это время и нѣжность зародыша требуютъ особеннаго вниманія со стороны лицъ, имѣющихъ съ нею сношеніе. Беременная женщина во всякаго образованнаго человѣка невольно вселяетъ въ ней чувство уваженія и даже благоговѣнія, какъ въ драгоцѣнному хранилищу тайнства благодати и премудрости Творца, и всякій проступокъ противъ беременной женщины, нарушающій состояніе ея здоровья, въ образованномъ государствѣ долженъ быть наказываемъ съ двойною строгостію.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи существуетъ *предразсудокъ*, что женщину въ послѣднемъ мѣсяцѣ ея беременности *нужно укрѣплять* и сильно питать потому, что она въ это время чувствуетъ слабость и для того, чтобы она легче перенесла самые роды; то и другое предположеніе совершенно ложно. Если беременная женщина не имѣетъ никакихъ особенныхъ припадковъ, то разрѣшеніе ея положенія нужно предоставить природѣ, которая лучше насъ знаетъ, что и какъ нужно употребить для счастливаго окончанія беременности. Но нужно замѣтить, что болѣзни, запоръ и поносъ, особенно *кашель* и упорный *насморкъ*, которыми подвержены женщины во второй половинѣ беременности, могутъ имѣть вліяніе на неблагополучное окончаніе беременности, такъ что производимымъ ими сотрясеніемъ всего тѣла при кашлѣ и чиханіи могутъ причинить кровотеченіе изъ матки и выкидышъ, или оставить послѣ

себя расположеніе къ чахоткѣ, легко развивающееся послѣ родовъ въ дѣйствительную болѣзнь; по этому болѣзни эти нужно лѣчить въ самомъ ихъ началѣ (см. эти болѣзни).

Критическій возрастъ женщины есть время прекращенія мѣсячныхъ кровей. Оно наступаетъ въ разные годы женской жизни, что зависитъ наиболѣе отъ тѣхъ же причинъ, какъ и появленіе мѣсячнаго очищенія, какъ-то: климата; тѣлосложенія, воспитанія, образа жизни и пр. Въ нашихъ странахъ прекращаются мѣсячныя крови и женщина дѣлается безплодною между 40 и 50 годами. Въ то время добродѣтельная, умная и опытная женщина, не подлежа болѣе вліянію страстей, пѣняетъ насъ разговоромъ и заставляетъ забывать объ увядшей красотѣ ея, о которой она и сама не сожалеетъ. Но страшенъ этотъ критическій возрастъ тѣмъ женщинамъ, которыя не выполнили святой обязанности супруговъ и матерей во всей строгости и точности, тѣмъ, которыя не хотѣли обуздать своихъ страстей, воображенія, желаній, не соблюдали воздержности въ своемъ родѣ жизни и пренебрегали правилами благоразумной опытности и добродѣтели; для нихъ натура, въ отмщеніе за пренебреженіе ея святыхъ законовъ, приготовляетъ въ этомъ критическомъ возрастѣ множество страданій и болѣзней. Число такихъ женщинъ между поселянами къ счастію очень мало и потому излишне здѣсь объ этомъ распространяться, тѣмъ болѣе, что и правила діетическія, и болѣзни, свойственныя критическому возрасту женщинъ, составляютъ предметъ собственно врачебный, даже, большею частію, акушерскій и хирургическій; слѣдовательно предохранительный совѣтъ въ избѣжаніе опасности по этому возрасту явствуетъ изъ предыдущаго, въ болѣзненныхъ же случаяхъ нужно совѣтовать обращаться къ врачу акушеру или хирургу.

IV. *Темпераментъ*, имѣя свое существенное основаніе въ насъ тѣлѣ, производитъ его особенность физическую и душевную, уклоняетъ теченіе внутренней и внѣшней жизни въ собственную сторону и располагаетъ къ болѣзнямъ, относительно ихъ чувствительности и раздражительности по своему. Темпераментовъ считается четыре: *сангвиническій, холерическій, меланхолическій и флегматическій*.

Сангвиническій темпераментъ есть проявленіе преимуществен-

наго развитія мозга и нервовъ, холерическій — сердца и артерій, меланхолическій — печени и венъ, а флегматическій — кѣлѣчатой плевы. Оттого въ первомъ особенно бываютъ дѣятельны мозгъ и нервы и зависящая отъ нихъ чувствительность, во второмъ сердце и артеріи и произходящая отъ нихъ раздражительность: въ третьемъ печень, вены, а наипаче воротная, а въ послѣднемъ т. е. въ флегматическомъ — желудокъ, кишки, пасочные сосуды и вообще кѣлѣгатая плева и выработываніе питательнаго сока.

Сангвиническій темпераментъ имѣетъ слѣдующія качества: голова довольно велика, черты лица пріятны и живы, цвѣтъ лица нѣжно-румяный, лобъ возвышенный, губы вздуты, толстоваты, подбородокъ круглый, зубы бѣлы, правильно расположены, уши малы, глаза довольно велики, голубые либо каріе, волосы свѣтлые либо каштановые. Сангвиникъ чрезвычайно воспріимчивъ, но непостояненъ, чувствителенъ, слабъ душою и тѣломъ: на него все дѣйствуетъ быстро и сильно, но непродолжительно, походка его скорая, но не твердая и шаткая, движеніе свободное, но скоро утомляющее. Сангвиникъ одаренъ прекрасными душевными качествами, которыми онъ одноаго можетъ упражняться поверхностно и непродолжительно; сангвиникъ легко возбуждается, но скоро и успокоивается; характеръ веселый, но вѣтренный; любитъ шумныя забавы; пріятенъ въ обществѣ, откровененъ, но не постояненъ ни въ любви, ни въ дружбѣ; легкомысленъ, безпеченъ, любитъ настоящее, забывая прошедшее, не обращая вниманія на будущее; пріятныя для него занятія: изящныя искусства, поэзія, краснорѣчіе, зрѣлища, многочисленныя общества. Дѣти, юноши и женщины, поляки, нынѣшніе французы и наши татары, грузины, горцы, балмыки, цыгане, евреи — вообще представляютъ болѣе типъ сангвиническаго темперамента. Юноши-сангвиники легко предаются распутству въ любовныхъ наслажденіяхъ, а дѣвицы подвергаются удобно разстройству мѣсячныхъ кровей, и потому требуютъ особенно строгаго присмотра за ихъ поведеніемъ.

Холерическій темпераментъ противоположенъ сангвиническому и отличается особымъ развитіемъ тѣла, сплюну и продолжительностію его дѣйствій. Ростъ холерика умѣренный, талія стройная, кожа смуглая, сухая, теплая, поросшая густыми волосами, руки и ноги

довольно толстыя, стройныя. брѣвнѣя, животъ круглый, черты лица рѣзныя. но правильно соразмѣрныя, щеки круглыя, носъ правильный. уши и губы соразмѣрной величины, ротъ не большой. подбородокъ выдавшійся, лобъ широкій, но невыпуклый, глаза черныя. волосы густые, темные, черные, жесткіе и кудрявые, все тѣло болѣе худощавое, чѣмъ тучное. Холерикъ не столько воспріимчивъ, сколько твердъ характеромъ, благородствомъ души и великодушіемъ. Онъ не трогается мелочными происшествіями, не легко увлекается и важными впечатлѣніями, за то долго содержитъ ихъ въ своей памяти; взглядъ важный и пронзительный, а при внутреннемъ возбужденіи — пламенный, нестерпимый, голосъ громкій, густой, рѣзкій, рѣчь умѣренно быстрая, походка твердая, ровная, неторопливая, движенія другихъ членовъ свободныя и не скоро утомляющія. Холерикъ любитъ пышность, роскошь, важныя занятія и увеселенія. Упражняясь въ наукахъ, онъ особенно извлекаетъ изъ нихъ практическую пользу; упражняясь постоянно и продолжительно въ одномъ предметѣ, онъ изслѣдываетъ его во всѣхъ возможныхъ положеніяхъ; нравъ его суровый и въ обществѣ тяжелый: когда возбуждается, не скоро успокоивается. Обладаемый гордостію, холерикъ способенъ къ важнѣйшимъ предпріятіямъ и подвигамъ; великодушный внутренно, онъ чуждъ низкихъ пороковъ. Холерическій темпераментъ, находясь въ юношескомъ возрастѣ всѣхъ народовъ, былъ господствующимъ между римлянами, а нынѣ находится у испанцевъ, итальянцевъ, малороссовъ и великороссовъ.

Холерикъ расположенъ къ болѣзнямъ — воспалительнымъ, особенно въ груди, кровохарканію и кровавой рвотѣ; въ возмужаломъ возрастѣ холерики страдаютъ желчными горячками, воспаленіемъ и завазомъ печени, кровавымъ пострѣломъ; сумасшествіемъ, почечумъ, а подъ старость разширеніемъ сердца и артерій и окостенѣніемъ послѣднихъ. Это расположеніе холерика къ болѣзнямъ основывается вообще на его полнокровіи и на сильномъ приливѣ крови къ той или другой полости тѣла: оно усиливается среднимъ возрастомъ жизни, бездѣйствіемъ или дѣятельностію, требующею сильнаго напряженія мышцъ, продолжительнымъ вліяніемъ яркаго солнечнаго свѣта, сильнаго вѣшняго жара и холода, остановленіемъ

мѣсячныхъ кровей, геморроя, кровотеченія изъ носа, привычнаго кровопусканія, гористымъ мѣстоположеніемъ, сухостію атмосферы, сѣверо-восточными вѣтрами, сочною, мягкою пищею, спиртными напитками, горячительными лѣкарствами, народными безпокойствами, сильными и продолжительными страстями. Къ холерическому темпераменту должно примѣнить общенародное довольно вѣрное замѣчаніе, что *крыпкіе люди хотя рѣдко хворіють, зато рѣдко и выздоравливають* отъ своихъ болѣзней.

Для ограниченія расположенія къ полнокровію, холерику можно совѣтовать растительную, а не животную пищу, водяное или кислое питье, но не чай и не кофе, а тѣмъ менѣе вино или спиртные напитки, частое и продолжительное движеніе и легкое, слабо грѣющее одѣяніе, прохладу жилыхъ покоевъ, правильное испражненіе низомъ, достаточное отдѣленіе мочи, поддерживаніе равномерной и постоянной испарины, купанье въ простой рѣчной водѣ, употребленіе щелочныхъ минеральныхъ водъ; на холерика хорошо дѣйствуютъ весна и осень, утро и вечеръ, влажностію своей атмосферы и прохладю; но лѣто и зима, жаръ и сухость для него вредны. Болѣзни же отъ полнокровнаго расположенія слѣдуетъ ограничивать строгою діетою, почти голодомъ, обильнымъ употребленіемъ кислаго питья и простой воды (нынѣшнее лѣченіе водою).

Меланхолическій темпераментъ отличенъ преимущественнымъ развитіемъ печени, венъ брюшныхъ нервовъ, и сильною внутреннею дѣятельностію при слабой чувствительности. У меланхолика ростъ высокій, тѣло худощавое, кожа блѣдная, желтоватая, сухая, вялая, руки и ноги длинные, грудь плоская, шея длинная, черты лица угрюмыя, но выразительныя и правильныя, цвѣтъ лица блѣдный, желтоватый, носъ правильный, острый, глаза мутные, ихъ бѣлки отливаютъ желтизною; голова продолговатая, вверху возвышенная, а съ боковъ сжатая, лобъ высокій, брови тонкія, волосы гладкіе, мягкіе, по большей части, черные. Меланхолики представляютъ сильную внутреннюю дѣятельность и поразительную робость относительно всего внѣшняго; взглядъ суровый, робкій и обращенный болѣе внутрь, чѣмъ наружи; слухъ слабый, голосъ тихій и не ясный, рѣчь не скорая, протяжная, дыханіе медленное, прерываемое частыми вздохами, походка робкая и тихая, утомляю-

шая, движенія умѣренныя. испражненія низомъ неправильны, чаще запоръ, чѣмъ поносъ, испарина въ кожѣ ничтожная, моча отдѣляется въ маломъ количествѣ, мутная, желтоватая. Меланхоликъ погруженъ въ собственную внутреннюю сферу и чуждается внѣшняго міра, и сколько онъ въ первомъ твердъ и постояненъ, столько же во второмъ малодушенъ и робокъ; онъ бываетъ печаленъ, унылъ, легко оскорбляется, чуждается веселыхъ и шумныхъ собраний и любитъ уединеніе, а въ искусствахъ— все возвышенное, ужасное и мрачное; охотно переселяется въ собственный мечтательный міръ, вѣрить существованію духовъ и привидѣній, несмотря на то, что его же разсудокъ ихъ отвергаетъ, любитъ глубокомысленныя разсужденія и розысканія, требующія продолжительнаго напряженія ума, начатое старается тихо и постепенно привести къ окончанію, остороженъ, заботливъ, скупъ, нечувствителенъ къ нуждѣ и страданію другаго, скрываетъ собственную страсть, переноситъ терпѣливо свои страданія, презираетъ людей, но склоненъ къ самоотверженію, въ жизни и своихъ дѣйствіяхъ однообразенъ; изъ наукъ ему особенно нравятся отвлеченная философія, математика и высокая поэзія, въ которыхъ онъ достигаетъ нерѣдко изумительнаго совершенства. Меланхолическій темпераментъ вообще свойственъ мужескому полу и возмужалому возрасту. Древніе индійцы, нынѣшніе англичане, нѣмцы, наши вятчане, чуваша, черемпы и вообще финны особенно расположены къ нему.

У меланхолика болѣзни состоятъ въ растройствахъ пищеваренія въ желудкѣ и кишкахъ, въ завалахъ брюшныхъ внутренностей, особенно печени и селезенки, дѣйствующихъ даже на легкія и сердце, въ засореніи вѣтвей воротной вены и въ мѣстномъ накопленіи густой, черной крови, въ накопленіи густой, темнозеленой, даже черной, острой желчи (отчего меланхоликовъ называютъ также и черножелчными) и въ неправильномъ ея дѣйствіи на пищу. Самыя болѣзни у меланхолика обнаруживаются желтухою, отвращеніемъ отъ мясной пищи и вообще потерю аппетита, горечью во рту, желтою нечистотою языка, вѣтрами, икотой, отрыжкою гнилыми яйцами, тягостію послѣ легкой трапезы, болью около желудка и въ сторонѣ печени, тошнотою, желчною рвотою, сухимъ кашлемъ, сухостію кожи и ея пронзительнымъ жаромъ, различною

сыпью и желтыми пятнами на груди и шее, слабостію во всемъ тѣлѣ и усталостію, болью головы, суставовъ, круженіемъ, шумомъ въ ушахъ, пятнами предъ глазами (мушки), скукою, тоскою, печалью, напряженіемъ въ правомъ подреберьи. неправильнымъ испражненіемъ на низъ густою яркочвѣтною мочою, ночечуиными припадками, слабымъ медленнымъ пульсомъ, частымъ кровавымъ поносомъ, желчными горячками, холерою, умственнымъ помѣшательствомъ и проч. Меланхолическій темпераментъ есть самый хилый и страдальческій по множеству болѣзней, ему свойственныхъ и по легкому ихъ развитію и мучительности. Это *болѣзненное расположеніе меланхолика усиливаютъ*: знойное время года и жаркій климатъ, сырая, туманная, продолжительная ненастная погода, жирная, бопченая, соленая пища, мясо и спиртные напитки, употребляемые въ излишествѣ, сидячая жизнь, продолжительное напряженіе умственныхъ способностей, особое занятіе отвлеченными науками, уединеніе и недостатокъ разсѣянности въ веселыхъ собраніяхъ, угнетающія страсти, неправильность и приостановленіе натуральныхъ отдѣленій, скрытіе сыпей, скорое заглѣченіе привычныхъ застарѣлыхъ язвъ, фонтанелей и проч.

Предохраненіе меланхолика отъ болѣзней основывается на удаленіи, если можно, вычисленныхъ причинъ; кромѣ того, здѣсь бывають полезны: легкая удобоваримая, питательная пища, чаще молочная, растительная, рыбная и рѣдко мясная, говядина и телятина, легкое виноградное вино (лучше бѣлое), разсѣянный образъ жизни, веселыя общества, пріятное препровожденіе времени въ семейномъ и дружескомъ кругу, прогулка, жителство на возвышенныхъ, сухихъ, освѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ, поддержаніе испарины, и особенно правильнаго испражненія низомъ, приличными діететическими средствами и простыми лѣкарствами; послѣднее обстоятельство такъ важно, что одни запоры на низъ и накопленіе въ кишкахъ вязкихъ слизей и черной, густой желчи, могутъ произвести случайную меланхолію, близкую къ умственному помѣшательству; при накопленіи этихъ нечистотъ въ желудкѣ, искусственная, а часто и произвольная рвота, скоро и явственно облегчаетъ мучительное положеніе меланхолика.

Флегматическій темпераментъ отличенъ особеннымъ развитіемъ

смѣ и дѣятельностію желудка, кишекъ, слизистыхъ оболочекъ и вообще кѣтчатой и жирной плевры. Флегматикъ имѣетъ ростъ тѣла посредственный, а часто и высокій. составъ тѣла рыхлый, губчатый, слабый, кожу мягкую, пухлую, бѣлую, безволосую, тѣло-сложеніе тучное съ значительнымъ накопленіемъ жира въ разныхъ мѣстахъ, особенно въ животѣ; грудь узкую, руки и ноги, особенно ихъ пальцы толстые, суставы припухлые, шею короткую, толстую, жирную, лице круглое, щеки полныя даже одутыя, губы толстыя, обвислыя, носъ мясистый, уши большія, глаза темныя, мутно-голубые, сѣрые, лобъ низкій, узкій, небольшой, голову маленькую, волосы на ней свѣтлые, свѣтло-каштановые, мягкіе и скоро вылѣзающіе. Черты лица вовсе невыразительны и безстрастны, взглядъ вялый, тусклый, безжизненный, голосъ не ясный, не чистый, часто тонкій (пискливый), рѣчь вялая, тихая, медленная, походка мѣрная, медленная, отъ тучности переважистая, движенія не свободныя, скоро утомляющія и особенное къ нимъ отвращеніе; температура тѣла низкая; позывъ на ѣду частый и удовлетвореніе его есть истинное наслажденіе флегматика; пищевареніе дѣятельное и скорое, отдѣленіе жира въ кѣтчатой плеврѣ происходитъ съ особенною дѣятельностію и производитъ тучность; другія отдѣленія и испраженія совершаются также правильно, но моча часто бываетъ мутно-блочковатая и съ осадкомъ. Флегматикъ не расположенъ ни къ любви, ни къ ненависти, но любитъ чувствennыя, спокойныя наслажденія, нѣгу и продолжительный глубокий сонъ и ненавидитъ умственныя занятія и тѣлесныя труды; прелести природы, красоты и искусства и общественныя произшествія его не трогаютъ; онъ понимаетъ медленно, судитъ неторопливо, разбираетъ дѣло хладнокровно и осторожно, читаетъ вѣрно и любитъ заниматься механическими работами, какъ доступнѣйшими для его слабого разсудка. Онъ терпѣливъ и постояненъ, совѣстливъ, справедливъ, любитъ чистоту и порядокъ. Флегматическій темпераментъ господствуетъ въ старческомъ возрастѣ, особенно въ женскомъ полѣ. Англичане-домосѣды и нынѣшніе голландцы представляютъ его типъ въ народной массѣ. Наше зажиточное купечество также изобилуетъ этимъ темпераментомъ.

Наклонность флегматика къ тучности и къ ослизенію располагаетъ его къ одышкѣ, къ разширенію венъ, къ грыжамъ, водяной болѣзни, къ отеку ногъ, сплизистому поносу, острому катарру и чахоткѣ, къ ганстамъ. къ различнымъ опухолямъ въ суставахъ въ видѣ грибовъ, къ лимфатическимъ опухолямъ, появляющимся на груди, шеѣ, спинѣ, въ пахахъ, къ бѣлымъ у женщинъ и къ сплизистому геморрою у мужчинъ, къ пострѣлу, къ ревматизму и дактилягрѣ, къ разнымъ сыпямъ и пр. *Расположеніе* флегматика *къ ослизенію усиливаютъ*: холодное и кислое питье, молодое пиво, молодья, бѣлыя легкія вина, овощной квасъ, бѣлое, молодое, нѣжное мясо (телятина, цыплята и пр.), мучнистая пища, горячій хлѣбъ, пироги, блины, незрѣлые плоды, зелень, овощъ, разные соусы, грибы, спячая праздная жизнь, пресыщеніе различными чувственными наслажденіями, холодное и сырое время года, низменное, неосвѣщенное солнцемъ и неочищаемое вѣтрами мѣстоположеніе и жилище, остановленіе испарины и пр.

Предохраненіе флегматика *отъ* его разныхъ *болѣзней* состоитъ *въ удаленіи* располагающихъ къ нимъ вышеназчисленныхъ *причинъ*; кромѣ того уничтожаютъ расположеніе къ скопленію слизи: возвышенное мѣстоположеніе, свѣтлое жилище, обращенное лицомъ на югъ или востокъ, частая прогулка по горамъ и въ сосновомъ лѣсу, верховая ѣзда, механическая работа, гимнастика, ношеніе на голомъ тѣлѣ фланелевой рубашки, растираніе тѣла щетками, суконками, спиртами, умѣренный сонъ на тюфякѣ, мясо взрослыхъ животныхъ, дичь, изъ огородной зелени разрѣшающіе сахарныя корни (спаржа, морковь, сельдерей, петрушка, цикорей и пр.), крѣпкія старыя вина, крѣпкое, старое, яровое пиво, пуншъ и горькія настойки, веселое общество и пр. Скопившуюся слизь нужно изгонять рвотными или же слабительными, смотря потому, находится ли она въ желудкѣ, или въ кишкахъ; слабительныя средства должны быть довольно сильны, чтобы могли разрѣшать всякую слизь: ихъ нужно употреблять по назначенію врача.

Изъ всего сказаннаго о темпераментахъ нашего организма видно, что они представляютъ болѣе или менѣе одностороннее развитіе главныхъ представителей нашей жизни. Но какъ совер-

шенство отдѣльной жизни и прочность личнаго здоровья состоитъ, какъ сказано выше, въ равновѣсїи и согласїи всѣхъ тѣлесныхъ и душевныхъ отправленій, то люди, въ устроенїи своего тѣла выказывающіе какой либо темпераментъ, вообще не наслаждаются ~~прочнымъ~~ здоровьемъ, и рѣдко бываютъ долговѣчны, и это тѣмъ справедливѣе, чѣмъ явственнѣе въ ихъ поступкахъ и тѣлѣ выражается извѣстный темпераментъ. Холерикъ имѣютъ самое прочное здоровье и наибольшую крѣпость силъ, но рѣдко достигаютъ глубокой старости: бурныя страсти и дѣятельная жизнь подвергаютъ ихъ хотя и рѣдкимъ, но за то жестокимъ болѣзнямъ, отъ которыхъ они рѣдко выздоравливаютъ; флегматики, по ихъ безстрастію и лѣни, наслаждаются здоровьемъ, рѣдко возмущаемымъ болѣзнями, но за то они ведутъ болѣе растительную жизнь, болѣе прозябаютъ тѣломъ, чѣмъ дѣйствуютъ духомъ; сангвиникъ болѣе другихъ наслаждается жизнью, хотя онъ преждевременно исчерпываетъ свои жизненные источники; но болѣе всѣхъ обиженъ природою меланхоликъ, осужденный на кратковременную жизнь; онъ ею почти и не наслаждается. Вообще сангвиникъ и флегматикъ наслаждаются жизнью въ настоящемъ, а холерикъ и меланхоликъ ожидаютъ этихъ наслажденій въ будущемъ и умираютъ, не достигнувъ наслажденій. Къ счастію однако, всѣ эти темпераменты весьма рѣдко развиваются въ людяхъ рѣзко и отдѣльно, а обыкновенно предусмотрительная попечительность промысла въ природѣ для упроченія нашего здоровья производитъ ихъ въ насъ *смѣшанно*, ограничивая одинъ другимъ; самое прочное здоровье и прекрасныя душевныя способности происходятъ изъ смѣшенія холерическаго темперамента съ флегматическимъ и сангвиническаго съ меланхолическимъ. Въ первомъ случаѣ излишество соковъ флегматика пожирается и перерабатывается у холерика особенно дѣятельностью легкихъ, сердца и артерій, бурное же дѣйствіе духа у послѣдняго ограничивается тихостью нрава перваго; а живость тѣлесныхъ дѣйствій и вѣтренность характера у сангвиника умѣряется медленностью тѣла и суровостью духа меланхолика; искусственно умѣрять эти крайности тамъ, гдѣ онѣ слишкомъ проявляются, можно только умѣняемъ, по выраженію философовъ, владѣть собою. Въ этомъ состоитъ истинная мудрость жизни, ос-

нованная на мудромъ познаніи самого себя, въ этомъ состоитъ благоразумный совѣтъ и лучший способъ сохранить здоровье свое и другихъ.

У. *Содержаніе* себя, относительно предразсудковъ, имѣетъ важное вліяніе на сохраненіе здоровья. Эти предразсудки суть: 1) *Страсть пускать кровь* при всякомъ нездоровьѣ: головной боли, тяжести въ тѣлѣ, жарѣ, ломотѣ въ членахъ. Кровопусканіе сильнѣе всѣхъ лѣкарствъ ослабляетъ крѣпость тѣла даже и тогда, когда оно, по роду болѣзни, необходимо для ея излѣченія; тѣмъ вреднѣе пускать кровь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эта мѣра совсѣмъ не нужна и гдѣ она въ корни подрываетъ здоровье и крѣпость, особенно при дѣятельномъ образѣ жизни поселянъ. Рабочій поселянинъ, преимущественно поденщикъ, какъ трудолюбивый муравей, въ пыли, въ грязи, въ сору, съ ношею, нерѣдко превышающею его самого, проводитъ весь день, съ восхожденія до захожденія солнца, въ непомѣрныхъ трудахъ его тяжелой работы. Ни лѣтній зной солнца, ни стужа жестоко-морозной зимы, ни мокрота весенней распутицы, ни сляготь ненастной осени, ничто не удерживаетъ заботливаго крестьянина отъ постоянныхъ и усиленныхъ трудовъ его. Истощенныя силы его едва лишь успѣютъ въ отдыхъ ночи вознаградиться, какъ опять утрачиваются въ наставшей работѣ слѣдующаго дня и такимъ образомъ хотя развиваются въ немъ все болѣе и болѣе, но это развитіе силъ въ работникѣ зависитъ отъ его постоянной дѣятельности, а въ сущности онъ изнуренъ и всегда слабѣе празднаго, покойнаго, по видимому слабаго и нѣжнаго владѣльца, или подобнаго себѣ, въ избыткѣ и на свободѣ живущаго крестьянина. Замѣчено, что рабочіе простолюдины скорѣе ослабѣваютъ отъ лѣкарствъ испражняющихъ и средствъ уменьшающихъ и выпораживающихъ соки, нежели люди, болѣе или менѣе, праздные; даже слуги, имѣющіе крѣпкое тѣлосложеніе и хорошее здоровье, болѣе поражаются слабительными и кровопусканіемъ, нежели ихъ господа, которыя гораздо слабѣе и нѣжнѣе. Поэтому несчастные земледѣльцы, поступившіе въ лазаретъ, всегда почти, колы скоро лѣчатъ ихъ на ряду съ другими слабительными и кровопусканіемъ, не обращая вниманія на ихъ слабость, происходящую отъ непомѣрныхъ трудовъ, бываютъ жертвою такого къ нимъ невниманія.

Отъ этого происходитъ то, что эти бѣдняки желаютъ охотѣе умереть у себя въ хлѣву, нежели идти въ больницу. Тутъ подлинно трудно рѣшить, говорить Д-ръ Никитинъ, что болѣе дѣлаетъ жертвъ — вса смерти, или ланцетъ хирурга. 2) *Предубѣжденіе*, что буда бы больной, чувствующій себя слабымъ, не можетъ перенести употребленія ни рвотнаго, ни слабительнаго, ни кровопусканія, гдѣ оно нужно, — это предубѣжденіе ложно: такая слабость есть мнимая и зависитъ не отъ дѣйствительнаго недостатка силъ, а отъ подавленія ихъ скопившимися въ желудкѣ нечистотами, особенно желчью, прилившею къ какому либо органу въ большемъ количествѣ крови. Съ удаленіемъ этихъ причинъ рвотнымъ, слабительнымъ, кровопусканіемъ, подавленныя силы освобождаются отъ подавлявшей ихъ тягости, и потому больные послѣ этихъ средствъ, умѣсто употребленныхъ, чувствуютъ себя крѣпче. Притомъ рвотное, дающее при началѣ повальной болѣзни, — оспы, бора, скарлатины, поноса, измѣняетъ ходъ самой болѣзни и дѣлаетъ ее неопасною. 3) Еще болѣе вредитъ слѣдующій предразсудокъ: слабого больного, для укрѣпленія его, *заставляютъ есть* похлѣбку, супъ, жаркое, пироги; пища, съѣденная больнымъ противъ его желанія и даже съ отвращеніемъ, крѣпитъ болѣзнь, а не больного, у котораго позывъ на ѣду появляется не прежде, какъ когда его желудокъ придетъ въ состояніе надлежащимъ образомъ переваривать пищу. 4) Равно вредно *отказывать* больнымъ *въ питаніи* изъ опасенія, чтобы они не простудились и изъ ложнаго страха, что чувствуемая больнымъ жажда, какъ требованіе болѣзни, усилитъ болѣзнь. 5) Далѣе, вредно и даже опасно больного потѣющаго или страдающаго лихорадочною сыпью, оспою, корью, скарлатиною, краснухою и пр. плотно укутывать одѣялами, перинами, жарко нагрѣвать его комнату, не отбывать окошка, изъ опасенія, чтобы онъ не простудился: здѣсь нужно замѣтить, что, если вредно остановленіе испаринны, то не менѣе вредно и пагубственно вынужденный потъ. 6) Также вредны *частыя посѣщенія* труднаго больного его родными и знакомыми: излишніе посѣтители наводятъ страхъ на больного, невольно обращая его вниманіе на опасность его болѣзни, портятъ своимъ дыханіемъ воздухъ въ его комнатѣ; но обо всемъ, что касается до больныхъ, будетъ сказано

подробно при описаніи каждой болѣзни въ частности. равнымъ образомъ и о содержаніи себя относительно чистоплотности и во время появленія повальныхъ болѣзней, (см. предохраненіе здоровья во время появленія повальныхъ болѣзней).

Независимо отъ изложенныхъ достаточныхъ свѣдѣній о главныхъ источникахъ происхожденія болѣзней и о предохранительныхъ противу нихъ мѣрахъ, по которымъ сельскій священникъ можетъ быть полезнымъ совѣтникомъ для своихъ прихожанъ, ему, знающему хорошо бытъ своихъ прихожанъ и тѣ особые случаи неосторожности, по которымъ каждый изъ нихъ въ особенности занемогаетъ, нужно знать для поданія частной врачебной помощи: свойство, признаки, видоизмѣненія, причины каждой изъ тѣхъ болѣзней, коимъ наибѣе подвергаются поселяне, преимущественно простой народъ; уметь распознавать какою собственно болѣзнію прихожанинъ его страдаетъ, какія поэтому преподавать правила близкимъ, окружающимъ больного роднымъ для надлежащаго за нимъ ухода и содержанія въ поправленію его здоровья, либо самому больному, коль скоро силы его позволяютъ ему владѣть собою: въ случаѣ же, если этихъ принятыхъ приличныхъ мѣръ противу каждой болѣзни будетъ недостаточно, то чѣмъ изъ простыхъ, или, по крайней мѣрѣ, менѣе сложныхъ средствъ (лѣкарствъ) помочь ему, и какъ лучше, удобнѣе, проще тѣмъ или другимъ изъ нихъ дѣйствовать, примѣняясь, кромѣ свойствъ болѣзни, къ тѣлосложенію, возрасту, темпераменту, быту, образу жизни, климатической мѣстности больного и времени года для излѣченія его болѣзни, чтобы врачебное пособіе было оказано и, соответственно какъ врачебному правилу: скоро, безопасно и пріятно (*cito, tuto et jucunde*), такъ и цѣли или намѣреніямъ самой природы, въ полномъ убѣжденіи, что *она лечитъ болѣзни, а врачи ея управители* (*natura curat morbos, medici vero ejus sunt ministri*). Самоучитель Сельскаго Лѣченія для этого содержитъ въ себѣ всѣ возможныя, по состоянію современной врачебной науки, свѣдѣнія, которыя въ тѣсномъ смыслѣ слова даютъ полное значеніе для его опредѣленія.

Итакъ Специальный Сельскій Лѣчебникъ, какъ самоучитель, научаетъ каждого, особенно духовныхъ лицъ, познавать сущность

всякой, наипаче случающейся между поселянами, особенно простымъ народомъ, болѣзни съ ея признаками, причинами и способомъ ея лѣченія посредствомъ соблюденія діететическихкихъ правилъ и употребленія менѣе сложныхъ лѣкарствъ, соотвѣтственно быту и званію поселянина *), для ихъ прихода, когда нѣтъ врача.

Предметъ его составляютъ: 1) изложеніе болѣзней, которыми наипаче подвергается простой народъ съ ихъ существеннымъ значеніемъ, причинами, какъ внутренними (предрасполагающими), такъ и вѣшними (производящими), признаками развитія ихъ въ формахъ обыкновенныхъ и видоизмѣненныхъ съ показаніемъ особыхъ, характеристическихкихъ, служащихъ къ распознаванію преимущественнаго сходства нѣкоторыхъ болѣзней между собою, равно и такихъ, которые, смотря по ходу болѣзни, могутъ быть знаменателями благовиднаго и неблаговиднаго исхода ея, какъ для предсказанія объ ней, такъ и для того, дабы въ первомъ случаѣ способствовать надлежащими средствами благополучному и скорѣйшему ея окончанію, а въ послѣднемъ предупреждать и поправлять дурное направленіе болѣзни домашними, народными, болѣе простыми средствами, съ указаніемъ на лѣкарства, которые позволено отпускать изъ аптекъ безъ рецептовъ, а также и на самыя необходимыя изъ сильнодѣйствующихъ, которыми духовное лицо можетъ заpastись чрезъ врача, каковы, ипекагуана, хининъ, нарывной пластырь и пр. съ предосторожностію ихъ употребленія, не упуская изъ виду: бровопусканія посредствомъ рожковъ и пѣвковъ, случаевъ, въ которыхъ можно совѣтовать кровопусканіе изъ вены съ указаніемъ на вредное его дѣйствіе. 2) Правила о попеченіи и хожденіи за роженицами и родильницами. 3) Правила о попеченіи и хожденіи за новорожденными. 4) Наставленіе объ оживленіи утопленниковъ, удавленыхъ, замерзшихъ и проч. и о томъ, какъ должно поступать при отравленіяхъ.

Цѣль или назначеніе самоучителя спеціальнаго сельскаго лѣченія состоитъ въ сохраненіи и поправленіи здоровья каждаго изъ поселянъ, особенно простаго народа, когда нѣтъ врача. Этотъ

*) Подъ именемъ поселянъ разумѣются сельскіе жители всѣхъ сословій, но преимущественно простой народъ.

классъ людей у насъ, какъ и вездѣ, есть самый обширный, наиболѣе нуждающійся во врачебномъ пособіи, потому что, будучи необразованъ, бѣденъ, большею частію безграмотенъ и, находясь въ непрерывныхъ трудахъ, занемогаетъ, страждетъ и бываетъ очень часто жертвою своего невѣдѣнія, неопытности и неимѣнія по близости никого, къ кому бы онъ могъ прибѣгнуть за совѣтомъ для сохраненія своего здоровья и въ особенности за врачебною помощію въ случаѣ болѣзни, преимущественно опасной и скоротечной, кромѣ сельскихъ знахарей, ворожеевъ, дѣйствующихъ наговорамъ отъ притки; за которую почитаютъ всякую болѣзнь, и другихъ шарлатановъ, нерѣдко такъ искусно притворяющихся свѣдущими и безкорыстными, что трудно постигнуть ихъ не только простолюдину, но и образованному человѣку. По необъятной обширности Россіи и большому разстоянію между городами и селеніями, не смотря на увеличивающееся ежегодно число врачей, владѣльцы и простолюдины не получаютъ надлежащаго врачебнаго пособія въ своихъ болѣзняхъ и не могутъ пользоваться совѣтами врача въ важныхъ случаяхъ сбереженія ихъ здоровья, даже и тогда, когда бы всѣ штатныя мѣста врачей были заняты дѣйствительными врачами, и когда бы число медицинскихъ мѣстъ по губерніямъ было удвоено и даже утроено противъ нынѣшняго. Какая польза для пораженнаго пострѣломъ, для отравившагося, задохшагося отъ угара крестьянина, для истекающей кровію женщины, что въ ихъ уѣздномъ городѣ есть уѣздный, городской и окружный врачъ, когда городъ отстоитъ отъ селенія и мѣстечка на нѣсколько десятковъ верстъ, и когда самый врачъ, во время несчастія въ селеніи, отлучился изъ города подѣламъ службы далеко отъ мѣста несчастія?— Ударъ, отравленіе, кровотеченіе, каждую минуту угрожаютъ имъ смертію, а врачъ къ больнымъ пріѣдетъ, можетъ быть, чрезъ недѣлю. Эти случаи по ихъ разнообразію и количеству, безчисленны и въ нихъ-то простое врачебное пособіе бываетъ дѣйствительно и должно быть произведено безъ отлагательства. Всѣ люди должны знать медицину, сказалъ отецъ ея Гиппократъ. Эта истина ясно выражается внутреннимъ стремленіемъ каждаго изъ насъ пособить больному ближнему нашему совѣтомъ, наставленіемъ, лѣкарствомъ, котораго пользу мы испытали на себѣ, или узнали отъ

другихъ, прочитали въ книгѣ, такъ что каждый изъ насъ въ свою очередь бываетъ лѣкаремъ другаго. Пословица говоритъ справедливо: «сколько людей, столько и лѣкарей». Это внутреннее побужденіе каждаго человѣка лѣчить больнаго собрата не всегда проходитъ изъ суетности, или хвастовства, но чаще изъ внутренняго расположенія сострадательной души, изъ невольнаго призыва чело-вѣколюбія, изъ врожденнаго чувства — помогать подобному себѣ въ его болѣзни, какъ истинномъ физическомъ несчастіи. Между тѣмъ самые образованные люди, относительно медицины, находятся въ такомъ глубокомъ невѣдѣніи, что каждаго изъ насъ можно такъ же легко обмануть въ его здоровьѣ, какъ ребенка въ его игрушкахъ; они, а тѣмъ болѣе простой народъ, безпрекословно вѣрятъ чудеснымъ рассказамъ шарлатана, не спрашивая его, на чемъ они основаны. Это оттого, что медицина почему-то не входитъ въ составъ наукъ, общихъ учебнымъ заведеніямъ и потому ей не предоставлено впадать свою лепту въ общую сокровищницу воспитанія юношей и чрезъ то она остается таинственностью для всѣхъ, кромѣ не большой касты людей, которые къ ней пріютились и съ нею сроднились. Въ такомъ случаѣ медицина, какъ наука, хотя чуждая, но нужная народу, во всякомъ случаѣ по крайней мѣрѣ должна быть близкою, всюду и вездѣ доступною ему. Къ тому же основаніемъ медицины можетъ быть только опытъ, подтверждаемый множествомъ повторительныхъ наблюденій, доставляемыхъ большимъ числомъ наблюдателей, хотя не врачей, но здравомыслящихъ людей, и если сирдобольныя сестры и сидѣлки, не имѣющія никакихъ свѣдѣній въ медицинѣ, по единственно отъ времени и безпрестаннаго нахожденія при больныхъ такъ вѣрно изучаютъ ходъ болѣзней, что безошибочно предсказываютъ хорошія и худыя перемѣны въ больномъ, то-тѣмъ болѣе духовныя лица, у которыхъ постоянно бываетъ въ виду каждый ихъ прпхожаніи съ минуты его рожденія до гробовой доски и зарытія въ могилу бездыханнаго тѣла его, слѣдовательно въ здоровомъ, болѣзненномъ и мертвомъ его состояніи. Изучая практически человѣка во всѣхъ этихъ трехъ видоизмѣненіяхъ его тѣла, они имѣютъ много на своей сторонѣ выгодныхъ преимуществъ предъ прочими, занимающимися медициною, людьми, въ достиженіи этой практической цѣли къ удовлетво-

ренію врачебныхъ потребностей со стороны селскаго народа, для пользы каждаго поселяннина въ частности и всего народонаселенія въ простомъ быту обширнаго нашего государства вообще; даже въ нѣкоторомъ, по важномъ отношеніи, имѣютъ большое преимущество предъ дѣйствительными врачами; потому что духовное лицо видитъ каждаго труднаго больнаго изъ своихъ прихожанъ въ селѣ- нии, а врачъ, можетъ быть изъ сотни и болѣе больныхъ въ городѣ, - видитъ только одного изъ нихъ, что совершенно зависить отъ приглашенія въ первомъ случаѣ по догматамъ религіи, а въ послѣ- днемъ по частному желанію врачебной помощи. Въ такомъ случаѣ наглядка на болѣзни у духовныхъ лицъ очень много можетъ имѣ- нно способствовать къ практическому распознаванію болѣзней, въ особенности по этому самоучителю. *Относительно поправле- нія здоровья* нужно соблюдать слѣдующія правила: 1) Прежде всего нужно *распознать болѣзнь*, опредѣлить ея сущность, родъ, видъ и степень. Это важнѣйшая часть лѣчебника и вра- чующаго. Тотъ, кто удачно распознаетъ болѣзнь, вѣрно будетъ имѣть успѣхъ и въ ея лѣченіи, если только она доступна излѣ- ленію. Удачное, безошибочное распознаваніе болѣзни приобрь- тается по сему самоучителю опытомъ, временемъ и частымъ об- ращеніемъ съ больными; по этому всячески нужно стараться о при- обрѣтеніи этой способности распознаванія болѣзни. Частая наглядка духовныхъ лицъ къ труднымъ больнымъ и знаніе каждаго изъ при- хожанъ своихъ во всѣхъ отношеніяхъ ихъ жизни облегчитъ имъ этотъ трудъ, и они при этомъ, узнавъ предварительно, каковы бо- лѣзнямъ каждый поселяннинъ-прихожанинъ ихъ бываетъ подверженъ по его быту и званію, климатической мѣстности жилищъ и вре- мени года и пр. изъ особыхъ статей объ этомъ, и изучивъ пане- редь отличительныя существенныя свойства болѣзней изъ опредѣ- ленія классификаціи ихъ системы, могутъ опредѣлять болѣзни без- ошибочно вѣрно въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ здѣсь предста- влены. Имѣя въ виду, что главное дѣленіе болѣзней основывается на преимущественномъ и недостаточномъ количествѣ лихорадоч- ныхъ болѣзненныхъ перемѣнъ (припадковъ), нужно прежде всего у постели больнаго опредѣлить къ какому отдѣленію принадлежить его болѣзнь, т. е. лихорадочная ли она, или не лихорадочная. При

этомъ надобно помнить, что и изъ числа лихорадочныхъ болѣзней бываютъ нѣкоторыя не лихорадочныя и наоборотъ изъ числа нелихорадочныхъ болѣзней бываютъ нѣкоторыя лихорадочныя, что зависитъ отъ степени ихъ развитія, въ первомъ случаѣ слабого, а въ последнемъ сильнаго, и отъ почвы (органической массы) тѣла больного. Потомъ, къ какому классу относится болѣзнь, къ воспаленіямъ ли, лихорадочнымъ сыпямъ, слизотеченіямъ, лихорадкамъ и горячкамъ изъ числа первыхъ, или къ болѣзнямъ нервовъ, крови, питанія, отложеній, отдѣленій и испражнений и мѣстнымъ изъ числа послѣднихъ, т. е. не лихорадочныхъ? При этомъ нужно помнить, что воспаления и горячки часто бываютъ вмѣстѣ, но первые отъ послѣднихъ отличаются постоянною, болѣе или менѣе острою болью въ страждущемъ мѣстѣ тѣла, чувствуемою самимъ больнымъ, либо при дотрогиваніи больного мѣста испытывающею рубкою врачующаго; а послѣднія отъ первыхъ — внутреннимъ жаромъ и расслабленіемъ тѣла безъ всякой боли; лихорадки — ихъ опредѣленною періодичностію, лихорадочныя сыпи — высыпью на поверхности тѣла съ предшествовавшимъ ознобомъ и потомъ жаромъ, а слизотеченія увеличеннымъ отдѣленіемъ слизистыхъ мокротъ. Классификація болѣзней нелихорадочныхъ основывается на преимущественномъ страданіи которой либо изъ системъ тѣла, какъ-то: нервной, кровеносной, плототворительной, отложительной, отдѣлительной и испражнительной, извѣстныхъ духовнымъ лицамъ изъ народной медицины. Опредѣливши классъ болѣзни, слѣдуетъ опредѣлить по частнымъ болѣзненнымъ признакамъ родъ, видъ, степень, сущность и причину болѣзни, какъ внутреннюю, къ ней предрасполагающую, такъ и вѣшнюю, ее производящую, потомъ немедленно приступать къ лѣченію болѣзни посредствомъ соблюденія правилъ діететическаго лѣченія, основаннаго на удаленіи причинъ болѣзни, предоставляя все прочее цѣлительной силѣ натуры тѣла больного, т. е. его собственному, внутреннему, священному врачу; а гдѣ этого не достаточно, можно присоединять дѣйствіе простыхъ и менѣе сложныхъ лѣкарствъ, исчисленныхъ и подробно описанныхъ въ лѣченіи каждой болѣзни существенномъ, основанномъ на поправленіи сущности болѣзни, въ такомъ точно порядкѣ, въ какомъ они представлены. При этомъ нужно помнить, что лѣченіе

существенное, какъ бы просто ни было, за всѣмъ тѣмъ требуетъ безошибочнаго назначенія лѣкарствъ, слѣдовательно, полнаго убѣжденія, что болѣзнь распознана вѣрно; въ случаѣ же сомнѣнія гораздо лучше ограничиваться однимъ діететическимъ лѣченіемъ, придерживаясь правила — лучше ничего съ своей стороны не дѣлать и наблюдать за ходомъ болѣзни и уходомъ за больнымъ по преподаннымъ діететическимъ правиламъ, чѣмъ вредить ему, тѣмъ болѣе когда не предвидится въ болѣзни особой опасности. Въ противномъ случаѣ вездѣ, гдѣ самоучитель совѣтуетъ приглашать врача, непременно должно выполнить этотъ совѣтъ, чтобы въ послѣдствіи не подвергнуться нареканію стороннихъ людей и упрекамъ собственной совѣсти, и только когда нѣтъ врача употреблять предлагаемое лѣченіе. 2) Лѣча болѣзнь посредствомъ соблюденія діететическихъ правилъ, должно всегда соображаться съ особыми правилами, изложенными въ описаніи рабочихъ поселянъ по ихъ быту и званію, равнымъ образомъ и въ существенномъ лѣченіи; относительно употребленія средствъ выпораживающихъ, какъ-то: рвотныхъ и слабительныхъ и кровопусканія, всегда нужно примѣняться къ этимъ правиламъ, какъ о томъ показано вездѣ въ статьяхъ о лѣченіи болѣзней; словомъ для практической пользы нужна точность при лѣченіи безъ всякаго отступленія даже въ порядкѣ представляемыхъ средствъ. Самоучитель спеціальнаго сельскаго лѣченія, имѣя въ виду быть вѣрнымъ своему назначенію, простымъ, яснымъ, понятнымъ въ изложеніи предметовъ, изъ коихъ болѣзни описаны простымъ общепринятымъ, а прочія статьи, какъ и вступленіе, простымъ народнымъ слогомъ, удобопонятнымъ каждому рускому, болѣе или менѣе образованному человѣку, позволяетъ себѣ вносить только то, что вѣками и цѣлыми поколѣніями испытано, доказано, определено и подтверждается ежедневными опытами, что доступно, какъ по цѣнности, такъ и по удобству приобрѣтенія въ сельскомъ быту, съ присоединеніемъ новыхъ наблюденій врачей въ разныхъ мѣстахъ Россіи, народныхъ врачеваній посредствомъ средствъ симпатическихъ, ладонокъ и проч., и обращаетъ особое вниманіе на болѣзни лихорадочныя, особенно воспалительныя, какъ на скоротечныя, требующія скорой помощи, на домашнія, туземныя, простыя, ма-

досложныя и дешевыя средства. Въ этомъ отношеніи самоучитель спеціального лѣченія преподаетъ врачебную силу, ея дѣйствіе, пріемъ, и способъ употребленія всего того, что только представляютъ домашній бытъ, сельское хозяйство, огороды, сады, поля, ~~луга~~, лѣса и пр. Сильнодѣйствующія врачебныя средства исключены въ немъ, кромѣ нѣкоторыхъ, очень не многихъ, необходимыхъ, какъ-то: рвотный корень, рвотный камень, хининъ, нарывной пластырь, синий купоросъ, ляписъ, оній, галлеровъ эликсиръ и пр., отпускаемыхъ изъ аптекъ по рецептамъ.

Порядокъ, въ коемъ располагаются обыкновенно болѣзни, по взаимному сходству и несходству ихъ между собою, называется систематическимъ, или системою, которая у разныхъ авторовъ, по различному ихъ взгляду на болѣзни довольно многоразлична. Система припадочная (симптоматическая), въ особенности наставника моего профессора Дядьковского, основывающаяся на признакахъ формъ болѣзней, по ихъ теченію и степени развитія — удовлетворительнѣе прочихъ для руководства въ изложеніи болѣзней этого самоучителя врачеванія.

Сходство и несходство между болѣзнями по ихъ сущности ближе показываетъ внутреннее ихъ существенное различіе. Смотра на нихъ съ этой точки зрѣнія, мы видимъ, что всѣ онѣ сопровождаются признаками, обнаруживающими явственно либо возвышенное состояніе нервной системы, либо уменьшенную ея дѣятельность. По этому основному состоянію нервной системы, относительно другихъ системъ тѣла, всѣ болѣзни раздѣляются на два отдѣленія, т. е. на болѣзни:

1. Лихорадочныя.
2. Не лихорадочныя.



ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

БОЛѢЗНИ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е. Лихорадочныя болѣзни суть тѣ, которыя, основываясь на возвышенномъ состояніи нервной системы, обнаруживаются: 1) чувствомъ изнеможенія, 2) ускореннымъ жилогісіемъ, 3) увеличенною теплотою, 4) опредѣленнымъ отношеніемъ всѣхъ болѣзненныхъ признаковъ между собою и опредѣленною продолжительностью хода болѣзни.

П р и з н а к и лихорадочныхъ болѣзней ограничиваются слѣдующими періодами: *Первый періодъ* состоитъ изъ признаковъ (припадковъ), называющихся *лихорадочными предвозвѣстниками*, каковы суть: расслабленіе и изнеможеніе, нерѣдко съ головою болью, вкусъ и позывъ на пищу испорченные, нерасположенность къ занятіямъ, иногда и потягота, а иногда и зѣвота вмѣстѣ. *Второй періодъ* — *время развитія лихорадочныхъ болѣзней*; его составляютъ: чувство холода, переходящее во многихъ случаяхъ въ ознобъ, а въ нѣкоторыхъ и въ самую дрожь. *Третій періодъ* — *развитіе* во всемъ тѣлѣ *жара*, болѣе или менѣе сильнаго. *Четвертый періодъ* — *разрѣшеніе болѣзни*, когда всѣ припадки, достигши высшей степени развитія своего, начинаютъ уменьшаться, или измѣняются въ другіе, съ образованіемъ другой болѣзни, будетъ ли послѣдняя лихорадочная, или нелихорадочная. *Пятый періодъ* — *уменьшеніе болѣзни*. Это есть время продолженія разрѣшенія. Этотъ періодъ, большею частию свойственный непрерывнымъ и послабляющимъ горячкамъ, замѣчается также и при воспаленіи.

Р а с п о з н а в а н і е лихорадочныхъ болѣзней весьма *легко* по свойственнымъ имъ признакамъ, ясно отличающимъ ихъ отъ всѣхъ другихъ болѣзней, но бываетъ *трудно* въ тѣхъ случаяхъ, когда лихорадочная болѣзнь обнаруживается или однимъ какимъ либо припадкомъ, напр. или жаромъ, или потомъ, при отсутствіи другихъ, а еще труднѣе, когда вмѣсто одного пароксизма самаго обыкновеннаго бываетъ припадокъ совсѣмъ не свойственный лихорадкамъ, только появляющійся периодически. Такъ нерѣдко обыкновенный лихорадочный пароксизмъ замѣняется ломомъ во всемъ тѣлѣ и даже въ одной какой либо части его, или падучею болѣзнію и пр.

Сущность перваго періода лихорадочныхъ болѣзней состоитъ въ онѣмѣніи всей нервной системы, втораго — въ усиленномъ противо-дѣйствіи высшей нервной системы, особенно системы бровотворитель-

ной, третьяго — въ отторженіи органическаго вещества въ видѣ отдѣленій и испражнений.

Причины, предсказаніе и лѣченіе излагаются при обзорѣ каждой лихорадочной болѣзни порознь.

Исходъ лихорадочныхъ болѣзней троякій: *въ здоровьѣ, другую болѣзнь и смерть*. Лихорадочная болѣзнь никогда не переходитъ въ ~~здоровье~~ иначе, какъ при предшествовавшемъ отдѣленіи и испражненіи отторженнаго вещества, болѣе или менѣе явномъ, что и называется рѣшеніемъ болѣзни (*morbi crisis et lysis*). Таковыя отдѣленія и испражненія совершаются потомъ, испражненіемъ на низъ, мочою, кровотеченіемъ и рѣдко слюноотеченіемъ. Рѣшеніе болѣзни совершается въ опредѣленные дни при данныхъ условіяхъ. *Рѣшительные дни*, болѣею частію, *нечетные*, таковы суть: 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 27, 35, 41. Обыкновеннѣйшіе и самые *надежнѣйшіе* рѣшительные дни: 3, 7, 11, 21; прочіе мало надежны. Кромѣ сего періодичнаго теченія, лихорадочныя болѣзни имѣютъ еще періодичность суточную, и именно: *къ ночи ожесточаются, а къ утру ослабѣваютъ*. Такъ бываетъ болѣею частію. Въ этихъ болѣзняхъ рѣшеніе удобнѣе происходитъ утромъ.

Раздѣленіе. Всѣ лихорадочныя болѣзни, смотря по признакамъ, свойственнымъ каждой изъ нихъ порознь, можно раздѣлить на слѣдующіе 4 класса: 1. *Воспаленія*, въ коихъ прежде, нежели обнаружится лихорадочное состояніе, обнаруживаются болѣе или менѣе явственно: мѣстная боль, опухоль, краснота и жаръ. 2. *Сыпи*, начинающіяся лихорадочными припадками, за коими въ опредѣленное время появляется сыпь, оканчивающаяся различнымъ образомъ по различію самыхъ сыпей. При этомъ во время высыпанія появляется вторичная лихорадка, впрочемъ тогда только, когда высыпаніе бываетъ въ видѣ прыщей, какъ напр. въ оспѣ. 3. *Лихорадки* собственно, которыя обнаруживаются лихорадочными припадками безъ мѣстныхъ предшествовавшихъ припадковъ. 4. *Слизетеченія*, въ которыхъ сначала бываетъ мѣстное раздраженіе въ какомъ-либо отдѣлительно-испражнительномъ органѣ, сопровождаемое чувствомъ зуда или настоящею болью, а въ слѣдъ за этимъ болѣе или менѣе слизистое отдѣленіе и испражненіемъ, къ коимъ присоединяется лихорадочное состояніе.

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.

О ВОСПАЛЕНІИ ВООБЩЕ.

О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е. Воспаленіе состоитъ въ возвышенномъ состояніи раздражительности и чувствительности воспаленной части. въ большемъ приливѣ крови и другихъ влагъ, съ наклонностію ихъ сгущаться и превращаться въ плотный составъ. Воспаленіе обнаруживаетъ у самого больного опухоль, красноту, жаръ и боль наружныхъ частей, а въ частяхъ внутреннихъ чувствуется въ то же время боль, жаръ и лихорадочныя движенія, болѣе или менѣе явственныя, которыя исполнены подчинены мѣстнымъ признакамъ болѣзни: чѣмъ сильнѣе послѣднія, внутреннія страданія, тѣмъ сильнѣе и наружныя.

Т е ч е н і е. Иногда воспаленіе протекаетъ всѣ періоды лихорадочныхъ болѣзней: начало, возрастаніе, высоту, уменьшеніе и окончаніе; а иногда ограничивается двумя или тремя. Самый порядокъ развитія признаковъ бываетъ неодинаковъ: иногда задолго до появленія воспаленія обнаруживаются лихорадочныя движенія, а иногда и по развитіи воспаленія ихъ совсѣмъ не бываетъ. Воспаленія оканчиваются большею частию въ 7. рѣдко продолжаются долѣе 12, а еще рѣже 21 сутокъ.

Р а з д ѣ л е н і е. Въ воспаленіяхъ нужнѣе и полезнѣе всего смотрѣть на измѣненіе органической матеріи, какъ со стороны ея качества, такъ и со стороны жизнедѣятельности. Въ этомъ существенномъ отношеніи воспаленія раздѣляются на: 1. *Кровяныя*, въ которыхъ раздражительность чрезвычайно велика: прилившая и скопившаяся кровь видимымъ образомъ прензобилуетъ началами: волокнистымъ и красящимъ; опухоль бываетъ чрезвычайно твердая и красная. 2. *Пасочныя* (лимфозныя) въ которыхъ раздраженіе не велико, скопившаяся кровь изобилуетъ пасокою (лимфою) болѣе, нежели упомянутыми началами, при чемъ очевидно измѣненіе органической матеріи въ ея смѣшеніи; добавляется это тѣмъ, что воспалительная опухоль бываетъ не столь тверда, не столь красна и весьма легко переходитъ въ изъязвленіе. 3. *Смѣшанныя*, которыя занимаютъ средину между двумя сказанными, т. е., кровяно-пасочныя и пасочно-кровяныя, смотря по тому, чего болѣе бываетъ замѣтно въ мѣстномъ приливѣ: крови-ли, а менѣе пасоки, или болѣе пасоки, чѣмъ крови.

Изъ воспаленій чаще всѣхъ случаются у поселянъ слѣдующія. *Чирей, или вередъ, огненикъ, нарывъ, нарывъ въ легкихъ, ноготьда, рожа красная, рожа бѣлая, окологлазница, ушное воспаленіе, внутреннее головное воспаленіе, внутреннее спинное воспаленіе, жаба зѣва, воспаленіе дыхательнаго горла, воспаленіе легкихъ, воспаленіе подреберной плевы, воспаленіе сердца и его сумочки, воспаленіе*

грудобрюшной преграды, воспаленіе печени, воспаленіе селезенки, воспаленіе желудка, воспаленіе кишокъ, воспаленіе брюшины, воспаленіе матки, воспаленіе мочевого пузыря, воспаленіе почекъ, ревматизмъ, поясничница, глазовоспаленіе.

Вередъ, или чирей.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Чирей есть кровавое воспаление, обнаруживающееся твердою, красною, лоснящеюся, ограниченою опухолью, занимающею кожу съ подлежащею ей жирною или подкожною клетчаткою, нагнаивающеюся въ самомъ центрѣ своемъ, съ образованіемъ особеннаго тѣла, называемаго стержнемъ.

ПРИЗНАКИ. На мѣстѣ болѣзни появляется сперва небольшой колючій зудъ, а при чесаніи чувствуется легкая боль. Потомъ является твердость, образуется опухоль, достигающая величины орѣха, а не рѣдко голубинаго и даже куриного яйца. При этомъ постепенно усиливается боль, къ которой не рѣдко присоединяются лихорадочныя движенія: у людей чувствительныхъ развиваются они въ форму настоящей горячки, съ ожесточеніемъ преимущественно въ ночное время. На 5—7 день, а въ упорныхъ случаяхъ и на 10-й, образуется прыщъ, содержащій въ себѣ сывороточную влагу. Прыщъ этотъ прорывается однимъ, либо нѣсколькими отверстіями, чрезъ которыя истекаетъ кровавистый гной, затѣмъ дѣлается легче, стержень отдѣляется сама натура, и происходитъ заживленіе.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Смотря по тому, по одиначкѣ ли являются чирьи на тѣлѣ, или съ появленіемъ одного появляются и другіе, получаютъ они разные названія. Въ первомъ случаѣ чирей называется *уединеннымъ*, а въ послѣднемъ *стадовымъ*.

ПРИЧИНЫ ВНУТРЕННІЯ (предрасполагающія). Полнокровіе тѣла съ ожесточеніемъ, или ослизненіемъ, происходящее: 1) вслѣдствіе предшествовавшихъ тяжкихъ болѣзней: горячки, воспаления, не совсемъ рѣшившихся; 2) отъ непонятной особенности въ юношескомъ возрастѣ; 3) отъ засоренія желудка и кишокъ, вслѣдствіе неправильнаго употребленія пищи и питья.

ПРИЧИНЫ НАРУЖНЫЯ (производящія): неопрятное содержаніе тѣла, какъ-то: рѣдкая перемѣна бѣлья, необмываніе себя послѣ пота отъ трудовъ во время работъ и т. п., перемѣна образа жизни, привычка пускать кровь, укушеніе насѣкомыхъ въ родѣ вшей и волосатика. Живодеры, сыромятники, кожевники и волосняники, торгующіе волосомъ, преимущественно бываютъ подвержены вередамъ.

Замѣчаніе. Послѣдняя причина, именно укушеніе, подлежитъ сомнѣнію и дальнѣйшимъ наблюденіямъ.

Исходъ. Чирей, большею частію, переходитъ въ *нагноеніе* и въ скорое потомъ *заживленіе*. У мокротныхъ и цынготныхъ людей однако онъ переходитъ и въ *рыттики* упорные, хроническіе, трудные къ

плѣченію. Случается даже, что переходитъ и *въ язву*, причѣмъ вмѣсто гноя отдѣляется сывороточная влага, что бываетъ, большею частію, когда чирей образовался вслѣдствіе не совсѣмъ разрѣшившихся лихорадочныхъ болѣзней. Иногда же чирей, не созрѣвши, переходитъ *въ затвердѣніе*.

Распознаваніе легко. Чирей, при первомъ особенно появленіи своемъ, сходствуетъ съ огневикомъ, отъ котораго отличается: 1) *меньшимъ пространствомъ*; 2) *большею степенью раздражительности и воспалительныхъ признаковъ*; 3) *горячкою характера воспалительнаго*, потому что въ огневикѣ горячка бываетъ характера нервно-гнилостнаго, и 4) *переходомъ, большею частію, въ нагноеніе*, потому что огневикъ, большею частію, переходитъ въ омертвѣніе.

Предсказаніе для жизни въ чирьѣ *не опасно* нисколько, но даже выгодно и благопріятно. Чрезъ чирьи сама натура лѣчитъ и вредное извергаетъ вонъ. Относительно же продолжительности болѣзни оно сомнительно, потому что случается, что по заживленіи одного является другой, третій и т. д., къ тому же переходъ ихъ въ *рытви*, язвы и омертвѣніе угрожаетъ продолжительностію. Вообще *чирьи*, происшедшіе *отъ причинъ наружныхъ* съ небольшимъ къ нимъ расположеніемъ, *продолжаются недолго*, недѣлю, двѣ, три и не болѣе; напротивъ, чирьи, *происшедшіе болѣе отъ внутренняго расположенія*, могутъ продолжаться *мѣсяцы*.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Расположенные и подверженные вередомъ должны *содержать себя опрятно и чисто*, дабы нечистота съ поверхности кожи не всасывалась тѣломъ и не входила внутрь его. Для этого имъ должно обмываться теплою водою съ мыломъ каждый разъ, какъ чувствуютъ себя грязными или пропотѣвшими, а послѣ обмыванія надѣвать бѣлье чистое, вымытое, выстиранное. 2) Независимо отъ этого полезно разъ въ недѣлю *ходить въ баню*: это содѣйствуетъ цѣлительной силѣ природы изгонять и выбрасывать изъ тѣла вредныя и болѣзненныя начала усиленіемъ испарины и очищеніемъ назоной системы, и такимъ образомъ предотвращаетъ отъ вередовъ, въ случаѣ же появленія ихъ способствуетъ къ скорѣйшему ихъ разрѣшенію^{*)}. 3) Одержимый вередомъ, особенно стадовымъ, въ занятіяхъ своихъ долженъ имѣть *тѣлодвиженіе* умѣренное и быть *остороженъ отъ простуды*, дабы съ одной стороны не попрепятствовать цѣлебному отложенію, производимому, дѣйствіемъ самой природы а съ другой не подать повода, при возвышенной чувствительности тѣла, къ другой важнѣйшей болѣзни. Соотвѣтственно времени года, погодѣ, пребыванію на открытомъ воздухѣ, какъ вообще все тѣло, такъ и въ частности страда-

^{*)} Въ послѣднемъ случаѣ баня должна имѣть теплую, а не горячую температуру воздуха, чтобъ въ ней можно было въ теплѣ обмыться при легкой испаринѣ, но не потѣть много и особенно не париться.

щее мѣсто должно защищать надлежащимъ платьемъ и обувью. 4) Въ *питье* употреблять чистую, свѣжую, ключевую, мягкую *воду*. Она разжижаетъ сгустившуюся кровь, разводитъ слизи, способствуетъ отдѣленіямъ и испражненію. Въ одинъ пріемъ однако много пить ей не должно, но съ перемежками, дабы не отнять у желудка всю теплоту и не подвергнуть его простудѣ. Квасъ, пиво, сусло, брага, вино и всѣ *снпртные* напитки вредны. 5) *Пища* должна быть *легкая, тонкая*, преимущественно *растительная*, наприм. кашница и каша изъ разныхъ крупъ, щи изъ капусты, квашеной и свѣжей, сѣрой и бѣлой, изъ зелени, какъ-то: крапивы, сныти, щавелю и т. п. съ выпеченымъ чернымъ хлѣбомъ: вареные овощи огородные, напримѣръ: свекла, рѣпа, брюква, карлябія, морковь и т. п. Изъ пищи молочной: простокваша, варенецъ, кислое молоко. Мясное же все, безъ исключенія, вредно, потому что умножаетъ полнокрое и густитъ кровь. Рыбу тоже нельзя одобрить, она производитъ и умножаетъ слизи. Волосняникамъ, кожевникамъ, сыромятникамъ, и живодерамъ назначены сверхъ того особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. (см. это росписаніе).

ЛѣЧЕНІЕ СУЩЕСТВЕННОЕ. *Льняное сѣмя* въ формѣ припарки (№ 23) смягчаетъ больное мѣсто и способствуетъ созрѣнію чирья. Съ этою цѣлію употребляется снаружи *простонародная мягчительная мазь* (№ 151). *Медовая лепешка* (№ 24) есть обыкновеннѣйшее у поселянъ наружное мѣстное средство въ чирьѣ для той же пользы, съ тою только разницею, что она, раздражая, ускоряетъ созрѣваніе, равно какъ и *раздражающая простонародная мазь* (№ 150). *Печеный лукъ* также есть повсемѣстное простонародное средство для наружнаго употребленія въ чирьяхъ, по одинаковому съ предшествовавшими дѣйствію (№ 25). Его прикладываютъ просто или съ медовою лепешкою вмѣстѣ. Въ послѣднемъ случаѣ прежде прикладываютъ слой лука, а потомъ сверху покрываютъ медовою лепешкою. Чѣмъ сильнѣе чирей, чѣмъ медленнѣе образуется, тѣмъ нужнѣе соединеніе печенаго лука съ медовою лепешкою. Многіе печеный лукъ протираютъ напередъ и, соединивъ потомъ съ лепешкою, прикладываютъ, что дѣйствуетъ гораздо лучше и вѣрнѣе. Въ легкихъ случаяхъ, подобно льняному сѣмени въ видѣ теплой припарки, оказываетъ хорошее дѣйствіе и *размазня*; равнымъ образомъ теплыя *припарки*, употребляемыя изъ *чернаго хлѣба съ масломъ*, изъ *просвинокъ*, *маковыхъ головокъ*, *печеной ртуты*, *картофеля*, *моркови*, оказываютъ большой успѣхъ въ наружномъ лѣченіи вередовъ. Вообще поступаютъ такъ, что днемъ къ вередамъ прикладываютъ припарки, а на ночь покрываютъ ихъ *спускомъ* (№ 29), или вмѣсто его простонародною мягчительною мазью (№ 149), либо *милотнымъ пластыремъ*, получаемымъ изъ аптекъ безъ рецепта. Послѣднія средства, именно: спускъ, простонародная мягчительная мазь и милотный пластырь, въ легкихъ случаяхъ этой болѣзни, одни отъ начала до конца замѣняютъ всѣ средства, особенно послѣдній, который

предпочтительнѣе первыхъ, какъ средство способствующее и назрѣванію до вскрытія нарыва чирья, и его заживленію послѣ онаго. *Вялый хлебъ*, вареный въ молокѣ. (№ 26). прикладываемый въ видѣ теплой припарки къ чирью, подобно припаркѣ изъ льнянаго сѣмани, производитъ въ легкихъ случаяхъ достаточно хорошее дѣйствіе. Но какъ скоро нужно бываетъ усилить дѣйствіе этихъ припарокъ, то присоединяютъ къ нимъ ромашку (№ 27) и шафранъ (№ 28). Обыкновеніе народное ~~социнывать~~ *социнывать верхушку* чирья, когда онъ созрѣлъ, большею частію имѣетъ хорошій успѣхъ, потому что социнываніе этого рода способствуетъ скорѣйшему выходу гноя: надобно только дѣлать это осторожно и во время созрѣнія чирья, въ противномъ случаѣ этой операціи отнюдь не должно совѣтовать. Обыкновеніе же народа выдавливать послѣ того чирей во всякомъ случаѣ нельзя одобрить. Отъ этого насилія нерѣдко бываютъ дурныя послѣдствія: чирей переходитъ въ другую болѣзнь — въ рыхлики и язву. Но для выхода образовавшагося гноя въ чирьѣ и для приведенія къ созрѣнію недозрѣвшей еще матеріи, равно и для смягченія его въ окружности. нужно продолжать тѣ же средства, какія употребляемы были до его вскрытія, до тѣхъ поръ, пока стержень весь выйдетъ, и матеріи болѣе показываться не будетъ. Но если чирей сидитъ глубоко подъ толстою кожею (на спинѣ, лязбѣ), то къ припаркамъ прибавляется *поваренная соль* (кислое тѣсто съ солью), печеный протертый лукъ, *чеснокъ*, *горчица*. Эти средства нужно продолжать до тѣхъ поръ, пока не прорвется вередъ и не выйдетъ изъ него стержень (который иногда въ этомъ случаѣ нужно оттуда вынуть булавкою, щипчиками, пальцами), и не смягчится твердая обрѣзность вереда. *Кровоупусканіе* изъ вены можетъ быть назначаемо тогда, когда больные, сдѣлавъ привычку къ нему, оставили оное по какимъ-либо обстоятельствамъ и чрезъ то подверглись чирьевому расположенію, которое не иначе можно истребить, какъ чрезъ возобновленное кровопусканіе. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что средство это должно употреблять съ крайнею осторожностью и не всегда: какъ потому, что болѣзнь не опасна для жизни, такъ и потому, что чѣмъ чаще повторяется кровопусканіе, тѣмъ болѣе натура не рѣдко располагаетъ къ полнокровію. Поэтому въ такихъ и подобныхъ случаяхъ лучше стараться уменьшить полнокровіе не чрезъ кровопусканіе, но, если можно, предоставить дѣйствовать самой натурѣ, которая, производя чирьи, будетъ мало по малу способствовать уменьшенію онаго, а врачъ-совѣтникъ долженъ содѣйствовать назначеніемъ діеты и легкихъ, разрѣшающихъ и испражняющихъ, средствъ для внутренняго употребленія, какъ напр. *корни: одуванчика, цикорея и тырея* хорошо помогаютъ въ вередахъ разрѣшающимъ своимъ дѣйствіемъ на соопъ, способствуя отдѣленіямъ. Употреблять ихъ должно въ горячемъ *отварѣ* (№№ 1, 2, 3.) съ сахаромъ, медомъ и безъ оныхъ; корни: *мыльнянки, репейники* (лапушный корень), стебли *пастернака*, употребляются въ вередахъ у людей мочотныхъ и худосочныхъ, какъ средства разрѣшающія и кровочисти-

тельные, поправляющія соки. Ихъ употребляютъ въ тепломъ отварѣ, подобно какъ и предшествовавшія (№№ 4, 5 и 6), съ сахаромъ, медомъ и безъ оныхъ, но лучше съ первымъ, чѣмъ съ послѣднимъ. *Огуречный разсолъ*, какъ хорошее разводящее средство, способствующее сверхъ того испражненію, съ пользою употребляется въ вередахъ по рюмкѣ и по стакану 4—6 разъ въ день. Въ случаѣ надобности усилить его слабительное дѣйствіе, прибавляютъ къ нему *медъ и конопляное масло* (№ 7). *Мята* дается въ чирьяхъ при наклонности въ вѣтрамъ, какъ средство вѣтрогонное, и въ горячемъ, какъ чай, и въ остуженномъ *настой*, и въ перегнанной *водѣ*, какъ одна, такъ и въ соединеніи съ вышеисчисленными *отварами* (№№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22). *Магнезія* дается страдающимъ вередами съ развитіемъ слизей и кислотъ въ пищеварительномъ каналѣ, какъ-то: въ желудкѣ и кишкахъ, что познается изъ безвкусицы, кислой промзглой отрыжки, либо травянаго вкуса, съ бѣлымъ, по краямъ ослизѣлымъ языкомъ. Она, вбирая и поглощая въ себя слизи и кислоты, извергаетъ ихъ чрезъ испражненіе (№ 8). *Бремортартаръ* даютъ, когда чирей, восходя до высшей степени своего развитія, сопровождается лихорадочными движеніями и признаками горячки, какъ средство разводящее, прохлаждающее и способствующее испражненію. Его даютъ и въ соединеніи съ магнезіею (№№ 9 и 10). *Сурьмъ цвѣтъ* можно давать для возбужденія дѣятельности пасочной системы и одинъ (№ 13), и въ соединеніи съ предшествовавшими средствами (№ 14). Содовые *шипучіе порошки*, какъ средство разводящее, прохлаждающее и утончающее соки въ чирьяхъ, употребляютъ съ хорошою пользою. Людямъ толстымъ, мокротнымъ и малочувствительнымъ должно давать ихъ во время шипѣнія; напротивъ, людямъ чувствительнымъ, склоннымъ къ раздраженію кровеносной системы, послѣ шипѣнія (№№ 11 и 12). При лѣченіи живодеровъ, сыромятниковъ, кожевниковъ и волосяниковъ, торгующихъ волосомъ, нужно соображаться съ особыми, изложенными для нихъ правилами въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію, преимущественно относительно кровопусканія. (См. это описаніе).

Огневикъ, или карбункулъ.

Опредѣленіе. Карбункулъ есть смѣшанное, но болѣе пасочное воспаленіе, поражающее подкожную кѣтчатку и самую кожу, обнаруживающееся шипющимъ зудомъ, жаромъ, колючею и жгучею болью, опухолью, иногда плоскою, иногда значительно возвышенною, рожевою краснотою, и сопровождаемое горячкою, либо гнилостно-нервною, либо нервно-гнилостною.

Раздѣленіе. Карбункулъ появляется въ народѣ троякимъ образомъ: или повсемѣстно, или мѣстно, или разсѣянно, почему и раздѣляется на *эпидемическій*, повальный развивающійся въ данное, опредѣленное время, при опредѣленныхъ условіяхъ у многихъ людей и мо-

гущій сообщаться отъ больныхъ здоровымъ; на 2) *эндемическій*, (народный), развивающійся въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ и зависящій отъ мѣстныхъ условій и на 3) *спорадическій*, (разбѣянный), обнаруживающійся при различныхъ вѣшнихъ условіяхъ у нѣкоторыхъ только людей и другимъ не сообщающійся.

Признаки карбункула *эндемическаго*: въ началѣ зудъ и небольшой жаръ на мѣстѣ появленія его; при чесаніи чувствуется колючая боль и видна краснота. Черезъ 6—12, а иногда 24 часа зудъ переходитъ въ боль весьма жгучую, вслѣдъ за кою появляется видимая опухоль и краснота, похожая на рожистую. Далѣе нерасположеніе духа, изнеможеніе во всемъ тѣлѣ, тяжесть и боль головы, бѣглый ознобъ. Чувствуется внутренній жаръ, пульсъ ускоренный, иногда носовое кровотеченіе, дающее нѣкоторое облегченіе. Ночью сонъ безпокойный съ грезами, жаръ сильный, пульсъ полный, твердый, однимъ словомъ, всѣ признаки горячечнаго состоянія. Утромъ легче, на время сонъ, аппетита нѣтъ; языкъ покрытъ бѣлою, клейкою, а иногда желтою налетомъ, позывъ на кислое питье. Опухоль и краснота занимаютъ большое пространство, представляя видъ лоснящейся рожи. Къ ночи опять хуже, сонливость, кожа сухая, горячая, подергиваніе конечностей и безпрерывный бредъ. Опухоль становится выше и ограниченнѣе. Утромъ опять легче, одна слабость. Въ третій, а иногда въ пятые сутки развиваются полные признаки гнилой горячки. Къ шестымъ суткамъ они особенно усиливаются, и больной впадаетъ въ совершенное безчувствіе. Мѣстные признаки соотвѣтствуютъ горячечному состоянію. На 3, а иногда на 5 день опухоль дѣлается дряблою, размягченною; краснота замѣняется синетою, начинающеюся отъ центра опухоли въ видѣ полосъ и жилочекъ, продолжающихся къ ея окружности; вообще кожа представляется какъ бы натертою свинцомъ. Въ опухли подъ кожей скорѣ появляется сывороточная жидкость, образуется прозрачный пузырь, чрезъ сутки прорывается, опухоль переходитъ въ разрушеніе; пораженныя части отъ давленія расползаются; появляются синія пятна по всему тѣлу, бредъ тихій, ротъ и глаза открыты, дыханіе едва замѣтно, конечности холодѣютъ; и больной на 5—6—10 день умираетъ. Но если мѣстное пораженіе будетъ свойства болѣе кровянаго, чѣмъ пасочнаго, а горячка болѣе воспалительная, чѣмъ гнилостная, если природа, при содѣйствіи искусства, произведетъ въ карбункулъ хорошее нагноеніе, то болѣзнь можетъ счастливо окончиться на 14—17—21 день. Надобно замѣтить, что хорошо нагнаивающійся карбункулъ прорывается не въ центрѣ и не въ одномъ мѣстѣ, подобно чирью, но вдругъ многими маленькими отверстіями, представляя видъ рѣшета, изъ боковъ выходитъ доброкачественный, смѣшанный съ сибровицею гной, за которымъ начинается облегченіе и выздоровленіе.

Признаки карбункула *эндемическаго*, кромѣ образа появленія его въ народѣ, значащагося въ его опредѣленіи, ничѣмъ другимъ не отличаются отъ признаковъ карбункула *эпидемическаго*.

Признаки карбункула *спорадического* отличаются от признаков карбункула эпидемического только степенью и продолжительностью. Воспаление бывает не так сильно: полное его развитие совершается въ 12 и даже къ 21 дню. Въ это время появляется доброкачественное нагноение, иногда выстъ съ омертвѣніемъ, которое впрочемъ ограничивается одною кожей, не проникая въ клетчатку; омертвѣвшая кожа мало по малу отдѣляется, и язва заживаетъ.

Примѣч. Эпидемическій и эндемическій карбункулъ называютъ настоящимъ, а спорадическій ложнымъ.

Мѣстопребываніе. Относительно частей тѣла карбункулъ преимущественно развивается на затылкѣ, плечахъ, спинѣ, на животѣ, на внутренней сторонѣ лѣваго бедра, на лицѣ и рѣдко на мошонкѣ; но на правомъ бедрѣ и на частяхъ, покрытыхъ волосами, никогда не былъ замѣченъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе къ карбункулу всѣхъ трехъ видовъ состоитъ въ особенномъ непонятномъ *ослизненіи* всего тѣла, а нерѣдко и *ожиреніи*. Чѣмъ старѣе человѣкъ съ даннымъ предрасположеніемъ, и чѣмъ раздражительность тупѣе, тѣмъ скорѣе онъ поражается карбункуломъ; сверхъ того *люди угреватые*, пьющіе кожу дряблую и красныя по тѣлу бородавки, преимущественно страдаютъ карбункулами.

Причины внѣшнія (производящія) доселѣ не опредѣлены. Кромѣ общихъ понятій о происхожденіи болѣзней эпидемическихъ и эндемическихъ ничего сказать нельзя, ибо карбункулъ эпидемическій и эндемическій происходитъ отъ измѣненнаго состоянія атмосфернаго воздуха особаго рода. Замѣчено только то, что изъ ослизѣло-ожирѣлыхъ людей чаще подвергаются карбункулу *невоздержные*, не соблюдающіе должной діеты, нежели воздержные, строгіе въ діетѣ, кои иногда и совсѣмъ остаются свободными отъ этой болѣзни во время ея свирѣпствованія. Между крестьянами настоящій, или эпидемическій, либо эндемическій карбункулъ происходитъ чрезъ зараженіе ихъ отъ скота, особенно лошадей, подвергшихся сибирской язвѣ, когда хозяева съ павшихъ лошадей снимаютъ кожи, или иначе прикасаются къ трупъ; также онъ появляется у людей, ѣвшихъ мясо убитаго уже больнаго скота, употреблявшихъ молоко, сыръ, масло отъ больныхъ коровъ. Поэтому у насъ въ Россіи, особенно въ Сибири, карбункулъ между крестьянами появляется въ жаркое лѣто, когда на лошадяхъ и рогатомъ скотѣ свирѣпствуетъ сибирская язва *). Настоящій карбункулъ появляется такъ

*) 1847 года лѣтомъ въ августѣ мѣсяцѣ, Казанской губерніи, Чистопольскаго уѣзда въ деревнѣ Старой Ерыклѣ у татаръ эта болѣзнь свирѣпствовала эндемически. Карбункулъ появился у нихъ на затылкѣ, спинѣ и плечахъ съ признаками нервно-гнилостной горячки, ожесточавшейся къ ночи до того, что многіе на 3-ю, иные на 5-ю и рѣдкіе на 9-ю ночь умирали съ быстрымъ переходомъ тѣла въ гнилостное состояніе. Смертность была значительная. Выздоровлявало 3 изъ 10-ти. При изъ-

же въ чумѣ. послѣ желчныхъ, гнилыхъ горячекъ, чаще всего на правую боку, противъ печени, на пальцахъ ногъ, на концѣ носа, на щекахъ послѣ ужаленія ядовитыми насѣкомыми. Чтоже касается до карбункула ложного (спорадическаго), то онъ вѣроятно развивается по силѣ одного предрасположенія у людей старыхъ, распутныхъ, невоздержныхъ, хворыхъ, подверженныхъ ломотѣ, подагрѣ, и при томъ нерѣдко отъ ничтожной причины, напр. отъ приложеннаго къ божѣ пластыря шпанскихъ мухъ, отъ порѣза кожи во время бритья, отъ содраннаго прыщика и проч. Живодеры, мясники и волосняники преимущественно бываютъ подвержены карбункулу.

Сущность карбункула видна изъ опредѣленія, съ присовокупленіемъ, что воспаленіе значительно можетъ измѣняться въ своемъ качествѣ, переходя отъ болѣе или менѣе кровянаго до болѣе или менѣе пасочнаго, такъ что карбункулъ, какъ эпидемическій, такъ и эндемическій, у молодыхъ людей имѣетъ характеръ болѣе кровяной, напротивъ, у пожилыхъ, особенно при значительномъ ослизненіи и ожиреніи, болѣе пасочный. Карбункулъ спорадическій всегда бываетъ характера болѣе или менѣе кровянаго.

Разпознаваніе въ началѣ болѣзни затруднительно и почти невозможно, по сходству его съ чирьемъ и съ рожею. При болѣшемъ развитіи карбункулъ отличается отъ чирья: 1) особою горячкою, 2) болѣшимъ пространствомъ опухоли и плоскостію; отъ рожи тѣмъ, что не имѣетъ признаковъ, свойственныхъ рожѣ; отъ обонхъ тѣмъ, что онъ часто свирѣпствуетъ эпидемически и эндемически, между тѣмъ чирей и рожа принадлежать къ болѣзнямъ всегда спорадическимъ. По совершенномъ развитіи, именно на 4, 5 день карбункулъ легко отличается вообще отъ всѣхъ болѣзней.

Предсказаніе весьма *сомнительно*. При переходѣ карбункула въ омертвѣніе и вмѣстѣ при сильной гнилостно-нервной, или нервно-гнилостной горячкѣ предсказаніе дѣлается еще болѣе невыгоднымъ, потому что больной, не смотря на всѣ старанія врача, умираетъ на 7. а иногда на 12 день. Относительно продолжительности, при счастливомъ ходѣ карбункулъ обанчивается на 14, 17, 22 день; а при несчастливомъ на 14—12 и даже на 7 день. Бромъ сего карбункулъ *эпидемическій и эндемическій опаснѣе, нежели спорадическій*, и чѣмъ глубже проникаетъ воспаленіе и омертвѣніе, тѣмъ опаснѣе онъ.

Лѣченіе діететическое одинаково, какъ и въ вередяхъ, съ при-

сѣдованіи причинъ болѣзни я замѣтилъ, что чума, свирѣпствовавшая въ то время въ той и нѣкоторыхъ пограничныхъ съ нею деревняхъ на рогатомъ скотѣ и причинившая сильный падежъ, при которомъ павшую скотину не всегда убрали и зарывали надлежащимъ образомъ, а кожу съ нея татары, большею частію, снимали и нерѣдко зачумѣвшую скотину кололи для употребленія себѣ въ пищу, чѣмъ они обыкновенно занимались въ ночное время для избѣжанія преслѣдованія, — была причиною развитія эндемическаго карбункула, столь сильнаго и жестокаго, который мѣстные жители называли заушницею.

совокупленіемъ, что: 1) настоящій (эпидемическій и эндемическій) карбункулъ, какъ болѣзнь прилипчивая, требуетъ *осторожности* и мѣръ предохранительныхъ *отъ сообщенія здоровыхъ людей съ больными*, имъ одержимыми, также *съ павшею скотиною*, подвергнутою сибирской язвѣ или чумѣ, причемъ не должно употреблять ни мяса, ни молока, ни сыра, ни масла отъ больныхъ коровъ. Спорадическій же (ложный карбункулъ, какъ не прилипчивый, этого не требуетъ. 2) Пища жирная, масляная и слизистая, какъ напр. рыба, вообще вредна. 3) Строгое *воздержаніе въ діетѣ* въ этой болѣзни несравненно нужнѣе, чѣмъ въ вередяхъ; невоздержные люди чаще подвергаются карбункулу, болѣе страдаютъ и труднѣе выздоравливаютъ, нежели воздержные. Которые и во время свирѣпствованія этой болѣзни либо легче и скорѣе выздоравливаютъ, либо и совсѣмъ остаются свободными отъ этой болѣзни. Само собою разумѣется, что это относится преимущественно къ легкимъ случаямъ, къ началу болѣзни и времени выздоравливанія отъ оной: въ совершенномъ же развитіи ея и въ трудныхъ случаяхъ сама натура беретъ противъ этого свои мѣры, отнимая аппетитъ. Равнымъ образомъ и относительно того, что: 4) больной долженъ быть *въ покоѣ* и, въ случаѣ какихъ либо легкихъ занятій, позволять себѣ *умѣренное движеніе* въ комнатѣ и на открытомъ воздухѣ, слѣдуетъ разумѣть въ заболѣвающимъ и выздоравливающимъ; въ совершенномъ же развитіи болѣзни сама натура беретъ къ тому свои мѣры, обезсиливая больного. 5) Сверхъ того *выздоровливающимъ* послѣ карбункула нужно давать *хорошую пищу, вино и хину*; живодерамъ, мясникамъ и волосняникамъ совѣтовать соблюдать особыя, сверхъ того, правила, изложенныя въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. росписаніе).

Лѣченіе существенное. Карбункулъ вообще есть опасная болѣзнь, особенно на шеѣ и лицѣ; онъ происходитъ скоро и оканчивается или выздоровленіемъ, или смертію; въ первомъ случаѣ нерѣдко остается безобразіе, невраждніе членами, а во второмъ — помертвѣніе, сильное нагноеніе, гнилая горячка, или опасное кровотеченіе убиваетъ больныхъ. Настоящій карбункулъ причиняетъ смерть помертвѣніемъ, а ложный нагноеніемъ и изнуреніемъ. Поэтому при появленіи карбункула у челоуѣка, прикасавшагося къ больной скотинѣ или къ ея трупѣ, нужно немедленно пригласить врача, или совѣтовать отправить къ нему больного, если послѣдній имѣетъ на то еще довольно силъ. При неизбѣжнѣи же врача должно довольствоваться слѣдующимъ ограниченнымъ лѣченіемъ. При первомъ подозрѣніи появленія карбункула нужно назначить больному *мыльную ванну*, въ которой обмыть все тѣло, или, смотря по удобству, *обтереть его теплою водою съ мыломъ*, сколь возможно чище, или пусть сходитъ въ баню и въ ней вымоется и попотѣетъ, имѣя въ виду ту осторожность, чтобы, по выходѣ изъ нея, разгоряченное тѣло не подвергнуть простудѣ. Мыльная ванна, обтираніе тѣла теплою водою съ мыломъ и баня въ этомъ случаѣ равно полезны. Потомъ давать внутрь

большому *слабителъно* изъ *кремортартара* съ *сильнымъ цвѣтомъ* *) безъ магнезін (№ 14) до тѣхъ поръ, пока его очистить испражненіемъ на низъ, а снаружи къ страждущему мѣсту прикладывать *припарки теплыя, мягчительныя*, какъ-то: *гречневую кашу съ масломъ, простонародную изъ сырой свѣжей заячей кожи, чесаного льна, или жудели* (№ 151), также припарки изъ средствъ, сверхъ того, возбуждающихъ, напр. *ромашки, бузины, садовой зари, донника, льняного семени* (№ 23). Иногда вмѣсто зари съ большею пользою употребляютъ *полынь*, или *божье дерево*, смотря по нуждѣ въ возбужденіи (№№ 54, 55). Эти припарки кладутся утромъ и вечеромъ три, четыре раза и держатся до чувствительнаго охлажденія. Въ промежутки отъ припарокъ для покрыванія карбункула употребляются: *простонародная мягчительная мазь изъ свѣчнаго сала съ крупичатою мукою, или крахмаломъ* (№ 149), *спускъ* (№ 29) и *милотный пластырь*. Эти послѣдніе средства употребляются, сверхъ того, и по вскрытіи карбункула для освобожденія матеріи и заживленія его. Но *свиное* топленое *сало* нерѣдко мягчительнымъ своимъ дѣйствіемъ, въ этомъ случаѣ, превосходитъ всѣ эти средства, особенно при чувствительности и изнуреніи тѣла больного. Какъ скоро желудочно-кишечный каналъ очистится достаточнымъ испражненіемъ на низъ, то для возбужденія испарины употребляются: *липовый цвѣтъ, сухая малина и мята въ горячемъ настое*, какъ чай. Послѣдняя особенно полезна при развитіи вѣтровъ въ желудочно-кишечномъ каналѣ.—Когда бываетъ бурчаніе въ животѣ и пученіе въ ономъ. Если этого недостаточно, и болѣзнь не только не проходитъ и не облегчается, но даже лихорадочное состояніе усиливается и принимаетъ форму горячки съ приливомъ крови къ головѣ, и оттого больной начинаетъ чувствовать въ ней сильную боль, сопровождаемую бредомъ и безчувственностію, то должно прибѣгнуть къ употребленію слѣдующихъ средствъ: на голову должно бросить компрессъ или ветошку, вчетверо сложенную и намоченную *краснымъ уксусомъ* или растворомъ *селитры* въ водѣ (золотникъ первой на фунтъ послѣдней). Ноги до половины икры оберты вать бинтомъ, смоченнымъ въ бѣлкомъ растворѣ *горчицы* или въ *щелоку*, въ коемъ растворенъ сухой *хлѣвъ*. На затылокъ, между лопатками, къ рукамъ, ногамъ, особенно къ икрамъ, прикладывать *горчичники, хлѣбовники*, если тѣхъ средствъ будетъ недостаточно. Само собою разумѣется, что прикладывать ихъ должно не ко всѣмъ этимъ мѣстамъ вдругъ, но то къ одному, то къ другому изъ нихъ попеременно, и держать до произведенія на нихъ красноты, съ цѣлю отвлечь отъ головы приливъ крови и чрезъ то облегчить страданія и предотвратить опасность: внутрь же давать пить *корень мыльной травы* (№ 4), какъ средство разрѣшающее, употребляемое въ этой болѣзни противъ predispositiona одинъ и въ соединеніи съ *александрійскимъ листомъ* (№ 30),

*) Д-ръ Чаруковский въ С.-Петербургѣ. Въ Москвѣ наставникъ мой профессоръ Дзялковскій вмѣсто этого давалъ Глауберу соль одну (№ 34) и съ нашатыремъ (№ 33).

для усиленія свойства побуждать и увеличивать испражнения, имѣя въ виду, чтобы у больного было на низъ въ сутки два, три и даже четыре раза. При тугой раздражительности и при угрожающей опасности упадка силъ съ пользою употребляется для этой же цѣли *ревень*, какъ горячительно-испражняюще-укрѣпляющее средство. одинъ самъ по себѣ (№ 31) и съ *магнезіею*. когда вкусъ у больного травянистый, языкъ покрытъ бѣлою мокротою, и видимо угрожаетъ гнилостное состояніе (№ 32). Хорошо въ послѣднемъ случаѣ ревень поджаривать. Для усиленія же дѣйствія пасочной системы и для уменьшенія развитія сгущенной паче составляютъ хорошее средство *стебли паслена* одни сами по себѣ въ отварѣ (№ 6) и съ соимяннымъ экстрактомъ, растворяя послѣдняго $\frac{1}{2}$ золотника на стаканъ горячаго, отвара съ цѣлю усилить его дѣйствіе. Но если карбункулъ великъ, развитіе его чрезвычайно быстро, а дѣйствіе отвлекающихъ вышеозначенныхъ средствъ недостаточно, то, чтобы сильнѣе отвлекать и, сверхъ того, умѣрить стремленіе дурной матеріи въ него, нужно приложить къ затылку *нарывной пластырь* (№ 58), а къ вискамъ, за уши, или около карбункула, пониже его, приставить *пѣвки*, числомъ отъ 12—24, смотря по возрасту и тѣлосложенію больного, либо *рожки*, для вытягиванія и выпораживанія крови отъ $\frac{1}{2}$ —1 фунта въ томъ же соображеніи. Если за всеѣмъ этимъ карбункулъ продолжаетъ свой губительный ходъ съ развитіемъ нервно-гнилостной горячки, причемъ жилованіе (пульсъ), какъ знаменатель отправления сердца, обыкновенно, замедляется, — вмѣсто 80-ти разъ въ минуту начинаетъ ударять 70—65, 60 и даже менѣе, дряблость и синева кожи, пораженной карбункуломъ, появляясь переходить въ гнилостное разрушеніе и даже въ омертвѣніе, — то въ такомъ случаѣ должно назначить средства для внутренняго употребленія: *корень валеріаны* — маунъ одинъ въ капляхъ (№ 36), либо въ отварѣ въ соединеніи съ стеблями паслена (№ 35); *корень змѣевика* одинъ въ отварѣ (№ 37) и въ соединеніи съ валеріаннымъ (№ 38), либо, сверхъ того, съ прибавленіемъ *мяты* (№№ 39 и 40); *цвѣтъ баранника* одинъ (№ 41) и въ соединеніи съ корнемъ змѣевика (№ 42); *корки: ивовая, дубовая и перувіанская* (хина), одни сами по себѣ (№№ 43, 45 и 47), и въ соединеніи съ *камфоромъ* (№№ 44, 46, 48, 49 и 50), и съ *гобманскими каплями* (№ 49). Снаружи карбункулъ должно присыпать порошкомъ *угля* съ *камфоромъ* вмѣсто припарокъ (№ 57), также корки: ивовая, дубовая, березовая и перувіанская (хинная), приведенныя въ порошокъ, могутъ служить присыпкою для произведенія раздраженія противъ омертвѣнія и гнилостнаго разрушенія карбункула. Независимо отъ этихъ средствъ, когда очищеніе низомъ достаточно произведено, для поправленія силъ и соковъ больного очень полезно употреблять ежедневно вечеромъ *ванны: ароматическую* съ травами: ромашки, бузины, душицы, полыни, божьего деревца и т. п. (№ 53), и *соленую* на 6 ушатовъ воды кладется $\frac{1}{2}$ —1 фунта поваренной соли. Температурою ванны должны быть 24°—26°—28° по Реом. Больной долженъ сидѣть въ ароматической ваннѣ не болѣе $\frac{1}{4}$ часа, а въ со-

ляной 6—8 и не болѣе 10 минутъ. Каждая изъ этихъ ваннъ назначается отдѣльно отъ другой, и лучше, если будутъ употребляемы попеременно-то та, то другая. Д-ръ и профессоръ Буальскій въ С.-Петербургѣ лѣчитъ карбункулы прикладываніемъ снаружи холодной катаплазмы (*тѣсто*) изъ *бѣлаго хлѣба со свиновой водою*, чтобы она покрывала всю красноту и опухоль: катаплазму перемѣнять 4 и 6 разъ въ сутки и оставлять день и ночь. Когда карбункулъ прорвется; то также прикладывать одну и ту же катаплазму. При перемѣнѣ ея, гной слегка изъ опухоли выдавливать, согнившую клѣтчатую плеву осторожно извлекать щипчиками и отрѣзать ножницами. Когда все внутри очистится, опухоль опадетъ и краснота исчезнетъ, тогда катаплазму оставить и перевязывать свиновой, или другою какою-либо простою мазью. Въ деревнѣ, гдѣ нельзя достать свиновой воды, катаплазму дѣлать изъ *мякчи чернаго хлѣба* съ водою, къ которой прибавить пятую или шестую долю *крепкаго уксуса*; вмѣсто воды съ уксусомъ можно брать *квасъ*, или класть на карбункулъ *кислоту* изъ квашни *тѣсто*, наскобливъ еще *милу*.—Вотъ все наружное лѣченіе его. При лѣченіи живодеревъ, мясниковъ, волосяниковъ и другихъ рабочихъ людей нужно соблюдать съ особыми правилами, изложенными въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. особо).

Если больной согласится на *крестообразный разрѣзъ* карбункула, то можно допустить до этого, и послѣ этой операціи слѣдуетъ прикладывать къ нему мягчительныя припарки, въ какомъ бы онъ состояніи ни находился. Этотъ способъ употребляемъ былъ двумя англичанами въ Москвѣ, когда въ ней эпидемически свирѣпствовалъ карбункулъ, и былъ увѣнчанъ отличнымъ успѣхомъ.

Примѣч. Полезнѣе производить этотъ разрѣзъ, когда карбункулъ еще не омертвѣлъ; во всякомъ же случаѣ надежнѣе нагнаивать карбункулъ безъ разрѣза, однимъ припарками при внутреннемъ лѣченіи. *Иглоукалываніе* карбункула *крестъ на крестъ* съ четырехъ сторонъ, а *нерѣдко продергиваніе иглы съ ниткою* также съ 4-хъ сторонъ отъ одного края до другаго противоположнаго, крестъ на крестъ, оставляя верхнюю часть въ цѣлости, и накладываніе потомъ на него сухой простой или *скобленой кортін*, дабы истекавшая матерія поглощалась ею, есть обыкновенный, лучшій и кратчайшій мѣстный способъ лѣченія карбункула у поселянъ. Когда при этомъ болѣзненное кровяное и пасочное накопленіе совсѣмъ вытечетъ, тогда они прикладываютъ ветошку съ свинымъ саломъ, и болѣзнь отъ того скоро облегчается и совсѣмъ проходитъ.

Примѣч. Хотя этотъ способъ посредствомъ иглопрокалыванія лучше предшествовавшаго способа англичанъ посредствомъ разрѣза, однако объ немъ то же слѣдуетъ замѣтить, что замѣчено и тамъ. Д-ръ Чарубовскій одобряетъ *прижиганіе* помертвѣлаго карбункула. Это прижиганіе производится: раскаленнымъ желѣзомъ, присыпаніемъ жженымъ квасцами, бѣлымъ поташемъ, также соленою кислотою, которая кисточкою нама-

зывается, или каплями наливается на помертвѣлыя мѣста и покрывается припаркою изъ кислаго тѣста съ мѣломъ и углемъ въ порошокъ; вмѣсто соляной кислоты, можно употребить крѣпкій растворъ хлориновой воды или извести (столовую ложку на $\frac{1}{2}$ —1 фунтъ воды); отдѣленіе струпа послѣ прижиганія первыми средствами ускоряется припарками.

Нарывъ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Нарывъ есть воспалительная опухоль, содержащая въ себѣ гной, или похожую на гной жидкость, образуемая изъ предшествовавшего смѣшаннаго воспаления, не разрѣшившагося въ продолженіе 3—6 дней и переходящаго въ нагноеніе.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Нарывъ бываетъ *горячій*, въ коемъ предшествовавшее воспаленіе болѣе кровяное, чѣмъ пасочное, и *холодный*, въ коемъ предшествовавшее воспаленіе болѣе пасочное, чѣмъ кровяное.

ПРИЗНАКИ НАРЫВА *горячаго* (истиннаго). Боль скоро воспаленіе сильно и достигаетъ быстро высшей степени, краснота дѣлается темною, боль давящею, а опухоль твердою и увеличивается; притомъ какъ скоро воспаленное мѣсто мягко, сочно, сосудисто, то слѣдуетъ ожидать нагноенія. Въ этомъ положеніи воспаленіе остается довольно долго безъ перемѣны; потомъ припадки его примѣтно даже усиливаются, но не на долго: скоро краснота блѣднѣетъ, опухоль уменьшается и становится мягче, больной чувствуетъ дрожь и ознобъ; все это обозначаетъ переходъ воспаленія въ нагноеніе, которое скоро образуетъ нарывъ, причемъ опухоль въ окружности падаетъ, но остается твердою и блѣднѣетъ, а посрединѣ темнѣетъ, возвышаясь въ острую верхушку, и становится мягкою; давящая боль дѣлается бьющею, и появляется тяжесть и тоска въ членѣ. Если такую опухоль слегка прижать по срединѣ, то она бываетъ мягка, уступчива, но упруга, и въ ней замѣчается движеніе, волненіе жидкости, называемое зыбленіемъ; окружность и дно опухоли остаются пока твердыми, но скоро и они смягчаются, и въ окружности опухоли также появляется мягкость, упругость и зыбленіе. Наконецъ кожа на верхушкѣ опухоли желтѣетъ, становится тоньше, въ ней появляются узенькія отверстія, чрезъ которыя просачивается жидкость; если кожа вдругъ прорывается большимъ отверстіемъ, и гной испражняется разомъ, больной чувствуетъ большое облегченіе и успокоивается. Если нарывъ происходитъ между твердыми, неуступчивыми частями, на рукахъ, ногахъ, между сухими жилами мышцъ, въ суставахъ, костяхъ, — то предъ нагноеніемъ припадки воспаления не только не ослабѣваютъ, но даже ожесточаются, оттого что скопляющійся гной пробирается между смежными частями. Если воспаленіе было очень слабое, то нагноеніе, нарывъ и его вскрытіе происходятъ очень медленно. При воспаленіи глуболежащихъ частей (хрящей надкостной плевы, костей и сухихъ жилъ) нагноеніе узнается очень трудно; здѣсь нужно принять въ расчетъ уменьшеніе припадковъ воспаленія безъ

всякаго перелома (пота, осадочной мочи, поноса), воспаленная часть не приходит въ свое прежнее здоровое состояніе, а напротивъ въ ней продолжается боль, давленіе, дрожь или холодъ, жгучій жаръ въ ладоняхъ или подошвахъ, особенно послѣ принятія пищи, рѣзко ограниченная краснота щекъ, къ утру холодный, клейкій потъ, поносъ, воспаленное мѣсто отекаетъ, или въ немъ глубоко чувствуется зыбленіе. По прорывѣ этого нарыва изливается изъ него не прозрачная жирно-и нѣжно-масляная, желтобѣлая жидкость, подобная густымъ сливкамъ, которая называется гноемъ. Гной этотъ впрочемъ измѣняется по строенію воспаленной части, по степени воспаленія, тѣлосложенію больного и по примѣси къ гною другихъ жидкостей. По этимъ причинамъ гной бываетъ то густой, какъ сметана, бѣлый, желтый; то жидкій, какъ вода, зеленый, даже темный, кровавистый. Особенно трудно отличить гной отъ гноевидной слизи, отдѣляющейся при воспаленіи слизистыхъ перепонъ (при кашлѣ, насморкѣ, кровавомъ поносѣ), хотя это бываетъ и весьма важно въ нѣкоторыхъ внутреннихъ болѣзняхъ, для опредѣленія, нѣтъ ли внутри нарыва (при чахоткѣ, кровавомъ поносѣ, воспаленіи внутренностей и проч.). Вообще гной густой, бѣлый, свѣжій, дѣйствуетъ благотворно на смежныя части, и лучше припарокъ и пластырей разрѣшаетъ отвердѣлую окрѣжность нарыва.

Признаки нарыва *холоднаго* (ложнаго). Появленію холодныхъ, пасочныхъ нарывовъ, прежде чѣмъ окажутся мѣстные каіе-либо припадки, предшествуютъ явленія общаго нездоровья: чувство слабости въ тѣлѣ, скорая усталость послѣ небольшого движенія, безпричинная скука, уныніе, бессонница или безпокойный сонъ, потеря аппетита. Послѣ этихъ явленій, продолжавшихся недѣлю, мѣсяцъ и болѣе на какой-либо части тѣла, наичаще тамъ, гдѣ больной замѣчалъ ползаніе мурашекъ — на груди, между лопатокъ, вверху на бедрахъ, вообще пасочныхъ и желѣзистыхъ частяхъ, — появляется небольшая, упругая опухоль, безъ боли и измѣненія цвѣта кожи, но съ тупымъ чувствомъ тяжести и напряженія; опухоль постепенно возрастаетъ до величины куриного, гусиного яйца, до дѣтской головки; при давленіи пальцами въ ней замѣчается зыбленіе жидкости, и притомъ, какъ по верхушкѣ, такъ и на всей окрѣжности, опухоль начинаетъ болѣть, кожа надъ ней краснѣетъ, больше напрягается, больной худѣетъ, получаетъ лихорадку, и въ лицѣ его замѣчается особенное страданіе, какое-то уныніе и страхъ; далѣе, кожа, постепенно дѣлаясь тоньше, прорывается однимъ большимъ, или многими маленькими отверстіями на верхушкѣ и по окрѣжности къ низу опухоли, и извергаетъ жидкую, гноевидную, зловонную матерію, послѣ которой течетъ еще тонкая, зеленая жидкость (ихоръ). Со вскрытіемъ нарыва и прониканіемъ въ него воздуха, гнойная матерія портится еще болѣе, испражняется въ большемъ количествѣ, силы больного быстро упадаютъ, появляется изнурительная лихорадка, обильные, холодные, клейкіе поты, поносъ, гнойная матерія поражаетъ кости, и больной скоро умираетъ отъ истощенія.

Причины нарывовъ тѣже, что и воспаленія, которое, появляясь въ наружныхъ частяхъ, чаще оканчивается нагноеніемъ и нарывомъ, чѣмъ во внутреннихъ, потому что прикосновеніе воздуха въ первомъ случаѣ поддерживаетъ и усиливаетъ раздраженіе въ воспаленномъ мѣстѣ. Къ нарывамъ холоднымъ пасочнымъ располагають: слабое тѣло-сложение, худосочность, блѣдность, вялость, золотуха, цынга, употребленіе много ртути, жидкость крови. Кормилницы преимущественно бывають подвержены нарывамъ, въ предотвращеніе которыхъ имъ должно совѣтовать соблюдать правила, изложенныя для нихъ особо въ описаніи поселянъ.

Лѣченіе настоящаго — *горячаго* нарыва различно по его различному состоянію. Если нарывъ не совсѣмъ еще созрѣлъ, то есть если въ немъ замѣчается блѣдность, желтизна, мягкость, упругость и зыбленіе только по срединѣ, на верхушкѣ, а въ окружности яркая краснота, твердость, то нужно способствовать дѣйствію природы и привести нарывъ въ созрѣнію, то есть смягчить и его окружность, и дѣйствительнѣйшее для этого средство есть *теплота*, употребленная *въ видѣ припарокъ, кислаго тѣста, пластырей, мазей*. Припарки для созрѣнія нарыва употребляются тѣже, что при воспаленіи; на мѣстахъ нѣжныхъ (около ушей, на грудяхъ, яичкахъ) употреблять припарки изъ *мякиши бѣлаго хлѣба съ молокомъ* (№ 26), изъ *льнянаго семени* (№№ 23, 27, 28 и 151); на мѣстахъ малочувствительныхъ (на спинѣ, ногахъ, животѣ, груди, рукахъ), толстокожихъ (подошвахъ, ладоняхъ) — *мякиш изъ ржаного хлѣба съ саломъ, или масломъ и солью, медъ съ мукою въ видѣ медовой лепешки* (№№ 24, 149, 150), *печеный картофельъ, морковь, рѣпу, лукъ* (№ 25), *чеснокъ*, сами по себѣ, или съ ржанымъ кислымъ тѣстомъ. При медленномъ нагноеніи эти припарки нужно употреблять довольно горячими и перемѣнять почаще; на ночь, когда нельзя употреблять припарокъ, нарывъ можно покрывать *пластыремъ донниковымъ, камедистымъ*, медовою лепешкою, кислымъ тѣстомъ; при сильной боли въ нарывѣ и жарѣ, къ окружности его припустить *пявокъ*, а къ припаркамъ прибавить *листья бѣлены, маковыхъ головокъ* или простаго *табаку* (№№ 60, 91). При такомъ лѣченіи, въ продолженіе 2—6 дней и болѣе нарывъ созрѣваетъ, то есть его твердая окрѣпость также смягчается и блѣднѣетъ, какъ и верхушка, и во всемъ нарывѣ, при давленіи пальцемъ, замѣчается равномерная упругость и зыбленіе; въ такомъ положеніи нарывъ, происшедшій на мягкомъ мѣстѣ, вскрывается самъ собою на верхушкѣ, или къ низу въ окружности. По большей части нарывы не глубокіе, не большіе, на спинѣ и груди, на животѣ, въ пахахъ, подъ мышками, на плечахъ и бедрахъ прорываются сами собою; но вскрытіе нарыва должно производить искусственно, не дожидаясь его произвольнаго прорыва: 1) когда гной накопляется между сухими жилами, неуступающими его напору, какъ то: на пальцахъ рукъ и ногъ, на ручной кисти, на стопѣ, на переднемъ плечѣ, на колѣнѣ; 2) когда нарывъ находится около глаза, задняго про-

хода, на шеѣ: 3) если нарывъ лежитъ глубоко между мышць и должно опасаться гнойныхъ ходовъ, или около суставовъ, въблизи костей, хрящей и сухихъ жилъ; 4) При нарывахъ, составляющихъ переломъ другой болѣзни (горячки) околоушныхъ желѣзъ, въ поясницѣ и проч. Во всѣхъ таковыхъ случаяхъ нужно вскрывать нарывъ искусствомъ и, если можно, пригласить для того врача. Если больные боятся и не допускаютъ вскрыть нарывъ острымъ орудіемъ даже и врача, то, хотя не такъ выгодно, но можно произвести это *вскрытіе нарыва* ѣдкимъ средствомъ такъ: весь нарывъ покрывается одною широкою холстиною, намазанною *липкимъ пластыремъ*; въ холстинѣ, на срединѣ ея, противъ верхушки нарыва прежде вырѣзывается дырочка, величиною въ 1—2 линіи; въ эту дырочку холстинки кладутъ кусочекъ, въ горошину, *ѣдкаго поташа*, или *адскаго камня* (лаписа) и покрываютъ сверху ленточкою липкаго пластыря. Черезъ 6—8 часовъ снимаютъ верхній пластырь, и мѣсто, гдѣ лежало ѣдкое средство, бываетъ покрыто струпомъ, или же пройдено до полости нарыва, изъ котораго течетъ гной. Но если нарывъ не прорвался, то или повторяютъ приложеніе ѣдкаго средства по прежнему, пока онъ прорвется, или же остатки кожи на нарывѣ прокалываютъ, гной выжимаютъ, нарывъ покрываютъ ленточками липкаго пластыря, обвиваютъ бинтомъ и кладутъ членъ такъ, чтобы гной скопился къ отверстию нарыва. При слипаніи краевъ нарыва, слѣдуетъ раздвинуть ихъ, гной выжать и перевязать нарывъ по прежнему.

Лѣчение *холодныхъ* нарывовъ должно предоставить врачу, или по крайней мѣрѣ употреблять средства по его совѣту. Впрочемъ средства, вычисленныя при лѣченіи горячихъ нарывовъ, по временамъ *слабительныя* внутрь, иногда разрѣшаютъ эти нарывы; но это случается очень рѣдко, а обыкновенно нарывъ самъ вскрывается, изъ него истекаетъ гнойная матерія въ большомъ количествѣ и скоро изнуряетъ больного, и все это происходитъ отъ прониканія воздуха въ нарывную полость, для предотвращенія чего врачи выдумали множество способовъ вскрывать эти нарывы такъ, чтобы воздухъ какъ можно менѣе проникалъ въ ихъ полости; посему и вскрытіе холодныхъ нарывовъ предоставляется врачу, но и онъ рѣдко бываетъ счастливъ при такихъ больныхъ.

При глубокихъ нарывахъ съ узкимъ отверстіемъ, когда больной держитъ ту часть тѣла, гдѣ находится нарывъ, въ отвѣсномъ положеніи, то есть когда онъ лежитъ въ постели — при нарывѣ на шеѣ, груди, брюхѣ, — и стоитъ, или сидитъ, свѣся ноги, опускаетъ руки — при нарывѣ на рукахъ, ногахъ — когда полость нарыва набиваютъ корпіемъ такъ, что запираютъ и его отверстіе, и не прижимаютъ компрессами нарыва снизу, то во всѣхъ такихъ случаяхъ гной, не имѣя свободного истока, скопляется въ нарывѣ и, по тяжести, опускается въ низу и пробирается между мышць, образуя чрезъ то новыя гнойныя полости и ходы. Это можно предполагать, если гной, не смотря на влажную поверхность нарыва и отсутствіе въ немъ боли и жара, уменьшается въ количествѣ, въ сторонѣ нарыва въ низу замѣчается краснота, отѣкъ, опу-

холь, которую, если пожать пальцами или ладонью, въ направленіи къ нарыву, то изъ послѣдняго вдругъ вытекаетъ много гноя, часто жидкаго, вонючаго; если притомъ провести чрезъ нарывъ зондъ въ то мѣсто, откуда вытекаетъ гной, то явно можно замѣтить, что здѣсь есть пустота. Если такія полости и ходы остаются долго, то они покрываются мягкой, рыхлою багъ губка, слизистою перепонкою, которая потомъ дѣлается бѣловатою, твердою, мозолистою, мѣшаетъ заживленію нарыва и превращаетъ его въ свищъ. Происхожденіе этихъ новыхъ гнойныхъ полостей и ходовъ можно предотвратить наложеніемъ *толстыхъ компрессовъ* на то мѣсто, гдѣ можно полагать накопленіе гноя, то есть, по нижней части нарыва, и довольно плотнымъ здѣсь *обвиваніемъ* члена посредствомъ *бинта*. Лѣченіе нарыва, превратившагося въ свищъ, — рѣзать, — относится къ статьѣ о лѣченіи сего послѣдняго. При обильномъ нагноеніи въ обширныхъ нарывахъ (на поясницѣ, на бедрахъ, животѣ, женскихъ грудяхъ) худой гной и медленное заживленіе нарыва зависятъ иногда отъ накопленія нечистотъ въ желудкѣ, кишкахъ; здѣсь нужно обратить вниманіе на аппетитъ, вкусъ во рту, нечистоту языка и дать больному *рвотное*, или слабительное, а потомъ наливку *чрнаго корня* съ *кремортартаромъ*, *ревенемъ*, настойкою *хины*, а между тѣмъ посоветоваться съ врачомъ.

Лѣченіе нарывовъ у *дѣтей* требуетъ особенно *припарокъ* изъ *льнянаго сѣмени* и *мыла* съ *молокомъ*; болѣе мягчительная припарка есть жидкая *овсяная каша* съ *масломъ*. На ночь класть на нарывы *милотный пластырь*, или *діахильный*, либо *свиное* топленое, очищенное *сало*. Багъ только нарывъ прорвется, то продолжать употребленіе этихъ пластырей для вытягиванія матеріи и для заживленія нарыва. Еслибъ нарывъ сдѣлался на такомъ мѣстѣ, что нужно его прорѣзать для того, чтобы скорѣе выпустить изъ него матерію по усмотрѣнію врача, то должно совѣтовать, чтобы родители не препятствовали ему въ этомъ.

Изъ нарывовъ внутреннихъ наичаще случается у поселянъ нарывъ въ легкихъ, и потому слѣдуетъ описать его особо.

Нарывъ въ легкихъ.

Опредѣленіе. Нарывъ въ легкихъ есть кровяно-пасочная воспалительная опухоль, образуемая вслѣдствіе предшествовавшего въ нихъ воспаления. Если воспаление легкихъ истинное въ теченіе 14-ти и болѣе 21-го дней, а воспаление легкихъ ложное въ теченіе 6-ти недѣль, ни самою натурою, ни врачебнымъ искусствомъ не излѣчилось, т. е. не разрѣшилось посредствомъ отдѣленій и испражнений, какъ-то: отхаркиваніемъ, испраженіемъ нозомъ, густою мочою и испариною, и больной не выздоровѣлъ и даже не получилъ облегченія, между тѣмъ лихорадочное состояніе продолжается довольно сильно, дыханіе все еще затруднительно и принужденно, ознобъ къ вечеру удваивается, щеки краснѣютъ, губы дѣлаются сухими, и притомъ жажда мучить больного, то

совокупность всѣхъ этихъ признаковъ вѣрно указываетъ на положительное заключеніе, что воспаленіе легкихъ перешло въ нагноеніе и образовался въ нихъ нарывъ.

Признаки. Кашель бываетъ непрерывный, особенно являющійся при малѣйшемъ движеніи и послѣ принятія какой-бы то ни было пищи, больной можетъ ложиться только на больной бокъ, а часто и совсѣмъ лежать не можетъ, почему и бываетъ принужденъ проставать, либо просиживать день и ночь; бессонница, безпокойство, часто ужасная тоска съ потомъ на груди и особенно на лицѣ. По ночамъ онъ потѣетъ, изо рта его часто пахнетъ дурно, особенно гнилыми протухлыми яйцами. Онъ очевидно худѣетъ, ротъ и языкъ у него сухи, жажда неутолимая, голосъ слабый и охриплый, глаза уходятъ подъ лобъ, на груди его противъ больного мѣста иногда примѣчается небольшая опухоль и перемѣна цвѣта едва примѣтная; у нѣкоторыхъ больныхъ можно узнать опухоль прижиманіемъ впадины желудка, особенно во время кашля.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ предшествовавшемъ воспаленіи легкихъ, хотя бы оно было истинное, или ложное.

Причины внѣшнія (производящія) слѣдующія: запущенное воспаление легкихъ, неправильное лѣченіе его, неправильное діететическое содержаніе при немъ больного и другія въ этомъ родѣ неблагоприятныя условія.

Сущность видна изъ опредѣленія.

Распознаваніе нарыва въ легкихъ легко по свойству образованія его изъ воспаленія и по признакамъ, обнаруживающимъ форму его проявленія.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ:

1. *Отъ мѣстопребыванія нагноенія.* Если нарывъ будетъ на внутренней грудной оболочкѣ, то иногда онъ выходитъ наружу и образуетъ на поверхности бока язву, посредствомъ которой выльчивается; а если займетъ мѣсто въ существѣ легкихъ, то матерія можетъ освободиться посредствомъ харканія. Но если гной разольется въ самой впадинѣ груди, т. е. между внутреннею грудною оболочкою и легкими, тогда только искусный хирургъ можетъ выпустить ее оттуда посредствомъ искусственнаго отверстія между ребрами: иначе послѣдствія самыя дурныя и предсказаніе въ этомъ случаѣ самое неблагоприятное.
2. *Отъ степени нарыва:* если нарывъ значительно великъ, то въ двухъ послѣднихъ случаяхъ его мѣстопребыванія, когда онъ прорвется, слѣдуетъ скоропостижная смерть отъ задушенія гнойвидною матеріею.
3. *Отъ тѣлосложенія больного:* если больной слабъ сложеніемъ, худосоченъ, золотушенъ, съ неправильнымъ образованіемъ груди, то предсказаніе, особенно въ послѣднихъ двухъ случаяхъ мѣстопребыванія нарыва, всегда не благоприятное, не надежное; больные умираютъ или вдругъ, или развившеюся чахоткою; въ противномъ же случаѣ больные при благоприятныхъ обстоятельствахъ, въ первыхъ двухъ случаяхъ мѣстопребыванія нарыва, нерѣдко выздоравливаютъ, а въ послѣднемъ все-

таки умираютъ, если не вдругъ — не скоропостижно, то развитіемъ чахотки. Относительно *продолжительности* предсказаніе не выгодно; больной страдаетъ долгое время и только въ первомъ случаѣ мѣсто-пребыванія нарыва срокъ теченія болѣзни бываетъ иногда короче, именно, когда онъ выходитъ наружу, пробиваетъ рану и ею излѣчивается: во всѣхъ же прочихъ случаяхъ больные, если не умираютъ скоропостижно отъ задушенія, то получаютъ развитіе чахотки.

Замѣчательно однако, что если матерія, которую больной извергаетъ отхаркиваніемъ, густа, если кашель по мѣрѣ того уменьшается, ежели дыханіе при этомъ становится свободнѣе, то можно ласкаться надеждою, что больной скоро выздоровѣетъ.

Лѣчение діететическое въ нарывѣ легкихъ требуетъ соблюденія преимущественно слѣдующихъ правилъ: 1) больной не только во время этой болѣзни, но и по выздоровленіи отъ нея долженъ *соблюдать* долгое время, не только мѣсяцы, но и годы, всѣ тѣ *правила*, какія предписаны въ діететическомъ лѣченіи *воспаленія легкихъ* истиннаго, особенно въ осеннее и зимнее время всячески стараться *избѣгать* того, отъ чего какъ извѣстно ему, послѣдовало *предшествовавшее* нарыву въ легкихъ *воспаленію*, потому что послѣ того остается большое расположение къ возвратамъ болѣзни. 2. Надобно *предостерегать* въ томъ, чтобы опасались давать больному дышать или *нюхать* нашатырный спиртъ, *эфиръ*, гофманскія капли, летучія соли — *отъ обмороковъ*, въ которые повергаетъ прорывъ нарыва, а *замѣнять ихъ* для нюханія *крѣпкимъ уксусомъ*. 3. *Пища* больного должна быть *легкая*, но *питательная*, возстановляющая его силы. Всего лучше супъ изъ цыпленка, отваръ изъ крупъ или изъ саго, кашка изъ сарачинскаго ишена съ *бѣлымъ хлѣбомъ*; а вмѣсто питья надобно давать больному сыворотки, послѣ пахтанья, или простой сыворотки, подслащенной медомъ.

Лѣчение существенное въ нарывѣ легкихъ есть предметъ особой важности, и потому должно совѣтовать обращаться для этого всегда ко врачу, а за отсутствіемъ его слѣдуетъ довольствоваться слѣдующими ограниченными средствами: если на поверхности бока груди замѣтно появляется опухоль, означающая мѣстопробываніе нарыва на внутренней грудной оболочкѣ, то слѣдуетъ лѣчить его, какъ чирей, или наружный нарывъ (см. лѣч. сущ. вередъ и нарыва); при чемъ, когда этотъ нарывъ будетъ близокъ къ прорыву наружу, больной долженъ *лежать опухолью* нарыва *внизъ*, чтобы матерія, когда онъ прорвется, вся выходила и стекала изнутри наружу. Если же никакой опухоли на бокахъ груди не видно, и нарывъ въ груди произошелъ въ слѣдствіе истиннаго воспаленія легкихъ, въ каковомъ случаѣ онъ долженъ быть непременно въ самомъ существѣ легкихъ; въ такомъ случаѣ сперва потребны *лекарства, умножающія отхаркиваніе*, описанныя въ лѣченіи воспаленій легкихъ. Если они чрезъ это не освобождаютъ легкія отъ нарыва, то надобно стараться разрѣшить его *мочегонными и потогонными средствами*, каковы суть: *Раверово питье*,

грудой чай, ссмирнъ из растительного молока, отвлекающія на-
рывы, особенно мушка, прикладываемая противъ больного мѣста
груди и проч., о чемъ подробно описано въ лѣченіи воспаления легкихъ
истиннаго. Если этого не достаточно, и нарывъ не вылечивается и раз-
рѣшеніемъ, то надобно стараться, чтобы онъ созрѣлъ и прорвался вну-
три. Для этого нужно давать больному нюхать и вдыхать въ себя *паръ*
теплой воды или уксуса, и пить большое количество смягчительной
жидкости, какъ напр., *отвара изъ ячменя и меда, телячьяго отвара*,
въ которомъ варилось телячье мясо, *молока*, смѣшаннаго пополамъ съ
водою, такъ чтобы желудокъ былъ всегда полонъ и полнымъ объемомъ
своимъ упирался въ легкія, отчего матерія нарыва, въ случаѣ его про-
рыва, будетъ направлена къ горлу. При этомъ по времени съ пере-
мѣшкою надобно заставлятъ больного кашлять, смѣяться, кричать и
проч., но осторожно, по немногу и на короткое время, чтобы не исто-
щились чрезъ это силы больного. Въ лѣтнее время, въ хорошую погоду,
если силы больного позволяютъ, можно для этой цѣли *провести* его въ
тряской телѣгѣ *по негладкой дорогѣ*, но небольшое пространство, что-
бы не ослабить больного. *Зам.* При этомъ непременно должно имѣть въ
виду, что лѣченіе тогда только можетъ быть успѣшно и полезно, когда
больной отъ природы крѣпкаго сложенія, не худосоченъ, съ правиль-
нымъ устройствомъ груди, не такъ слабъ, что не встаетъ съ постели:
при чемъ беспокоить его никакъ не должно, потому что такая слабость
означаетъ большой нарывъ въ легкихъ, который угрожаетъ опасностію
жизни. Если у больного въ слѣдствіе воспаления и нарыва въ легкихъ
появляется отхаркиваніе гноевидною матеріею такою, которая, если ее
смѣшать съ водою, тонетъ на дно сосуда, продолжается долгое время не
только безъ всякаго облегченія для него, но съ большею время отъ вре-
мени потерю силъ и худобою тѣла, то это значить, что уже развилась
чахотка. Больнымъ въ этомъ состояніи полезенъ *воздухъ гнилостнаго*
свойства для дыханія, почему слѣдуетъ совѣтовать имъ чаще *нюхать*
свѣжій коровій калъ, а въ лѣтнее время и *жить въ коровникѣ*. Пить
теплое, *парное молоко молодыхъ коровъ, козъ, кобылъ*, въ степяхъ
кумысъ. Пищу употреблять легкую, питательную. Изъ лѣкарствъ со-
вѣтовать употреблять *кору ивы* (№ 43), *дуба* (№ 45), *липы* (№ 47),
сладкогорькій пасленъ (№ 6), *свинцовый сахаръ съ вишневымъ клеемъ*
или камедью (№ 120), *солодковый корень съ медомъ, анисомъ и слизью*
льнянаго семени (№ 121). Между тѣмъ совѣтовать обратиться ко
врачу, тѣмъ болѣе, что лѣченіе этой болѣзни и врачамъ служить фи-
лософскимъ камнемъ.

Ногтоѣда.

Опредѣленіе. Ногтоѣда есть смѣшанное, т. е. кровавое и вмѣстѣ
пасочное воспаленіе, обнаруживающееся краснотою, жаромъ, припухло-

стию съ сильнѣйшею болью, поражающее околоноготную и подноготную часть и переходящее въ сывороточное нагноеніе.

Мѣстопрѣбываніе. Ноготьда обыкновенно бываетъ на концахъ пальцевъ, преимущественно рукъ, рѣдко на ногахъ. Ручные пальцы находятся въ сопребосновеніи съ природою виѣшнюю чаще ножныхъ, оттого они при расположеніи организма чаще и поражаются.

Раздѣленіе. Смотра по тому, будетъ ли поражаться ею околоноготная и подноготная часть, или поражение пальца будетъ на подобіе кольца въ ближайшемъ отъ ногтя сочлененіи, ноготьда получаетъ разныя наименованія: въ первомъ случаѣ она называется *истинною*, а въ послѣднемъ *ложною*. Во всемъ прочемъ оба эти вида ноготьды сходны между собою, и нѣтъ надобности описывать каждый изъ нихъ порознь.

Признаки: припухлость и боль въ околоноготныхъ и подноготныхъ мѣстахъ; черезъ 5—6—12 часовъ присоединяется отложеніе сывороточной влаги подъ малпигіеву ткань, воспаленіе ожесточается, боль нестерпимая, бьющаяся съ каждымъ ударомъ пульса. Опухоль, жаръ, краснота иногда такъ увеличиваются, что не только поражаютъ палецъ, но распространяются по всей кисти и даже по цѣлымъ рукамъ. Появляются лихорадочныя движенія и бессонница по цѣлой ночи отъ сильнаго страданія. Скопившаяся подъ кожей сывороточная влага отбрыкаетъ себѣ выходъ наружу, становится легче, болѣзнь дѣлается ограниченною собственно въ страждущихъ частяхъ. Кожица вся спадаетъ, и ноготь отдѣляется отъ подлежащей кѣтчатки. Начинается правильное нагноеніе, язва скоро и удобно заживаетъ, кожица и ноготь со временемъ замѣняются новыми. Все теченіе болѣзни совершается въ 7—15—20 дней. Иногда однакожъ, особенно ежели отдѣляется не весь ноготь, а только часть его, воспалительное состояніе поражаетъ не только поверхностную околоноготную часть, но проникаетъ до самой кости, и болѣзнь дѣлается продолжительною, переходя въ омертвѣніе страждущихъ мягкихъ частей, или сывороточное отдѣленіе, прорываясь глубоко въ мягкія части, достигаетъ самой кости, которая, поражаясь ноготьдою, отваливается иногда цѣлымъ суставомъ, и въ этомъ-то случаѣ простой народъ приписываетъ болѣзнь эту волосатику.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ пасочно-золотушномъ расположеніи тѣла, отъ котораго ноготьда, большею частью, происходитъ такъ, что изъ десяти страждущихъ этою болѣзнію двое имѣютъ это расположеніе, по которому они при самыхъ легкихъ виѣшнихъ причинахъ подвергаются ноготьдѣ. Оттого нѣкоторые каждый мѣсяцъ страдаютъ ноготьдою, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ она называется *послѣдовательною*.

Причины виѣшнія (производящія) при внутреннемъ расположеніи легко производятъ ноготьду, въ противномъ же случаѣ трудно, такъ что безъ внутренняго расположенія къ этой болѣзни не иначе какъ очень сильная причина можетъ произвести ноготьду, которая въ такомъ случаѣ называется *простою*, или *первоначальною*. Къ числу

такихъ причинъ относятся: уколы, занозы, ушибы, ѣдкія вещества, какъ напр. щелокъ и т. п.

Замѣч. Ноготьда простая, или первоначальная, отличается отъ ноготьды послѣдовательной и тѣмъ еще, что первая имѣетъ воспаленіе свойства кровяного, теченіе быстрое и нагноеніе правильное; напротивъ ноготьда послѣдовательная, будучи по воспаленію свойства болѣе пасочнаго, совершаетъ теченіе медленно. Рыболовы, баньщики, прачки, сапожники, башмачники и портные преимущественно бываютъ подвержены ноготьдѣ.

Сущность ноготьды состоитъ въ смѣшанномъ, т. е. кровяномъ и пасочномъ воспаленіи кожи и малпигіевой ткани около ногтя и, часто, подлежащихъ ногтю частей.

Распознаваніе ноготьды очень *легко*. Хотя бы и чирей занялъ мѣсто около ногтя, или ноготьда поразила бы часть, лежащую выше ногтя, во всякомъ случаѣ распознать ее можно, 1) потому что она обрушаетъ палецъ на подобіе кольца: 2) потому что въ ноготьдѣ не бываетъ хорошаго нагноенія, но отдѣленіе сывороточное.

Предсказаніе вообще для жизни *безопасно*. По *продолжительности* же болѣзни и сбереженію ногтя очень *сомнительно и невыгодно*. Если воспаленіе проникаетъ до надкостной ткани и поражаетъ самую кость; то часто кость вываливается, и болѣзнь продолжается мѣсяцъ, два и болѣе. Вообще ноготьда тѣмъ продолжительнѣе, чѣмъ болѣе характера пасочнаго; характера же кровяного она менѣе продолжительна.

Исходъ ноготьды бываетъ или чрезъ *разрушеніе*, или чрезъ *сывороточное отложеніе*. Ноготьда болѣе кровяная чаще оканчивается разрушеніемъ, нежели пасочная.

Лѣченіе *діетическое* въ этой болѣзни нужно, если больной имѣетъ сильное къ ней расположеніе, — если онъ мокротенъ, пасоченъ (лимфозенъ) золотушенъ. При этомъ онъ долженъ употреблять въ *питье* одну *ключевую воду*. Привычное употребленіе чая въ умѣренномъ количествѣ не вредитъ. *Пища* должна быть *тонкая*, преимущественно изъ *царства растительнаго*, за исключеніемъ картофеля, состоящая изъ яствъ вареныхъ, печеныхъ и жареныхъ, а не сырыхъ. *Занятія* по мѣрѣ силъ и возможности должны быть производимы *членами тѣла здоровыми*, а *больной палецъ* долженъ быть всегда завязанъ и, какъ нельзя лучше, защищенъ отъ воздуха и всего, что можетъ имѣть на него болѣе или менѣе вредное вліяніе, словомъ — должно его *содержать осторожно*. Въ предохраненіе же отъ этой болѣзни должно внушать поселянамъ, чтобы они были осторожны отъ уколовъ, занозъ, ушибовъ, ѣдкихъ веществъ *).

*) Я зналъ въ Москвѣ одну женщину, у которой большой палецъ правой руки былъ пораженъ ноготьдою отъ укола чешуею рыбы при ея чищеніи; болѣзнь продолжалась болѣе года и кончилась тѣмъ, что палецъ по 1-й суставъ отвалился. У женщинъ нерѣдко происходитъ ноготьда отъ неосторожности ихъ во время мытья въ щел-

Лѣчение существенное, большею частію, употребляется *одно мѣстное* — *наружное* съ цѣлію разрѣшить ноготьду, либо привести въ нагноеніе, а потому оно раздѣляется на: *разрѣшающее и нагнаивающее*.

Лѣчение разрѣшающее возможно только тогда, когда болѣзнь будетъ захвачена въ самомъ началѣ, когда нѣтъ еще наклонности къ отдѣленію сывороточной влаги; въ такомъ случаѣ употребляются слѣдующія средства: 1) *Горячая припарка*, или *примочка*. Для этого больной палецъ погружаютъ въ горячую воду одну, либо съ прибавленіемъ *уксуса* и травы *бѣлены*. Горячая вода препятствуетъ распространенію воспаленія въ ноготьдѣ, уксусъ предотвращаетъ болѣзненное отложение и отражаетъ переходъ въ нагноеніе; а бѣлена осаживаетъ или притупляетъ возвышенную раздражительность и чувствительность больныхъ нервовъ и чрезъ то успокоиваетъ боль. 2) *Плина* съ уксусомъ и травою бѣлены, обваренною кипяткомъ, вмѣстѣ смѣшанная и обложенная кругомъ больного пальца, споспѣшествуетъ разрѣшенію ноготьды. 3) *Отваръ* коровъ: *ивы, вяза, дуба, нерѣдко и ольхи* съ травою бѣлены, помогаетъ также разрѣшенію ноготьды. Горячимъ отваромъ этимъ либо намачиваютъ ветошку и обкладываютъ больной палецъ, либо палецъ опускаютъ въ горячій отваръ частымъ повтореніемъ. 4) *Прижиганіе* больного мѣста *на свѣтъ*, по обыкновенію простаго народа, *прикладываніе* къ больному мѣсту *горячаго воска, смолы, сала* и т. п. также хорошо помогаетъ. Если этого недостаточно, то 5) *перевязавъ* палецъ такъ, чтобы онъ нѣсколько онѣмѣлъ, *погружаютъ* его въ болѣе *горячую* противъ прежняго *воду*. Этотъ способъ особенно выгоденъ въ томъ случаѣ, когда воспаленіе обширно. 6) Перевязанный палецъ *обмокнуть* въ самый *крепкій* винный *спиртъ* и потомъ *зажечь*. Если пораженная ноготьдою часть сдѣлается твердоватою, онѣмѣлою, нечувствительною, если не будетъ показываться сывороточное отдѣленіе, то видно, что лѣчение разрѣшающее имѣло свое дѣйствіе. *Замѣч.* Въ этомъ и подобныхъ случаяхъ при совершеніи сказанныхъ операцій должно остерегаться, чтобы не захватить здоровыхъ частей; въ противномъ случаѣ воспаленіе увеличится, и ноготьда перейдетъ въ худшее состояніе. 7) Метода лечить *холодною водою* ноготьду состоитъ въ томъ, что больной палецъ, обернувъ полотенцомъ, держать надъ порожнимъ сосудомъ и посредствомъ небольшой гребной губки, обмакиваемой въ холодную воду, находящуюся въ другомъ сосудѣ, непрерывно смачиваютъ палецъ, а равно и всѣ болящія части руки. Это продолжаютъ цѣлый часъ. Больной въ это время чувствуетъ, какъ уменьшаются боль и жаръ. Эта метода лучше погруженія пальца въ холодную воду или его примачиванія, потому что въ первомъ случаѣ увеличивается приливъ крови къ пальцу чрезъ наклоненное его положеніе, а во второмъ жаръ пальца

локу; поэтому для рабочихъ поселянъ, какъ-то: прачекъ и другихъ вышеозначенныхъ изложены особые правила въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

скоро высушиваетъ компрессъ. Въ Пермской губерніи общенародно обыкновеніе лѣчить ноготѣду крѣпкою водкою, или, завязавъ туго больной перстъ кускомъ крашенины выше мѣста воспаленія, со свободнаго конца зажигаютъ ее и гасятъ горящую крашенину, когда больной палецъ не въ силахъ болѣе выносить жара. Иные вкладываютъ больной палецъ въ крѣпкій горячій щелокъ или въ вино, съ отличнымъ успѣхомъ, особенно на 2 или на 3 день болѣзни (Др. Зд. 1834 г. стр. 70). 8) *Завязанный корень* (Tormentilla) въ началѣ, когда именно несносная эта болѣзнь еще только начинается, излѣчивается ноготѣду. Завязная трава растетъ у насъ вездѣ въ лѣсахъ, а сухой корень ея можно получать въ аптекѣ безъ рецепта. Корень должно высушить въ горячей печи, какъ можно лучше, и толченіемъ привести его въ порошокъ, который смѣшать съ яичнымъ желткомъ такъ, чтобы вышло тѣсто. Этимъ тѣстомъ намазать ветошку и обложить ею больной палецъ, сверхъ этой ветошки положить еще *припарку* изъ *льнянаго сѣмени* для того, чтобы первая припарка не скоро высыхала *).

Лѣчение нагнаивающее употребляется тогда, когда болѣзнь въ самомъ началѣ не захвачена, когда появилась уже склонность къ отдѣленію сывороточной влаги; въ такомъ случаѣ употребляются средства въ видѣ тепловатой и даже горячей припарки: 1) *Водяной*, озерный, *лопушный корень*, называемый народомъ «*бахтовникъ*» мелко истолченный съ льнянымъ сѣменемъ способствуетъ нагноенію и отдѣленію пасоки (№ 59). Для этого же употребляется *простонародная мягчительная мазь* (№ 151). 2) *Табакъ* имѣетъ хорошее дѣйствіе съ *ромашкою* (№ 60), съ *сырымъ* или *печенымъ лукомъ* (№ 61), съ *горчицею*, *чеснокомъ* и т. п., прибавляя ихъ по $\frac{1}{4}$ части противъ всего количества табака. *Замѣч.* При употребленіи табака должно остерегаться его сильной остроты. Для этого листья его, обваренные кипяткомъ, слѣдуетъ тщательно выжимать, дабы острота оставалась болѣе въ водѣ. 3) *Маковый цвѣтъ* съ *полынью* или *божьиимъ деревцомъ*, или съ *листами проскурнячника*, или *рожи*, или съ *мякишемъ бѣлаго хлѣба*, или *пшеничною мукою*, прилагая послѣднихъ отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ части противъ всего количества цвѣтовъ мака. 4) *Мазь*, приготовляемая изъ *меда* съ *печенымъ лукомъ* и какою-либо *мукою*, оказываетъ дѣйствительную пользу. 5) *Кислое тѣсто* или *черный хлѣбъ*, размятый въ горячей водѣ съ *солью*, съ пользою могутъ быть употреблены, равно какъ и *простонародная раздражающая мазь* (№ 150), состоящая изъ *мыла* и *свѣчнаго сала*. 6) Когда произойдетъ хорошее нагноеніе, то нужно открыть путь для выхода гноя, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; въ противномъ случаѣ гной проникнетъ глубоко и поразитъ самую кость. *Искусственное открытіе гноя* необходимо бываетъ тамъ, гдѣ или кожа будетъ толста, или гной скопится подъ ногтемъ. 7) *Спужъ* (№ 29) и *простонародная мягчительная мазь* (№ 149)

*) Д-ръ Моренъ. Др. Здр. 1840 г. стр. 203.

гладятся по вскрытіи нагноенія, если не останется послѣ того призна-
ковъ нарыва; въ противномъ случаѣ слѣдуетъ прибѣгнуть къ употребле-
нію вышеупомянутыхъ припарокъ и къ слѣдующей: 8) *Рожь аптеч-
ная*, или *малва*, коей листы берутся и смѣшиваются съ корнею
бахтовника по равной части; будучи истолчены въ порошокъ, приго-
товляются съ кипяткомъ для припарки и бывають употребляемы так-
же съ большою пользою. *Прим.* Противъ востанія ногтей употреблять
слѣдующія простые средства: а) *приподнимая* постепенно кончикомъ
перочиннаго ножичка *уголъ ногтя*, гдѣ онъ углубляется въ мясо, *под-
кладываетъ* подъ него немного *хлопчатой бумаги*. Когда ноготь до-
статочно поднимется вверхъ, посредствомъ подложенной подъ него
хлопчатой бумаги, то довольно обвязать палецъ: дикое мясо само собою
осядетъ, изъязвленіе проходить, и боль исчезаетъ удивительно скоро,
или: б) *кусочекъ жести*; согнуть его такъ, чтобы онъ хорошо при-
ставалъ къ ногтю, спилить узкую сторону кусочка такъ, чтобы она
сдѣлалась тонкою, вложить эту жость сверху внизъ между ногтемъ
и мягкою частию и пригрѣпить ее ленточками, намазанными *липкимъ
пластыремъ*. При употребленіи этого средства прекращается раздраже-
ніе въ легкихъ частяхъ, которыя потомъ приходятъ въ натуральное
состояніе. 9) Еще есть новый успѣшный способъ лѣченія ногтеѣды
(во всякомъ ея періодѣ, т. е. до, во время и по нагноеніи), который
очень простъ и сопряженъ съ такою малою болью, что его легко мо-
жно употреблять даже у нѣжныхъ дѣтей. Страждущую часть смачива-
ють водою и потомъ потирають *адскимъ камнемъ* до тѣхъ поръ, пока
то мѣсто начнетъ блѣднѣть, на что, смотря по жестокости воспаления,
потребно отъ 1 до 4 минутъ. Послѣ этого больную часть покрываютъ
корпѣй, обвязываютъ холстинной тряпочкой и даютъ той части воз-
вышенное положеніе. Если болѣзнь продолжалась 1—2 дня, то, какъ
бы ни было сильно воспаление, въ большей части случаевъ вскорѣ не
остается ни малѣйшей боли, почернѣвшая кожа приподнимается, и
ее легко удалить прочь безъ боли; вмѣстѣ съ тѣмъ выходитъ гнойная
или водянистая влага. Но если все еще есть опухоль, краснота и чув-
ство біенія въ больномъ мѣстѣ, то потираніе адскимъ камнемъ возоб-
новляется и даже еще на другой день, пока не останется уже опухоли
и въ почернѣвшемъ мѣстѣ не будетъ боли. Если кожа жестка, какъ
напр. у мастеровыхъ, то надобно передъ потираніемъ адскимъ кам-
немъ срѣзать ее прочь ножикомъ тонкими слоями, что можно дѣлать
и при повторительномъ потираніи; если не выступаетъ влажность, и
боль еще значительна, тогда можно употребить и теплыя припарки.
При этомъ простомъ пользованіи, въ первые 8 дней, а часто уже и въ
3 дня, послѣдуетъ излѣченіе, на которое иначе потребовалось бы нѣ-
сколько недѣль, а иногда и мѣсяцевъ. При ногтеѣдѣ надобно произво-
дить потиранія около самого ногтя, у такъ называемой закраины, осо-
бенно когда ноготь у корня уже отсталъ и гной просачивается. При
этомъ не нужно вырывать ноготь, какъ многіе совѣтуютъ, потому что

уже на другой день не бывает ни боли, ни гноя; почернѣвшая кожа и ноготь отпадаютъ мало по малу. Смѣлымъ употребленіемъ адскаго камня воспаленіе въ самомъ началѣ уничтожается, и болѣзнь удерживается отъ развитія. Если же былъ гной, то стержень отстаетъ въ 24 часа, и его удаляютъ пинцетомъ, такъ что потомъ крѣпко-прилегающая, сухая перевязка дня въ два доставляетъ совершенное излѣченіе *). 10) Не менѣе того вѣрный и скорый способъ лѣченія ногтоѣды предлагаетъ Д-ръ Корицкій **). Если матерія образовалась, а нарыва въ ногтоѣдѣ еще невидно, то онъ старается отыскать мѣсто матеріи, проходя къ нему булавкою, иглою, перочиннымъ ножикомъ или ланцетомъ, прокалываетъ его и слегка выдавливаетъ матерію, а въ открытомъ нарывѣ осушаетъ ранку скобленною корпкою, заливаетъ её 2, 3 или 4 гофманскими каплями, вкладываетъ туда маленький свертокъ такой же корпкѣ, намоченной гофманскими каплями, и слегка завязываетъ. Если ранка эта значительна и матеріи много, то онъ перемѣняетъ сверточекъ чрезъ 4 и 5 часовъ таковымъ же свѣже-намоченнымъ: а ежели матеріи мало, то наливаетъ на прежній, не вынимая его 3, 4, 5 гофманскихъ капель, стараясь, чтобы онъ проникли до дна ранки, и это повторяютъ также чрезъ 4 и 5 часовъ. Поверхъ этого свертка, на воспаленное и опухшее мѣсто онъ накладываетъ каждый разъ скобленную корпкою, намоченную въ гофманскія капли. Этимъ способомъ излѣчивается ногтоѣда очень скоро, именно въ продолженіе одного, двухъ и много трехъ дней. Д-ръ Корицкій употребляетъ его болѣе 30-ти лѣтъ и никогда не допускаетъ страждущаго ни до уродливости ногтей или суставовъ, ни до потери ихъ. Даже застарѣлыя, запущенныя, годъ продолжавшіяся ногтоѣды, излѣчивалъ онъ этимъ средствомъ въ нѣсколько недѣль, и никогда при ногтоѣдѣ не употреблялъ ни примочекъ, ни пластырей, ни мазей. Кто чувствителенъ и не терпитъ инструментовъ можетъ самъ себя дѣлать эту безболѣзненную и легкую операцію. При лѣченіи рабочихъ, какъ то: рыболововъ, банщиковъ, прачекъ, сапожниковъ, башмачниковъ, портныхъ и др., нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Р о ж а к р а с н а я .

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е . Рожа есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе кожи, обнаруживающееся жаромъ, щиплющею болью, лоснящеюся опухолью и болѣе или менѣе живою, розовою, рѣдющеюся красниною, исчезающею при давленіи и снова появляющеюся по удаленіи давящей причины.

П р и з н а к и . Сначала на мѣстѣ болѣзни тупая, частію жгучая боль

*) Д-ръ Веренсъ въ Ганноверѣ. Др. Здр. 1844 г. № 44 стр. 348.

**) Др. Здр. 1846 г. № 19, стр. 147.

съ зудомъ, потомъ небольшая опухоль и свѣтлорозовая краснота. Далеѣ: лихорадочныя движенія, выражающіяся нерасположенностію къ занятіямъ, болѣю головы, превратнымъ вкусомъ, разстройствомъ аппетита, ознобомъ въ видѣ подиранія по кожѣ, переходящимъ иногда въ дѣйствительную лихорадочную дрожь, смѣняющуюся жаромъ, сопутствующимъ болѣзни нерѣдко до самаго ея окончанія. При этомъ опухоль, увеличиваясь, занимаетъ нерѣдко значительное пространство, свѣтлорозовая краснота дѣлается темнѣе, жгучая боль усиливается, между тѣмъ какъ зудъ уменьшается; къ ночи бываетъ легче. Съ появленіемъ испаринъ на другой или на третій день болѣзнь ослабѣваетъ, лихорадка болѣе незамѣтна, краснота уменьшается, кожа скупливается въ видѣ крупныхъ отрубей и лоскутовъ, и здоровье больного возстановляется. Такъ бываетъ въ обыкновеннѣйшихъ, наипаче случающихся легчайшихъ видахъ рожи, но въ частныхъ случаяхъ признаки рожи бываютъ весьма разнообразны.

Раздѣленіе. По частной разнообразности признаковъ рожи слѣдуетъ принять слѣдующія постояннѣйшія и главнѣйшія ея видоизмѣненія: Рожа *поверхностная*, когда краснота, жаръ и опухоль только поверхностно поражаютъ кожу вмѣстѣ съ малпигіевою тканью и кожей, причемъ признаки лихорадочные едва замѣтны, скоро проходятъ и оканчиваются испариною. Рожа *глубокая* проникаетъ отъ поверхности кожи до подлежащей вѣтчатки и даже до мышцъ. Ей предшествуютъ лихорадочныя движенія; отъ неправильнаго содержанія больного и дурнаго лѣченія она переходитъ легко въ нагноеніе, а иногда въ растворительное изъязвленіе. Рожа *гладкая* имѣетъ поверхность пораженной части гладкую, лоснящуюся и какъ бы выполированную. Этотъ видъ рожи сопровождается всѣми признаками рожи поверхностной, которые выше описаны. Рожа *пузырчатая* покрывается пузырьками, наполненными пасочно-сывороточною влагою. Лихорадка, сопутствующая ей, имѣетъ склонность принимать характеръ нервно-гнилостный. Развѣтіе ея находится въ прямомъ содержаніи съ глубокою рожею. Рожа *нарывная*, или *чирьевая*, кромѣ признаковъ глубокой и пузырьчатой рожи, имѣетъ еще свои особенныя признаки, именно нарывы или чирьи различной величины, только *безъ стержня*. Горячка, сопутствующая этому виду рожи, всегда бываетъ характера нервно-гнилостнаго и продолжается не менѣе 21-го дня, а нерѣдко оканчивается въ 41-й день *).

Рожа *постоянная* постоянно въ одномъ, пораженномъ ея мѣстѣ, совершаетъ свое теченіе и не переходитъ на другія части тѣла. Рожа

*) Но у меня былъ случай, гдѣ эта рожа образовалась какъ бы цѣлебнымъ дѣйствіемъ природы, во время пользованія мною одного страждущаго бѣлою горячкою съ перепоя по причинѣ періодическаго запоя, и была очевиднымъ образомъ критическою. По мѣртѣ того, какъ рожа на лѣвой рукѣ болѣе и болѣе рѣдѣла и распространялась, образуя въ центрѣ нарывъ, бѣлая горячка становилась легче и легче и совсѣмъ прошла, кожь скоро нарывъ, придя въ совершенное нагноеніе, вскрылся и матерія изъ него вся вышла.

ползучая, начавшись и развившись въ одномъ мѣстѣ, распространяется и на другія, близъ лежащія части; если же она перейдетъ на другое мѣсто, болѣе или менѣе отдаленное отъ того, гдѣ развилась первоначально, тогда называютъ ее рожею *бродящею*. *Замѣчаніе*. Ползучая и бродящая совершаютъ теченіе свое такъ, какъ пузырчатая и чирьевая, а рожа чирьевая во всемъ сходствуетъ съ поверхностною и гладкою.

Рожа *поясная* поражаетъ верхнюю часть живота въ видѣ пояса. Этотъ видъ рожи есть видоизмѣненіе рожи пузырчатой, отъ которой отличается: 1) тѣмъ, что преимущественно поражаетъ кожу между грудью и пупкомъ, между тѣмъ какъ пузырчатая можетъ развиваться на всякой части тѣла и 2) еще тѣмъ, что пузырьки поясной рожи, прорываясь, образуютъ струпья, чего въ пузырчатой незамѣтно. Кромѣ того, смотря на *разность* рожи со стороны ея *происхожденія*, раздѣляютъ ее на: *первоначальную*, которая происходитъ, хотя и при существующемъ къ ней внутреннемъ расположеніи, всегда вслѣдствіе внѣшнихъ (производящихъ) причинъ, и *последовательную*, которая развивается преимущественно по внутреннему къ ней предрасположенію безъ содѣйствія причинъ внѣшнихъ (производящихъ). Къ первоначальной можно отнести рожу поверхностную и гладкую, а къ последовательной рожу глубокую, собственно пузырчатую и чирьевую. *По степени* можно раздѣлить рожу на: *легкую* или *слабую*, которая, сопровождаясь какъ мѣстными, такъ и общими признаками, очень маловажными, оканчивается въ короткое время: такова рожа поверхностная и глубокая, но вмѣстѣ гладкая; и *тяжелую* или *сильную*, которая, обнаруживаясь признаками, достигающими высшей степени своего развитія, обыкновенно бываетъ продолжительна: такова рожа пузырчатая, чирьевая, ползучая и бродящая. *По внутреннему свойству* рожа раздѣляется на: *воспалительную*, которая обнаруживается признаками горячки, или чисто воспалительной, или желудочно-воспалительной. Рожа, сопровождаемая горячкою чисто-воспалительною, оканчивается скоро и бываетъ обыкновенно или поверхностная, или глубокая, только гладкая; но та, которой сопутствуетъ горячка желудочно-воспалительная, гораздо медленнѣе и бываетъ характера желчно-воспалительнаго, или мокротно-воспалительнаго. Сюда относятся: рожа глубокая и пузырчатая въ высшей степени ихъ развитія; — и *гнилостная* или тифозная, которая сопровождается горячкою характера преимущественно нервно-гнилостнаго, — къ ней причисляется пузырчатая въ высшей ея степени, а еще болѣе чирьевая и ползучая.

Мѣсто пребываніе. Относительно системъ тѣла извѣстно, что рожа можетъ занимать общіе покровы, или *кожу*, подлежащую ей *клетчатку*, а иногда и самыя *мышцы*; но относительно частей тѣла, рожа можетъ быть на всѣхъ частяхъ, кромѣ ладоней и подошвъ. Рожа чирьевая чаще поражаетъ *конечности* и чаще *верхнія*, чѣмъ *нижнія*: никогда не бываетъ на животѣ, не смотря на то, что она можетъ быть бродящею. Рожа ползучая преимущественно поражаетъ *лицо*, а поясная развивается

постоянно въ *поджелудочной сторонѣ*. Причина этой разной мѣстности неизвѣстна.

Причины внутреннія (предрасполагающія) заключаются въ особенномъ пасочно-остротномъ состояніи тѣла, каковое расположеніе въ рожѣ еще болѣе увеличивается отъ употребленія пищи слизистой и жирной, питья мучнистаго, не выброженнаго, и можетъ усиливаться до того, что производить эту болѣзнь безъ всякаго, по видимому, вліянія причинъ производящихъ (внѣшнихъ). Примѣромъ тому можетъ служить *рожа*, такъ называемая *привычная*, которая легко развивается безъ всякихъ явныхъ внѣшнихъ вліяній; равнымъ образомъ задержаніе мѣсячнаго очищенія, остановленіе геморoidalнаго кровотеченія и запоры, усиливая расположеніе къ рожѣ, могутъ производить ее.

Причины внѣшнія (производящія). Одна изъ главнѣйшихъ производящихъ причинъ есть дѣйствіе холода, отъ котораго останавливается испарина, какъ кожное отдѣленіе, совершаемое силою самой природы, стремящейся отдѣлять и извергать изъ тѣла ненужное и вредное для него вещество; словомъ: *простуда*, жаркіе и холодные дни, сырыя ночи, — отчего рожа и происходитъ часто лѣтомъ и осенью разомъ у многихъ людей, т. е., повально; — также изліяніе желчи и раздраженіе въ животѣ, нечистоты въ желудкѣ и кишкахъ, трудно варимая пища (устрицы, угри, раки). Кромѣ того рожа можетъ происходить и отъ всѣхъ вліяній, производящихъ раздраженіе въ общихъ порывахъ, напр. отъ тренія, дѣйствія острыхъ паровъ, или сочувственно какъ-то: отъ душевнаго возмущенія, напр. гнѣва, испуга, печали, внезапной радости; отъ послѣднихъ она можетъ внезапно скрываться съ поверхности тѣла и бросаться въ голову, грудь, животъ, причиняя воспаленіе внутренностей, бредъ, бѣшенство, судороги, параличъ. Вообще всѣ эти внѣшнія причины обусловливаются внутреннимъ расположеніемъ, безъ котораго производящія причины, какъ бы сильно ни дѣйствовали, прямо рожи не производятъ. Рыбаки, занимающіеся продажей рыбы, особенно подвержены рожѣ.

Сущность рожи поверхностной состоитъ въ особенномъ смѣшанномъ воспаленіи малпигіевой ткани и кожи, но въ рожахъ глубокихъ воспаленіе проникаетъ въ самую жировую кѣтчатку и принимаетъ характеръ, болѣе пасочный. Относительно же предрасположенія сущность рожи состоитъ въ пасочно-остротномъ состояніи тѣла.

Распознаваніе. Рожу въ началѣ ея развитія довольно трудно бываетъ отличить отъ огневика и даже отъ чирья, по причинѣ сходства первоначальныхъ признаковъ всѣхъ этихъ трехъ болѣзней между собою, но въ дальнѣйшемъ потомъ развитіи рожа отличается свѣтло-розовою краснотою, занимающею значительное пространство, никогда не ограничивающеюся такъ, какъ это замѣчается въ упомянутыхъ болѣзняхъ. Рожа можетъ быть смѣшиваема еще съ ревматическими воспаленіями, отъ коихъ отличается тѣмъ, что они сопровождаются темнова-

тою краснотою, несравненно чувствительнѣйшею болью безъ зуда и болѣе ограниченной опухолью.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ отъ степени развитія, а еще болѣе отъ внутренняго свойства рожи. Въ *легкихъ случаяхъ*, и гдѣ воспаленіе кровяное, оно *хорошо*; но въ рожавъ *сильныхъ* и характера гниlostнаго предсказаніе *сомнительно* и даже *не выгодно*, потому что гниlostное состояніе показываетъ уже общее устройство въ организмѣ, и что виды такихъ рожъ глубоко поражаютъ занимаемое ими мѣсто и могутъ переходить или распространяться на другія части тѣла, гораздо важнѣйшія для жизни. Относительно продолжительности, предсказаніе въ рожѣ зависитъ отъ большей или меньшей степени расположенія къ ней или внутренней ея причины, такъ что чѣмъ предрасположеніе къ ней будетъ сильнѣе, тѣмъ продолжительнѣе будетъ рожа. Кромѣ того, оно зависитъ и отъ степени развитія рожки, и отъ внутренняго ея свойства. Въ началѣ ее можно излѣчить скоро, а безъ того она можетъ продолжаться до 7-ми дней; принявши же характеръ нервногниlostный, она кончается не ранѣе 21-го дня, или даже 41-го дня, считая время съ перваго ея появленія.

Исходы. Въ *разрѣшеніе* исходъ бываетъ вообще въ легкихъ рожавъ поверхностныхъ или и въ глубокихъ, но гладкихъ, имѣющихъ характеръ болѣе воспалительный; но при счастливомъ лѣченіи и гниlostнаго свойства рожа можетъ разрѣшаться, хотя съ большимъ затрудненіемъ. Исходъ въ *нагноеніе* свойственъ преимущественно рожамъ глубокимъ, особенно пузырчатымъ, а еще болѣе чирьевымъ. При этомъ надобно замѣтить, что въ нагноеніе переходятъ не всѣ части, пораженныя рожею, а только чирьи или пузырьки, ей сопутствующіе. Въ разрушительное *раствореніе* рожа переходитъ особенно тогда, когда она, или по неправильности лѣченія, или по неосторожности самого больного, будетъ подвергнута вліянію сырости; такой исходъ можетъ имѣть не только рожа глубокая, но и поверхностная. Иногда бываетъ подобный исходъ рожки у больного, страдающаго цынготю, тѣмъ болѣе, если рожа будетъ находиться въ нижнихъ конечностяхъ. Исходъ въ *омертвѣніе* свойственъ только рожамъ, достигшимъ высшей степени своего развитія, и преимущественно тѣмъ, кои имѣютъ характеръ гниlostный. Исходъ въ затвердѣніе случается очень рѣдко и тогда только, когда поражена будетъ рожею какая-либо желѣзистая часть.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1. Подверженные частымъ возвратамъ рожки, или привычной рожѣ, равно какъ и страдающіе ею не должны *содержать* себя ни въ излішнемъ холодѣ, ни въ излішней теплотѣ; потому что излішество того или другаго вгонитъ сыпь внутрь, что всегда надобно предупреждать во всякомъ видѣ рожки. Температура воздуха въ *комнатѣ*, или избѣ больного должна быть *умѣренной и сухой теплоты* 14°—18° гр. по Реом. 2. Когда болѣзнь легка, то достаточно больному быть только въ комнатѣ, и нѣтъ нужды ложиться въ постель: при этомъ

больное мѣсто покрыть такъ, чтобъ тутъ была умѣренная и сухая теплота; сырость вообще вредна, ни мочить, ни мазать, ни припаривать больное мѣсто ничѣмъ не должно. 3. Особенно должны *остерегаться отъ* сильныхъ движеній души или *страстей*, какъ-то: страха, гнѣва и проч., воздерживаться отъ употребленія крѣпкихъ напитковъ, отъ яствъ соленыхъ, копченыхъ, вязкихъ и очень питательныхъ. *Тѣлодвиженіе* предпринимать достаточное. 4. Воздерживаться сверхъ того отъ употребленія пищи слизистой и жирной, питья мучнистаго, не выброженнаго. *Пища* должна быть *легкая*, состоящая изъ молока, изъ плодовъ, изъ корней *свойства прохладительнаго*, напр. кашлица, цыплячій бульонъ, или варимый съ ячменемъ, прохладительными плодами и растениями, печеные яблоки, черносливъ; можно позволить уху изъ мелкой рыбы, какъ-то: сорожки, ершей, окуней, съ кореньями, разрѣшающе-уточающими и способствующими отдѣленіямъ, напр. съ петрушкою, спаржею, морковью, пущарнакомъ и т. п. Рыбу же крупную, особенно рѣчную и морскую, равно мясо взрослыхъ животныхъ — должно запрещать. 5. Способствовать *отдѣленію испарины* и всячески избѣгать случаевъ и повода къ задержанію какъ ея, такъ и другихъ отдѣленій, какъ-то мѣсячнаго очищенія и геморoidalнаго кровотечения. 6. *Питье* должно состоять либо изъ одной чистой *воды*, либо *сыворожки* и поддонковъ послѣ паханья, либо изъ *ячной* воды, либо изъ *настоя* съ бузиными цвѣтами. 7. Въ сильной рожѣ, въ совершенномъ ея развитіи и съ нервно-гнилостнымъ характеромъ, можно дозволить въ питье для подбѣрженія силъ больного тонкое *полнво* изъ яроваго хлѣба, *виноградное вино* съ водою, *сѣ сагою* и т. п.; въ пищу — питательные бульоны изъ мяса, какъ-то супъ съ телятиною и говядиною, съ ароматическими кореньями, напр., петрушкою, пущарнакомъ и пр., понемногу, но почаще.

Лѣчение существенное должно соотвѣтствовать внутреннему свойству болѣзни и ея теченію. Но какъ въ началѣ рожѣ трудно узнать внутреннее ея свойство по степени особенно, легкая ли она будетъ, или тяжелая, то всего лучше съ перваго ея появленія совѣтовать прибѣгать за пособіемъ къ врачу, особенно въ рожѣ на лицѣ, въ рожѣ, скрывшейся внезапно, и въ рожѣ, сопряженной съ другими болѣзнями, или имъ сопутствующей; за немѣніемъ же его по близости должно ограничиться слѣдующими средствами — *изъ рожѣ воспалительной: цвѣты липы, бузины, ромашки, также мята, душица, буквица, шалфей, сухая малина* и т. п. употребляемые въ горячемъ настоѣ, какъ чай, способствуя набожному отдѣленію, именно испаринѣ, въ то же время уменьшаютъ самое раздраженіе и чрезъ то помогаютъ силѣ природы привести болѣзнь въ разрѣшеніе. Употреблять этотъ чай лучше чаще, но понемногу, напр. по чайной чашкѣ или по стакану, нежели вдругъ въ большомъ количествѣ до поту; а снаружи большею частію ничего не требуется, кромѣ защищенія пораженной части отъ вліянія атмосфернаго воздуха, холода, давленія, и потому для покрытія ея съ

пользую употребляютъ сухіе: *мышъ*, какой бы-то ни было, болѣе *заячий*, *шерсть*, *бланель*, *сукно*, особенно *красное*, *паклю*, *хлопчатую бумагу*, *толстую бумагу*, старую, мягкую *ветонку*, нѣсколько разъ свернутую, особенно *смоченную въ крови чернаго зайца* (кролика) и высушенную, *траво-ароматные мышечки* *), которые по причинѣ испаряемой безпрерывно пораженною частію остротной пасоки нужно перемѣнять чаще, по крайней мѣрѣ черезъ 6 часовъ, и стараться, чтобы они не лежали мокрыми. *Мылъ*, тертый на сукнѣ, особенно *красномъ*, простой народъ обыкновенно прикладываетъ къ рожѣ, какъ вѣрное и надежное средство. *Отруби* на бѣлой тряпицѣ простымъ народомъ прикладываются къ поверхности рожѣ также не безъ пользы. Всѣ эти вышеозначенныя средства употребляются съ большою пользою въ рожѣ воспалительной, поверхностной и глубокой, но гладкой; въ рожѣ же пузырчатой, сопровождаемой воспалительно-мокротною, или воспалительно-желчною горячкою, прикладываніе однихъ теплыхъ и сухихъ вещей недостаточно; нужны, сверхъ того, средства всасывающія, которыя гораздо лучше употреблять въ видѣ присыпокъ, нежели въ видѣ мѣшечковъ. Но прежде всего необходимо *прорѣзать пузырьки* и выпустить изъ нихъ влагу, наблюдая ту осторожность, чтобы не замочить смежныхъ, пораженныхъ краснотой частей; потомъ употреблять уже присыпки или мѣшечки. *Пудра* и всякая тонкая, просѣянная сухая *мука*, *плауновый порошокъ*, *магнезія*, *спружки*, тонко наскобленные изъ мягкихъ деревъ, какъ напр. изъ липы, и даже самые опилки ихъ полезны для присыпокъ въ рожѣ пузырчатой; даже цвѣты: липовые, бузиновые и ромашковые полезны въ этой рожѣ, и стертые для присыпки, или истолченные въ мелкій порошокъ для мѣшечка (№ 68), который нужно чаще перемѣнять по причинѣ мокроты.

Если этихъ средствъ, какъ внутреннихъ, такъ и наружныхъ, недостаточно, то къ числу первыхъ можно для усиленія дѣйствія присоединить употребленіе *риверова питья* (№ 62) по $\frac{1}{2}$ рюмкѣ черезъ часъ съ настоемъ липоваго цвѣта или мяты и т. п. Также *миндереровъ спиртъ* для этого очень хорошее средство. Его употребляютъ и одинъ передъ чаемъ вышеупомянутыхъ растений отъ 5—10—15 капель съ водою или на сахарѣ, либо съ риверовымъ питьемъ (№ 62), полагая его на каждую $\frac{1}{2}$ рюмки питья отъ 5—10 капель въ настоѣ мяты, липоваго цвѣта и т. п. Къ числу послѣднихъ, т. е. наружныхъ средствъ, очень полезно присоединять: *теплыя ванны* для ногъ и голеней (№ 96), или *кувшины съ горячею водою* при узкомъ плотно заткнутомъ горлѣ, *нагрѣтые кирпичи*, либо *горчичники*, или *тѣсто съ горчицею* (№№ 88, 89 и 90); *хриновники* (№ 91), прикладываемые къ подошвамъ ногъ, дѣлають большое облегченіе въ рожѣ, поразившей лицо, какъ поверх-

*) Въ рожѣ на лицѣ травяныя подушечки полезны только при слабой рожѣ; въ жестокой же онѣ вредны; ибо усиливають приливъ крови къ головѣ; лучше покрывать лицо холстинкою съ крахмаломъ, мѣломъ и проч.

постной и глубокой, но гладкой, такъ и въ пузырьчатой. *Прим.* Ноги включительно по голени ставить въ теплую воду и держать въ оной отъ 10-ти минутъ до $\frac{1}{4}$ часа, а кувшины съ горячею водою, или пагрѣтые кирпичи держать у подошвъ до появленія испарины; оба эти средства гораздо лучше употреблять на ночь, горчичники же и хрѣковники прикладываются и держатся до произведенія ими красноты и острой щемающей, жгучей боли. Если же больной чувствуетъ боль подъ ложечкою, и притомъ языкъ у него нечистъ, — покрытъ бѣлою мокротою, а моча отдѣляется мутная, густая, то для очищенія желудка отъ кислотъ и слизи доставляютъ большую пользу и облегченіе: *уголь липы* въ порошокъ, который даютъ внутрь по $\frac{1}{3}$ золотника съ водою одинъ и съ порошкомъ *ревеня*, полагая онаго $\frac{1}{10}$ золотника для свободного испражненія черезъ два часа до дѣйствія; съ этою же цѣлю даютъ точно также, какъ и угольный липовый порошокъ, магнезію по $\frac{1}{3}$ золот. съ $\frac{1}{10}$ зол. тертаго ревеня въ водѣ черезъ каждыя 2 часа до дѣйствія. Также дается *кремортартръ* одинъ по чайной ложечкѣ и съ магнезіею (№ 63), и сверхъ того съ тертымъ и поджареннымъ ревенемъ (№ 64) съ тою же цѣлю. Если больной не имѣетъ вышеозначенныхъ признаковъ окисленія и ослизенія желудка, но видимо подверженъ запору при рожѣ, то *огуречный разсолъ съ медомъ и коноплянымъ масломъ* (№ 7), какъ самое обыкновенное простонародное средство, дается для свободного испражненія съ хорошою пользою. *Глауберова и горькая соли* по $\frac{1}{4}$ золотн. даются съ водою 2—4 раза въ день до дѣйствія; въ запорѣ при горячкѣ рожн онѣ особенно полезны. Само собою разумѣется, что ихъ должно давать каждую соль порознь, либо ту, либо другую, а не въ соединеніи. Но если замѣчено будетъ, что языкъ покрытъ желтоватою слизью, вкусъ горькій, жажда къ кислому питью, жгучая боль подъ ложечкою страдающаго рожею, особенно если при этомъ больной чувствуетъ тошноту и позывъ ко рвотѣ, то должно давать ему пить теплую воду и *гладить спину между лопатокъ* круговымъ движеніемъ ладони руки съ цѣлю произвести рвоту постороннею силою. Когда сама натура силится произвести оную, тогда достаточно бываетъ для этого и этихъ однихъ средствъ; въ противномъ же случаѣ, т. е. когда эти средства будутъ безуспѣшны, нужно давать по $\frac{1}{7}$ золотника *рвотнаго камня* въ теплой водѣ, запивая ею, черезъ каждыя $\frac{1}{4}$ часа до дѣйствія. Рвотный камень въ этомъ случаѣ нерѣдко замѣняетъ и слабительныя средства, потому что послѣ рвоты отъ него бываетъ свободное испражненіе низомъ, — рвотный же корень не употребляется при этомъ: онъ можетъ сильно повредить больному раздражающимъ-горячительнымъ его дѣйствіемъ. Напротивъ, если у одержимаго рожею не будетъ замѣчено ни вышеозначенныхъ признаковъ окисленія и ослизенія желудка, ни обремененія его и засоренія пищею или желчно-острою мокротою, ни запора на низъ, а лихорадка и воспаленіе велики, и появились признаки воспалительной горячки, то ему слѣдуетъ давать *селитру*, 3 или 4 раза въ день въ обыкно-

венномъ питьѣ по $\frac{2}{3}$ золотника за одинъ пріемъ, одну безъ всякихъ другихъ средствъ, либо съ ревенемъ, въ случаѣ, если при горячкѣ замѣчено будетъ засореніе желудка съ запоромъ на низъ, прибавляя порошка ревеняго каждый разъ къ селитрѣ по $\frac{1}{10}$ золотн. до тѣхъ поръ, пока достаточно очистится пищеварительный каналъ, послѣ чего продолжаютъ давать больному одну селитру до окончанія горячки. При этомъ *кровоопусканіе* изъ вены руки назначается съ большою осторожностію и осматрительностію. Показаніемъ на оное могутъ быть, кромѣ признаковъ воспалительной горячки въ сильной степени, крѣпкое здоровое тѣлосложеніе больного, его полнокрое, привычка открывать кровь, привычка пить крѣпкіе напитки, когда болѣзнь гнѣздится въ головѣ, возмужалый возрастъ, короткая шея, напряженіе шейныхъ и височныхъ бьющихся жилъ (артерій), рожа на лицѣ и начальное время болѣзни отъ 3—6 дней. При этихъ условіяхъ можно назначить кровоопусканіе изъ вены руки, ближайшей къ мѣсту болѣзни отъ 3 до 4 чайныхъ обыкновенныхъ чашекъ. Въ противномъ случаѣ, если больной видимо не полнокроевъ, къ кровоопусканію не привыченъ, рожу имѣетъ не на лицѣ, голова не болитъ и не тяжела, лучше обойтись безъ кровоопусканія, которое, если будетъ, предпринято по истеченіи 6, 7 и 8 дней болѣзни, то уже во всякомъ случаѣ послужитъ ко вреду больного. Оно въ такомъ случаѣ не облегчитъ, а замедлитъ и за труднитъ излѣченіе болѣзни.

Въ рождѣ гнилостной, или тифозной: 1) должно напередъ очистить пищеварительный каналъ, какъ-то: желудокъ и кишки, средствами слабительными: кремортартаромъ, ревенемъ, магнезією и огуречнымъ разсоломъ въ такомъ точно видѣ, какъ они показаны выше. Въмѣсто магнезіи съ хорошею пользою употребляютъ *нашатъръ* съ кремортартаромъ и ревенемъ (§ 65). Въ этомъ видѣ рожи рѣдко бываетъ нужно рвотное, и если понадобится по описанію признаковъ выше сего описанныхъ, то употребляютъ не рвотный камень, а *рвотный корень* — *ипекагуану* въ порошокъ по $\frac{1}{4}$ золотника съ теплою водою, запивая послѣднюю до дѣйствія. Трава мяты въ этомъ случаѣ для чая преимущественнѣе прочихъ; не менѣе того полезенъ и шалфей, который слѣдуетъ готовить также, какъ и мяту, для подобнаго употребленія. *Гобманскія капли* (§ 51), *мятные капли* (§ 66) и *валерианныя капли* (§ 36); *змиевикъ* (§§ 37, 38, 39 и 40); *камфора* (§ 52) необходимы для употребленія въ этомъ случаѣ бываютъ тогда, когда уже пищевой каналъ очищенъ, а нервное состояніе имѣетъ перевѣсъ надъ гнилостнымъ, т. е. когда будетъ замѣчено, что горячка, сопутствующая гнилостной рождѣ, болѣе гнилостно-нервная. *Дягиль* (§ 67), *коржи: ивовая* (§§ 43-й и 44-й), *дубовая* (§§ 45 и 46) и особенно *лимонная* (§§ 47, 48 и 49) нужны и полезны для употребленія въ тѣхъ случаяхъ рожи, гдѣ, напротивъ, будетъ замѣченъ перевѣсъ гнилостнаго состоянія надъ нервнымъ. *Замѣчаніе*. Если болѣзнь слишкомъ запущена и перешла въ изъязвленіе, сопровождаемое истеченіемъ полугнойной

матеріи, притомъ съ признаками особаго худосочія въ тѣлѣ, или перешла уже въ затвердѣніе, въ такомъ случаѣ должно обратиться къ врачу. При выздоровленіи, для укрѣпленія силъ отъ слабости, полезны для внутренняго употребленія въ отварахъ и настояхъ: *третель*, *миллелистникъ* (миллефоль), *полынь* и *цикорій*. Снаружи же въ рождѣ гнилостнаго свойства, выражающагося состояніемъ сильной гнилости въ пораженной части, и сопровождаемого, обыкновенно, нервно-гнилостною горячкою, съ пользою употребляются: трава мяты, *душицы*, *полыни*, *богородская* и *цвѣты баранника*, и для мѣшечка (№ 69), и для присыпки стертые, или истолченные и просѣянные въ мелкій порошокъ. Мѣшечекъ, по причинѣ мокроты, слѣдуетъ чаще перемѣнять, а присыпку повторять. Если будутъ замѣчены признаки омертвѣнія въ рождѣ, то прибавляется въ порошокъ къ вышеозначеннымъ цвѣтамъ и травамъ по золотнику на мѣшечекъ камфора въ порошокъ; также корки: *ивы*, *дуба*, *хины*, стертые или истолченные и просѣянные въ порошокъ, равно *мастика*, *мирра* въ порошокъ, — которыя употребляютъ для присыпки въ дѣйствительномъ омертвѣніи части, пораженной рожею. Если рожа, или вѣрнѣе чирей, сопровождающій рожу, перейдетъ въ нагноеніе, то рожа лѣчится одними, а нагноеніе другими средствами, какъ наприм. на рожу накладываютъ мѣшечки, а на чирей *сухая кортня*, которую должно чаще перемѣнять. Если при сильномъ расположеніи больнаго къ рождѣ замѣтно, что чирей продолжаетъ гноиться, то не нужно спѣшить скорымъ заживленіемъ язвы, а терпѣливо ожидать, пока сама природа освободитъ тѣло отъ вредной матеріи. При этомъ должно еще замѣтить, что нагнаивающуюся часть не должно обмывать никакою жидкостью: въ противномъ случаѣ рожевое воспаленіе только усилится или даже, если оно прошло, легко возобновится.

Замѣчаніе. Вообще, т. е. во всякомъ видѣ рожи, должно имѣть въ виду слѣдующія два обстоятельства: 1) Если рожа переходитъ съ мѣста на мѣсто, или часто возвращается на томъ же мѣстѣ, въ такомъ случаѣ *шпанская мушка* или *нарывной пластырь* (№ 58), прикладываемые къ самому мѣсту рожи, излѣчиваютъ и ее, и расположеніе къ ней. 2) Если рожа вдругъ скроется безъ скупленія кожи и безъ разрѣшенія ея обильнымъ потомъ или мочою, если въ слѣдъ затѣмъ появляется боль въ головѣ, въ груди, въ животѣ, горячка, бредъ, рвота, а нѣтъ врача, то должно посоветовать больному *пустить кровь*, приставить *пиявицы*, дать *рвотное* изъ *рвотнаго камня*, а потомъ то мѣсто, откуда скрылась рожа, сильно растирать фланелью, суконкою, спиртомъ, раздражать горчишникомъ (№№ 88, 89 и 90), мушкою и т. п.

У новорожденныхъ красная (рдѣющая) рожа бываетъ въ первые дни ихъ жизни; но послѣ шести недѣль отъ рожденія она случается рѣдко.

Признаки ея состоятъ въ слѣдующемъ: 1) рожевидная краснота чаще всего показывается сначала вокругъ пупка въ видѣ темнокраснаго, лоснящагося, ни мало не возвышеннаго пятна, которое распростра-

няется далѣе по животу, нерѣдко достигаетъ груди, затылка и лица, и болѣею частію занимаетъ руки и ноги. 2) Если это красное мѣсто подавить пальцемъ, то краснота исчезаетъ, но вскорѣ опять возвращается. 3) Бываютъ горячечные припадки, кожа дѣлается сухою, горячею, губы трескаются. 4) Есть признаки разстройства пищеваренія: испражненія низомъ зеленоватыя, зловонныя, нерѣдко бываетъ молочница во рту. 5) Иногда мѣста не покрытыя рожею представляются особенно желтыми. 6) Въ опасныхъ случаяхъ появляются судороги. Изъ всего этого видно, что рожа новорожденныхъ есть поверхностная, — гладкая.

Причины ея бываютъ: 1) Со стороны дитяти: а) накопленія въ кишкахъ нечистотъ; б) сырое, теплое неопрятное жилище; в) испорченный воздухъ; г) нечистота и неопрятность тѣла дитяти, заворачиваніе его въ сырыя пеленки и т. п. 2) Со стороны родителей: получаютъ эту болѣзнь: а) дѣти, рождающіяся отъ родителей бѣдныхъ, преданныхъ пьянству, или отъ матери хилой, больной, одержимой худосочиємъ сифилитическимъ, чесоточнымъ; б) дѣти, кормленныя кормилицею нездоровою, употребляющею пищу вредную, тяжелую, питье горячительное, или если она подвергнется испугу, огорченію.

Предсказаніе. Красная рожа у новорожденныхъ дѣтей опасна и трудноизлѣчима и становится еще опаснѣе: 1) отъ невозможности устранить причины, производящія болѣзнь; 2) отъ крайняго истощенія и изнуренія тѣла дитяти; 3) отъ присоединенія къ ней судорожныхъ припадковъ, поноса, сильной молочницы, помертвѣнія. У дѣтей поселянъ, какъ въ низшемъ и бѣдномъ классѣ людей, эта болѣзнь почти неизлѣчима по такимъ обстоятельствамъ, которыя совершенно не благоприятны для здоровья дитяти и часто неотвратимы и непреодолимы, не менѣе она неизлѣчима и потому, если дитя, заболѣвшее рожею, принадлежитъ родителямъ достаточнымъ, но болѣзнь происходитъ у него отъ такихъ причинъ, которыя въ основаніи уже разстроили здоровье дитяти и которыя часто дѣйствовали на него въ утробѣ матери.

Лѣченіе діететическое. При этомъ лѣченіи должно только руководствоваться правилами о попеченіи и хожденіи за новорожденными дѣтьми, особо изложенными.

Лѣченіе существенное. Для оказанія врачебнаго пособія должно совѣтовать обращаться ко врачу, а за немѣніемъ его должно ограничиться соблюденіемъ правилъ, относящихся къ діететическому лѣченію.

У дѣтей взрослыхъ красная рожа бываетъ сверхъ того иногда и пузырчатого вида, съ маленькими пузырями на томъ мѣстѣ, гдѣ краснота, наполненными свѣтлою влагою; пузыри потомъ лопаются, и влага превращается въ струпу. [На 5 или 9 день болѣзнь эта у нихъ оканчивается тѣмъ, что краснота блѣднѣетъ, переходитъ въ желтоватый цвѣтъ, и кожа отдѣляется въ видѣ шелухи.

Причины. 1) Нечистоты, особенны желчныя въ кишкахъ; 2) простуда; 3) натиранія тѣла крѣпкими мазями, прикладыванія шпан-

ских мушек, ужаления пчелъ, ушибы; 4) употреблеііе пищи трудно-варимой, жирной, мучнистой, раковъ, рыбы; 5) гнѣвъ, испугъ.

Лѣченіе, какъ діететическое, такъ и существенное, наружное и внутреннее, одинаковы, какъ и въ рожѣ у взрослыхъ, съ примѣненіемъ только къ возрасту, по которому приемы внутреннихъ лѣкарствъ должны быть $\frac{1}{2}$ менѣе въ сравненіи съ приемами для взрослыхъ. Изъ наружныхъ средствъ мѣлъ на синей бумагѣ прикладывать не годится, потому что бумага жестка, а мѣлъ раздражаетъ кожу. Не нужно также употреблять и подушечку, или мѣшечекъ съ ромашкою и комфорой, потому что и она причиняетъ жаръ и раздражаетъ. Хуже всего присыпаніе бѣлилами. Если рожистая краснота у дѣтей произойдетъ отъ ушибовъ, отъ шпанской мушки, отъ ужаления пчелы, то здѣсь можно примачивать большую часть *холодною водою*, смѣшанною пополамъ *съ уксуомъ* или *свинцовою водою*, которая выписывается изъ аптеки, или же положить на рожу спускъ или подушечку съ ромашкой и комфорой. Если сдѣлается послѣ рожѣ нарывъ, то поступать, какъ сказано о чирьяхъ.

Рожѣ бѣлая.

Опредѣленіе. Бѣлая рожа есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе кожи съ подлежащими ей мягкими частями, обнаруживающееся явственною, иногда большою твердостію, опухолью и чувствованіемъ значительнаго болѣзненнаго раздраженія, только безъ всякой красноты въ пораженной части, но еще явственнѣе увеличенную блѣдность и нѣкоторою даже бѣлизною и прозрачностію страждущей части.

Признаки. Вдругъ появляется бѣлая опухоль; постепенно, но быстро увеличиваясь до степени высшаго ея развитія, она начинаетъ уменьшаться, и въ теченіе одной, не болѣе двухъ недѣль, совсѣмъ исчезаетъ, или прежде ощущается мѣстное раздраженіе, происходящее отъ извѣстной причины, къ которому уже вдругъ присоединяется и бѣлая опухоль въ пораженномъ мѣстѣ. Не большая опухоль чрезъ сутки исчезаетъ легко сама собою, не сопровождаясь никакимъ разстройствомъ организма; но въ большой опухолѣ принимаетъ участіе все тѣло, появляются признаки лихорадочныхъ движеній, выражающихся сначала бѣглымъ ознобомъ и летучимъ жаромъ при тоскѣ, головокруженіи, наклонности къ обморокамъ и бреду, при подергиваніи сухихъ жилъ и, если не будетъ подана больному надлежащая помощь, лихорадочныя движенія принимаютъ полный характеръ нервной горячки, переходящей въ послѣдствіи въ горячку нервно-гнилостную: тѣло покрывается синими пятнами, языкъ черною мокротою; испраженія гнилостнаго свойства, самыя части, пораженные бѣлою рожею, переходятъ въ состояніе растворительнаго нагноенія, сопровождаемаго омертвѣніемъ; изъ пораженной части истекаетъ полугнойная, полусывороточная влага. Если въ это время не будетъ подано врачебное пособіе, или если и оно

останется безуспѣшнымъ, то вся пораженная часть, не исключая даже и самыхъ мышцъ, переходитъ въ дѣйствительное омертвѣніе, и больные, спустя двѣ недѣли и не болѣе 20 дней, умираютъ отъ изнуренія, съ полными признаками гнилой горячки. Эти признаки бѣлой рожи составляютъ обыкновеннѣйшую ея форму, которая бываетъ разнообразна. смотря по различію слѣдующихъ видовъ ея.

Раздѣленіе. Рожа бѣлая *простая лютная* является вдругъ безъ причины, большею частію, во время сна, безъ всякихъ болѣзненныхъ ощущеній. Признакъ ея есть твердая опухоль, въ центрѣ красноватая, по краямъ бѣлая, иногда прозрачная. Она продолжается сутки, и не болѣе двухъ, особенно когда будутъ взяты надлежащія мѣры.

Рожа бѣлая *ядовитая*, происходящая отъ укушенія ядовитыми животными, которая можетъ быть легкою и тяжелою.

Рожа бѣлая *венерическая*, происходящая въ слѣдствіе сообщенія венерическаго яда; она бываетъ у мужчинъ на крайней плоти, а у женщинъ на большихъ дѣтородныхъ губахъ, и отъ другихъ видовъ отличается тѣмъ, что 1) развивается быстро безъ болѣзненнаго ощущенія; 2) не сопровождается лихорадочными припадками и имѣетъ продолжительное теченіе; 3) чаще переходитъ въ затвердѣніе, а въ раствореніе переходитъ не иначе, какъ отъ неправильнаго лѣченія. Венерическая бѣлая рожа извѣстна подъ названіемъ *нахлучки*, или *незалупы* и *удавки*, или *неотлупы*.

Причины внутреннія (предрасполагающія) во всѣхъ видахъ этой рожи незамѣтны, такъ что ихъ, повидимому, нѣтъ.

Причины внѣшнія (производящія) — укушеніе насѣкомыми: комаромъ, мухою, полагаютъ за причину бѣлой лютней рожи. Причиною же бѣлой ядовой рожи бываетъ укушеніе ядовитыми животными, къ коимъ принадлежатъ: оса, пчела, шмель, паукъ, козулька, змѣя обыкновенная, мѣдянка, гремучая, тарантулъ и скорпионъ жаркихъ странъ. Сюда также принадлежатъ отдѣлительные соки нѣкоторыхъ растений, в. т. крапивы, молочая, равно какъ и сокъ растенія, извѣстнаго подъ именемъ *црас*, которыми, какъ полагаютъ, дикіе народы намазываютъ свои стрѣлы; яды незначительныхъ насѣкомыхъ, каковы: оса, пчела и др. считаются легчайшими и дѣйствующими различно, на однихъ не такъ сильно, а на другихъ сильнѣе. Есть переносящіе укушеніе 20 пчелъ и болѣе безъ всякаго обнаруженія опухоли. Былъ такой случай: змѣя укусила двухъ человѣкъ въ ногу, одинъ изъ нихъ остался невредимъ, между тѣмъ какъ другой сильно пострадалъ. Сильнѣйшіе же яды дѣйствуютъ на всѣхъ почти равно. Причина венерической бѣлой рожи — *нахлучки* и *удавки* есть венерическій ядъ чрезъ сообщеніе, какъ и сказано уже выше.

Сущность бѣлой рожи видна изъ опредѣленія. Присовокупить слѣдуетъ только то, что всѣ пораженные части въ этой болѣзни получаютъ стремленіе образовать и развивать болѣе ступающую пасоку, такъ что красильное вещество крови почти совершенно исчезаетъ.

Распознаваніе бѣлой рожи весьма легко, какъ по признакамъ, такъ и по причинамъ, её производящимъ.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ: 1) отъ свойства производящей причины, а въ рождѣ лѣтней отъ степени самой болѣзни. При укушеніи очковою и гремучею змѣею или скорпіономъ жарчайшихъ странъ предсказаніе дурное и почти безнадежное, а еще безнадежнѣе оно бываетъ при пораненіи стрѣлами, намазанными ядомъ растенія урасъ; 2) Отъ количества сообщеннаго яда; были примѣры, что и отъ укушенія пчелъ умирали; 3) отъ времени продолженія бѣлой рожи, такъ что чѣмъ она новѣе, тѣмъ и предсказаніе надежнѣе: есть еще возможность дать больному пособіе. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе зависитъ отъ степени ея. Рожа бѣлая лѣтняя легкая окончивается иногда въ 15 или 20 часовъ; напротивъ, рожа, происшедшая отъ укушенія болѣе ядовитыхъ животныхъ, продолжается до 3 недѣль и болѣе; рожа, происшедшая отъ укушенія ядовитѣйшими животными, оканчивается смертію, иногда въ теченіе одного дня, а при лучшихъ обстоятельствахъ можетъ продолжаться и до 7 дней. Рожа бѣлая венерическая для жизни не опасна, но продолжительна, такъ что можетъ оставаться на всю жизнь; но въ послѣднемъ случаѣ она переходитъ уже въ продолжительное (хроническое) затвердѣніе.

Исходы бѣлой рожи: 1) *разрѣшеніе*, 2) *растворительное нагноеніе и омертвѣніе*, 3) *затвердѣніе*.

Въ разрѣшеніе переходитъ рожа лѣтняя, равно какъ и происшедшая отъ ядовитыхъ животныхъ, легкая, но не тяжелая; также и рожа венерическая. Въ затвердѣніе переходитъ одна только рожа венерическая. Въ растворительное нагноеніе и послѣдующее потомъ омертвѣніе и самую смерть переходитъ рожа тяжелая, происшедшая отъ сильныхъ животныхъ ядовъ.

Лѣченіе діететическое преимущественно требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ лѣтнее время поселяне не должны *спать на землѣ безъ подстилки и покрыванія, какъ всего тѣла*, такъ особенно членовъ его, находящихся, большею частію, открытыми, в. т. головы, рукъ и ногъ. 2) Въ предостереженіе себя отъ ужаленія ядовитыми насѣкомыми поселяне на открытомъ воздухѣ въ лѣтнее жаркое время, когда появляются эти насѣкомыя въ большомъ количествѣ, *должны быть одѣты и обуты съ покрытою головою*. Лицо и руки умывать дегтярною водою (№ 70), либо слегка вымазать руки чистымъ дегтемъ, а на головѣ и лицѣ *носить стѣлку, пропитанную чистымъ дегтемъ*, какъ противнымъ средствомъ для всѣхъ этого рода насѣкомыхъ. 3) Въ предотвращеніе укушенія ядовитыми змѣями, гдѣ ихъ бываетъ много, поселяне, предъ выходомъ въ лѣсъ, или въ тѣ мѣста, гдѣ замѣчено жительство змѣй, должны напередъ *руки, ноги* и даже въ случаѣ и *лицо натирать зорею*, какъ предохранительнымъ оттого средствомъ. 4) Въ случаѣ появленія болѣзни бѣлой рожи, вообще не должно

употреблять ничего горячительнаго ни въ пищу, ни въ питье. *Пить* ключевую воду, *сыворожку*, *отваръ ячменя съ клюквольнымъ*, или *брусничнымъ сокомъ*, а *пить камису* или *похлебку изъ крупъ*, варенныя *овощи*, *уху* изъ *мелкой рыбы*, к. т. окуня, ерша, сарожки, молочную лапшу, творогъ, варенецъ, кислое молоко, простоквашу. Мясное же все, какъ очень питательное, увеличивающее мѣстный приливъ соковъ и чрезъ то усилывающее болѣзнь, будетъ вредно. 5) Въ сообщеніяхъ съ людьми сомнительнаго здоровья во время полового *совокупленія* должно напередъ *двѣтородныя части вымазать* какимъ нибудь *масломъ*, всего лучше *деревяннымъ*, а послѣ сообщенія вскорѣ *вымыть* *целокомъ*, или *виномъ*, или *мочою*, либо *водою съ мыломъ*. 6) Больной не долженъ чесаться, какъ бы ни свербѣло пораженное этою рожею мѣсто: болѣзнь отъ этого ожесточается.

Лѣчение существенное бѣлой рожи должно быть соотвѣтственно:

- 1) разностямъ сказанныхъ видовъ оной; 2) силѣ или крѣпости ядовъ и
- 3) степени самой болѣзни.

Въ бѣлой рожѣ лѣтней и въ легкихъ случаяхъ ея, происшедшей отъ ядовитыхъ животныхъ, съ пользою употребляютъ слѣдующія простыя и менѣе сложныя средства: *медъ*, которымъ намазываютъ больное мѣсто; *петрушку*, которую прикладываютъ къ больному мѣсту; *уксусъ*, которымъ, смочивъ ветошку, нѣсколько разъ сложенную, накладываютъ на больное мѣсто. Отъ ужаленія комарами это лучшее средство. *Масло деревянное* теплое есть одно изъ лучшихъ средствъ въ этомъ случаѣ, имъ натираютъ пораженную часть. Также натираютъ больное мѣсто *деревяннымъ масломъ съ камфорою*, или *камфорнымъ масломъ* (§ 71). Лучше, если натирание будетъ производимо при постоянной степени жара отъ 20° 30° по Реом.

Но если рожа будетъ тяжелая и уже производить лихорадочныя движенія, хотя бы и не предполагалось большой силы или крѣпости въ ядѣ отъ укушенія незначительныхъ животныхъ, въ такомъ случаѣ, кромѣ втиранія масла, нужны еще средства потогонныя, какъ то: *цвѣтъ липовый*, *ромашковый*, *бузиновый*, *сухая малина* и т. п. для внутренняго употребленія, подобно чаю, чтобы произвести испарину. *Кремортартръ*, или винный камень, даютъ по чайной ложечкѣ на стаканъ отварной воды для питья во время жажды. *Селитра* дается по $\frac{1}{4}$ золотника въ рюмкѣ отварной воды 2—4 раза въ день, когда развивается въ тѣлѣ больного жаръ и волненіе въ крови.

Если же ядъ сильно дѣйствующій, укушеніе произведено значительными ядовитыми животными, и рожа отъ него сильна и сопровождается нервными припадками, въ такомъ случаѣ *) тотчасъ производится

*) Противъ укушенія змѣями употребляютъ *листья ясеневаго дерева* которыя ослабляютъ ядъ. Это извѣстно было древнимъ; а Діаскоридъ, Шроеръ, Борегаръ, Монтень Амстинъ несомнѣнное дѣйствіе этого средства подтверждаютъ своими наблюденіями. Выжатый сокъ изъ ясеневыхъ листьевъ отъ 3—4 унцій (стаканъ) выпиваютъ

высасываніе яда ртомъ, не опасаясь губительнаго его дѣйствія, особливо если пѣтъ во рту никакихъ язвъ, и притомъ если тотчасъ послѣ операціи вымываютъ ротъ масломъ, или растворомъ мыла, или щелокомъ. Для этого пораженную часть должно велѣть напередъ разрѣзать. Если этого почему либо нельзя будетъ сдѣлать, напр. если ядовитое укушеніе приключилось въ полѣ или въ лѣсу, гдѣ никого нѣтъ, то должно какъ можно скорѣе бѣжать къ водѣ, и, погрузивъ укушенный членъ въ воду, сдѣлать тщательное обмываніе укушеннаго мѣста. (Народное повѣрье, что будто бы польза отъ этого основана на томъ, кто скорѣе успѣетъ добѣжать до воды, — укушенное ядовитое животное, или укушенный человекъ: въ первомъ случаѣ жить а въ послѣднемъ умереть, — есть одно суевѣріе и предразсудокъ). *Рожки* или насосныя банки, конечно, безопаснѣе употреблять вмѣсто высасыванія; если онѣ будутъ подъ руками. Въ томъ и другомъ случаѣ рана намазывается послѣ операціи деревяннымъ масломъ, нѣсколько подогрѣтымъ. Очень полезно въ этомъ случаѣ *прижиганіе*. Если змѣєю укушена нога или рука, какъ обыкновенно случается, то, крѣпко перевязавъ членъ выше или около укушеннаго мѣста, взять кусокъ трута, либо губки и, положивъ на рану, сжечь. Полезно также прижигать укушенное мѣсто порохомъ, крѣпкою водкою и ѣдкимъ поташемъ. *Наматирный известковый спиртъ*, гдѣ можно его имѣть, одинъ, съ водою, употребляется какъ единственное средство для примачиванія пораженной части до высасыванія яда и рожковъ и послѣ оныхъ, полагая его по 15-ти капель на рюмку чистой воды. Это средство точно также и для той же цѣли смѣшиваютъ съ деревяннымъ масломъ при подобномъ наружномъ употребленіи; но его съ отличною пользою даютъ и для внутренняго употребленія, какъ въ водѣ, такъ и съ деревяннымъ масломъ, полагая на рюмку воды или масла по 5-ти капель 1—2 раза въ день. Укусъ и для внутренняго употребленія также считается въ бѣлой рожѣ, происшедшей отъ ядовитаго укушенія всякаго рода, однимъ изъ лучшихъ средствъ и употребляется либо одинъ, либо съ водою, либо съ ячнымъ отваромъ вмѣсто питья, смотря по его крѣпости. *Миндереровъ спиртъ* 5—10—15 капель съ водою дается внутрь чрезъ чай или два для возбужденія испарины. *Спиртъ оленьяго рога* даютъ по 10 до 20 капель на приемъ съ водою, точно также и для той же цѣли. *Доверовъ порошокъ* съ водою употребляется внутрь и для возбужденія испарины, и для успокоенія нервовъ при обнаруженіи судорожныхъ движеній — по $\frac{1}{2}$ золотника 2—4 раза въ день. При этомъ *цвѣты ромашки, верхи душицы и донники и богородская трава*, какъ порознь, такъ и въ соединеніи, что гораздо лучше, употребляются испрошенные снаружн

въ теченіе двухъ дней одинъ, или съ виномъ, а на укушенное мѣсто кладутъ припарку изъ этихъ листьевъ. Смѣшанный въ такомъ случаѣ сокъ съ виномъ пьютъ чрезъ каждыя $\frac{1}{2}$ часа по рюмкѣ. Плиній увѣряетъ, что тѣнь ясеня наводитъ страхъ на змѣй (Др. Здр. 1834 г. стр. 196).

для припарки пораженного мѣста. Если рожка эта будетъ изъ самыхъ сильнѣйшихъ, происшедшая отъ укушенія змѣями: обыкновенною, или мѣдною, или гремучею, и если горячка приметъ перво-гнилостный характеръ, а между тѣмъ и самая пораженная часть перейдетъ уже въ раствореніе, въ такомъ случаѣ даются слѣдующія возбуждающія и слегка вяжущія внутрь средства: *Кирказонъ* (круглый ихинovníкъ) и *Сенегъ*, корки корки, равно какъ и корень *Змѣевника* (№№ 37, 38, 39 и 40) употребляются въ отварахъ собственно въ бѣлыхъ рожкахъ, происшедшихъ отъ укушенія гремучимъ змѣемъ до тѣхъ поръ, пока пройдетъ рвота, но даются по высосаніи напередъ яда изъ укушеннаго мѣста, къ которому на рану кладутъ и разжеванный корень сенегъ. Что касается до корня змѣевника, то онъ употребляется съ одинаковою пользою во всѣхъ укушеніяхъ змѣями ядовитѣйшими, сопровождаемыхъ перво-гнилостною горячкою. Снаружи корки *ивы*, *дуба* и *лины* въ отварахъ (№№ 43, 45 и 47) употребляются для припарки, само собою разумѣется тогда, когда уже ядъ изъ укушеннаго мѣста нельзя исторгнуть ни высасываніемъ, ни рожками, ни прижиганіемъ. Изъ новѣйшихъ испытанныхъ средствъ противъ укушенія ядовитыми змѣями Кеннеди совѣтуетъ *новарснну соль* тотчасъ по укушеніи, распространивъ ранку ножикомъ и разжевавъ нѣсколько соли, положить еѣ на ранку. Камперъ и Гинце почитаютъ *прованское* (лучшее деревянное) *масло* внутрь и снаружи специфическимъ средствомъ. Прина пишетъ, что для отвращенія послѣдствій отъ укушенія, лучше всего укушенную часть обливать *холодною водою*. Моришо-Боманъ совѣтуетъ ставить на укушенное мѣсто *пѣявицу*, а Пюрри и Кларке вросососную банку (*рожокъ*). Въ журналѣ Гүфеланда предложено: подъ укушеннымъ мѣстомъ крѣпко *прсвязать членъ* широкимъ *бинтомъ*, и вблизи ранки втереть деревянное масло, потомъ положить на нее теплую припарку, приготовленную изъ бѣлаго хлѣба и молока; внутрь больному дать прохладительное потогонное лѣкарство-чай (№ 85) съ травой мяты и шафраннопѣйною настойкою (*лавданъ*) 25 капель на пріемъ. Многіе почитаютъ специфическимъ средствомъ *нашатырный спиртъ* снаружи и внутрь по нѣскольку капель, какъ выше сказано. — Костеръ совѣтуетъ распространить ранку и обмыть ее растворомъ *хлористой соды*, или *хлориновой извести*; Робино-Девуади *прижечь* ранку *адскимъ камнемъ*; Ираландъ втирать *мазь* изъ скипидарнаго масла, нашатырнаго спирта и деревяннаго масла *). Въ Орловской губернии простолоудины лѣчатъ бѣлую рожу отъ ужаленія змѣи прикладываніемъ *живыхъ лягушекъ* къ ранѣ и держать на ней до тѣхъ поръ, пока она жива, а какъ умретъ, тотчасъ прикладываютъ вмѣсто нея другую живую, эта умретъ — прикладываютъ третью и т. д. до тѣхъ поръ, пока уже болѣе лягушки отъ раны не умираютъ, это значить, что болѣзнь уже не опасна и излѣчена отъ вредной ядовитости укушенія. Былъ слу-

*) Другъ Здр. 1837 г. 164 стран.

чай, что въ продолженіе 2-хъ часовъ прикладыванія живыхъ лягушекъ къ ранѣ отъ укушенія змѣю 10-ть лягушекъ умерли, а потомъ всѣ оставались живыми, сколько имъ прикладывали, и больная (крестьянская дѣвка) на другой день была совсѣмъ здорова *). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Московской губерніи бѣлую рожу отъ ужаленія змѣями лѣчатъ *эмпиревматическимъ табачнымъ масломъ*. Ужаленное мѣсто на рукѣ или ногѣ тотчасъ перевязываютъ сверху и снизу, а на самое мѣсто прикладываютъ ветошку, густо намоченную влагою, которая остается всегда въ чубукахъ курительныхъ трубокъ, и называемую эмпиревматическимъ табачнымъ масломъ. Эту ветошную накладку напityваютъ масломъ чаще, потому что она скоро высохнетъ, и продолжаютъ это нѣсколько часовъ, а иногда и сутки, когда помощь подана не тотчасъ по ужаленіи. Въ продолженіе этого времени даютъ больному три или четыре раза по столовой ложкѣ прованскаго, или обыкновеннаго деревяннаго масла, но только чистаго, а все тѣло кругомъ ужаленнаго мѣста чаще натираютъ этимъ масломъ. — Замѣчено, что средство это, во время употребленнаго, оказываетъ цѣлебное дѣйствіе **). Въ южныхъ провинціяхъ Россіи встрѣчается чрезвычайно много тарантуловъ. Въ Валахіи, Булгаріи и въ Одессѣ сдѣлалъ надъ ними наблюденіе д-ръ Вицманъ. Укушеніе ихъ почитается ядовитымъ и причиняетъ, при бѣлой рожѣ, сумасшествіе, опасное воспаленіе, даже самую смерть, преимущественно же, случается, что укушенные ими люди принуждены безпрестанно плясать, и излѣчиваются отъ того *музыкою*. Тарантулъ очень осторожно залѣзаетъ къ спящему на полу человѣку и сосетъ его кровь, оставляя едва примѣтную рану. Проснувшись, укушенный чувствуетъ въ ней боль, постепенно усиливающуюся; мѣсто это воспаляется, бѣлая рожа въ нѣсколько часовъ объемлетъ значительное пространство, такъ что въ короткое время распухаетъ весь членъ. Если лѣченіе предпринято тотчасъ по укушеніи, то опасность бываетъ не велика, только бы ядъ не былъ давно уже всосанъ. Средствомъ къ насыщенію и уничтоженію яда служитъ *нашатырный спиртъ*, за недостаткомъ его *растворъ поваренной соли и уксусъ* въ видѣ промыванія до 3-хъ разъ въ день и накладыванія потомъ мокрыхъ ветошекъ. Нашатырный спиртъ даютъ и внутрь съ водою по 2—4 капли. Если укушенный тотчасъ вымоетъ рану нашатырнымъ спиртомъ, то онъ предохраненъ отъ послѣдствій. При недостаткѣ его и другихъ средствъ, безъ сомнѣнія съ большою пользою можно употреблять мочу *урины* ***). Въ обоихъ видахъ бѣлой рожи венерической, т. е. въ видѣ нахлучки, или незалупы и въ видѣ удавки, или неотлупы, лѣченіе должно быть одинаково, потому что сущность ихъ одна и таже. *Втираніе* нагрѣтымъ *деревяннымъ масломъ* составляетъ хорошее средство въ началѣ болѣзни. Также теплое, нагрѣтое и *парное молоко*

*) Сообщилъ Баронъ Пекуль Др. Здр. 1840 г. стр. 287.

**) Др. Здр. 1841 г. № 12. стр. 164.

***) Военно-медицинскій журналъ 1824 г. часть IV. № 1. стр. 111.

въ видѣ ванны, либо *припарокъ*, хорошо помогаетъ; *мякишъ благо-хлѣба*, *варенный въ молокѣ*, употребляемый припаркою, оказываетъ большую пользу, *припарка* изъ *кореньевъ конскаго щавеля*, сваренныхъ въ *молодомъ квасѣ*, съ пользою употребляется простымъ народомъ. Гол-ятся и другіе виды щавеля. Можно также употреблять для этого *побѣ-ги: калиновые, черемуховые* и др.

Околоушница.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Околоушница есть смѣшанное (бровяное и пасочное) воспаление околоушной желѣзы, а иногда вмѣстѣ съ нею и подчелюстной, обнаруживающееся опухолью, твердостью, труднымъ жеваніемъ, а иногда глотаніемъ и дыханіемъ и несвободнымъ развѣваніемъ рта, сопровож-дается, большею частію, значительно слѣпью воспалительной го-рячкою.

Раздѣленіе. По различному способу ея проявленія она имѣетъ разные виды, а именно: 1) околоушница *тѣльная*, воспаление въ существѣ и клѣтчаткѣ желѣзы; 2) околоушница *нервная*, воспаление которой уже не въ существѣ и клѣтчаткѣ желѣзы, но въ нервахъ, идущихъ отъ нерва личнаго. Околоушница тѣльная подраздѣляется на: а) *первообразную*, которая происходитъ непосредственно отъ вліянія внѣшнихъ причинъ; б) *отложительную*, которая происходитъ въ слѣдствіе предшествовавшей горячки, почему и можно назвать ее еще *критическою*, и в) *переносною*, при которой воспаление переносится съ дру-гаго мѣста на околоушную кожицу.

П р и з н а к и, коими выказывается форма тѣльной околоушницы *первообразной*, суть слѣдующіе: общее ощущеніе нерасположенности и изнеможенія, чувствованіе боли въ сторонѣ предъжильной желѣзы съ замѣтною опухолью. Потомъ признаки лихорадочные, опухоль и твердость увеличиваются, боль становится чувствительнѣе при движеніи челюсти. Воспаленіе развивается болѣе и болѣе, глотаніе и дыханіе дѣлаются трудными, лицо раздувается, краснѣетъ, а у нѣкоторыхъ сплѣтеть, начинаеть сильнѣе болѣть голова, особенно если воспаленіе находится на обѣихъ сторонахъ. По прошествіи 2—3 дней, съ уменьшеніемъ лихора-дочныхъ припадковъ, появляются отдѣленія, особенно нагноное, умень-шаются мѣстные признаки болѣзни и въ теченіе 5—7—12 дней совер-шенно исчезаютъ. Другія *тѣльныя* околоушницы въ формѣ своей *от-личаются отъ первообразной* тѣмъ, что никогда не достигаютъ ска-занныхъ высшихъ степеней развитія, такъ что при значительной твер-дости и опухоли не бываетъ даже и предвозвѣстниковъ лихорадочныхъ; теченіе ихъ медленнѣе и тише, и окончаніе чаще бываетъ нагноитель-ное. По этому тѣльная околоушница первообразная болѣе характера кро-вянаго, а другія болѣе пасочнаго.

П р и з н а к и нервной околоушницы выражаютъ ее въ слѣдующей формѣ: упадокъ силъ, слабость, тоскливость, тяжесть, головная боль,

необыкновенная блѣдность лица, аппетитъ и жажда иногда совсѣмъ пропадаютъ, потомъ болѣе или менѣе замѣтная боль въ сторонѣ желѣзы, иногда небольшая твердая опухоль, не болѣе куриного яйца; околооушниця части здоровы: нѣтъ ни красоты, ни напряженности; наконецъ вдругъ настаетъ чисто перво-горячечное состояніе, общая слабость; въ ночи болѣзнь усиливается и боль дѣлается мучительною. Въ утру становится легче, день проводится довольно сносно, но къ ночи опять слѣдуетъ ожесточеніе, и болѣзнь продолжается такимъ образомъ до 3 или 5 сутокъ, причемъ появляется или носовое кровотеченіе нѣсколько разъ, или, если больной употреблялъ неосторожно пищу — рвота; послѣ того припадки утихаютъ, опухоль исчезаетъ, и болѣзнь оканчивается.

Причины. Внутреннихъ предрасполагающихъ причинъ къ этой болѣзни, повидимому, особыхъ нѣтъ. Внѣшнія же (производящія) причины различны, смотря по разности видовъ околоушницы. Причины околоушницы тѣльной первообразной: непосредственное дѣйствіе холода на предъушныя желѣзы, механическія вліянія (очень рѣдко) и неправильное употребленіе средствъ слюногонныхъ, которыя поражаютъ иногда эту желѣзу. Переносная околоушница происходитъ отъ прекращеннаго воспалительнаго процесса въ яичкахъ, и, что очень рѣдко, отъ насильственнаго прекращенія бѣлей у женщинъ. Отложительная околоушница происходитъ въ слѣдствіе предшествовавшей горячки, особенно, когда во время лѣченія были недостаточны испраженія низомъ. Причины околоушницы нервной состоятъ въ особенномъ качествѣ воздушнаго повѣтрія, образующемся при юго-восточномъ вѣтрѣ, при погодѣ значительно теплой и сырой, не смотря на самое лучшее время лѣта. Это состояніе воздушнаго повѣтрія происходитъ отъ большаго количества въ немъ селитророда и углерода, приносимыхъ юго-восточнымъ вѣтромъ, и потому нервная околоушница свирѣпствуетъ эпидемически. Такая эпидемія была въ Москвѣ въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ 1816 года.

Разпознаваніе легко. Околоушница тѣльная обнаруживается ясно формою ея признаковъ. Околоушница нервная также легко распознается, если будетъ сопутствуема сколько нибудь замѣтною опухолью и твердостью; но если бы опухоли не было, то распознаваніе становится затруднительнымъ, и скорѣе можно принять околоушницу за нервный ревматизмъ. Впрочемъ ошибка не важна; лѣченіе обѣихъ болѣзней одинаково.

Предсказаніе относительно опасности для жизни хорошо, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда воспаленіе распространится на соедѣнія части, особенно на мозгъ. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе различно, смотря по разности ея видовъ. Первоначальная тѣльная околоушница, если развивается только до предвозвѣстниковъ лихорадки, оканчивается въ 5—7 и даже въ 3 день. Если же разовьется до втораго періода лихорадочныхъ болѣзней, то легко продолжается до 12—21 дня и нерѣдко переходитъ въ отвердѣніе; равнымъ образомъ при такихъ сильныхъ развитіяхъ, особенно у людей мо-

кротныхъ, перѣдко переходить въ скрытое нагноеніе, которое начинается между мышечными пластами и не обнаруживается признаками своими, а узнается только по тому, что ни разрѣшающій, ни отвлекающій способы, не помогаютъ, и болѣзнь въ такомъ видѣ можетъ продолжаться очень долго. Иногда гной устремляется на слуховой проходъ, особенно когда не будетъ въ свое время вскрыта нагноившаяся часть. Отложительная и переносная околоушница бывають очень скоротечны, и особенно первая; онѣ легко и разрѣшаются, и нагнаиваются. Переносная можетъ кончиться въ сутки, даже въ нѣсколько часовъ; стоитъ только возстановить воспаленіе яичекъ или бѣли. Предсказаніе въ нервной околоушницѣ относительно продолжительности всегда хорошо; продолжается, много 9, ато 5—3 дня, хотя страданія и велики.

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) поселяне въ трудахъ своихъ на открытомъ воздухѣ *околоушныя мѣста* и *защипки* должны *защищать* и сохранять отъ непосредственнаго вліянія на нихъ *холода*, особенно въ упоры вѣтровъ, преимущественно юго-восточнаго, хотя бы-то было-ль томъ въ жаркое время и при ношеніи увѣсистыхъ тяжестей на плечахъ и рукахъ. 2) *При боли въ яичкахъ* не должны *рѣшаться на дальній путь* въ зимнее морозное время, особенно безъ теплыхъ, толстыхъ суконныхъ штановъ; иначе боль изъ яичекъ, по причинѣ сжимаемости ихъ отъ сильнаго холода, перенесется въ околушныя желѣзы, произойдетъ околушница, и болѣзнь эта можетъ угрожать опасностію жизни въ дорогѣ. Женщины же, имѣющія у себя бѣли, не должны прибѣгать для превращенія ихъ къ насильственнымъ средствамъ, напр. пзлпшне вяжущимъ, к. т. квасцамъ, надожнику, пли бодягѣ, отварамъ короевъ: ивы, вяза, дуба, ольхи и т. п. 3) *Трупы умершихъ животныхъ* *немедленно* должно *убирать* и зарывать глубже въ землю, особенно *современа надежды* на нихъ отъ заразительныхъ болѣзней, какъ напр. отъ чумы, въ отдаленномъ отъ жительства мѣстѣ, *не снимая кожъ*. 4) Во время повальнаго свирѣпствованія этой болѣзни поселяне въ селеніи должны очищать воздухъ въ своихъ жилищахъ куреніемъ уксуса, поливая его на раскаленный кирпичъ одинъ, или съ мятою и богородскою травою. 5) Со времени пораженія околушницею, каждый, *одержимый* ею, *долженъ* находиться въ тепломъ мѣстѣ въ комнатѣ, или пзбѣ, *остерегаться отъ холоднаго воздуха и сквознаго вѣтра*. Ничего горячительнаго ни въ пищу, ни въ питье употреблять не должно. Отварная ключевая вода, отваръ ячменя, съ блюбвеннымъ или брусничнымъ сокомъ, и сыворotka могутъ быть лучшимъ питьемъ, а растительныя произведенія: крупы и огородныя овощи въ варевѣ, также горячее и квашеное молоко, к. т. кислосе, варенець, простоваша и т. п. составляютъ полезную и пріятную пищу въ этой болѣзни.

Лѣченіе существенное, соотвѣтственно разнымъ видамъ околушницы, требуетъ употребленія слѣдующихъ, болѣе простыхъ средствъ.

Въ тѣльной первообразной околушницѣ прежде всего даютъ внутрь

больному для очищенія испражнительнаго канала *огуречный разсолъ съ медомъ* (№ 7.), и *толокно съ медомъ и солью* (№ 72), *магнезію* (№ 8), *кремортартаръ* (№№ 9 и 10), *глауберову соль* (№№ 33 и 34), *горькую соль* (№ 73), *рвотъ* (№№ 31 и 32), *сухую кору крушины* въ отварѣ (№№ 72 и 75).

Снаружи прикладываются въ *мышечку* или въ *подушечку* къ больному мѣсту, съ цѣлю возбудить нагноеніе и увеличить всасываніе, *ароматическія травы*: ромашка простая, липовый цвѣтъ, бузина, мята, полынь, верхи душицы, богородская трава, бараниникъ (№№ 68 и 69). Если этого недостаточно, то эти же травы употреблять снаружи въ *формѣ припарокъ* (№№ 54 и 55), съ прибавленіемъ *мака, льнянаго сѣмени и корня бахтовника* (№ 59). Чтобы разрѣшить болѣзнь, употребляютъ, сверхъ того, для наружнаго втиранія въ больное мѣсто мази: *масло деревянное съ камфорою* (№ 71) и *съ нашатырнымъ спиртомъ* (№№ 76 и 77), *аподельдокъ, майскій бальзамъ, сумасхотовъ бальзамъ, надощникъ, или бодягу* (№ 78); прикладываютъ *пластыри*: *млотноый, мензихотовъ, мыльный, цикутный, бленный, смоляной, бегтарный сгустокъ съ колеса или оси* (простонародное средство). Намазываютъ оныя на ветошгу и покрываютъ ими больное мѣсто, съ цѣлю способствовать разрѣшенію болѣзни. Для возбужденія испарины даютъ больнымъ, одержимымъ этою болѣзнію, употреблять, какъ *чай*, цвѣты: *липовый, ромашковый, бузинный*, травы: *богородскую, душицу, донникъ, шалфей, мяту*. Передъ этимъ чаемъ полезно давать *риверово питье* (№ 62) по столовой ложкѣ каждый разъ. При этомъ дѣлаютъ большую пользу и облегченіе болѣзни *кувшины съ горячею водою*, плотно заткнутые пробкою, либо *нагрѣтые кирпичи*, приложенные къ подошвамъ ногъ, съ укутываніемъ тѣла во время употребленія чая. Въ случаѣ сильнаго воспаления приставляютъ *плевки* или *рожки* къ больному мѣсту и около него. Количество тѣхъ и другихъ должно быть въ прямомъ содержаніи съ степенью болѣзни. Чѣмъ сильнѣе мѣстное воспаленіе и лихорадочное состояніе, тѣмъ приставляется большее количество пивокъ, или рожковъ (6—24 п. 3—12 р). *Кровоопусканіе* изъ вены назначается въ теченіе первыхъ сутокъ болѣзни, когда воспаленіе распространяется на заушные — подчелюстные желѣзы, какъ для предотвращенія распространенія его на мозгъ, такъ не менѣе и для разрѣшенія его на мѣстѣ околоушныхъ желѣзъ. Если болѣзнь въ 24 часа не уступаетъ всѣмъ этимъ средствамъ, то слѣдуетъ употреблять отвлекающе-нагнаивающіе: *нарывной пластырь* (№ 58) приложить на верхнюю часть руки, пока нарветъ пузырь, по прорѣзаніи котораго положить на ветошкѣ *нарывную мазь изъ рвотнаго камня* (№ 79), которую, перемѣняя, прикладывать до тѣхъ поръ, пока болѣзнь начнетъ разрѣшаться. Но когда натура, видимо, наклоняетъ воспаленіе къ нагноенію, то должно прикладывать къ больному мѣсту *мягчительныя припарки* (№№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 80 и 151) и продолжать ихъ употребленіе до тѣхъ поръ, пока нагноеніе прорвется

и будет истекать матерія. приче́мъ употребляются: *спускъ* (№ 29), *мази* (№№ 149 и 150), *сало*, *сухая кортиа*, *милотный пластырь* и т. п., для перевязки. При сильной боли во время припарокъ прибавляютъ къ нимъ *маковый цвѣтъ* (№ 81).

Въ околоушницѣ отложительной существенное лѣчение состоитъ изъ употребленія средствъ наружныхъ, нагнаивающихъ, описанныхъ въ предшествовавшихъ мягчительныхъ припаркахъ (рѣдко разрѣшающихъ), потому что отложенія бывають, большею частію, послѣ трудныхъ горячекъ, слѣдовательно при изнуреніи тѣла, а для разрѣшенія нужны средства испражняющія, которыя необходимо изнуряють.

Въ околоушницѣ тѣльной, переносной, если она произошла отъ переноса воспаленія яичекъ, лѣчение должно быть нагнаивающее, чтобы предотвратить возвратъ на прежнее мѣсто; сюда относятся тѣже мягчительно-нарывающія припарки, которыя исчислены въ предшествовавшей околоушницѣ отложительной. Если же она произошла отъ насильственного прекращенія бѣлей, то бѣли должно возстановить и лѣчить имъ свойственнымъ образомъ. Для возстановленія бѣлей полезно употребленіе *ножныхъ ваннъ*, прикладываніе къ подошвамъ ногъ бѣвшинъ съ горячею водою и нагрѣтыхъ кирпичей.

Въ нервной околоушницѣ лѣчение назначается точно тоже, какъ и въ околоушницѣ тѣльной первообразной, съ тою разницею, что здѣсь нужно приложеніе средствъ, успокоивающихъ нервы страдающихъ частей. *Камфорное масло* одно (№ 71) и съ *масломъ бѣлены* (№ 82), также *маковое масло* предпочитаютъ въ этомъ случаѣ для втиранія прочимъ вышеупомянутымъ мазямъ. Пластыри: *цикутный*, *бѣленный*, *минзихтовъ*, *шифгаузенскій* въ этомъ случаѣ также заслуживають преимущество предъ другими, выше сего исчисленными. Ихъ также, какъ и тѣ, прикладываютъ къ больному мѣсту и носятъ на немъ. Въ мѣшечки, или подушечки изъ ароматическихъ травъ (№№ 68 и 69) прибавляется порошкованная, или насобленная *камфора* по $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ ч., *золотника*. *Горчичники* (№№ 88, 89, 90), прикладываемые къ затылку, къ рукамъ, икрамъ ногъ, тоже помогаютъ. *Ножныя ванны* изъ одного *щелока* (№ 83) или изъ теплой воды съ *горчицею* и *солью* (№ 84) къ ночи, когда болѣзнь ожесточается, дѣлають большое облегченіе. Въ сильнѣйшихъ страданіяхъ, при ожесточеніи болѣзни и при употребленіи чая изъ цвѣтовъ: липовыхъ, ромашковыхъ, бузиновыхъ, травъ: мяты, шалфея, душицы, богородской, — дается внутрь *доверовъ порошокъ* также *на ночь* по $\frac{1}{8}$ ч. *золотника*. Слабительныя средства, которыя показаны выше, даются въ этомъ видѣ околоушницы только тогда, когда у больного или безвѣсница, или травяной вкусъ, и языкъ покрытъ побрямъ бѣлою мокротою, или весь бурый.

Ушное воспаление.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Воспаленіе ушное есть воспаленіе смѣшанное

(кровяное и вмѣстѣ пасочное) обнаруживающееся шумомъ, стрѣльбою, ломомъ и глухотою того или другаго уха, или обѣихъ вмѣстѣ.

Раздѣленіе. Ушное воспаление раздѣляется *по происхожденію* на *первоначальное*, происходящее отъ непосредственнаго вліянія вѣшнихъ (производящихъ) причинъ на страдающія части, безъ всякаго внутренняго болѣзненнаго расположенія къ нему; *сочувственное*, происходящее преимущественно по силѣ существующаго внутренняго болѣзненнаго расположенія, какъ напр. оно нерѣдко происходитъ отъ жабы зѣва, потому что при этомъ часто евстахіева труба бываетъ раздражена, и воспаление по сочувствію распространяется на ухо, что случается особенно у людей нѣжныхъ; и *сопряженное*, которое бываетъ золотоушное, венерическое и сложноревматическое.

По образу проявленія ушное воспаление раздѣляется на: *внѣшнее*, обнаруживающееся болѣе или менѣе явственною опухолью *извнѣ* и вмѣстѣ возвышенною раздражительностію, не терпящею особенно механическихъ вліяній; *внутреннее*, обнаруживающееся преимущественно чрезмѣрною нетерпѣливостію слуха, относительно звуковыхъ впечатлѣній, и отсутствіемъ опухоли во вѣшнемъ слуховомъ проходѣ. При воспаленіи вѣшнемъ боль бываетъ легче, а при внутреннемъ сильнѣе. При вѣшнемъ воспаленіи боль въ пораженной части много облегчается при открытіи рта, но при внутреннемъ это нисколько не помогаетъ.

По внутреннему свойству ушное воспаление раздѣляется на *кровяное* и *пасочное*; то и другое извѣстно изъ опредѣленія воспаления по ихъ сущности.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Воспаленіе первоначальное происходитъ легко, безъ всякаго въ тѣлѣ расположенія, исключая общее и частное полнокровіе, по силѣ причины вѣшной производящей; воспаления сочувственное и сопряженное происходятъ по силѣ внутренняго особеннаго болѣзненнаго состоянія, часто безъ причины вѣшной производящей.

Причины вѣшнія (производящія) важны только при воспаленіи первоначальномъ. Сюда принадлежатъ всѣ условія, могущія произвести раздраженіе въ ухѣ, какъ то: неосторожное очищеніе ушей, пораненіе, заплззаніе наѣбѣмыхъ, скопленіе и засыханіе ушной сѣры, удары, направленные на ухо, холодъ, сильное надуваніе инструментовъ, ударъ изъ пушки, громъ и прочія потрясенія.

Сущность ушнаго кровянаго воспаления состоитъ въ увеличенномъ раздраженіи и увеличенномъ кровяномъ приливѣ; сущность ушнаго пасочнаго воспаления состоитъ въ чисто пасочномъ приливѣ и въ маломъ раздраженіи.

Распознаваніе ушнаго воспаления кровянаго и пасочнаго, какъ двухъ существенныхъ видовъ этой болѣзни, по извѣстнымъ о нихъ понятіямъ *легко*.

Предсказаніе основывается на качествѣ, степени и мѣстопре-

бываніи ушнаго воспаленія. Относительно опасности для жизни, ушное воспаление первоначальное гораздо опаснѣе другихъ, потому что легко распространяется на общее чувствилище — мозгъ. Воспаленіе кровяное опаснѣе пасочнаго, воспаленіе внутреннее опаснѣе наружнаго. Относительно продолжительности ушное воспаление кровяное и сильное скорѣе обанчивается, нежели пасочное и слабое. Воспаленіе наружное скорѣе обанчивается, нежели внутреннее; послѣднее можетъ продолжаться мѣсяцы и годы.

Исходы: *разрѣшеніе, нагноеніе, сывороточное отдѣленіе, отвердѣніе и костонда*. Въ разрѣшеніе чаще переходитъ ушное воспаление первоначальное; въ нагноеніе — воспаленія сопряженные, особенно золотушное и венерическое; въ отолстѣніе и отвердѣніе переходятъ сопряженные, чаще сложно-ревматическія; въ сывороточное отдѣленіе имѣетъ исходъ воспаленіе уха золотушное; сывороточное отдѣленіе иногда бываетъ болѣе пасочное, въ костодѣ переходитъ воспаленіе уха венерическое, иногда золотушное. Какъ узнать такіе исходы? Если воспаленіе уха перешло въ разрѣшеніе, то признаки воспаленія исчезаютъ. Если произошло нагноеніе, то признаки воспаленія также исчезаютъ, и при воспаленіи внѣшнемъ появляется истеченіе гноя. Если всѣ признаки воспаленія исчезли, но больной вдругъ оглохъ, значитъ, что внутреннее воспаленіе перешло въ нагноеніе. Для большей въ томъ увѣренности, должно заставить больного скопить во рту воздухъ и пустить его въ евстахіеву трубу; тогда воздухъ нерѣдко выгоняетъ гной наружу. Случается иногда, что при большомъ скопленіи гноя и при широкой полости евстахіевой трубы, гной самъ по себѣ вытекаетъ въ полость рта. Если при глухотѣ одинъ воздухъ будетъ выходить изъ евстахіевой трубы, то значитъ, что произошло отвердѣніе, особенно если глухота образовалась медленно. Для узнанія костоды вводятъ металлическій и именно серебряный зондъ-цилиндръ, который, при прикосновеніи съ гноемъ, чернѣетъ, причемъ и самый гной имѣетъ вонючій запахъ.

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Должно *уми*, до, во и послѣ болѣзни, какъ органы слуха, *защищать* и сохранять отъ всѣхъ условій, могущихъ производить въ нихъ раздраженіе, какъ то: неосторожнаго очищенія ушей, пораненія, запыленія насѣкомыхъ, скопленія и засыхания ушной сѣры, ударовъ, направленныхъ на ухо, холода, особенно во время вѣтровъ, сильнаго надуванія инструментовъ, ударовъ изъ пушки, грома и другихъ потрясеній. 2) *Постороннія тѣла*, попавшіе по неосторожности въ то или другое ухо, или въ оба, должно *тотчасъ вынимать*. 3) *При запыленіи насѣкомыхъ* народное обыкновеніе *затыкать ухо волосами*, или *наливать въ него* какой нибудь *жидкости*, какъ то воды, квасу, молока, масла, мыльнаго раствора и т. п., смотря по разности насѣкомыхъ, скоро производитъ умерщвленіе вползшаго насѣкомаго, или выгоняетъ его, послѣ чего тотчасъ стрѣльба

и всѣ боли затихаютъ и пропадаютъ. 4) Въ случаѣ раздраженія, послѣдшаго въ томъ или другомъ ухѣ, или въ обоихъ, отъ какаго либо потрясенія, *впускание деревяннаго масла* по каплѣ нѣсколько разъ въ день содѣйствуетъ къ предотвращенію развитія болѣзни. 5) Во время болѣзни, каждый *страждущій* ушнымъ воспаленіемъ *долженъ содержать себя въ покоѣ отъ* всякаго шума, крика, стуковъ и т. п. словомъ: *въ тишинѣ и спокойствіи*, имѣя при всемъ томъ *страждущее ухо* всегда *завязаннымъ*. 6) Сверхъ того онъ долженъ быть *въ комнатѣ* или *пѣбѣ*, постоянно *теплой*; относительно потребностей въ пищу и питье ограничиваться одними легкими, не раздражающими и не разгорячающими, словомъ руководствоваться тѣми же правилами, какъ и въ околоушницѣ.

Лѣчение существенное должно быть соотвѣтственно существенной разности ушнаго воспаления. Ушное воспаление кровяное, основывающееся на сильной раздражительности пораженныхъ частей и сильномъ приливѣ крови, требуетъ помощи самого врача; за неимѣніемъ же его по близости должно ограничиться употребленіемъ слѣдующихъ, болѣе простыхъ средствъ: *Приспособленіе пиявокъ* или *рожекъ* при наружномъ воспаленіи спереди и внизу уха, а при внутреннемъ, за ухомъ въ углубленіи, около сосковиднаго отростка, бываетъ существенно нужно въ этомъ видѣ ушнаго воспаления. *Кровопускание* пзъ вены можно назначать до трехъ чайныхъ чашекъ, если обнаружилось лихорадочное состояніе, и притомъ сильное. Внутрь же давать *риверо* *питье* (№ 62) по столовой ложкѣ черезъ часъ и два въ настоѣ *чая изъ ароматическихъ растений*, какъ-то: липовыхъ, ромашковыхъ, бузиновыхъ цвѣтовъ, сухой малины, травъ: мяты, шалфея, богородской, бубницы и т. п. (№№ 15, 16, 85). Чай этотъ при употребленіи риверова питья употребляется послѣ онаго, такъ что и пріемъ риверова питья запивается этимъ чаемъ, хотя бы и остывшимъ. *Селитра съ вишневымъ клеемъ* въ порошокъ (№ 86), или въ растительномъ *молокѣ конопля*, *мака* и *сладкаго миндаля* (№ 87) помогаетъ въ этой болѣзни. *Слабительныя* средства, каковы суть: корень *одуванчика* (№ 1), корень *пырея* (№ 3), *олуечный разсолъ* (№ 7), *магnezія* (№ 8), *кремортартръ* (№№ 9, и 10), корень *мыльнянки съ alexandрійскимъ листомъ* и *глауберовою солью* (№ 30), глауберова соль (№ 34), *толокно съ медомъ и солью* (№ 72), *горькая соль* (№ 73), *кора крушины* одна (№ 74), и съ глауберовою солью (№ 75), *конской щавель* (№ 91), очищая свободнымъ испражненіемъ пищеварительный каналъ, разрѣшаютъ болѣзнь. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то слѣдуетъ присоединить къ нимъ еще дѣйствіе средствъ отвлекающихъ, производящихъ красноту, каковы напр. *горчичникъ* (№№ 88 и 89), *хрюновникъ* (№ 90), которые съ большою пользою прикладываются на руки и затылокъ, а при внутреннемъ воспаленіи уха—за ухо. Прикладываніе это продолжается до тѣхъ поръ, пока воспаленіе не будетъ прервано. Между тѣмъ *впрыскиваніе* въ больное ухо изъ мягчитель-

ныхъ и болеутолительныхъ средствъ, какъ наприм. изъ *деревяннаго, прованскаго масла, настоя ромашки съ бѣленою* и т. п. но не съ *болголовомъ*, который слишкомъ раздражаетъ, не менѣе того нужно и полезно.

Ушное воспаленіе пасочное требуетъ употребленія средствъ снару-
жи отвлекающихъ, какъ производящихъ красноту, какъ-то: горчични-
ковъ (№№ 88 и 89), хрѣновниковъ (№ 90), такъ въ особенности *на-
рывныхъ* (№ 58), а внутрь легкихъ разрѣшающихъ и слабительныхъ,
соотвѣствующихъ сопряженности. Въ этомъ случаѣ должно обратиться
ко врачу. Нагноеніе, костоѣда, отолстѣніе и отвердѣніе, отложеніе, какъ
пасочное, такъ и сывороточное, въ которыя перешло ушное воспаленіе,
составляютъ въ лѣченіи предметъ особой важности и затрудненія, по-
чему въ подобныхъ случаяхъ должно совѣтовать обращаться къ врачу.
Снаружи средства отвлекающія: горчичникъ, хрѣновникъ и мушка мо-
гутъ быть полезны въ большей части случаевъ этихъ исходовъ ушнаго
воспаленія, за исключеніемъ однако цынготнаго болѣзненнаго сопряже-
нія въ тѣлѣ *). Отъ постояннаго звона въ ушахъ или въ одномъ ухѣ
помогаетъ постоянное *втираніе* за ушами *нарывной мази* (№ 79), до
появленія оспенныхъ прыщей, которые должно поддерживать прикла-
дываніемъ по времени этой мази до чувствованія облегченія отъ ушна-
го звона. Иные производятъ втираніе этой мази пониже плечъ; но это
очень далеко отъ больныхъ мѣстъ.

Головное внутреннее воспаленіе.

Опредѣленіе. Головное внутреннее воспаленіе есть воспаленіе
внутреннихъ головныхъ частей, кровавое, обнаруживающееся сильнымъ
постояннымъ жаромъ и несносною болью головы, раздутостью и красно-
тою лица, особенно глазъ, нетерпѣливостію впечатлѣній на чувства,
особенно на зрѣніе и слухъ, и наконецъ растройствомъ душевныхъ спо-
собностей, сопровождаемымъ наиболѣе отвращеніемъ и неудовольствіемъ
ко всему окружающему, такъ что больной стремится все разрушить,
уничтожить.

Раздѣленіе. Явленія, исчисленныя въ этомъ опредѣленіи болѣз-
ни, не всегда бываютъ всѣ въ совокупности и не всегда въ одной сте-
пени. Эта разность въ обнаруженіи явленій зависитъ *отъ разности
происхожденія*, по которому головное внутреннее воспаленіе бываетъ:

*) Простонародное обыкновеніе ставить въ больное ухо свѣчку (изъ бумаги и дру-
гихъ веществъ, свернутыхъ въ трубочку), однимъ концемъ, а другой зажигать для
вытягиванія матеріи, какъ вредное, слѣдуетъ запрещать. Одинъ крестьянинъ, зани-
мавшійся кузнечною работою, отъ стрѣльбы и боли въ ухѣ имѣлъ это обыкновеніе въ
облегченіе болѣзни; но на 40-мъ году жизни умеръ скоропостижно отъ кроваваго моз-
гового удара. При вскрытіи мною его трупъ твердая мозговая оболочка найдена отвер-
дѣвшею, во многихъ мѣстахъ окостенѣвшею и хрящевидною и, хранится въ анатоми-
ческомъ кабинетѣ казанскаго университета.

первообразное, происходящее непосредственно отъ вліянія внѣшнихъ причинъ, дѣйствующихъ на голову, напр. отъ удара въ голову и проч. *сочувственное*, происходящее отъ раздраженія брюшныхъ органовъ, отражающагося по сочувствію на мозговую систему. Первое отъ послѣдняго отличается тѣмъ, что преимущественно обнаруживается припадками, означенными въ опредѣленіи: сочувственное же, напротивъ, не выказывается, большею частію, ничѣмъ, кромѣ расстройства душевныхъ способностей, сопровождаемаго гнѣвомъ и отвращеніемъ ко всему окружающему; нѣтъ ни боли головы, ни анхорады, ни другихъ припадковъ, хотя впрочемъ замѣнены случаи, гдѣ при жизни нѣкоторыхъ признаковъ, какъ матеріальныхъ, такъ и динамическихъ, не было, а послѣ смерти оказалось сильное прежде бывшее первообразное воспаленіе, кончившееся нагноеніемъ и даже омертвѣніемъ внутреннихъ головныхъ частей; но эти случаи рѣдки, исключительны и, по видимому здоровью, не требуютъ лѣченія. Первообразное воспаленіе бываетъ различно, смотря по тому, какія головныя внутреннія части поражаются. Такъ, воспаленіе твердой мозговой оболочки проявляется одною головною болью постоянно или послабляющею; воспаленіе паутинной оболочки обнаруживается иногда единственно болью головы и отупѣніемъ внѣшнихъ чувствъ, а иногда болью головы и превратностями зрѣнія, двоепредметностію и др., но можетъ также выражаться и всѣми вышесказанными явленіями; воспаленіе мягкой ткани и самаго мозга можетъ быть скрытое, безъ всякихъ признаковъ болѣзни; можетъ быть сильное нагноеніе, или изліяніе безъ всякихъ признаковъ воспаленія. Это же первообразное, или первоначальное воспаленіе бываетъ различно, смотря по качеству и степени дѣйствія производящихъ причинъ. Такъ, психическія причины производятъ воспаленіе, обнаруживающееся помѣшательствомъ душевныхъ способностей и тупостію внѣшнихъ чувствъ. Сюда принадлежатъ всѣ помѣшавшіеся на рѣшеніи богословскихъ задачъ, на любви и проч.; напротивъ — воспаленіе, происшедшее отъ причинъ физическихъ — динамическихъ и механическихъ, большею частію обнаруживается полными, сказанными въ опредѣленіи признаками; относительно степени дѣйствія внѣшнихъ (производящихъ) причинъ можно допустить: чѣмъ медленнѣе дѣйствуетъ причина, тѣмъ воспаленіе бываетъ болѣе скрытое, и наоборотъ: чѣмъ причина скорѣе дѣйствуетъ, тѣмъ воспаленіе бываетъ болѣе явное.

По продолжительности теченія своего, головное внутреннее воспаленіе бываетъ *скоротечное и хроническое* (продолжительное). Эта разность еще явственнѣйшимъ образомъ измѣняетъ форму воспаленія первоначальнаго и сочувственнаго, а именно: скоротечное воспаленіе выражается всѣми признаками, сказанными въ опредѣленіи; хроническое, напротивъ, преимущественно выражается формою, свойственною воспаленію сочувственному, и расстройствомъ только душевныхъ способностей. По этому-то воспаленіе это и есть почти тоже, что и помѣшательство — манія.

Но *главная*, важная и нужная при лѣченіи *разность* головного внутренняго воспаления состоитъ въ томъ, будетъ ли оно имѣть форму *лихорадочную* или *не лихорадочную*.

Признаки головного внутренняго воспаления *въ формѣ лихорадочной*: прежде всего чувствуется тяжесть въ головѣ, потомъ то сжимающая боль въ ней, то разламывающая; смѣшанность идей о предметахъ; нерасположенность къ нѣкоторымъ лицамъ и вещамъ; лицо дѣлается вдругъ краснымъ; отдѣленія и испражненія уменьшаются; бѣглое лихорадочное состояніе, но больной еще на ногахъ и занимается дѣлами, притомъ иногда имѣетъ только наклонность ко сну, а иногда и засыпаетъ. Во снѣ прорывается тихій бредъ, перебѣгающій съ одного предмета на другой, дышетъ сильно, часто вздрагиваетъ и поражается спазматическимъ подергиваніемъ то той, то другой конечности и лица. При пробужденіи отъ сна, а иногда и во время бодрствованія, больной вскакиваетъ, какъ бы отъ страха, и при первомъ появленіи кого либо изъ окружающихъ показываетъ неудовольствіе, сердится и обнаруживаетъ признаки бѣшенства; въ это время начинается развитіе всѣхъ признаковъ воспаления первоначальнаго: лицо рдѣетъ, выраженіе его представляется бѣшеннымъ, глаза краснѣютъ и выпучиваются, слухъ становится раздражительнымъ, прочія чувства нерѣдко тупѣютъ, особенно вкусъ и обоняніе, кожа дѣлается сухой и горячею, пульсъ полный, твердый, натянутый; дыханіе сухое и горячее, языкъ и губы красные, горячіе и сухіе; моча малоколичественная, красная и тонкая; испражненія низомъ совсѣмъ прекращаются. Къ ночи жаръ, бредъ и самое бѣшенство быстро возрастаютъ. Днемъ болѣзнь то ожесточается, то послабляетъ; къ слѣдующей ночи упомянутые признаки болѣзни еще болѣе ожесточаются, больной старается уйдти и бѣетъ все, что попадется ему навстрѣчу. У дѣтей предъ этою болѣзнію бываетъ особый признакъ, заслуживающій вниманія, и состоящій въ томъ, что они падаютъ необыкновенно часто и безо всякаго къ тому повода. У иныхъ дѣтей предшествуютъ этой болѣзни въ теченіе многихъ дней внезапные по ночамъ судорожные припадки, отъ которыхъ днемъ не остается и слѣда; дѣти бѣгаютъ и рѣзвятся, какъ обыкновенно. Къ числу признаковъ этой болѣзни у дѣтей присоединяется рвота, которая дѣлается отъ маловажныхъ причинъ, и особенно тогда, когда ихъ поднимаютъ. Въ это время ихъ не столько рветъ, сколько тянетъ; а подъ конецъ болѣзни глубокій сонъ, болѣзненная спячка.

Это внутреннее головное *лихорадочное* воспаление бываетъ: 1) *настоящее* (сильное), которое тоже, что и первообразное; 2) *нервное* (слабое), замѣчаемое у пьяницъ, рубоблюдовъ (онанистовъ), ипохондриковъ, истеричекъ, *называемое* вообще *бѣлою горячкою*; 3) *желудочное* отъ раздраженія желчью, глистами; 4) *роженичное* (сильное) у роженицъ отъ переноса молока; 5) *скарлатинное* (жестокое) отъ переноса на мозгъ скарлатины; 6) *тысячное*, какъ слѣдствіе остано-

ленного теченія мѣсячныхъ кровей у женщинъ и 7) *носовое у дѣтей* отъ остановившагося кровотеченія изъ носа.

Признаки головного внутреннего воспаленія *въ формѣ ея лихорадочной* выражаются разстройствомъ только душевныхъ способностей и онѣмѣlostію внѣшнихъ чувствъ. Болѣзнь начинается непримѣтно. Признаки ея скорѣе или медленнѣе, въ теченіе нѣсколькихъ дней, недѣль, а иногда и цѣлыхъ мѣсяцевъ, мало по малу развиваются, такъ что у больного явственно можно замѣтить разстройство одной какой либо, или многихъ душевныхъ способностей. При этомъ органическія отправления, большею частію, совершаются хорошо: но, по мѣрѣ большаго разстройства душевныхъ способностей, осязаніе, обоняніе и вкусъ начинаютъ болѣе и болѣе терпѣть, отдѣленія и испражненія задерживаются, особенно мочи и низомъ. Пульсъ дѣлается иногда очень медленнымъ, рѣдкимъ, волнистымъ. Нерѣдко присоединяется необыкновенная прожорливость и другія побужденія, особенно къ сонтию, нюханію табака и испражнений и къ употребленію всѣхъ отвратительныхъ веществъ. Иногда, напротивъ, является совершенный недостатокъ побужденій, такъ что больные въ теченіе двухъ или болѣе недѣль не ѣдятъ, не пьютъ, не спятъ и не испражняются. Вся жизнь ихъ выражается одною болтливостію; сужденія обо всѣхъ предметахъ высокопарныя; не рѣдко также дѣлается просвѣтленіе разсудка, больные говорятъ о самыхъ высокихъ для нихъ вовсе не извѣстныхъ предметахъ, съ удивительною разсудительностію и основательностію.

Причины внутреннія (предрасполагающія) суть всѣ условія, содѣйствующія развитію излишне-ускоренной раздражительности внутреннихъ головныхъ частей и излишней прѣмчивости сосудовъ и скопленію въ нихъ крови: наследственное тѣлосложеніе, свойственное цѣлымъ семействамъ, равно и пріобрѣтенное сильными умственными занятіями, глубокими умствованіями, содержаніемъ головы въ излишней теплотѣ, неправильнымъ, продолжительнымъ, пониженымъ наклоненіемъ головы, необходимо сопряженнымъ съ нѣкоторыми занятіями и т. под. Большая вмѣстительность головныхъ сосудовъ и скопляемость въ нихъ крови. Такъ, имѣющіе большую голову часто подвергаются внутреннему головному воспаленію. Люди горячіе и страстные, раздражительные, вспыльчивые, нервныя тоже расположены къ нему. Воспаленія другихъ сосѣдственныхъ частей, наприм. околоушной желѣзы, зѣва и др. переносы дактилагрическіе, переносы болей, скарлатинной заразы и мѣла, особливо въ первомъ періодѣ послѣ родовъ отъ 7 до 12 дней, остановка привычныхъ кровяныхъ отдѣленій, какъ-то: гемороя у мужчинъ, а мѣсячнаго очищенія у женщинъ и т. п. Болѣзни сердца и легкихъ, печаль, болѣзнованіе и проч. нерѣдко быстро причиняютъ головное внутреннее воспаленіе.

Причины внѣшнія (производящія): всѣ условія, развивающія въ высшей степени сказанное предрасположеніе, которыя или чрезмѣрно возвышаютъ чувствительность и ускоряютъ раздражительность, или

способствуют скопленію крови въ головѣ. Причины, возвышающія чувствительность и ускоряющія раздражительность: 1) *занятія*, несоотвѣтствующія степени раздражительности, особливо *въ ночное время*, когда сама природа требуетъ успокоенія нервовъ; 2) *напряженія умственныхъ* при рѣшеніи вопросовъ о такихъ предметахъ, къ изясненію которыхъ умъ не приготовленъ предварительными свѣдѣніями: таковы вопросы о Богѣ, о душѣ, о религіи, о будущей жизни и проч. 3) *сильныя движенія души*, такъ: отъ любви, отъ гнѣва, страха, испуга, радости и другихъ подобныхъ потрясеній подвергаются иногда человѣка головному воспаленію; 4) *употребленіе спиртныхъ напитковъ*, какъ привычно-болѣзненное, запойное, такъ и въ непомѣрныхъ сельскихъ праздничныхъ попойкахъ, обрядныхъ и обычныхъ пирушкахъ, производитъ нерѣдко эту болѣзнь; 5) *механическія вліянія*, дѣйствующія на голову, удары въ шею, спину и поясницу, ушибы, раны и другія подобныя потрясенія головы; 6) сильный *холодъ* или *жаръ*, удареніе солнечныхъ лучей на открытую голову (у крестьянъ во время лѣтнихъ работъ въ полѣ), что нерѣдко случается въ жаркомъ климатѣ южной Россіи, гдѣ эта болѣзнь особенно поражаетъ людей въ цвѣтущемъ возрастѣ, также жаръ въ банѣ, если голова была до того нѣсколько охлаждена. Причины, увеличивающія скопляемость крови въ головѣ, слѣдующія: сплывы и продолжительныя нагрѣванія головы; тѣсныя, шейныя повязки, задерживающія свободный отливъ крови отъ головы; ношеніе большихъ тяжестей на головѣ, потому что сильное напряженіе шейныхъ мышцъ препятствуетъ свободному движенію груди, дыханіе затрудняется, а съ нимъ вмѣстѣ затрудняется и свободный отливъ крови отъ головы. Причины этой болѣзни у дѣтей бываютъ троякаго рода: 1) со стороны дитяти—врожденное расположеніе, особенно у дѣтей полнокровныхъ, имѣющихъ большую голову съ раздутыми на ней жилами, золотушное тѣлосложеніе, англійская болѣзнь, продолжительные запоры на низъ: накопленіе слизи и нечистотъ въ кишечномъ каналѣ; неправильное лѣченіе сыпей, особенно одними наружными средствами, напр. паршей, молочной коры, чесотки; прорѣзываніе зубовъ, глисты; употребленіе въ излишество и преждевременно мясной и вообще раздражающей, разнообразной пищи; привычка съ дѣтства къ кофе, чаю и даже вину; которое даютъ нѣкоторые родители малолѣтнимъ дѣтямъ для ихъ укрѣпленія; частое и короткое обстриганіе волосъ на головѣ, начинаемое даже съ младенческаго возраста; пребываніе дѣтей съ непокрытою головою на сильномъ холодѣ, а особенно на солнечномъ жарѣ; рановременное напряженіе и развитіе умственныхъ способностей непомѣрнымъ ученіемъ; излишне продолжительное кормленіе дѣтей грудью; сильное качаніе дѣтей въ люлькахъ. 2) Со стороны матери: сильныя душевныя возмущенія и страсти; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ во время беременности. 3) Со стороны кормилицы: сильныя страсти, особенно сварливость, излишество питательной и горячительной пищи, употребленіе вина, водки, пива, кофе.

Причины, производящія головное внутреннее сочувственное воспаление, состоятъ въ многоразличныхъ раздраженіяхъ брюшной системы, по сочувствію отражающихся на мозгъ; желчь, глисты, всякая сильная лихорадка, особенно нервная, скрытыя раздраженія въ печени, почкахъ и вообще въ мочевыхъ органахъ, нерѣдко отражаются на систему головную и производятъ въ ней воспаление. У женщинъ раздраженіе матки и грудей, неправильное теченіе мѣсячныхъ кровей, не умѣренное плотское совокупленіе, онанія (рукоблудіе), истерика, ипохондрія, сильная неудовлетворенная похоть, самая даже беременность бывають иногда причиною головного воспаленія.

Сущность востанитъ въ воспаленіи головныхъ внутреннихъ частей, какъ вообще всѣхъ мѣстъ взятыхъ, что бываетъ рѣдко, такъ и въ частности одной, или нѣкоторыхъ изъ нихъ, что бываетъ чаще; въ послѣднемъ случаѣ частность подлежитъ многимъ разностямъ, которыя, не смотря на общій противу-воспалительный способъ лѣченія, требуютъ нерѣдко особенныхъ своихъ частныхъ изворотовъ и сноровокъ въ лѣченіи, могущихъ соотвѣтствовать только извѣстной опредѣленной воспаленной части.

Распознаваніе головного внутренняго *лихорадочнаго* воспаления *легко*. Сильная лихорадка, краснота лица, тонкій слухъ, сильное бѣненіе шейныхъ и височныхъ артерій, блескъ глазъ, судорожное подергиваніе сухихъ жилъ, безпорядокъ умственныхъ способностей такъ хорошо характеризуютъ эту болѣзнь, что нельзя смѣшать ее ни съ какою другою. Напротивъ, головное внутреннее воспаление *не лихорадочное* до того бываетъ *трудно распознать*, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ узнать его совершенно невозможно, и это можетъ ввести въ ошибку и заблужденіе самаго опытнаго врача. Это вообще; чтожъ касается до опредѣленія мѣста воспаленія въ частности, какъ оболочекъ, такъ и мозга, то на это нѣтъ данныхъ, на которыхъ-бы можно было основать распознаваніе, за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ, очень не многихъ, собственно относящихся къ мозгу, въ которыхъ при тонкомъ соображеніи довольно приблизительно можно опредѣлить, что та или другая часть мозга поражена воспаленіемъ. Такъ, если больной страдаетъ потерю памяти, неправильнымъ соображеніемъ, безъ нарушенія впрочемъ воли, то говорятъ, что въ этомъ случаѣ воспалены переднія доли мозга. Напротивъ, если воля повреждена, дыханіе трудно, конечности недвижимы, мочевыя отправления разстроены, особенно если замѣчается частое напряженіе уда, то предполагають, что въ этомъ случаѣ страдаютъ заднія доли мозга.

Предсказаніе относительно опасности для жизни. Вообще чѣмъ воспаление имѣетъ болѣе характеръ лихорадочный, тѣмъ оно опаснѣе для жизни, потому что въ теченіе нѣсколькихъ минутъ болѣзнь можетъ убить больного; напротивъ, чѣмъ воспаление будетъ болѣе характера не лихорадочнаго, тихаго, тѣмъ и предсказаніе лучше; есть возможность успѣть подать больному нужную помощь. Но и эти правила не безъ ис-

включений; бывают случаи, гдѣ воспаление не лихорадочное иногда убываетъ также скоро, какъ и воспаление лихорадочное; по этому въ предсказаніи должно быть осторожну. Въ частности, — въ лихорадочной формѣ воспаления: безпрестанный бредъ, въ которомъ больной соби-
рается куда нибудь ѣхать, или ѣдетъ, вертящіеся, какъ буркалы, глаза. ловленіе мухъ, выдергиваніе изъ одѣяль набивки, безпрестанное дрожаніе, подергиваніе сухихъ жплъ, остановка мочи, упорная бессонница. непрерывная перхота, скрежетаніе зубовъ, какъ видъ порчи — все это опасные признаки болѣзни для жизни. Напротивъ: испарина, или потъ, обильное кровотеченіе изъ носа, открывшійся геморой, моча обильная съ большимъ осадкомъ на днѣ, поносъ, а у женщинъ кровотеченіе изъ дѣтородныхъ частей — признаки болѣзни, благоприятные для жизни. Предсказаніе относительно продолжительности болѣзни въ формѣ лихорадочной находится въ обратномъ содержаніи съ предсказаніемъ относительно опасности для жизни, такъ что чѣмъ воспаление будетъ быстрѣе, тѣмъ болѣзнь скорѣе оканчивается, и на оборотъ. Въ нелихорадочной формѣ, при болѣе тихомъ теченіи болѣзни, можно сказать, что болѣзнь окончится на 12—17 или 21 день. Еслиже воспаление происходитъ отъ раздраженія, производимаго глистами, или въ слѣдствіе скрывшейся сыпи, то въ этомъ случаѣ можно сказать, что болѣзнь кончится тогда, когда выгнаны будутъ глисты, или вызвана сыпь. Но и тутъ въ предсказаніи нужна осторожность.

Исходы формы лихорадочной. За полнымъ и сильнымъ развитіемъ сказанныхъ признаковъ этой болѣзни иногда по прошествіи нѣсколькихъ часовъ, иногда двухъ, или трехъ дней, а иногда двухъ или болѣе недѣль, слѣдуетъ *смерть*, или скоропостижно, смотря когда воспаление бываетъ сильнѣе, или всѣ болѣзненные признаки, мало по малу, утихаютъ, и больной выздоравливаетъ, или онъ изъ полного бѣшенства впадаетъ въ болѣе тихое и медленное, *въ манію*, или меланхолическое состояніе, или *въ состояніе безумія*, или наконецъ въ состояніе *безчувственности*, при которомъ общее чувствилище находится въ совершенномъ бездѣйствіи, отчего больные также скоро умираютъ. При вскрытіи труповъ людей, умершихъ въ такомъ безчувственномъ состояніи, всегда находили или изліяніе, или отложеніе кровяное, или сывороточное подъ оболочками мозга и въ существѣ его.

Исходы формы не лихорадочной. Болѣзнь въ этой формѣ, продолжаясь мѣсяцы, годы и даже цѣлую жизнь, оканчивается по обыкновенному закону природы, или *выздоровленіемъ* или *смертью*. Иногда же болѣзнь, развиваясь до какой-либо изъ сказанныхъ степеней, принимаетъ видъ или *бѣшенства*, или *ипохондрии*, или *безумія*, иногда же появляются признаки или нагноенія, или отложенія, за которыми скоро слѣдуетъ смерть.

Лѣченіе діететическое внутренняго головнаго воспаления требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Должно бдѣть больного или *содержать его въ мѣстѣ спокойномъ*, болѣе прохладномъ, чѣмъ

тепломъ, гдѣ бы температура воздуха была 13° 14° по Реом., особенно при лихорадочной формѣ болѣзни. Если же болѣзнь будетъ формы не лихорадочной, особенно, если при этомъ будетъ замѣтно состояніе спазматическое, то воздухъ долженъ быть не менѣе 17° и до 20° тепла.

2) *Клать больного* должно не на перинахъ, но на *матрасъ*, *тюфякъ*, а еще лучше на мягкомъ *соломенникѣ*, покрытомъ простынею, сложенною вчетверо; при этомъ кровать его должна быть поставлена такимъ образомъ, *чтобы доступъ къ нему былъ* возможенъ со *всѣхъ четырехъ сторонъ* для удобнаго и поспѣшнаго, осторожнаго и искуснаго оказыванія ему пособія. особенно во время примачиванія головы холодною водою и т. п.; болѣе всего обращать вниманіе, *чтобы подушки подъ головою его были суха*, для чего нужно имѣть въ запасѣ поболѣе подушекъ; на подушкахъ (*кожаныя лучше простыя*) должна быть всегда чистая холщевая наволочка; покрывать его легкимъ одѣяломъ; 3) Больной долженъ *лежать прямо*, лишь съ нѣскольکو *возвышенною головою*; *окна завѣсить* сторами, либо занавѣсями, либо чѣмъ нибудь въ родѣ оныхъ, такъ чтобы въ комнатѣ былъ только слабый свѣтъ. 4) *Комната* должна быть *чистая, сухая*, высокая, *просторная*, находится *въ отдаленіи* отъ другихъ жилыхъ покоевъ, *въ избѣжаніе шума*, который въ этой болѣзни всего несноснѣе для больного. 5) Не должно *безпокоить больного* ни разговорами, ни пустыми разспросами; не дѣлать ему никакой непріятности, а тѣмъ болѣе противорѣчій и угрозъ, но исполнять его желанія и даже прихоти, какъ можно поспѣшнѣе: потому что всё, что сердить и огорчаетъ его, усиливаетъ раздраженіе во внутренностяхъ головы и приливы къ нимъ крови; для этого нужно выбирать для присмотра за больнымъ благоразумную женщину, которая умѣла бы предупреждать всѣ малѣйшія его желанія, и искусно отвлекала бы его желанія отъ всего вреднаго, а въ случаѣ упорнаго желанія, хотя бы и вреднаго, или невозможнаго, не должно отбазывать ему на отрѣзъ, но поблажать общаніемъ, или, если можно, удовлетворить его, имѣя въ виду, что отъ этого ему менѣе будетъ вреда, нежели отъ положительнаго отказа. Словомъ, надобно употребить всё то, что его забавляло, когда онъ былъ здоровъ, и чѣмъ можно забавить его въ болѣзни. 6) Должно какъ можно *меньше* давать больному *пств* и только тогда, когда онъ самъ попроситъ, дать немного овсяной кашницы, процѣженной и сваренной съ свѣжимъ, сливочнымъ масломъ. *Для питья достаточно одной воды*, въ случаѣ *сыворотки* и *отвара ячменя*. 7) При *выздоровливаніи*, если силы больного изнурены, то *діета* должна быть слегка *укрѣпляющая*, и пища обыкновенно употребляется не вдругъ, а по немногу, словомъ: исподволь отъ употребленія пищи легкой и въ маломъ количествѣ, должно переходить къ употребленію пищи всякаго рода, обычной по образу жизни больного до его болѣзни и послѣ оной. Если приливы крови къ головѣ происходятъ отъ полнокровнаго тѣлосложенія, образа жизни, обстоятельствъ, или вліяній на здоровье болѣзней, и сопровождается

особенными продолжительными припадками, какъ то: краснотой лица при возмущеніи духа, излишней теплотой, употребленіемъ спиртныхъ напитковъ, чувствомъ жара въ щекахъ и головѣ, болью головы, особенно въ темени и затылкѣ, головокруженіемъ, шумомъ въ ушахъ, исправами предъ глазами, слабостію во всемъ тѣлѣ, охлажденіемъ рукъ и ногъ, — которыя угрожаютъ внутреннимъ головнымъ воспаленіемъ или возвратомъ онаго, то дождевыя ванны, или орошенія тѣла, особенно головы, водою, устремленною на голову въ видѣ дождя чрезъ металлическое рѣшето съ дырочками различной величины, или изъ воронки большой огородной лейки помогаютъ лучше всего. Нѣкоторые люди привыкаютъ къ такимъ ваннамъ до того, что они употребляютъ ихъ ежедневно. При этомъ главнымъ условіемъ должно быть то, чтобы испражнения низомъ были исправны, чтобы не брать ваннъ вскорѣ послѣ употребленія пищи, утомленія тѣла движеніемъ, разгоряченія его какими либо причинами.

Лѣчение существенное внутренняго головного лихорадочнаго воспаленія составляетъ предметъ особой важности. Цѣлебное усиліе природы одно не можетъ преодолѣть эту болѣзнь безъ врачебнаго искусства, да и оно должно помогать ему самымъ дѣятельнымъ и осторожнымъ образомъ, съ полнымъ знаніемъ этого дѣла; поэтому должно всегда въ этомъ случаѣ совѣтовать прибѣгать собственно къ врачу, а за неимѣніемъ его по близости слѣдуетъ ограничиться слѣдующими средствами: 1) Прежде всего должно *удалить причину*, явно произведшую болѣзнь, если она продолжается еще свое дѣйствіе. Такъ напр. если еще дѣйствуетъ жаръ солнечный, если вонзены въ голову инородныя тѣла, если черепъ поврежденъ и мозгъ претерпѣваетъ давленіе отъ обломковъ костей и т. п., то всѣ эти причины напередъ должно стараться по возможности удалить; потомъ 2) *назначить кровопусканіе* изъ вены руки, которое по степени развитія болѣзни, по возрасту больного и его тѣлосложенію должно быть въ количествѣ различно. Человѣку крѣпкому, взрослому, въ сильной степени болѣзни выпускается крови до 4-хъ, слабому по тѣлосложенію до 3-хъ, а дѣтямъ отъ 1 до 2 чайныхъ чашекъ въ полусидячемъ положеніи. 3) Независимо отъ кровопусканія изъ вены послѣ него, а иногда вмѣсто его ставятъ *піявицы*, либо *рожки* за ушами, къ затылку и къ вискамъ взрослымъ 12—16—24 и болѣе, а дѣтямъ отъ 4 до 6 и 10-ти. Полезно бываетъ ставить піявицы иногда и къ ноздрямъ; даютъ много вытекать крови, и для этого поддерживаютъ кровотеченіе обмываніемъ теплою водою той части, гдѣ были приставлены піявицы. Большое число піявицъ необходимѣе всего для больныхъ полнокровныхъ, съ явными признаками сильнаго прилива крови къ головѣ, а равно послѣ ушибовъ и поврежденій головы. Въ послѣднемъ случаѣ, если нѣтъ поврежденія черепа, все спасеніе больного зависитъ отъ многократнаго приставленія піявицъ къ головѣ. Обыкновенная польза отъ нихъ оказывается черезъ 12 часовъ. Но если не послѣдуетъ облегченія, то значить, что болѣзнь очень жестока,

упорна, подаетъ мало надежды къ выздоровленію, и что нужно непремѣнно повторить приставленіе пиявицъ и поставить ихъ въ большемъ числѣ, какъ это необходимо здѣсь во многихъ случаяхъ. Если есть рвота у дѣтей, страдающихъ этою болѣзнію, и ихъ рветъ послѣ всякаго питья, лѣкарства, а животикъ тугъ, горячъ, то д-ръ Грумъ совѣтуетъ ставить имъ пиявки и у подложечки, числомъ отъ 2 до 3-хъ. При употребленіи пиявицъ должно обращать вниманіе на то, чтобы не пошелъ больной кровію, что очень возможно, потому что онъ лежитъ безъ памяти и движенія, или ужасно мечется и въ безпокойствѣ. Лучшее всего, тотчасъ по приставленіи пиявицъ, остановить кровь прикладываніемъ ко всѣмъ раночкамъ ветошки, вчетверо сложенной и намазанной саломъ, либо масломъ; а въ случаѣ надобности гораздо полезнѣе повторить приставленіе пиявицъ, оно препятствуетъ приливу крови къ головѣ. Препускаютъ пиявицъ и къ заднему проходу для открытія гемороя, если больной былъ подверженъ оному, но теченіе его почему либо остановилось. При этомъ, равно какъ и во время припущенія пиявокъ къ ноздрямъ, осторожность требуетъ не спускать съ глазу ни одной пиявки, — имѣть въ виду всѣхъ ихъ на перечесть, дабы которая нибудь изъ нихъ не вползла въ ноздри, или въ задній проходъ и не причинила бы вреда, вмѣсто пользы. 4) *Примачиваніе головы холодною водою*, какъ сильное и дѣйствительное средство, наиболѣе способствуетъ, послѣ пиявицъ, къ уничтоженію воспаленія мозга и его оболочекъ. Средство это тѣмъ необходимѣе, чѣмъ форма болѣзни лихорадочнѣе, и если пиявицы мало принесли очевидной пользы. Хотя у насъ бояться холодныхъ примочекъ къ головѣ, даже если предлагаетъ ихъ и врачъ, однако это опасеніе несправедливо. Здѣсь никакъ нельзя простудить головы, какъ обыкновенно думаютъ, а между тѣмъ необходимо въ скорѣйшемъ времени сильными средствами освободить больного отъ опасности. Въ этомъ мнѣніи согласны между собою всѣ врачи, будучи совершенно убѣждены наблюденіями и опытами, говорящими въ ихъ пользу, не менѣе какъ и въ томъ, что полезно прикладывать къ головѣ *толченый ледъ*. Для этого кладутъ его мелкими кусочками въ чистый, свиной или бычачій пузырь такъ, чтобы онъ до половины былъ наполненъ льдомъ и обхватывалъ почти всю верхнюю часть головы. Для лучшей удобности, и чтобы льдины не кололи остроконечными своими краями голову, нужно налить сперва въ этотъ пузырь нѣсколько холодной воды. Для примачиванія же головы налить большую миску холодной воды и положить туда, если есть, нѣсколько кусковъ льда или снѣга, обмачивая въ этой водѣ небольшую салфетку, вчетверо сложенную, и класть ее на всю голову. Миску ставить у постели больного; возобновлять примачиваніе, смотря по обстоятельствамъ, черезъ 5 минутъ или черезъ $\frac{1}{4}$ часа; стараться, чтобы салфетка или полотенце не согрѣвались, и чтобы въ ведрѣ была всегда холодная вода, въ которой должна лежать другая салфетка или полотенце, для того, чтобы ее можно было класть, какъ начнетъ согрѣваться полотенце, ко-

торое лежить на головѣ. Примочка изъ *раствора соли въ уксусъ и воду* употребляется тогда, когда чистая вода не помогаетъ, и особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнь произошла отъ сильнаго ушиба головы, что случается нерѣдко. Въ этомъ обстоятельствѣ дѣлаютъ еще примочку изъ одной части воды, восьмой части *селистры* и $\frac{1}{10}$ ч. *нашатыря* (№ 93). Если врачъ потребуетъ, чтобы посадили больного въ теплую ванну по шею и клали ему на голову холодныя примочки и даже *пузырь со льдомъ*, то совѣтовать роднымъ и близкимъ больного не препятствовать ему въ томъ, потому что это есть дѣйствительное средство противъ болѣзни. Нѣкоторые врачи въ отчаянныхъ случаяхъ льютъ на голову *струю холодной воды*, напр. изъ чайника, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ головы. Поселяне въ подобныхъ случаяхъ прикладываютъ ко лбу *кислую капусту, соленые огурцы, глину съ квасомъ*. Но если форма болѣзни не лихорадочная, и притомъ замѣтно состояніе спазматическое, при которомъ бываетъ скошеніе глазъ, моча водянистая, пульсъ не ровный спазматическій, то эти примочки не только бесполезны, но даже вредны, особенно при воспаленіи головномъ, которое обнаруживается въ видѣ такъ называемой бѣлой горячки. Въ этомъ случаѣ лучшими отгоняющими средствами будутъ примочки, слегка возбуждающія, тепловатыя, именно: *тепловатая вода съ простымъ виномъ и настоемъ мяты*, также *уксусъ съ чаемъ изъ мяты*, либо *мятною водою* и съ *камфоромъ*. 5) *Промывательныя* (вѣстиры): а) сильно-послабляющія, и б) охлаждающія. Для первыхъ берется *поваренная соль*, или *горькая соль* и *мыло*; для вторыхъ *уксусъ*. Если понадобится дѣйствовать вмѣстѣ послабляющимъ и охлаждающимъ образомъ, то къ обыкновенному промывательному изъ овсянаго отвара, меда, масла прибавляютъ отъ 1 до 3 столовыхъ ложекъ ренскаго уксуса, а дѣтямъ отъ $\frac{1}{2}$ до $1\frac{1}{2}$ стол. л. смотря по ихъ возрасту. Промывательныя служатъ не только къ испражненію нечистотъ изъ кишечнаго канала, но и составляютъ средства, отвлекающія раздраженіе отъ мозга и приливы крови отъ головы. Если мало послабить, то прибавить къ промывательному поллота масла, или поваренной, либо горькой соли. Нужно промывательныя повторять, потому что больному дѣлается тѣмъ легче, чѣмъ болѣе выходитъ у него слизистыхъ испражнений изъ кишечнаго канала. Если больной не хочетъ принимать внутрь лѣкарства, то дѣлать небольшія промывательныя съ малымъ количествомъ уксуса (№ 95). 6) *Ножныя ванны* (№№ 83, 84, 96) составляютъ средство очень полезное: они отвлекаютъ кровь отъ головы. 7) *Горчичники* (№№ 88, 89, 80, 90), прикладываемые къ ногамъ больного, особенно къ внутренней сторонѣ бедръ (ляшкамъ), или къ икрамъ, между лопатками, къ шеѣ, если только воспаленіе не въ заднихъ доляхъ мозга, и на спину, производя раздраженіе, красноту, приносятъ большую пользу при лѣченіи этой болѣзни; они тоже отвлекаютъ кровь отъ головы, и для постоянного отвлеченія крови часто прикладываютъ ихъ непрерывно, перемѣняя одно мѣсто на другое: то къ ляшкамъ, то къ икрамъ, а иногда и къ подошвамъ ногъ. Перемѣнять горчичникъ слѣ-

дуетъ тогда, когда онъ высохнетъ: но когда сдѣлается значительная краснота, а нужно дѣлать сильнѣе отвлеченіе крови отъ головы къ низу, то положить еще горчичникъ къ другимъ мѣстамъ ногъ. Величина горчичника должна соответствовать возрасту больного и потребности произвести больше или меньше раздраженія въ кожѣ. Употребляютъ съ пользою *обертываніе ногъ фланелью* или *сукномъ*, намоченнымъ въ горячемъ *щелоки*, или въ *водѣ съ горчицею*. 8) *Нарывной пластырь* (мушка № 58), прежде кровопусканія или извлеченія крови пиявицами и под. не должно прикладывать. Такъ какъ онъ дѣйствуетъ только послѣ нѣсколькихъ часовъ, то полезно его прикладывать или вмѣстѣ съ пиявицами, или предъ приставленіемъ оныхъ, на затылокъ, или позади ушей; величина должна соответствовать возрасту больного. Многіе врачи совѣтуютъ въ отчаянномъ случаѣ покрывать всю верхнюю часть головы нарывнымъ пластыремъ, и это можетъ быть очень полезнымъ средствомъ. По истеченіи 5—8—10 часовъ этотъ пластырь или мушку снять, и если есть уже сильная краснота на кожѣ, или выступили на ней маленькіе пузырьки, то достаточно положить на это мѣсто *свиного сала*, намазаннаго на тряпочкѣ. Часа черезъ три подымется пузырь, по прорѣзаніи котораго и выпущеніи изъ него воды, снять кожицу и на ранку наложить *мелотный пластырь*, или *спускъ* (№ 29) смѣшанный съ малымъ количествомъ мушки. Иногда надобно поддерживать раздраженіе въ томъ мѣстѣ, гдѣ была мушка, до тѣхъ поръ, пока болѣзнь начнетъ видимо уменьшаться. Для этого достаточно иногда класть простое мыло, намазанное на ветошю.

Еслижъ дѣйствіе мушки, поставленной на затылокъ, не принесло очевидной пользы, то прикладывать ее еще или къ плечамъ, или къ икрамъ, для того чтобы еще болѣе отвлечь отъ головы раздраженіе. *Нарывная мазь* (№ 70) приноситъ большую пользу въ этой болѣзни и преимущественно въ формѣ нелихорадочной. Она втирается въ одну или въ обѣ руки, пониже плечъ на 4 поперечныхъ перста, гдѣ обыкновенно прививается дѣтямъ оспа, по $\frac{1}{4}$ ч. чайной ложечки до суха одинъ и два раза въ сутки, до появленія гнойвидныхъ прыщей въ видѣ горошинъ: послѣ чего должно прикладывать или *масло*, или *спускъ* (№ 29). *Замѣч.* При употребленіи средствъ нарывныхъ осторожность требуетъ, чтобы они были прикладываемы: 1) послѣ кровопусканія общаго или мѣстнаго, о чемъ уже было сказано и 2) до появленія припадковъ бѣшенства и сумасбродства. Были примѣры, что безъ этой осторожности нарывныя средства были вредны болѣе, чѣмъ полезны, такъ что больные умирали собственно по причинѣ этой неразборчивости, особенно мужчины. Для внутренняго употребленія полезно назначеніе *селитры*, особенно когда испраженія на низъ обильны и вообще нѣтъ запора; но чаще всего приходится употреблять ее съ лѣкарствами послабляющими и прохлаждающими, какъ то: *съ отваромъ чернослива*, *съ растворомъ кремортартара*, *съ сывороткою*. (№№ 86, 87, 88, 97, 98, 99, 100). *Риверово питье* (№ 62) давать черезъ часъ по столовой ложкѣ также хоро-

ше, какъ средство охлаждающее и разрѣшающее. Въ страданіи головныхъ внутренностей важныя пособія составляютъ слабительныя. Для этого, *масла: деревянное, прованское, миндальное, касторовое* (блещевидное, пальмовое) *съ яичнымъ желткомъ и сахарною водою* (№ 101) служатъ хорошими средствами. Въ случаѣ нужды, т. е. когда рвота не позволяетъ давать внутрь лѣкарства, что бываетъ особенно у дѣтей, или по какой нибудь другой причинѣ, а между тѣмъ вышеозначенныя промывательныя не имѣли своего дѣйствія, или и имѣли, но недостаточно, можно употребить касторовое масло въ этой смѣси *съ промывательнымъ*. Вообще: чѣмъ болѣе слабить въ этой болѣзни, чѣмъ болѣе выходить нечистотъ, тѣмъ лучше для больного. Даже поносъ здѣсь полезенъ.

Въ сильномъ внутреннемъ головномъ лихорадочномъ воспаленіи, происходящемъ непосредственно отъ причинъ, подѣйствовавшихъ на голову, нужны: *кровопусканіе* изъ вены руки, повторительный припускъ *пятами* къ затылку, вискамъ, позади ушей, къ ноздрямъ, потомъ ко всей коротко остриженной головѣ, *холодныя примочки* изъ воды *съ уксусомъ, льдомъ, сырымъ*, или изъ воды *съ нашатыремъ и селитрою* (по 3½ золотника того и другой на фунтъ воды); *обливаніе головы* чрезъ два часа, или и чаще, смотря по тому, какъ скоро опять усилятся жаръ, уменьшившійся послѣ перваго обливанія; *горчичники* къ икрамъ, подшвамъ и *ипанская мушка* на затылокъ; внутрь — *селитра съ кремортартаромъ, горькою солью* (№ 138), *винскимъ питьемъ* (№ 139). Когда воспаленіе ослабѣетъ, что можно узнать изъ того, что лихорадка, краснота лица и глазъ, біеніе шейныхъ артерій уменьшаются, но бредъ и сонливость еще продолжаются, — то нужно ограничиться прохладнымъ содержаніемъ больного (безъ холодныхъ примочекъ), свободнымъ испражненіемъ низомъ, приложеніемъ къ затылку или къ обритой головѣ нарывнаго пластыря, продолженіемъ употребленія горчичниковъ и вообще средствъ отвлекающихъ (о чемъ подробнѣе описано выше, въ лѣченіи существенномъ).

Въ нервномъ внутреннемъ, головномъ, лихорадочномъ воспаленіи, замѣченномъ у пьяницъ, рукоблудовъ (онанистовъ), ипохондриковъ, истеричей, называемомъ бѣлою горячкою, полезны: *умѣренно холодная примочка* къ головѣ, *теплыя ванны, отвлекающія средства*, особенно же *опій*, который дается въ такомъ количествѣ, чтобы онъ произвелъ сонъ, а именно: взрослымъ мужчинамъ по 1—2 грана на пріемъ, а юношамъ и женщинамъ по ½—1 грану чрезъ 1—2 часа, пока больной не заснетъ глубокимъ, тихимъ сномъ, въ которомъ нужно его оставить до пробужденія (величина грана равняется величинѣ коноплянаго зерна).

Если это воспаленіе есть слѣдствіе пьянства и появляется у брѣпыхъ, полнокровныхъ людей, то предъ употребленіемъ опія часто нужно бываетъ *пустить кровь*.

Въ желудочномъ внутреннемъ головномъ воспаленіи отъ раздраженія желчью, глистами. необходимы сначала: *кровопусканіе*, а потомъ

пѣвицы въ головѣ и *холодные примочки*, и затѣмъ уже *разрѣшающія слабительныя* (№№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 30, 33, 34, 63, 65, 72, 74, 75, 97, 98, 100, 138 и 139).

Внутреннее головное, лихорадочное воспаленіе у роженицъ отъ переноса молока требуетъ дѣятельнаго противувоспалительнаго лѣченія, описаннаго выше, въ настоящемъ сильномъ такомъ же воспаленіи, но кромѣ того необходимо нужны: *теплыя припарки* въ грудямъ и животу для привлеченія молока (№№ 23, 26, 27, 28, 54, 55, 56, 80 и 122), *высасываніе молока* изъ грудей, *слабительныя клистиры* (№ 95). Послѣ этого воспаленія часто остается помѣшательство ума.

Внутреннее головное воспаленіе лихорадочное, отъ переноса на мозгъ скарлатины, всегда бываетъ жестокое и требуетъ дѣятельнаго лѣченія вышеописаннаго противувоспалительнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ отвлекающаго, состоящаго преимущественно изъ прикладыванія снаружи раздражающихъ средствъ, какъ-то: *хриновниковъ* (№ 91), *горчичниковъ* (№№ 88, 89 и 90) и *нарывныхъ* (№№ 58, 79, 116 и 117). Оно обыкновенно переходитъ въ водянку мозга и бываетъ очень похоже на дѣтское воспаленіе мозга съ выпотѣніемъ, т. е. дѣтскую водянку мозга.

Внутреннее головное лихорадочное воспаленіе, какъ слѣдствіе остановленныхъ мѣсячныхъ кровей у женщинъ, кромѣ общаго, пріличнаго этому случаю лѣченія, требуетъ *кровопусканія изъ вены ноги, припуска пѣвицъ: къ дѣтороднымъ частямъ, къ заднему проходу; припарокъ* въ нижней части живота; *мягчительныхъ клистировъ* изъ отвара овса, льнянаго сѣмени, однихъ, либо для усиленія въ соединеніи *съ масломъ, медомъ, солью, простою и горькою* (№ 95); *ножныхъ ваннъ съ золою и горчицею* (№№ 83 и 84); *горчичниковъ* (№№ 88, 89 и 90) въ верхней и вертлужной частямъ бедеръ, въ поясицѣ.

Таковое же воспаленіе у дѣтей, отъ остановившагося кровотоčenія изъ носа, скорѣе всего уступаетъ *припуску пѣвицъ къ ноздрямъ*.

Внутреннее спинное воспаленіе.

Опредѣленіе. Внутреннее спинное воспаленіе есть воспаленіе смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ пасочное), обнаруживающееся иногда лихорадочными движеніями, и въ этомъ случаѣ оно бываетъ болѣе кровяное; когда же лихорадочныхъ движеній нѣтъ, то оно пасочное.

Раздѣленіе. Оно бываетъ или *острое*, — *лихорадочное*, или *тихое*, медленное — *не лихорадочное*.

Признаки. Боль на одномъ какомъ либо мѣстѣ спины, притомъ или постоянная, или же проходящая и потомъ опять возвращающаяся на то же мѣсто; по прошествіи нѣсколькихъ дней или же недѣль и даже мѣсяцевъ, у больнаго замѣчается онѣмѣніе рукъ, а чаще ногъ. Подобное же онѣмѣніе, или параличъ, замѣчается иногда и во внутреннихъ органахъ, смотря по мѣсту воспаленнаго спиннаго мозга. При воспале-

нія этого мозга противъ шеи и груди бываетъ трудное глотаніе, одышка, сухой кашель, усиленное біеніе сердца, обмороки, а при воспаленіи спиннаго мозга противъ брюха и въ поясницѣ — отрыжки, рвота, тяжесть въ желудкѣ, запоръ кала и мочи, или же непроизвольное ихъ испражненіе. По этому воспаленіе спиннаго мозга можетъ быть причиною множества болѣзней, какъ-то: паралича, сухотки, запора, изнурительнаго поноса, задержанія и недержанія мочи, удушья, кашля и пр.

Распознаваніе. Для вѣрнѣйшаго распознаванія воспаленія спиннаго мозга, нужно всю спину, начиная отъ затылка до крестца, изслѣдовать пальцами, прижимая позвонки съ боковъ и посрединѣ, причемъ отъ давленія боль усилится на мѣстѣ воспаленія спиннаго мозга; тоже самое можно замѣтить, если по всей спинѣ тихо проводить губку, намоченную не слишкомъ горячею водою, и при этомъ также боль въ воспаленномъ мѣстѣ дѣлается примѣтною чрезъ прикосновеніе съ губкою.

Причины. Причиною спиннаго воспаленія бываетъ: неосторожное поднятіе дѣтей за голову, ушибы въ спину, упаденія на спину, ревматизмъ, переносы на спину ревматизма, подагры, разныхъ сыпей, почечуйные приливы крови и проч.

Предсказаніе. Вообще это воспаленіе довольно продолжительно. Острое — лихорадочное скорѣе обанчивается, чѣмъ тихое — не лихорадочное, которое продолжается не только недѣли, но и мѣсяцы, и даже годы.

Исходъ. Острое — *лихорадочное*, большею частію *разрѣшается*; а тихое — *не лихорадочное*, большею частію, *переходитъ* въ выпотѣніе сыворотки (*водянки* позвоночнаго канала), *нагноеніе*, *костюду* позвонковъ, *срастеніе* послѣднихъ и негибкость спины.

Лѣченіе: діететическое одинаково, какъ и въ прочихъ воспаленіяхъ; а существенное особенно требуетъ: повторительнаго припуска пиваго въ воспаленному мѣсту, употребленія слабительныхъ (№№ 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 98, 99, 100, 101, 138 и 139), и повторительнаго приложенія нарывнаго пластыря (№ 58), долго поддерживаемаго въ нагноеніи.

Жаба зѣва.

Опредѣленіе. Жаба зѣва есть также смѣшанное воспаленіе глотки, гортани и миндалевидныхъ желѣзъ, обнаруживающееся опухолью и краснотою этихъ частей, болью при глотаніи и бѣльшимъ, или меньшимъ измѣненіемъ голоса.

Раздѣленіе. Жаба зѣва бываетъ: *лихорадочная*, сопровождаемая горячками: или воспалительною, или воспалительно-мокротною, или мокротно-гнилостною, и *нелихорадочная*, которая отличается отъ лихорадочной отсутствіемъ горячечнаго состоянія, гораздо меньшимъ развитіемъ воспаленія относительно его степени, а въ пораженныхъ

частяхъ не только не возвышеннымъ, но еще уменьшеннымъ плотнотвореніемъ.

Признаки жабы лихорадочной, сопровождаемой горячками, или воспалительною, или мокротно-гнилостною: трудность глотанія, боль въ зѣвѣ и головѣ, краснота, опухоль и жаръ во рту. Потомъ бѣглыя лихорадочныя движенія, за которыми слѣдуетъ ознобъ, смѣняемый жаромъ, который чѣмъ болѣе продолжается, тѣмъ мѣстные воспалительные признаки дѣлаются сильнѣе; но рѣдко жаръ непрерывно продолжается долѣе сутокъ, обыкновенно онъ опять смѣняется ознобомъ, и въ этомъ случаѣ мѣстные признаки воспаления, обыкновенно, остаются ограниченными, голосъ измѣняется, глотаніе теплыхъ жидкостей бываетъ довольно свободно, и подчелюстные желѣзы мало опухаютъ; напротивъ, если жаръ будетъ непрерывно продолжаться, то воспаление развивается въ высшую степень и въ силѣ, и въ пространствѣ, появляется бредъ, дыханіе дѣлается хриплымъ, лицо багровѣетъ, подчелюстные желѣзы обѣихъ сторонъ сильно опухаютъ, а иногда воспаляются даже околоушные желѣзы; дыханіе при этомъ очень затрудняется, рѣчь дѣлается носовою и невнятною. Въ ночи всѣ признаки усиливаются. Тутъ нужна врачебная помощь, безъ которой дѣлается тихій бредъ, сопровождающійся судорожнымъ подергиваніемъ мышцъ. За этимъ, если болѣзнь, или искусственно, или самою природою, производящую иногда сильныя кровотоčenія изъ носа, какъ цѣлебныя дѣйствія, не будетъ ослаблена, больные умираютъ въ безчувствіи или отъ изліянія крови въ существо мозга, или отъ воспаления его, или отъ гнилой горячки. Въ жабѣ воспалительно-мокротной мѣстные признаки развиваются въ меньшей степени, притомъ отдѣленіе изъ слизистой ткани, выстилающей зѣвъ, не только не уменьшено, но еще увеличено; самая горячка бываетъ гораздо слабѣе.

Кромѣ того жаба бываетъ *простая* (безъ прыщей и язвъ) и *язвенно-гнилостная* (съ прыщами и язвами). Простая подраздѣляется на: *первообразную*, происходящую непосредственно отъ вліянія внѣшней, производящей причины, и *сочувственную*, происходящую въ слѣдствіе какого-либо первоначальнаго страданія въ брюшной системѣ. *Язвенная же* бываетъ или *разсыпная* (спорадическая) въ народѣ всюду и вездѣ; люди подвергаются ей изрѣдка и поодиначкѣ, отъ своихъ частныхъ причинъ; или *повальная* (эпидемическая), свирѣпствующая въ народѣ и поражающая въ одно и тоже время не одного и не двухъ, а большую часть людей.

Признаки жабы язвенной отличаются въ теченіи своемъ отъ признаковъ жабы воспалительно-мокротной тѣмъ, что на 3 или на 4 день болѣзни появляются на воспаленныхъ мѣстахъ прыщи, иногда распространяющіеся по всей полости рта и скоро переходящіе въ омертвѣніе. *Язвенная жаба* начинается предвозвѣстниками: чувствомъ слабости, болью и тяжестью головы, блѣдностью лица, безпокойствомъ, потерю вкуса и позыва на пищу. Потомъ появляются непостоянныя лихорадочныя дви-

женія, чрезъ 3 или 4 часа переходящія въ состояніе горячки, обнаруживающейся малымъ, не ровнымъ, иногда перемежающимся жглобіеніемъ и небольшимъ жаромъ кожи, которая вскорѣ послѣ того дѣлается вялою, моча блѣдною и мутноватою, нерѣдко появляется слизистый поносъ остротнаго свойства, отчего при испражненіи больные чувствуютъ сильное раздраженіе въ заднемъ проходѣ; опухоль, краснота и жаръ въ зѣвѣ продолжаются, глотаніе дѣлается затруднительнымъ, болѣзненнымъ, голосъ сиплый; языкъ покрывается мокротою, похожею на перловую слизь, или нѣсколько желтоватою. Среди дня болѣзнь дѣлается слабѣе, а къ ночи до самаго поздняго утра опять ожесточается и продолжается такимъ образомъ до 5—7—12 дня. Между тѣмъ омертвѣлая части скоро покрываются веществомъ, похожимъ на струппа, изъ подъ которыхъ вытекаетъ клейкая, буровато-темная мокрота, извергаемая при кашлѣ въ большомъ количествѣ. Съ усиленіемъ мѣстнаго омертвѣнія, и притомъ если не будетъ подана помощь, горячка принимаетъ характеръ гниlostный, и больные впадаютъ въ безчувственность; зѣвъ представляется покрытымъ струппами, содержащими мокроту темновато-черную. Если же омертвѣніе не столь сильно, то и самая горячка удерживаетъ характеръ воспалительно-гниlostный; въ этомъ случаѣ струппа обыкновенно послѣ 3-хъ дней отпадаютъ и оставляютъ нечистыя язвы, покрытыя желтоватою мокротою, и болѣзнь, при надлежащемъ пособіи и благопріятныхъ условіяхъ, оканчивается выздоровленіемъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) вообще не замѣтны, развѣ только принять особенную врожденную раздражительность органовъ, пораженныхъ жабою. Но въ частности къ жабѣ мокротной предрасполагаетъ флегматическое тѣлосложеніе, ослизеніе тѣла и вообще мокротное состояніе, такъ что при малѣйшемъ вліяніи холода, особенно сыраго, тотчасъ развивается жаба. Есть люди, которые, какъ въ началѣ весны, такъ и осени, въ сырую погоду, постоянно страдаютъ жабою; оттого и называютъ ее въ этомъ случаѣ привычною. Воспалительная жаба, говорятъ Буханъ, можетъ приключиться и отъ опущенія кровопусканія, или другаго какого нибудь привычнаго выпораживанія.

Дѣтей у которыхъ исключительно почти бываетъ жаба язвенная, полагаютъ къ этой болѣзни слѣдующія двѣ причины: 1) избыточная, сгущаемая у нихъ пасока (лимфа) и 2) нѣжность и дѣятельность въ отроческомъ и въ началѣ юношескаго возраста органовъ, служащихъ для образованія голоса. Различіе язвенной жабы у дѣтей отъ жабы взрослыхъ состоитъ въ томъ, что у первыхъ изъязвленіе бываетъ глубокое и находится постоянная склонность къ гниlostному состоянію, между тѣмъ какъ у взрослыхъ изъязвленіе бываетъ болѣе поверхностное.

Причины вѣшнія (производящія) въ воспалительной жабѣ: сырой холодъ, особенно непосредственное дѣйствіе его на шею, холодное питье, особенно сторяча; мокрыя ноги, также мокрыя платья, лежаніе на сырой землѣ, на сквозномъ вѣтрѣ, или возлѣ отвореннаго

обна, лежаніе на сырой постели, житіе въ нововыстроенныхъ покоехъ; только что вымытыя еще не высохшія комнаты составляютъ также причины, которыя могутъ подать поводъ къ этой болѣзни остановкою испарины въ слѣдствіе простуды. Острыя вещества, непосредственно дѣйствующія на зѣвъ и окружающія части, суть: перецъ, имбирь, корица, гвоздика, употребляемая неосторожно, особливо если они еще приправлены лимонною кислотою. Остановившіяся въ горлѣ косточки, острые, металлические, или минеральные пары, распространяющіеся въ воздухъ, напр. мышьяковые, сурьмяные, известковые и т. п., равно все, что можетъ напрягать и раздражать мышцы горла, напр. высокое пѣніе, продолжительное чтеніе, ранній выходъ утромъ на росу послѣ ночныхъ кутежей, кантованій и лигованій за бутылками. Жаба мокротная происходитъ отъ дѣйствія сыраго холода, свойственнаго временамъ: весеннему, осеннему и большому оттепелямъ; причины эти такъ сильны, что производятъ мокротную жабу безъ всякаго къ ней предрасположенія. Причина, производящая язвенную жабу, есть тотъ же сырой, холодноватый воздухъ, но наполненный гнилыми испареніями и другими веществами, изслѣдованіе которыхъ остается невозможнымъ до сихъ поръ; большею частію этотъ воздухъ содержитъ въ себѣ азотъ; равно испортившіеся съѣстные припасы, неопрятность и т. п. Отъ вліянія такого воздуха, какъ отъ заразы, язвенная жаба свирѣпствуетъ часто повально-эпидемически и бываетъ, замѣтно, прилипчива. Сырники, пѣвцы, чтецы на распѣвъ, діаконы, проповѣдники, земледѣльцы въ зимнее время особенно подвержены бываютъ жабѣ.

Сущность жабы воспалительной состоитъ въ возвышенной раздражительности и чувственности и увеличенной плототворительности пораженныхъ частей при совершенномъ прекращеніи изъ нихъ отдѣленія. Сущность жабы мокротной относительно раздражительности и плототворительности состоитъ въ низшей степени жабы воспалительной, только въ пораженныхъ ею частяхъ отдѣленіе не только уменьшено, но увеличено. Жаба язвенная въ сущности своей отличается отъ мокротной тѣмъ только, что въ ней пораженные части тотчасъ приходятъ въ разрушеніе, и умноженное отдѣленіе изъ нихъ измѣнено въ своемъ качествѣ. Сверхъ того къ сущности сочувственной жабы должно отнести и то первоначальное страданіе брюшной системы, отъ которой она зависить.

Мѣсто пребываніемъ, или гнѣздомъ этой болѣзни можетъ быть каждая изъ тѣхъ частей, которыя, вмѣстѣ взятая, составляютъ пищепріемное горло и дыхательное горло, или гортань, какъ-то: мяготъ неба, язычекъ, миндалевидныя желѣзы, отверстіе дыхательнаго горла, покрывша или занавѣсь его, самое дыхательное горло, корень языка, пищепріемное горло и проч. Иногда жаба поражаетъ одну только часть изъ этихъ, но чаще многія вдругъ; оттого произошли различные виды воспалительной жабы.

Распознаваніе въ жабѣ воспалительной и мокротной, по дан-

нымъ признакамъ, *легко*; жаба мокротная легко отличается отъ катарра возвышенною плототворительностію, припуханіемъ пораженныхъ частей, чего нѣтъ въ катаррѣ. *Язвенная* жаба до появленія язвенокъ очень *трудно* отличается отъ мокротной. Впрочемъ, если страждетъ дитя, и притомъ если жаба развилась при условіяхъ вышеозначенныхъ и появляется вдругъ у многихъ дѣтей, то и до появленія язвенокъ не только можно подозрѣвать, но и положительно заключить при самомъ началѣ болѣзни, что жаба будетъ язвенная. Не останется никакого сомнѣнія въ распознаваніи, если язвенная жаба въ самомъ началѣ сопровождается слѣдующими признаками: блѣдностію лица, мутностію глазъ, потливостію и охлажденіемъ кожи, мутною мочею, перловою мокротою на языкѣ и прочими припадками, свойственными горячкѣ нервногнилостной, хотя бы страждущій жабою былъ юноша. Жаба сочувственная отъ первообразной отличается точнымъ опредѣленіемъ причинъ той и другой. Жаба язвенная, бывающая въ скарлатинѣ и оспѣ, отличается отъ простой язвенной жабы: 1) изслѣдованіемъ развитія болѣзни; 2) тѣмъ, что изъязвленія въ жабѣ скарлатинной и оспенной ограничиваются однимъ зѣвомъ и переходятъ въ настоящее омертвѣніе, между тѣмъ какъ въ простой язвенной жабѣ изъязвленія разсѣваются по всей полости рта и переходятъ въ растворительное разрушеніе, — тотъ же антоновъ огонь, но безъ черноты. Во всякомъ случаѣ при распознаваніи этой болѣзни, какъ относительно ея мѣстопробыванія, такъ и относительно существенной разности ея въ разныхъ видоизмѣненіяхъ, особенно красноты, увеличенной плототворительности въ видѣ припуханія, язвенности, мокротъ и т. п., должно всегда, *открывъ ротъ больному, прижать концемъ ложки корень языка и, взявъ свѣчку, разсматривать и проникать, сколь возможно далѣе въ полость зѣва и горла*; при этомъ признаки прыщей и язвенности, красноты и опухлости пораженныхъ частей бываютъ видимы. Но если опухоль при этомъ разсматриваніи бываетъ не видна, то это обстоятельство даетъ понятіе объ опасности и смертельности этой болѣзни. Жаба не лихорадочная распознается отъ венерической болѣзни въ полости зѣва тѣмъ, что въ послѣдней язвы бываютъ очертаніемъ круглыя, съ гноевиднымъ, на подобіе сала, дномъ, безъ предшествовавшаго нарыва по причинѣ запущенія или неправильнаго лѣченія этой болѣзни на дѣтородныхъ частяхъ и проч. (см. объ ней особо).

Предсказаніе въ жабѣ зависитъ отъ исходовъ cadaго ея вида, на которые должно болѣе всего обращать вниманіе.

Исходы жабы по разности ея видовъ различны: жаба воспалительная, большею частію, или искусствомъ, состоящимъ по врачебной помощи, или цѣлебнымъ дѣйствіемъ самой природы, переходитъ въ разрѣшеніе. Въ этомъ случаѣ носовое кровотеченіе служитъ благоприятнымъ признакомъ въ этой болѣзни. Нерѣдко однакожь переходитъ эта болѣзнь и въ нагноеніе, которое, если составляетъ видимую опухоль въ полости зѣва, затрудняетъ только глотаніе, производимое съ сильною

болью, а не дыхание, остающееся еще свободнымъ, есть также хороший признакъ, что болѣзнь благополучно кончится чрезъ нагноеніе и истеченіе болѣзненной матеріи изъ опухоли или нарыва наружу вонъ изъ тѣла. Недурно бываетъ и то, когда въ этой болѣзни покажется опухоль на затылкѣ, или подъ подбородкомъ, или на груди, словомъ выйдетъ наружу. Это означаетъ, что натура сама цѣлебнымъ своимъ, дѣйствіемъ хочетъ вывести болѣзнь изъ тѣла чрезъ нагноеніе. Но если эта опухоль въ такомъ случаѣ скроется, пропадетъ почему либо и уйдетъ внутрь, — въ грудь, то это очень опасно и угрожаетъ смертію, тѣмъ болѣе если больной при этомъ неимѣетъ никакихъ изверженій мокроты. Равнымъ образомъ, если воспаление, находясь въ самомъ зѣвѣ, перейдетъ въ нагноеніе и образуетъ большой нарывъ, что бываетъ нерѣдко, то онъ можетъ быть опасенъ для жизни не только тѣмъ, что, прорываясь неожиданно, изливаетъ гной въ дыхательные органы, отчего больной скоропостижно умираетъ съ признаками задушенія, каковы суть: пѣна во рту, языкъ толстый, лицо блѣдное, искаженное, но и тѣмъ, что жаба эта, перешедшая въ нагноеніе, нерѣдко переходитъ въ гортанную чахотку; оттого больные, одержимые жабою, имѣющіе сухое горло съ перхотою безъ мокротъ, либо и съ мокротой, но въ маломъ количествѣ, считаются въ опасности. Если будутъ воспалены миндалевидныя желѣзы, что чаще случается у дѣтей, въ такомъ случаѣ жаба переходитъ въ затвердѣніе. Въ омертвѣніе воспалительная жаба не переходитъ, развѣ въ рѣдкихъ случаяхъ и при самыхъ неблагоприятныхъ внѣшнихъ условіяхъ. Воспалительно-мокротная жаба также оканчивается разрѣшеніемъ, но часто переходитъ въ нагноительное изъязвленіе, или раствореніе; впрочемъ переходъ этотъ не опасенъ; язвы легко заживляются. Исходъ жабы язвенной постоянно есть омертвѣніе, которое при горячкѣ, большею частію, оканчивается смертію.

Лѣчение діетическое въ этой болѣзни требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Все, подверженныя воспаленіямъ горла, въ сохраненіе себя отъ онаго, должны жить умеренно и осторожно, — избѣгать случаевъ къ простудѣ, воздерживаться отъ употребленія острыхъ, раздражающихъ веществъ, какъ то: перца, гвоздики, корицы, имбиря и т. п.* Также отъ сильнаго тѣлодвиженія, которое, умножая быстроту и силу крови, особенно располагаетъ къ воспаленію горла, тѣмъ болѣе, если кто вскорѣ потомъ пьетъ холодные напитки, или вдругъ выходитъ на холодъ, тогда какъ напередъ слѣдуетъ ему прохладить себя и не иначе, какъ постепенно и исподоволь, приступать къ тому и другому. 2) *Шею держать потеплѣе* противъ обыкновеннаго; для этого полезно носить на ней кусокъ фланели, или сукна, либо шерстяной платокъ на подобіе галстука, или сапоги носить теплые, или фланелевый камзолъ — фуфайку. Эти средства, повидимому малозначащія, производятъ превосходныя дѣйствія. Конечно, опасно ихъ оставить, если сдѣлается къ нимъ привычка, но невыгоды оттого предпочтительнѣе должны быть въ сравненіи съ опасностями отъ пренебре-

женія оныхъ. 3) Въ случаѣ неудобства, или нежеланія соблюдать эти предосторожности, почаше *прибѣгать къ прочищеніямъ пищеварительнаго канала* и другимъ выпораживаніямъ, дабы выгнать излишество соковъ. Были случаи, что фонтанель, открытая на рукѣ, предохраняла отъ жабы, при расположеніи къ ней. 4) Одержимые воспалительною жабою должны *быть въ покое*, потому что сильныя движенія, какъ души, такъ и тѣла, равно вредны; содержать себя въ теплотѣ, располагающей къ испаринѣ, говорить только въ полголоса; во время лежанія въ постели голова ихъ должна быть приподнята выше обыкновеннаго. 5) *Шсю обвернуть* фланелью, сложенною въ нѣсколько рядовъ, либо *шерстянымъ чулкомъ*, который слѣдуетъ оставлять на всю ночь. Это средство до того полезно, что болѣзнь нерѣдко отъ него одного, какъ бы очарованіемъ, облегчается, а простая нелихорадочная жаба совсѣмъ проходитъ, и потому никогда его въ этомъ случаѣ не должно упускать изъ вида. По снятіи съ шеи чулка, покрыть её платкомъ, или кускомъ фланели, пока воспаленіе совсѣмъ пройдетъ. 6) Пищу употреблять легкую и въ маломъ количествѣ; всего лучше мягчительное горячее варено, какъ напр. овсяная каша съ масломъ *); питье, напротивъ, въ большемъ количествѣ, но разжижающее, охлаждающее, кислое, напр. воду, сыворотку, ячный отваръ съ клюквеннымъ морсомъ, или брусничнымъ, или смородиновымъ, подобно какъ и въ другихъ воспалительныхъ болѣзняхъ. 7) *Въ жабу язвенной съ омертвѣніемъ больной* еще болѣе *должны быть* въ покой и большую часть времени *въ постели*, потому что, стоя, будетъ подвергаться частымъ обморокамъ; *пищу употребляютъ укрѣпляющую*, восстанавливающую силы, напр. кашу, или похлѣбку мясную, студень изъ мяса, разварную говядину, или телятину и т. п. *питье противодѣйствующее гнилости* напр. хорошій квасъ, сваренный съ хлѣбомъ, тонкое яровое пиво, вода и сыворотка съ краснымъ виномъ и т. п. Для сырниковъ, пѣвцовъ, діаконъ и проповѣдниковъ, равно и для земледѣльцевъ изложены сверхъ того особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. особо).

Лѣчение существенное въ разныхъ видахъ жабы зѣва должно быть сообразно съ внутреннимъ свойствомъ и степенью воспаления, со-

*) 1832 года весною въ Царевкококтайскѣ, захватъ ко мнѣ офицеръ Д—во, обзрѣвавшій корабельныя рощи, и просилъ меня сказать ему, можетъ ли онъ живымъ доѣхать до Казани (130 верстъ) съ объясненіемъ, что уже болѣе недѣль, какъ онъ ничего не ѣлъ и ѣсть не можетъ отъ сильной боли въ горлѣ. Онъ былъ худъ, блѣденъ, изнуренъ и слабъ до того, что его водили подъ руки. При осмотрѣ мною его зѣва я замѣтилъ въ немъ сильный нарывъ. Обвертѣвъ его шею шерстянымъ шарфомъ, предложилъ ему покушать горячаго молочнаго супа изъ маннхъ крупъ. Едва онъ пропустилъ въ себя двѣ столовыя ложки этой пищи, какъ почувствовалъ, что нарывъ у него въ зѣвѣ прорвался. Когда онъ нагнулся, и матеріи вышло очень много, ему стало свободнѣе. На дорогу слѣзано ему питье изъ брусничнаго моченія, и онъ прѣѣхалъ въ Казань совсѣмъ почти здоровый.

отвѣтственное усилюмъ самой природы организма къ освобожденію себя отъ нея, потому что жаба, говоритъ Буханъ, въ высочайшей степени воспалительная, часто есть не что иное, какъ сильное стремленіе природы найти въ горлѣ проходъ для освобожденія легкихъ и окололежащихъ частей отъ засоренія; слѣдовательно необходимо нужно при этомъ соображеніе особаго рода, и важность пораженного мѣста требуетъ полнаго знанія дѣла въ лѣченіи этой болѣзни, особенно въ назначеніи кровопусканія и средствъ слабительныхъ; для этого должно всегда совѣтовать обращаться за пособіемъ къ врачу, по немнѣнію же его вблизи можно ограничиться съ успѣхомъ слѣдующимъ лѣченіемъ.

Въ жабѣ простой, не лихорадочной (безъ горячечныхъ припадковъ) шею должно *натирать* утромъ и вечеромъ *деревянными масломъ* однимъ, либо съ примѣсью *камфоры* (№ 71.) или *летучею мазью* (№ 76), *обвязать шею шерстяными чулкомъ, натертымъ сухою камфорой*, или однимъ (по замѣчанію простаго народа чулокъ долженъ быть съ лѣвой ноги). Для перемѣны можно прикладывать вокругъ шеи *ветошку, намазанную мыломъ*. Простолюдины въ этомъ случаѣ натираютъ шею и *дегтемъ, и медомъ*. Если есть кашель, вытереть грудь *свѣчнымъ саломъ*. Въ случаѣ боли въ горлѣ и трудности глотанія употребить *полосканье* (№ 102). Если боль и трудность глотанія не проходятъ отъ этихъ средствъ, то употребить *другое* (№ 103, 104). Еще сильнѣе дѣйствуютъ *полосканья* (№№ 105, 104 и 141). Для внутренняго употребленія полезны: *сбитень*, либо легкій *настой изъ липовыхъ цвѣтковъ, шалфея съ молокомъ и медомъ*. Если замѣчается расстройство пищеваренія; то дать *слабительное изъ кастороваго масла* (№ 101), *толокна* (№ 72), *огуречнаго разсола* (№. 7), *ревеня*, или его *сиропа*. Первое и послѣднее средство имѣютъ особенное преимущество для дѣтей въ этой болѣзни.

Въ жабѣ лихорадочной (съ горячечными припадками) часто необходимо нужны сперва *пѣвицы* къ шеѣ, приставленіе которыхъ иногда повторяется два и три раза, смотря по степени воспаленія; потомъ *мушка* на затылокъ (№ 58); по приставленіи пѣвокъ можно вскорѣ намазать тряпку *казанскимъ мыломъ* и приложить ее къ шеѣ. При сильной боли горла сдѣлать *припарку изъ льнянаго сѣмени*, сваренаго съ *молокомъ и масломъ* (№ 106). *Пометы* домашнихъ животныхъ, какъ то: *коровій, лошадинъ и псовый*, употребляемые простымъ народомъ для припарокъ, равно какъ и *ласточкины гнѣзда*, приносятъ очевидную пользу, но не болѣе, какъ и *припарка изъ мякиша бѣлаго хлѣба*, сваренаго съ молокомъ (№ 26). Мягчительныя *полосканья изъ сѣмянъ льняныхъ*, приготовляемыя и изъ отвара *вишневыхъ ягодъ* (№ 107) приносятся для горла большую пользу тогда особенно, когда воспаленіе въ горлѣ начало переходить въ нагноеніе — въ видимый, болѣе или менѣе, нарывъ въ горлѣ въ видѣ опухоли, не уступающій другимъ средствамъ; въ этомъ случаѣ очень полезенъ *паръ теплой воды*, вдыхаемый боль-

нымъ посредствомъ большой воронки, причемъ хорошо пить больному *вареное молоко, теплую воду, или теплую смесь молока и воды*, и постоянно *держатъ во рту винную лгду*; въ противномъ же случаѣ, т. е. когда воспаленіе остается воспаленіемъ и въ нагноеніе не переходитъ, опухоли въ видѣ нарыва въ зѣвѣ незамѣтно и не предвидится, то лучше употреблять полосканья, показанныя въ простой жабѣ (№№ 102, 103, 104, 105.) Для внутренняго употребленія сперва нуженъ отваръ изъ ячменнаго сѣмени съ патокой и небольшимъ количествомъ *селитры* (№ 108); или *молоко—миндальное, конопляное, маковое, и съ селитрою* (№ 87). *Слабительнаго* изъ *кастороваго масла* (№ 101), *толокна* (№ 72) и здѣсь необходимо; а *промывательное* еще лучше (№ 95).

Въ воспалительно-мокротной жабѣ все вниманіе должно обращать на умноженное отдѣленіе слизи и наклонность воспаленія къ изъязвленію. Въ этомъ случаѣ помогаютъ средства возбуждающія, вяжущія въ полосканьяхъ (№№ 102, 103, 104, 105), особенно полосканье изъ *ромашки съ шалфеемъ* и *бурю* (№. 109) составляетъ одно изъ лучшихъ средствъ, когда въ воспаленіи замѣтна наклонность къ изъязвленію. *Хмелевыя пилюли* употребляемыя народомъ для припарокъ и для полосканья въ отварѣ, служатъ также полезнѣйшимъ средствомъ, особенно съ ромашкою въ формѣ паровъ (№ 110) вдыхаемыхъ больнымъ, у котораго воспалена собственно гортань. Кромѣ того полезно въ этомъ случаѣ дышать бальзамическими средствами: *бургундскою смолою, вирономъ, каннфолью* и т. п. Пары приготавливаются такъ: смола кладется на желѣзную плитку, подъ дно которой ставится свѣча; смола, испаряясь, даетъ пары для вдыханія страдающему эту болѣзнь.

Въ жабѣ язвенной спасительное лѣкарство состоитъ въ томъ, чтобъ почаще впускать въ ротъ, посредствомъ опрокинутой большой воронки, *теплый паръ смеси*, составляемой изъ *уксуса, мирры и меда* (№ 111). Тѣло обтирается уксусомъ съ виномъ отъ 2 до 4 разъ въ день. При горячкѣ воспалительнаго свойства въ этой жабѣ дается внутрь для испарины чай изъ *цветовъ липы, ромашки, бузины, либо зеленого чая*, или *благословеннаго волчца* по нѣскольбу разъ въ день, и въ то же время кладется *нарывной пластырь* (№ 58), или за ушами, или къ затылку, или на грудь, — который должно держать 12—24 часовъ. Если больной слабѣетъ, и горячка, видимо, изъ воспалительной переходитъ въ гнилостно-нервную, или уже перешла, то должно давать внутрь въ отварѣ *корень валерианы, змѣевика* (№№ 35, 36, 37, 38, 39, 40) *баранника* (№№ 41, 42), *корень дягиля* (№ 67), *кору ивы* (№№ 43, 44), *дуба* (№№ 45, 46), *хины* (№№ 47, 48), одни и съ *камфорою*. Эти отвары можно употреблять и для полосканья рта и зѣва, если язвенность переходитъ, или уже перешла въ омертвѣніе. Въ случаѣ засоренія желудка, какъ напр. при тошнотѣ или позывѣ къ рвотѣ дается $\frac{1}{4}$ золотника рвотнаго корня (*ипекакуаны*) въ порошокъ за одинъ приемъ съ теплою водою, которою слѣдуетъ запивать до тѣхъ поръ, пока воспослѣдуетъ рвота.

Замѣч. Дѣтямъ, вмѣсто полосканья, лучше дѣлать сиринцованье, во время котораго дитя должно лежать на боку; этимъ предотвращается проглатываніе дитятею жидкости. При лѣченіи выше означенныхъ поселенъ и другихъ нужно соображаться сверхъ того съ особыми, изложенными для нихъ правилами въ росписаніи поселенъ по ихъ быту и званію (см. особо).

Воспаленіе дыхательнаго горла, перепончатая жаба, крупъ.

Определеніе. Воспаленіе дыхательнаго горла есть смѣшанное (бровяное и пасочное) воспаленіе внутренней его поверхности, обнаруживающееся въ самомъ началѣ кашлемъ мокротнымъ и измѣненіемъ голоса, дѣлающагося похожимъ на крикъ молодого пѣтуха, или на визжаніе щенка, отъ образующейся въ страждущемъ мѣстѣ перепонки, которая быстро толстѣетъ и все болѣе и болѣе уменьшаетъ въ гортани пространство для прохода воздуха изъ рта въ легкія и обратно, такъ что пространство это наконецъ становится до того тѣснымъ, что воздухъ уже почти не проникаетъ въ гортань, и больной умираетъ отъ удушья.

Признаки. Сперва появляется мокротный кашель съ лихорадочными предвѣстниками, который, усиливаясь, дѣлается похожимъ на коклюшный; лихорадочные предвѣстники при этомъ переходятъ прямо въ періодъ жара, сопровождаемого, большею частію, потомъ, или всеобщимъ, или только мѣстнымъ, особенно головы и груди; тутъ голосъ измѣняется, кашель дѣлается почти непрерывнымъ, мокрота отдѣляется также непрерывно или въ видѣ пузырей, наполняющихъ весь ротъ и выскакивающихъ изъ него, или въ видѣ тонкихъ тянущихся нитей; лицо надувается, глаза краснѣютъ, слезятся, появляется сонливость, потъ на головѣ и груди дѣлается проливнымъ, непрерывнымъ, дыханіе время отъ времени затрудняется, такъ что больные иначе не могутъ дышать, какъ завернувъ назадъ голову и вытянувъ грудь. Въ ночи болѣзнь ожесточается, и задушеніе угрожаетъ опасностію жизни болѣе въ ночное время. Голосъ, смотря по разности мѣстопробыванія воспаленія, измѣняется различно. Такъ, если воспаленіе въ верхней части дыхательнаго горла — у гортани, то голосъ дѣлается визгливымъ, подобнымъ пѣтушьему, или щенячьему; если воспаленіе въ срединѣ дыхательнаго горла, то голосъ бываетъ густой, похожій на теноръ-басъ; а если воспаляются вѣтви дыхательнаго горла, то голосъ бываетъ очень низкимъ и хриплымъ; такъ небольшое дитя говоритъ и кашляетъ басомъ. Въ это время появляется нерѣдко опухоль подчелюстной желѣзы одной, или обѣихъ сторонъ, быстро возвышающаяся, а иногда вмѣсто опухоли подчелюстныхъ желѣзъ развивается околуюшница. Въ слѣдъ за симъ глаза дѣлаются мутными, лицо синѣетъ. При

этихъ признакахъ болѣзнь въ теченіе одного или двухъ часовъ умираютъ. Если болѣзнь не такъ сильна, если замѣчается только небольшая опухоль слезанныхъ желѣзъ, или даже совсѣмъ ея не замѣчается, если приливъ къ головѣ также небольшой, то болѣзнь, пользуясь хорошими силами, остаются на ногахъ нерѣдко въ продолженіе двухъ дней, потомъ впадаютъ въ сонливость, дыханіе и глотаніе затрудняются, и слѣдуетъ скоропостижная смерть. Крупъ такого характера, говоритъ Дядьковский, свирѣпствовалъ въ Москвѣ въ 1816 году. Иногда за нѣсколько дней до смерти въ зѣвѣ показывается изъязвленіе, какъ бы двѣ эти болѣзни были между собою соединены. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ болѣзнь обыкновенно теряютъ способность и говорить, и глотать, и умираютъ съ видимыми признаками задержанія крови въ головѣ. Есть третіе легчайшее теченіе крупы. Болѣзнь развивается не далѣе лихорадочныхъ предвозвѣстниковъ и обнаруживается только небольшимъ мокрымъ кашлемъ съ значительнымъ измѣненіемъ голоса. Въ этомъ состояніи болѣзнь, продолжаясь 2—3 недѣли и болѣе съ перемѣнами: то ожесточеніемъ, то послабленіемъ, наконецъ мало по малу исчезаетъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) заключаются собственно въ дѣтскомъ возрастѣ, преизобилующемъ сгущаемою пасокою, особенно если больной очень мокротенъ и расположенъ къ ослизненію воздухоносныхъ путей. Тѣ дѣти болѣе расположены къ этой болѣзни, которыя имѣютъ голосъ сиповатый, хриплый, басистый. Впрочемъ замѣчено, что въ жесточайшихъ эпидеміяхъ эта болѣзнь поражала не только дѣтей 6—7 лѣтъ, но 10—11 и даже 18 лѣтъ.

Причина производящая единственно заключается въ особомъ повѣтріи, свойственномъ преимущественно весеннему, осеннему и зимнему времени года. Воздухъ при этомъ, говоритъ Дядьковский, бываетъ сырой, содержащій особую пригорѣлость и остроту, ощущаемая обоняніемъ, и тотъ же самый воздухъ производитъ краснуху, коклюшъ, скарлатину и всѣ болѣзни катаральнаго свойства. Гуфеландъ же говоритъ: «крупъ происходитъ чаще всего оттого, что дѣтей съ разгоряченнымъ тѣломъ тотчасъ переносятъ на холодъ и при сильной стужѣ подвергаютъ ихъ сѣверному, либо сѣверо-восточному вѣтру».

Сущность видна изъ опредѣленія.

Распознаваніе. Такъ какъ болѣзнь эта свойственна только дѣтямъ, скоротечна, очень опасна и удобоизлѣчима только въ первые два дня, то очень важно распознать ея во время. Для этого должно обратить все вниманіе на: 1) *появленіе существованіе между дѣтьми въ селеніи какого-то необыкновеннаго кашля, который удушаетъ дитя на 3 и уже никакъ не далѣе, какъ на 7-й день появленія своего у него.* 2) *Появленіе у дитяти насморка и кашля, который въ крупѣ бываетъ приступами (находитъ) нѣсколько разъ въ день, но чѣмъ чаще начнется онъ мучить дитя, тѣмъ болѣе и болѣе сходствуетъ звукъ его съ отрывистымъ тѣніемъ молодого петуха, или съ лаями щенка, и по-*

тому звукъ этотъ названъ крупнымъ и похожъ на голосъ склада *рунз*, произносимаго открытымъ ртомъ. 3) *Дыханіе свистящее, визгливое*, появляющееся иногда вдругъ, и обыкновенно *ночью*, дѣлающееся частъ отъ часу труднѣе, томительнѣе, съ вышеописаннымъ кашлемъ. 4) *Голосъ дитяти осиплый, съ критическимъ и клокотаніемъ въ горлѣ*. 5) Горячечные припадки постепенно усиливающіеся. 6) *Боль въ гортани*. Взрослыя дѣти показываютъ еѣ тамъ, *гдѣ кадыкъ*, а маленькія хватаются руками за шею и силятся отбинути голову назадъ. При всемъ этомъ *крупъ можно смѣшать съ милларовымъ удушьемъ*, въ которомъ также, какъ и въ крупѣ, голосъ дѣлается пѣтушьимъ, высокимъ, дыханіе затрудняется, лицо надувается, глаза выпучиваются, краснѣютъ, вырывается густой басоватый кашель, и тѣмъ еще скорѣе можно ошибаться въ распознаваніи, что нерѣдко къ крупу присоединяется и милларово удушье. Однакожъ эти двѣ столь схожія болѣзни можно отличить тѣмъ, что 1) милларово удушье нападаетъ безъ всякихъ предвозвѣстниковъ лихорадочныхъ, вдругъ стѣсняетъ грудь больного такъ сильно, что онъ принужденъ вытягивать ее; въ крупѣ припадки ожесточаются постепенно; 2) въ милларовомъ удушѣ, на какой бы степени развитія ни былъ кашель, онъ всегда обнаруживается только во время самыхъ пароксизмовъ, между тѣмъ какъ въ крупѣ онъ бываетъ и во время послабленій; 3) *въ удушѣ кашель всегда бываетъ сухой, а въ крупѣ мокротной*; 4) въ удушѣ по прошествіи пароксизмовъ больной дѣлается какъ здоровый; напротивъ, въ крупѣ, хотя болѣзнь и послабляется, но припадки совершенно не прекращаются. Если бы эти болѣзни были вмѣстѣ въ одномъ и томъ же больномъ, то и тутъ легко отличить ихъ, потому что *припадки крупы непрерывны*, постоянны, напротивъ, *припадки удушья* возвращаются *периодически*. Кроме того *крупъ еще сходствуетъ съ коклюшемъ*; при развившемся коклюшѣ также надувается лицо, глаза краснѣютъ, заложеніи головные, кашель постоянный, густой, отхаркиваемая мокрота густая, клейкая, голосъ также измѣняется. Однакожъ коклюшъ отъ крупы отличить очень легко, потому что: 1) коклюшъ начинается признаками катарральными медленно въ теченіе двухъ недѣль, или болѣе возрастающими; въ крупѣ, напротивъ, если теченіе его и бываетъ также медленно, какъ развитіе коклюша, но не обнаруживаются значительные припадки катарральные, какіе замѣчаются въ коклюшѣ; 2) припадки крупы идутъ постоянно, непрерывно, напротивъ, припадки коклюша имѣютъ перемежку: дитя откашливается и потомъ опять бѣгаетъ и играетъ спокойно.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, очень *невыгодно*; потому что сущность болѣзни такова, что, если не подано пособія, то смерть неизбѣжна. Вообще предсказаніе зависитъ отъ степени болѣзни и быстроты развитія ея. Продолжительность болѣзни также зависитъ отъ степени послѣдней, такъ что въ сильныхъ развитіяхъ болѣзнь оканчивается смертію въ теченіе 6—8 часовъ, иногда въ 3 и даже въ 1 часъ; но въ низшихъ развитіяхъ продолжается не рѣдко 2—3

недѣли и болѣе, безъ важныхъ признаковъ и припадковъ, такъ что болѣзнь остается на ногахъ; однако если не подано пособіе, то болѣзнь и здѣсь оканчивается смертію. Если же развитіе болѣзни такъ слабо, что развивается не далѣе лихорадочныхъ предвозвѣстниковъ и обнаруживается только небольшимъ мокротнымъ кашлемъ съ значительнымъ измѣненіемъ голоса, то предсказаніе будетъ хорошо, потому что болѣзные, въ теченіе 7—12 дней, совершенно выздоравливаютъ безъ всякаго пособія.

Исходы: въ *здоровье* переходить или при помощи искусства, или безъ всякаго пособія; впрочемъ послѣднее бываетъ только тогда, когда болѣзнь такъ легка, что походить на простое воспаленіе дыхательнаго горла, какъ въ жабѣ простой. Въ *изъязвленіе* переходить тогда, когда это воспаленіе не затрудняетъ дыханія на столько, чтобы отсюда могла послѣдовать смерть; впрочемъ, если изъязвленіе бываетъ значительно, то *чахотка горловая* неизбѣжна. Въ *смерть* исходъ бываетъ по причинѣ прекращеннаго дыханія въ слѣдствіе образовавшейся ложной тѣани, — перепонки, какъ сказано въ опредѣленіи, слѣдовательно отъ задушенія.

Лѣчение діететическое должно быть направлено въ особеннѣйшій противъ причинъ, какъ внутреннихъ, предрасполагающихъ, такъ и внѣшнихъ, производящихъ эту болѣзнь, такъ что съ удаленіемъ ихъ не будетъ и болѣзнетворнаго ихъ дѣйствія; по этому оно требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *дѣтей*, расположенныхъ къ этой болѣзни, малыхъ и большихъ и тѣмъ болѣе страдающихъ ею, должно всѣми мѣрами стараться *воздерживать* отъ употребленія *пищи слизистой, жирной, неудобоваримой, вязкой, сырой*, особенно плодовъ сырыхъ, зеленыхъ, незрѣлыхъ, или дурнаго свойства и т. п., равнымъ образомъ и *отъ питья мучнистаго, невыброженнаго, сыраго*, какъ напр. сельскаго кваса, браги и т. п. 2) Въ весеннее, осеннее и зимнее время года дѣтей должно *беречь отъ* вреднаго вліянія на нихъ *сыраго воздуха*, а *ноги ихъ отъ мокроты и сырости*, особенно когда крупъ свирѣпствуетъ между ними повально и, видимо, бываетъ *приличивъ*. Тутъ во всякомъ случаѣ всѣ безъ исключенія *дѣти*, болѣзные и здоровыя, должны находиться *въ своихъ жилищахъ*, чистыхъ, опрятныхъ, *окуриваемыхъ* почаще *уксусомъ съ мятою*, поливаемымъ на раскаленный кирпичъ. При этомъ *здоровыхъ* дѣтей всегда слѣдуетъ *отдѣлять отъ больныхъ* для прекращенія всякаго сообщенія между ними. Также не излишне перестать *ходить въ тотъ домъ*, гдѣ крупъ, и къ себѣ *никого изъ того дома не принимать*. 3) Дѣтей съ разгоряченнымъ тѣломъ не переносить тотчасъ на холодъ и *при сильной стужѣ не подвергать ихъ сѣверному или сѣверовосточному вѣтру*, какъ вообще, такъ и въ частности пораженныхъ уже этою болѣзнію, и безъ того всегда почти смертельною. 4) Дѣтямъ, *подверженнымъ частымъ возвратамъ* этой болѣзни, не излишне сверхъ того въ какой нибудь части тѣла *имѣть* безпрестанное истеченіе посредствомъ *фрон-*

манли, которая предотвращает возвраты этой болѣзни. По наблюденіямъ Бухана и *пластырь изъ смолы бурундской* (варъ), прикладываемый между плечами, предупреждаетъ также возвраты, но надлежитъ его оставить тамъ на нѣсколько лѣтъ.

Лѣченіе существенное въ этой, столь важной, опасной и скоротечной дѣтской болѣзни, преимущественнѣе прочихъ должно вполнѣ соответствовать сущности ея, а потому, какъ только начнутъ родители подозрѣвать, что дитя одержимо крупомъ, немедленно ни минуты должно имъ прибѣгнуть къ врачу, которому обязаны они дать полную свободу дѣйствовать, зная, что и онъ не всегда можетъ ручаться за успѣхъ лѣченія: иногда малюткѣ дѣлается гораздо лучше, и вдругъ смерть поражаетъ его; такъ жестока, обманчива эта болѣзнь! За отсутствіемъ же врача, для ограниченнаго лѣченія трудно передать вѣрные способы къ спасенію больного, — такъ какъ и самый надежный способъ врачеванія не всегда бываетъ удаченъ, — развѣ только нѣкоторые необходимѣйшія средства, и то съ соблюденіемъ чрезвычайной осторожности, по которой для успѣшнаго простаго пользованія болѣзнь эту раздѣляютъ на *три періода*, причемъ должно обращать вниманіе на слѣдующія обстоятельства: 1) Въ какомъ періодѣ жестокости находится болѣзнь? *Первый* періодъ, когда бываетъ только *насморкъ и кашель*, который кажется простымъ, простуднымъ, но, спустя нѣсколько часовъ послѣ появленія кашля, замѣчается въ немъ какой-то необыкновенный звукъ. Періодъ этотъ, названный періодомъ *катарральнымъ*, продолжается отъ половины до цѣлыхъ сутокъ. *Второй* періодъ, когда крупъ обнаружится вполнѣ, со всѣми вышеисчисленными припадками и особенно кашлемъ *съ круповымъ звукомъ*, (этотъ періодъ продолжается *два, три дня* и болѣе, и можетъ окончиться или смертію, или выздоровленіемъ). Въ первомъ случаѣ припадки удушенія становятся все сильнѣе и сильнѣе; а во второмъ — наступаетъ *третій* періодъ, т. е. *періодъ ослабленія* болѣзни. Дыханіе, очевидно, дѣлается свободнѣе, дитя спокойнѣе, отхаркиваніе мокроты легче, кашель болѣе и болѣе приближается къ простудному. 2) Какъ сильны горячечные припадки, чтобы можно было судить по нимъ о силѣ воспаленія въ дыхательномъ горлѣ. 3) Есть ли и въ какой степени, признаки напора крови въ головѣ, судя по состоянію лица и глазъ. 4) Въ какой постепенности дитя слабѣетъ съ увеличивающеюся трудностію дыханія. 5) Какъ, при употребленіи врачебныхъ средствъ, дыханіе дѣлается свободнѣе, а дитя спокойнѣе, измѣняется круповой звукъ голоса и приближается къ звуку простаго, простуднаго кашля.

Въ катарральномъ состояніи, т. е. въ самомъ *началѣ болѣзни*, когда припадки ея слабы, кашель и голосъ не показываютъ сильнаго страданія дыхательнаго горла, должно совѣтовать *давать* дитяти *пить*, какъ можно болѣе, *теплаго молока*, которое иногда производитъ рвоту, приносящую пользу. Вблизи рта держать *греющую губку*, обмоченную въ горячій *бузинный* или *липовый чай*, чтобы дитя вдыхало въ себя

этотъ *ндръ*. Въ тоже время надлежитъ опустить *руки* дитяти *по до-
лгъ* въ довольно горячую воду, держать ихъ въ ней отъ 10 до 15 ми-
нутъ и повторять это каждые полчаса до тѣхъ поръ, пока дыханіе сдѣ-
лается легче, а крупный звукъ кашля пройдетъ. Дѣти начинаютъ по-
слѣ 1-й или 2-й ванны чихать: носъ, который въ крупѣ, какъ и ды-
хательное горло, сухъ, дѣлается влажнымъ, дыханіе свободнѣе, соб-
ственно лаящій тонъ кашля теряется, и тутъ, по истеченіи часа, мож-
но оставить больного съ совершенною увѣренностію въ спасеніи его
жизни, какъ говоритъ Граль.

Если кашель и другіе припадки не измѣняются отъ этого средства, то
взять горячей воды, обмакивать въ ней кусокъ мягкой гредкой губки,
прикладывать ее на минуту къ тому мѣсту шеп, гдѣ гортань, и повто-
рять это въ продолженіе отъ 10 до 20 минутъ, именно до тѣхъ поръ,
пока покажется на передней части шеп сильная краснота, какъ бы отъ
горячяго тѣста. Еще сильнѣе дѣйствуетъ, по увѣренію доктора Кер-
би, *фланелевая подушка съ горчицею и солью*; для этого надо взять
шерстяной чулокъ, наполнить его не туго горячею солью такъ, чтобы
можно было выгодно положить его вобругъ шеп дитяти, *на подобіе
галстука*. Соль должна быть такъ горяча, какъ только можетъ выдер-
жать рука. Когда при употребленіи помянутыхъ средствъ въ теченіе
6—10 часовъ припадки въ круповомъ состояніи не только не прохо-
дятъ, но еще усиливаются, необходимо назначить *пѣявицы*: ихъ над-
лежитъ приставить къ нижней части шеп, ближе къ груднымъ костямъ:
дѣтямъ отъ 4 до 6 лѣтъ ставить отъ 6 до 12 пѣявицъ; отъ 2 до 3 лѣтъ —
4—7 пѣявицъ. Впрочемъ это примѣрное число должно соотвѣтство-
вать возрасту дитяти и жестокости болѣзни, но при этомъ смотрѣть,
чтобы дитя не истекло кровью. Иногда нужно бываетъ повторить при-
ставленіе пѣявицъ; у полнобровныхъ крѣпкихъ дѣтей все спасеніе за-
виситъ отъ пѣявицъ. Такимъ дѣтямъ можно тотчасъ послѣ обваруженія
у нихъ припадковъ крупа поставить пѣявицы, ни на что не смотря,
если есть припадки жестокой горячки и напора крови къ головѣ. За
неимѣніемъ пѣявицъ должно прибѣгнуть къ употребленію мѣстнаго бро-
вопущанія посредствомъ *рожковъ*, назначеніе которыхъ должно быть
соотвѣтственно назначенію пѣявицъ въ опредѣленіи количества выпу-
щенія крови. При этомъ соображеніи должно имѣть въ виду то основа-
ніе, что одна пѣявица высасываетъ крови 3 1/2 золотника. По прекра-
щеніи кровотеченія и при видимомъ облегченіи, обложить шею *казан-
скимъ мыломъ*, намазаннымъ на ветошку, и, если есть дома *мушка*,
положить ее на верхнюю часть груди, и чтобы дѣйствовать усильнѣе,
поставить горчичники на руки. Такъ какъ мушка составляетъ здѣсь
дѣйствительное средство, то нужно знать, гдѣ ее наложить. Мушку
(№ 58) величиною въ рубль серебромъ, положить на верхнюю часть
грудной кости. Когда она нарветъ, и когда срѣжутъ пузырь, то рану
перевязать *свѣчнымъ саломъ*, намазаннымъ на тряпочкѣ. Въ опас-
ныхъ случаяхъ крупа, къ салу можно примѣшать нѣсколько нарывна-

го пластыря (№ 58), такъ чтобы имъ произвести порядочное нагноеніе кожи. Если у дитяти долго не было на низъ, поставить *промывательное* изъ отвара льнянаго семени съ солью и масломъ, а если есть горячечные признаки, то съ вкусомъ (№ 95) или употребить слабительныя: *магнезію съ сахаромъ, кашку слабительную, кассію, манну въ молоко*. Самый лучший способъ употребленія этихъ слабительныхъ состоитъ въ томъ, чтобы разводить ихъ въ какой нибудь жидкости и давать понемногу и почаще, пока не прослабитъ. Такимъ образомъ должно давать по чайной ложкѣ магнезіи, смѣшавъ пополамъ съ мелко истолченнымъ сахаромъ, черезъ часъ, повторяя приемъ до тѣхъ поръ, пока прослабитъ дитя раза три или четыре. Или, вскипятивъ борки кассіи 7 золотниковъ, либо 3½ золотника слабительной каши въ одномъ фунтѣ воды, давать, процѣдивши, по полчашкѣ чайной чрезъ ½ часа. Сверхъ того, Геліусъ совѣтуетъ *обвернуть ноги фланелью*, смачиваемою теплою водою. При случаѣ и шерстяной чулокъ можетъ замѣнить фланель. Какъ ни дѣйствительны эти наружныя средства, но не всегда они могутъ уничтожить болѣзнь. Внутреннія лѣкарства необходимы противъ нея, и *рвотное*, данное во время и повторенное въ опасныхъ случаяхъ, особенно въ самомъ началѣ болѣзни, приносить очевидную пользу. *Рвотный корень* — ппекагуана и *рвотный камень* лучше всего производить рвоту. Первый хуже послѣдняго и требуетъ бѣльшей осторожности, потому что увеличиваетъ раздраженіе. Рвотный камень дается въ значительныхъ приемахъ; дѣтямъ перваго возраста 1 гранъ, дѣтямъ втораго возраста 2½—3 грана, дѣтямъ третьяго возраста 4—5 гранъ за одинъ разъ въ теплой водѣ, запивая ею для скорѣйшаго дѣйствія (гранъ равняется зерну коноплянаго семени). Это средство есть одно изъ лучшихъ для скорѣйшей помощи отъ задушенія больного по причинѣ образовавшейся въ дыхательномъ горлѣ перепонки, и до того вѣрно и надежно, что мнѣ въ теченіе 18-лѣтней моей практики никогда въ этихъ случаяхъ не доводилось прибѣгать къ другимъ средствамъ *). Рвотное даютъ, большею частію, послѣ приставленія пивовѣ. За неимѣніемъ этихъ рвотныхъ средствъ необходимо употребить или *синій купоросъ*, или *домашнее средство*, состоящее изъ *коноплянаго*, либо *льнянаго свѣжаго масла*, *простой соли и тепловатой воды* (№ 112) до рвоты. Съ нею выходитъ иногда очень много мокротъ, послѣ чего ребенку дѣлается гораздо легче. Разумѣется это средство тогда только можно употребить, когда дитя въ состояніи глотать или принимать его. Если послѣ рвотнаго, въ дыхательномъ горлѣ накопится много слизи, что узнается по влокотанію въ немъ

*) 1844 года зимою въ г. Чистополѣ во время полуночи меня пригласили на консилиумъ къ одной благородной дѣвицѣ, страдавшей крупомъ и неимѣвшей никакого облегченія отъ лѣченія врачемъ другими средствами. Найдя ее въ припадкахъ задушенія отъ крупы, я тотчасъ далъ 10 гранъ рвотнаго камня (ей было 18 лѣтъ отъ роду) въ рюмкѣ теплой воды, говоря, что это одно спасеніе въ этомъ средствѣ. Черезъ 10 минутъ послѣдовава рвота съ мокротою и перепонками. Стало легче, и она выздоровѣла.

мокроты и по прерывистому дыханію, то, по совѣту Рекамье, должно вырывать посредствомъ насоса въ ротъ и въ носъ жидкость, составленную изъ 3-хъ частей теплой воды и одной части теплаго молока. Насосцемъ можетъ служить сдѣланный на скорую руку сифончикъ изъ пера орлиного, лебединого, даже толстаго гусиного, съ приспособленнымъ къ тому поршнемъ изъ сухой лучины съ мягкимъ и плотнымъ на концѣ наерткомъ изъ чего либо.

Въ состояніи послабленія болѣзни, когда дитя начнетъ дышать легче, извергать слизистую мокроту сильно и свободно, крупный звукъ кашля исчезаетъ, и кашель дѣлается обыкновеннымъ, притомъ, если дитя начнетъ потѣть, достаточно дать для питья теплый настой изъ липовыхъ цвѣтовъ, подслащенный медомъ или сгущеннымъ сокомъ изъ солодкового корня, либо чай изъ другихъ грудныхъ травъ, чтобы поддержать испарину и содѣйствовать легкому отдѣленію мокроты. Еслиже, по уменьшеніи жестокости крупа, горячечные припадки еще продолжаютъ, то сдѣлать или отваръ изъ льнянаго сѣмени, или молоко изъ сладкаго миндаля, или конопляныхъ, либо маковыхъ сѣмянъ; на стаканъ отвара, или на стаканъ молока, положить неполную ложечку чистой, мелкоистолченной, селитры; этой смѣси давать всякій часъ по чайной, либо по столовой ложкѣ. А когда уже покажется легкая испарина, то сдѣлать настой изъ липовыхъ цвѣтовъ, подсластить его медомъ и, прибавивъ къ нему немного селитры, давать каждый часъ по столовой ложкѣ.

Въ состояніи выздоровленія, какъ только дитяти сдѣлается гораздо легче, надобно ежеминутно наблюдать за нимъ, потому что болѣзнь можетъ ожесточиться сверхъ всякаго чаянія. Если это случится, поступить вышеизложеннымъ образомъ. Чтобы кашель былъ легче, и свободнѣе отдѣлялась мокрота, натирать грудь дитяти свѣчнымъ саломъ или теплымъ масломъ, смѣшивая его иногда съ камфорою или летучею мазью; положить на грудь ветошку, намазанную мыломъ. *Синій купоросъ* (мѣдный купоросъ) докторъ Грумъ находитъ признаннымъ, наиболѣе дѣйствительнымъ, средствомъ противъ крупа. Это врачебное средство есть самое сильное и вмѣстѣ съ тѣмъ опасное лѣкарство; но такъ какъ его можно достать вездѣ, то онъ объ немъ говоритъ очень обстоятельно. Опытъ показалъ, что, если употреблять это средство съ возможною осторожностію, — въ отношеніи количества, — то оно не только не можетъ быть вреднымъ, но, напротивъ того, составляетъ весьма полезное лѣкарство противъ крупа. Въ запасъ лучше его выписать изъ аптеки. Онъ дѣйствуетъ двоякимъ образомъ: въ большихъ приемахъ онъ производитъ рвоту, а въ меньшихъ — разводитъ мокроты, накопившіяся въ дыхательномъ горлѣ. Если нужно произвести рвоту, то дѣтямъ отъ 2 до 5 лѣтъ надобно дѣлать порошокъ изъ одного (рѣже двухъ, а весьма рѣдко изъ трехъ) гранъ синяго купороса и 6-ти гранъ сахара (гранъ купороса равняется величинѣ коноплянаго зерна). Сахаръ и купоросъ какъ можно больше растирать и приводить въ тонкій

порошокъ. Когда произойдетъ отъ такого порошка рвота, то другой порошокъ, который надобно имѣть въ запасъ, развести въ 12-ти чайныхъ ложечкахъ чистой воды и давать, смотря по надобности, или каждый часъ, или каждыя два часа, по полной чайной ложечкѣ. Иногда можно дать сперва этотъ растворъ купороса, а послѣ того и самый порошокъ: тогда вѣрнѣе наступаетъ рвота. Есть еще простой способъ лѣченія крупа, состоящій, главное, изъ внутренняго употребленія порошковъ синяго купороса, его раствора и наружныхъ холодныхъ повязокъ на шею. Прежде даются больному дитяти порошки (№ 169). Отъ нихъ дѣлается рвота два или три раза, и этого довольно. Рвота не должна быть сильная. Въ промежуткахъ между рвотами не давать пить дитяти, потому что питье замедляетъ дѣйствіе лѣкарства. Во время рвоты, или непосредственно послѣ рвоты, надобно поступать слѣдующимъ образомъ: 1) нужно имѣть холодную, какъ ледъ, воду (голодезную); 2) имѣть носовой шейный платокъ небольшой величины; 3) другой платокъ нѣсколько больше. Первый платокъ долженъ быть полотняный, а другой бумажный; меньшій платокъ смочить холодною водою, выжать его нѣсколько разъ такъ, чтобы съ него не капало; потомъ сложить его въ видѣ повязки и повязать имъ шею слегка такъ, чтобы платокъ покрывалъ гортань и часть дыхательнаго горла; концы платка завязать спереди обыкновеннымъ образомъ; все это сдѣлать въ нѣсколько секундъ; поверхъ этого повязать другой сухой платокъ обыкновеннымъ образомъ. Первую повязку оставить на шеѣ на 10 минутъ, потомъ снять ее, чтобы снова увлажить ее холодною водою и обложить шею-вышепоказаннымъ образомъ. Черезъ 10 минутъ нужно повторить еще самымъ точнымъ образомъ такое смачиваніе и повязываніе платкомъ. Последнюю повязку оставить на мѣстѣ 12 часовъ. Послѣ того снять повязку и прикладываніе ея, какъ сказано выше, повторить еще 3 раза, производя это чрезъ каждыя 10 минутъ. Итакъ, если первая примочка сдѣлана въ 7 часовъ вечера, то другая слѣдуетъ въ 7 часовъ утра, а третья въ 7 часовъ вечера и т. д. Обыкновенно чрезъ нѣсколько часовъ послѣ перваго намачиванія, а иногда и раньше, наступаетъ значительное облегченіе. Примачиваніе должно производиться самымъ точнымъ образомъ, безъ всякаго отлагательства. Вообще слѣдуетъ наблюдать предосторожности; надобно на дитя надѣть рубашечку и кофточку, но если нѣтъ послѣдней, то надѣть двѣ рубашки. Положить дитя на мягкую постель и покрыть его одѣяломъ, по возможности теплѣе, потому что дитя непременно должно потѣть, что главное, существеннымъ въ этомъ лѣченіи. Надѣть на ножки бумажные чулки и положить между ножками или бутылки, или кувшины, хорошо затенутые, съ горячею водою; кувшины должны быть такъ жарки, какъ можно выдержать. Впрочемъ дитя не надобно покрывать слишкомъ тяжело. Дитяти давать пить поболѣе тепловатаго молока, подслащенного сахаромъ. Давать молоко пить чашками, какъ только дитя попроситъ его. Первые три дня давать дитяти легкую молочную пищу: сначала жи-

деньгій молочный супъ и мякишъ изъ булки, размяченный въ молокѣ: когда болѣзнь ослабится, то приступать и къ другимъ обыкновеннымъ дѣтскимъ кушаньямъ. Груднымъ дѣтямъ давать, кромѣ грудного молока, еще теплое коровье. Вышеупомянутыя холодныя обкладыванія, возобновляемыя дважды въ сутки, продолжать три или четыре дня: послѣ этого довольно бываетъ однажды въ день дѣлать такое обкладываніе, и для предупрежденія возврата болѣзни продолжать его недѣлю и даже мѣсяцъ. Этихъ холодныхъ примочекъ вовсе не должно бояться. Дѣти къ нимъ привыкаютъ скоро. При употребленіи внутрь теплаго молока и снаружи горячихъ вѣшниковъ, у дитяти, лежащаго въ теплой постелѣ, наступаетъ по всему тѣлу обильный потъ, который составляетъ главную часть лѣченія. Пить теплое молоко въ продолженіе одной или двухъ недѣль и постепенно уменьшать его количество. Въ началѣ надобно около половины кварты молока на день для 2-хъ лѣтнаго дитяти; это количество принять за мѣру для дѣтей другаго возраста. Для успокоенія родителей, давать дитяти легкій растворъ синяго купороса (половину грана — съ ползерна коноплянаго сѣмени, на стаканъ воды безъ всякой примѣси); принимать по чайной ложечкѣ чрезъ каждые 2 часа. Это лѣкарство впрочемъ не безъ пользы. Такимъ образомъ лѣченныя дѣти скоро и совершенно выздоравливаютъ *).

На счетъ приѣмовъ мѣднаго купороса (синяго) надобно замѣтить слѣдующее: дѣтямъ годовымъ давать его на приѣмъ по $\frac{1}{8}$ или $\frac{1}{6}$ долѣ грана, а болѣе взрослымъ по $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ грана черезъ $\frac{1}{4}$ часа, или черезъ 2 часа, смотря по опасности и жестокости припадковъ, и въ крайнихъ только случаяхъ, когда уже ни одно изъ исчисленныхъ выше средствъ, гораздо безопаснѣйшихъ, не оказало пользы, словомъ: только видимая опасность, оказывающаяся припадками удушенья, даетъ право не врачу рѣшиться на употребленіе купороса, и то только тогда, когда нѣтъ никакой возможности прибѣгнуть къ помощи врача.

Воспаленіе легкихъ.

Опредѣленіе. Воспаленіе легкихъ есть воспаленіе кровяное, обнаруживающееся труднымъ, короткимъ, удушливымъ дыханіемъ, особенно выдыханіемъ, тяжестью въ груди, частымъ густымъ, въ началѣ сухимъ, а въ послѣдствіи мокротно-кровянымъ кашлемъ и наконецъ низкимъ хриплымъ голосомъ безъ ощущенія особенной боли въ груди.

Раздѣленіе. Воспаленіе легкихъ бываетъ:

1. Истинное.
2. Ложное.

Воспаленіе легкихъ истинное.

Признаки: чувство тяжести въ груди, затруднительное выдыханіе, перхота, лихорадочныя движенія, ознобъ, жаръ, жестокий заду-

*) Д-ръ Itzigson. Др. Здр. 1849 г. № 44. стр. 249.

шающій кашель съ неприятнымъ чувствованіемъ при выдыханіи; отдѣленія и испражненія пріостанавливаются, спящая тяжесть головы, особенно боковыхъ ея сторонъ, височныя артеріи иногда бьются сильно и скоро; глаза блестятъ, слезятся, лицо краснѣетъ и надувается. На третій день болѣзни, если не подано пособія, припадки еще болѣе развиваются, кашель дѣлается очень острымъ, сильнымъ, хриплымъ, беспыльнымъ, при которомъ нерѣдко прорывается часть крови. Къ ночи болѣзнь ожесточается, пульсъ дѣлается большой, твердый, полный, сильная жажда, безпокойный сонъ, либо совсѣмъ безсонница, моча красная. Къ утру припадки утихаютъ. На пятый день болѣзнь еще болѣе развивается: дыханіе совершается одною верхнею частию груди, кашель дѣлается еще болѣе густымъ, сильнымъ, нерѣдко съ отхаркиваніемъ густой вязкой мокроты, смѣшанной уже съ большимъ количествомъ крови въ видѣ капель, или полосокъ, иногда съ столовую ложку; лихорадочное состояніе достигаетъ высшаго развитія; если болѣзнь въ этомъ состояніи не будетъ остановлена, то на седьмой день лицо больного дѣлается раздутымъ, синеватымъ, слухъ тупѣетъ, кашель непрерывный, кровохарканіе увеличивается, больные начинаютъ извергать кровь кусками, либо въ видѣ пѣнистой мокроты. Случающіяся носовыя кровотечения облегчаютъ больного и ослабляютъ болѣзнь. Безъ того, если и тутъ не будетъ подана помощь, больные впадаютъ или въ состояніе сонливости, или въ истощеніе силъ, влекущее за собою развитіе припадковъ гнилостной горячки. Иногда же, напротивъ, вмѣсто отхаркиванія крови съ мокротою появляется гнойная мокрота, означающая нагноеніе легкихъ, что составляетъ чахотку легочную. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ болѣзнь, достигнувъ высшаго своего развитія, вдругъ повергаетъ больного въ безчувственность съ хрипlostію и признаками скопленія крови, выражающимися, какъ бы клокотаніемъ (простой народъ клокотаніе это называетъ «хохрець» и считаетъ его вѣрнѣйшимъ признакомъ наступающей смерти) въ воздухоносныхъ путяхъ, и больные чрезъ часъ или два умираютъ. Если болѣзнь очень легка, воспаленіе ограничивается однимъ какимъ нибудь небольшимъ мѣстомъ, то и припадки болѣзни бываютъ гораздо въ меньшей степени, а кровохарканія почти не бываетъ; ощущается только небольшая боль въ томъ мѣстѣ, которое поражено воспаленіемъ. Эти припадки продолжаются 7—15 дней, и болѣзнь переходитъ или въ разрѣшеніе — выздоровленіе, или въ нагноеніе съ отхаркиваніемъ чистаго гноя — въ чахотку.

Причины внутреннія, — предрасполагающія: 1) полнокровіе легкихъ по причинѣ ихъ особой слизиости и раздражительности. 2) Привычное раздраженіе ихъ сильнымъ надуваніемъ инструментовъ, напряженнымъ пѣніемъ, чтеніемъ и проч. 3) Неправильное образованіе груди какъ-то: тѣснота и неровность, бывающая обыкновенно или въ верхней, или въ нижней части груди. 4) Бугорки, или затвердѣнія легкихъ, образующіяся почти всегда въ слѣдствіе золотушнаго состоянія тѣла. 5) Опеченіе легкихъ.

Причины внѣшнія (производящія) суть всѣ раздражающія условия, способствующія скопленію крови въ легкихъ: удары, уколы, остановка испарины отъ холода или простуды, мокраго платья и проч., непомѣрное тѣлодвиженіе, усиливающее движеніе крови, злоупотребленіе пряностей и спиртныхъ напитковъ, вдыханіе острыхъ паровъ и газовъ. спальный гнѣвъ, который сверхъ частнаго своего отношенія къ печени имѣетъ также вліяніе и на легкія, особенно при данномъ расположеніи: отчаяніе, которое также производитъ скопленіе въ легкихъ, видимо по причинѣ ослабленія ихъ; безнадежная любовь, воспаленія другихъ окололежащихъ частей, какъ-то: подреберной плевры, сердечной сумочки, печени и дыхательнаго горла. Скоророды, охотники, земледѣльцы, хлѣбники, или пекари хлѣба, преимущественно подвержены этой болѣзни, особенно зимою.

Сущность видна изъ опредѣленія, съ присовокупленіемъ, что важнѣйшій моментъ ея составляетъ приливъ крови къ легкимъ.

Распознаваніе воспаленія легкихъ истиннаго въ полномъ его развитіи очень *легко*. Кашель сперва сухой, потомъ мокротный съ кровію, служитъ отличительнымъ признакомъ этой болѣзни отъ другихъ. Отъ воспаленія подреберной плевры, извѣстнаго подъ именемъ колотья въ бокахъ, воспаленіе легкихъ истинное отличается тупою болью, между тѣмъ какъ въ воспаленіи подреберной плевры боль бываетъ сильная, рѣжущая, колючая, такъ что больной не можетъ перевести дыханія, еще и тѣмъ, что въ колотѣ затрудняется вдыханіе, а при воспаленіи легкихъ выдыханіе; при воспаленіи легкихъ пульсъ бываетъ твердый, брѣпкій, полный, а при воспаленіи подреберной плевры пульсъ, хотя также брѣпкій, но никогда не бываетъ полный и большой. Воспаленіе легкихъ истинное сходствуетъ съ воспаленіемъ сердца и его сумочки. въ которыхъ также боль бываетъ тупая, но различіе въ томъ, что боль эта въ сердцѣ развивается и ощущается только при біеніи пульса, а не при самомъ актѣ выдыханія. Кромѣ того воспаленіе легкихъ истинное сходствуетъ съ воспаленіемъ легкихъ ложнымъ, особенно, если первое бываетъ тихое и медленное; но нераспознаваніе разницы между этими двумя болѣзнями, въ случаѣ, если они такъ сблизаются въ сходствѣ ихъ между собою, не вовлечетъ въ большую ошибку потому, что лѣченіе въ томъ и другомъ случаѣ бываетъ совершенно одинаково. Для узнаванія какъ пространства, такъ и самаго мѣстопробыванія болѣзни въ легкихъ, съ пользою можетъ служить стетоскопъ, а за неимѣніемъ его вполне достаточно ухо. Когда легкія здоровы, то ухо, приложенное къ груди, слышитъ легкій равномерный шумъ, подобный выпѣнію воды. соотвѣтствующій акту дыханія; напротивъ, если въ какой либо части легкихъ есть воспаленіе, препятствующее обыкновенно свободному прохожденію воздуха въ воздухоносные пузырьки, то ухо укажетъ то самое мѣсто, гдѣ воздухъ не производитъ сотрясенія, необходимаго при актѣ дыханія, и такимъ образомъ откроется мѣстопробываніе воспаленія. Если же въ легкихъ находится нагноеніе, то въ этомъ случаѣ прило-

женное къ груди ухо слышитъ звукъ неровный, какъ бы kloкочущій, какъ будто что-то жидкое хочетъ прорваться изъ своего вмѣстипища. При посредствѣ стетоскона или уха, можно удобнѣе и вѣрнѣе дѣлать предсказаніе, какъ относительно опасности для жизни, такъ и продолжительности болѣзни.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ отъ: 1) степени развитія болѣзни; 2) времени, или поприща ея: чѣмъ ранѣе болѣзнь захвачена, тѣмъ предсказаніе менѣе опасно, потому что есть еще возможность подать больному помощь; вообще пока еще воспаление не перешло ни въ изліяніе, ни въ нагноеніе, ни въ омертвѣніе, предсказаніе довольно хорошо, и напротивъ; 3) Отъ внутреннихъ и внѣшнихъ условій, болѣе или менѣе невыгодныхъ. Продолжительность болѣзни 1) находится въ обратномъ содержаніи со степенью ея, такъ что чѣмъ сильнѣе бываетъ болѣзнь, тѣмъ она оканчивается скорѣе; 2) зависитъ также и отъ поприща болѣзни, такъ что, если воспаление еще продолжается, то болѣзнь можетъ продлиться 1—12—21 день; если оно перешло уже въ отложеніе, или нагноеніе, въ такомъ случаѣ продолжительность бываетъ различна; легкое воспаление можетъ продолжаться болѣе 42 дней. При нагноеніи предсказаніе относительно продолжительности зависитъ отъ пространства самаго нагноенія. Самое же пространство нагноенія узнается изъ припадковъ изнурительной лихорадки. Равнымъ образомъ предсказаніе въ періодѣ нагноенія зависитъ отъ возраста и тѣлосложенія больного: чѣмъ моложе и нѣжнѣе больной, тѣмъ скорѣе болѣзнь можетъ окончиться смертію; и на оборотъ, люди вѣрные, пожилые и при образованіи нагноенія живутъ очень долго, даже выздоравливаютъ. Вообще при хорошихъ условіяхъ нагноеніе легкихъ не всегда бываетъ смертельно, особенно въ теплому благоприятномъ климатѣ, гдѣ температура не подвержена внезапнымъ быстрымъ перемѣнамъ. При отложеніяхъ, какъ внутреннихъ такъ и наружныхъ, въ грудную полость, предсказаніе относительно опасности для жизни бываетъ очень дурно, потому что смерть, большею частію, неизбежна: относительно продолжительности предсказаніе неопредѣленно, такъ что и за одинъ день ручаться нельзя.

Исходы видны изъ предыдущаго.

Лѣченіе діететическое должно быть направлено противъ причинъ какъ внутреннихъ, предрасполагающихъ къ этой болѣзни, такъ и внѣшнихъ—производящихъ оную, дабы въ первомъ случаѣ предотвратить или ослабить вредное вліяніе отъ дѣйствія ихъ на развитіе и успленіе болѣзни, а во второмъ—совсѣмъ удалить и предоставить самой натурѣ цѣлебнымъ ея дѣйствіемъ поправить и возстановить здоровье. Для этого требуется соблюденіе слѣдующихъ правилъ: 1) Люди, *имѣющіе расположеніе* къ этой болѣзни, какъ-то: а) крѣпкіе, сильные, широкоплечіе съ выпуклою, круглою, высокою грудью, словомъ атлеты, б) привыкшіе заниматься игрою на какомъ-либо духовомъ инструментѣ, или пѣніемъ, чтеніемъ и т. п. в) равно какъ имѣющіе

органическіе недостатки по неправильному образованію ихъ груди, либо тѣсной, сжатой, либо плоской съ возвышенными лопатками, либо неровной въ верхней или нижней ея части, не менѣе того, г) чувствующіе у себя болѣзненность въ груди, или затвердѣніе, въ слѣдствіе злотухи, или опечененіе, отъ прежде бывшихъ болѣзней въ легкихъ, *должны быть строги къ самимъ себѣ и внимательны въ своихъ привычныхъ занятіяхъ и образъ жизни для сохраненія своего здоровья отъ всѣхъ раздражающихъ условий, способствующихъ скопленію крови въ легкихъ*, какъ-то: излишняго надуванія инструментовъ въ привычномъ занятіи духовою музыкою, напряженія въ пѣніи, изустномъ чтеніи и т. п., особенно въ молодые лѣта отъ 18 до 25 и болѣе лѣтъ, когда природа стремится своими силами къ совершенному образованію ихъ, причемъ они въ это время безъ того бываютъ раздражительны и полнокровны. 2) Кромѣ того они особенно должны остерегаться *избѣжать сильныхъ вѣшнихъ поражений въ грудь*, какъ-то: ударовъ, (подъ ними разумѣются и привычные народные кулачные бои, боронья и т. п.) укуловъ, равно простуды отъ холода на воздухъ и отъ мокраго платья, неподвижнаго тѣлодвиженія; сюда относится и народная игра въ перегонку, вдыханія острыхъ паровъ и газовъ, сильнаго гнѣва, отчаянія, безнадежной любви и т. п. Въ этихъ послѣднихъ случаяхъ внушаемая вѣрою и надеждою пословица: «все къ лучшему» всего лучше развлекаетъ, утѣшаетъ и успокоиваетъ. 3) Если кто подверженъ возвратамъ этой болѣзни собственно по одной какой-либо изъ причинъ, располагающихъ къ ней, зависящей не отъ него, а отъ занятій по обязанности или образу жизни, въ такомъ случаѣ должно совѣтовать ему *перемѣнить вредное для его здоровья занятіе, или образъ жизни*, такъ чтобъ съ удаленіемъ вреднаго вліянія удалилось бы и вредное его дѣйствіе, напр. каменщику въ такомъ случаѣ для здоровья лучше быть кирпичникомъ, мельнику пахаремъ и т. п. 4) *Страждущаго* этою болѣзнію должно *содержать въ покой, въ умеренной теплотѣ 14—16° по Реом. и, сколько возможно, свободные*; кутать одѣялами подъ предлогомъ возбудить потъ и защищать его отъ холода не должно. Это народное обыкновеніе въ этомъ случаѣ вредно: оно умножаетъ жаръ въ тѣлѣ, утомляетъ больного и не только не помогаетъ испаринѣ, но еще препятствуетъ ей; напротивъ, онъ можетъ время отъ времени посидѣть, если силы позволяютъ (эта перемѣна положенія часто производитъ очень хорошія слѣдствія: она облегчаетъ грудь и голову, умѣряя быстроту крови въ стремленіи ея къ легкимъ и мозгу), но не на долгое время, а если есть у больного расположеніе къ испаринѣ, то лучше оставить его лежать, лишь бы голова его и грудь были нѣсколько возвышены посредствомъ подушекъ. 4) *Свѣжій воздухъ* ему не вреденъ, но еще *полезенъ*, особенно въ осеннюю погоду, но не холодный. Во время впусканія его въ комнату или избу больного, нужна большая предосторожность, чтобъ онъ не простудился, что безпрестанно случается въ крестьянскихъ деревенскихъ избахъ, гдѣ больного, обыкновенно, кладутъ на кошмѣ

возлѣ двери, часто отворяемой для входа и выхода ходящими взадъ и впередъ, особенно въ утреннее время, по хозяйству; при этомъ больного въ защиту отъ вреднаго на него вліянія холоднаго воздуха, особенно въ зимнее время, должно ограждать ширмою, или чѣмъ либо въ этомъ родѣ, что еще нужнѣе въ черныхъ избахъ (безъ трубъ), въ которыхъ во время топленья печей для выхода дыма дверь всегда бывасть отворена, и больному отъ холода во всей избѣ нѣтъ спасенія, особенно въ холодное и зимнее время (пора бы это запретить въ Россіи, цѣлность трубы не велика). 6) Если *въ комнатахъ жарко*, отъ жаркой ли погоды, или жаркаго натапливанія печи, то должно *прохлаждать ея укусными опрыскиваніемъ*. 7) Относительно пищи и питья для больного этою болѣзною слѣдуетъ сказать почти тоже, что сказано и въ предъидущей болѣзни, съ тою разницею, что *пищеупотребленіе* должно быть болѣе *легкое*, нежели въ другой какой либо воспалительной болѣзни. Больной долженъ какъ можно болѣе остерегаться и избѣгать пищи вязкой, неудобоваримой, очень масляной и жирной и питательной, какъ-то: мяса, масла боровьяго, сыра, яицъ, молока; не менѣе того ему надобно воздерживаться отъ пищи горячительнаго свойства. Питье его должно состоять изъ обыкновенной сыворотки, груднаго чая изъ настоя грудныхъ растеній; яичный отваръ (№ 113) и отваръ изъ винныхъ ягодъ, изюма съ ячменемъ (№ 114), могутъ служить ему вмѣсто пищи и питья. 8) *Тѣло* больного должно *содержать въ опрятности и чистотѣ*; для этого надобно ежедневно умывать ему руки и ноги теплою водою; иногда можно посадить его въ ванну на нѣсколько минутъ: это положеніе облегчить его грудь и голову и посодѣйствуетъ дыханію и испаринѣ, причемъ слѣдуетъ перемѣнить черное бѣлье на чистое, оправить постель и подушки, чтобы удобнѣе ему было послѣ того лечь. Для спороходовъ, охотниковъ, земледѣльцевъ, хлѣбниковъ и др. изложены сверхъ того особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣчение существенное должно быть вполне направлено противъ сущности болѣзни. Но какъ главный моментъ сущности истиннаго воспаленія легкихъ есть приливъ крови къ нимъ, а уменьшать количество крови и отвлекать ея отъ легкихъ общимъ кровопусканіемъ изъ вены руки или ноги, какъ единственнымъ, большею частію, средствомъ, требуетъ чрезвычайной осторожности и соображенія съ состояніемъ отдѣленій и испражнений, то необходимо при этомъ лѣченіи полное знаніе дѣла; для этого слѣдуетъ немедленно прибѣгнуть къ врачу и совѣтовать родителямъ дать ему полную свободу дѣйствовать по его усмотрѣнію; за отсутствіемъ же его должно ограничиться слѣдующимъ лѣченіемъ:

На цѣлебное дѣйствіе природы въ этой болѣзни болѣе всего должно быть обращено вниманіе; только оно можетъ быть руководителемъ въ назначеніи *кровопусканія*. Если у больного отдѣленія и испражнения недостаточны, нѣтъ ни отхаркиванія, или отдѣленія мокротъ, что по-

знается изъ сухаго кашля, ни испарины, что познается изъ сухой, горячей кожи, ни поноса, или увеличеннаго испражненія низомъ, или и имѣть отхаркиваніе, но съ признаками крови въ видѣ полосокъ, или капель, либо пѣнистой мокроты, или кусковъ, словомъ провохарканіе, между тѣмъ лихорадочное состояніе сильное, дыханіе трудное, особенно выдыханіе, то больному немедленно должно назначить кровопусканіе *изъ вены руки*, либо ноги 1—1½ фунта, смотря по возрасту и степени развитія болѣзни. Если кровь при отхаркиваніи болѣе алая, то кровопусканіе назначается лучше изъ вены руки; если же она имѣетъ цвѣтъ болѣе темный, или темно-багровый, то лучше назначать его *изъ вены ноги*. Если въ продолженіи 19-ти или 24-хъ часовъ провохарканіе не уменьшилось, или уменьшилось, но вновь показалось по прежнему, то въ такомъ случаѣ можно назначить повторить кровопусканіе; а безъ того не должно повторять его подъ опасеніемъ несчастныхъ послѣдствій этого. Старикамъ, для которыхъ, какъ извѣстно, кровопусканія вредны, потому что они чрезмѣрно ослабляютъ силы, Д-ръ Редереръ назначаетъ *рвотную соль* въ соединеніи *съ опиумъ*, основываясь на томъ, что въ этомъ возрастѣ воспаленіе легкихъ сопровождается упадкомъ дѣятельности мозга, бредомъ, болью, распространяющеюся, большею частію, по всей груди, кашлемъ и поносомъ, ослабляющимъ силы больныхъ. Въ продолженіе первыхъ 4—5 дней болѣзни, рѣдко долѣе, ежедневно даетъ онъ 4—6 порошковъ, состоящихъ изъ равныхъ, стертыхъ вмѣстѣ, частей рвотной соли (рвотный камень) и опія, по грану (величиною равняющемуся зерну коноплянаго сѣмени) того и другаго средства. По прошествіи этого времени обыкновенно оказывается улучшение, и тогда онъ постепенно уменьшаетъ приѣмы до 7—8 дня. При такомъ лѣченіи наступаетъ обильное отдѣленіе мочи, пота и харкотины, и больные имѣютъ 2—3 водянистыя испражненія низомъ *).

О земледѣльцахъ слѣдуетъ замѣтить, что имъ не должно пускать крови такъ много, какъ пускается горожанамъ; иначе ихъ организмъ, истощенный трудами, легко ослабѣваетъ, также, если кровь пускается большею струею, то силы земледѣльца упадаютъ такъ, что не бываетъ возможности перенести болѣзнь. Многіе врачи полагаютъ, что можно безъ страха пускать кровь, если она густа, чтобы дать ей больше движенія, но Баллю замѣчаетъ, что слуги, имѣющіе крѣпкое тѣлосложеніе и хорошее здоровье, болѣе поражаются слабительными и кровопусканіемъ, нежели ихъ господа, которые гораздо слабѣе и нѣжнѣе ихъ. Быть земледѣльца-поселянина въ этомъ отношеніи непремѣнно требуетъ особой сноровки и соображенія; иначе трудно будетъ рѣшить, что болѣе умерщвляетъ: коса смерти, или шниперъ рудомета **) *Примѣч.* Чахо-

*) Др. Здр. 1843 г. № 26 стр. 207, и Даллеманъ. Др. Здр. 1844 г. № 41 стр. 325.

**) Д-ръ Никитинъ. Др. Здр. 1845 г. № 13. стр. 98.

точное тѣлосложеніе, привычка пускать кровь еще болѣе дѣлають необходимымъ кровопусканіе, но въ такихъ случаяхъ надобно кровь пускать въ небольшомъ количествѣ, 1—2 чайныя чашки. Во всякомъ случаѣ не должно пускать кровь до обморока, во время котораго легко ссѣдается кровь въ сердцѣ, и оттого происходятъ въ немъ полипы. Но какъ скоро больной имѣетъ отдѣленіе мокротъ (отхаркиваніе) свободное, нисколько не кровянистое, то кровопусканіе назначать не должно, тѣмъ болѣе, если при этомъ замѣтны признаки испарины, либо поносъ; въ такомъ случаѣ надобно способствовать отдѣленію мокротъ; для этого полезно впускать въ грудь посредствомъ воронки *паръ теплой воды*, или вдыхать его; онъ тутъ бываетъ тоже въ отношеніи легкихъ, что и припарки въ отношеніи внѣшнихъ частей, утончаетъ и разбиваетъ густыя мокроты, скопившіяся, застоявшія въ легкихъ и засоряющія его. Этотъ же паръ должно совѣтовать больному вдыхать въ себя и послѣ сдѣланнаго ему кровопусканія и остановленнаго кровохарканія. Кромѣ того въ вспомошествованіе отдѣленію мокротъ, равно и для произведенія мокрохарканія надобно давать внутрь чрезъ 4 часа по 2 ложки *аммоніаковаго раствора* (§ 115). *Селитра съ нашатыремъ* и *сокомъ солодковаго корня* въ отварѣ *просвирокъ* (§ 142) употребляемая внутрь, тоже служитъ хорошимъ средствомъ къ ускоренію отдѣленія мокротъ изъ легкихъ. Послѣ кровопусканія полезно дать больному рвотный камень съ селитрою (§ 163). При этомъ кашлица изъ перловыхъ крупъ съ медомъ, даваемая черезъ каждыя $\frac{1}{4}$ часа по полрюмкѣ можетъ служить больному и пищею, и вспомошествовающимъ лѣкарствомъ. *Укропъ, анисъ, тминъ*, солодовый корень въ тепломъ настоѣ, *какъ грудной чай*, тоже способствуютъ отхаркиванію. Большую пользу доставляютъ часто повторяемыя *ножныя ванны*: *простая*, состоящая изъ одной теплой воды, *щелочная* (§ 83), *съ горчицею* (§ 84), которыя однако не должны быть слишкомъ теплы, иначе онѣ производятъ раздраженіе въ кровеносной системѣ; *раздражающія обвертки ногъ* (§ 116): *кувшины съ горячею водою* плотно заткнутые, либо *нагрѣтые кирпичи*, прикладываемые къ подошвамъ ногъ подъ одѣяломъ, также *горчичники*, прикладываемые къ икрамъ и груди (§§ 88, 89 и 90) противъ больного мѣста, либо на который нибудь бокъ ея, гдѣ чувствуется боль. Полезно бываетъ натирать это мѣсто снаружи по нѣскольку разъ въ день *настойкою шпанскихъ мухъ* (§ 117). Если больного слабитъ, но такъ, что этотъ поносъ не обезсиливаетъ его, то не только не должно его останавливать, но еще и помогать ему посредствомъ *промывательныхъ* изъ одной теплой воды, если же его не слабитъ, нужно давать ему *слабительныя* изъ *александрійскаго листа* (§ 118), либо изъ *коры крушины* одной (§ 74), либо *съ слабительною солью* (§ 75), либо изъ *порошка* корня *яланпа*, по $\frac{1}{4}$ золотн. на пріемъ съ водою. Если этого недостаточно, то нужно направлять кровь къ окружности тѣла, именно къ кожѣ, чтобы содѣйствовать испаринѣ; для этого давать больному внутрь *риверова питье* (§ 62) черезъ часъ по столовой лож-

бѣ, грудной и *потогонный чай* (№ 85); вмѣсто риверова питья можно давать *молоко сладких миндалей*, также *молоко изъ огуречныхъ и тыквенныхъ семянъ*, отваръ *проскурнячяго корня съ селитрою*, полагая ея по золотнику на фунтъ молока или отвара въ совершенномъ растворѣ, по рюмкѣ отъ 4 до 6 разъ въ день (№ 87). Полезенъ въ этомъ случаѣ также *отваръ корня сенегги-истода* (№ 119).

Воспаленіе легкихъ, ложное.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Воспаленіе легкихъ ложное есть пасочное воспаленіе тихое, медленное, въ началѣ не лихорадочное, обнаруживающееся тяжестью при дыханіи, а особенно при выдыханіи, небольшимъ и обильнымъ кашлемъ, но несвободнымъ отхаркиваніемъ, безъ всякаго ощущенія боли.

ПРИЗНАКИ. Сперва затрудняется дыханіе, особенно выдыханіе. вмѣстѣ съ тѣмъ отхаркивается густая мокрота; потомъ являются: чувство чрезвычайной тяжести и накопленія легкихъ, голова тяжелеетъ и тупѣетъ, лицо дѣлается багровымъ и даже синимъ, слухъ и зрѣніе также тупѣютъ; нерѣдко показываются носовыя кровотеченія: кровь течетъ густая и черная. Если въ это время не будетъ подана помощь, то аппетитъ пропадаетъ, испражненія задерживаются, а иногда отрывается поносъ, моча красноватая, не рѣдко слизистая, мутная. при дыханіи обнаруживается хлопотаніе, понуждающее больного отхаркивать; отхаркиваемая мокрота выскакиваетъ въ видѣ пузырьковъ. За этимъ появляется уже горячка нервно-гнилостная; припадки ея ночи ожесточаются, а днемъ нѣсколько ослабѣваютъ; если и въ этомъ состояніи не подана помощь, то больной умираетъ или отъ скоростнаго удара, или отъ истощенія; въ первомъ случаѣ шейныя вены напругаются иногда до того, что представляются бьющимися на подобіе артерій.

Въ легчайшихъ же случаяхъ затрудненное дыханіе мало по малу смѣняется довольно легкимъ отхаркиваніемъ мокроты. Съ увеличеніемъ отхаркиванія больные получаютъ нѣкоторое облегченіе, дыханіе дѣлается свободнѣе, чувство тяжести въ груди мало по малу исчезаетъ. такъ что при хорошихъ обстоятельствахъ больные совершенно поправляются. Но если условія бываютъ неблагоприятны; то болѣзнь переходитъ въ состояніе мокротной чахотки.

ПРИЧИНЫ внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ общемъ полнокровіи при малодѣйствіи легочной системы, что преимущественно свойственно людямъ полнокровнымъ, возмужалымъ, за 30 лѣтъ и болѣе.

ПРИЧИНЫ внѣшнія (производящія) однѣ и тѣже, какъ и въ воспаленіи легкихъ истинномъ, дѣйствующія въ этомъ случаѣ гораздо въ меньшей степени.

Сущность состоитъ въ застоѣ крови въ легочной, кровяной системѣ и накопленіи густыхъ, вязкихъ мокротъ, засоряющихъ волосъ-

ные сосуды легких съ незначительнымъ развитіемъ воспалительнаго процесса.

Распознаваніе *легко* повышеизложеннымъ признакамъ, и если это ложное воспаление легкихъ будетъ такъ похоже на воспаление ихъ истинное, что распознать трудно, то въ этомъ въ случаѣ затрудняться не должно, потому что лѣченіе того и другаго воспаления почти одно и тоже.

Предсказаніе относительно опасности для жизни *не важно*, если только болѣзнь еще не перешла въ чахотку; относительно продолжительности оно довольно *не выгодно*: болѣзнь можетъ продолжаться мѣсяцы и болѣе.

Исходы: нагноеніе, затвердѣніе, опечененіе легкихъ, водянка и сращеніе легкихъ съ подреберною тканью (плевою).

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни *одинаково съ* сомняннымъ *лѣченіемъ воспаления легкихъ истиннаго*. Пищеупотребленіе должно состоять изъ слабыхъ бульоновъ, а питье изъ крупиной воды, подслащенной медомъ, или изъ легкаго отвара солодкового корня, приправленнаго медомъ.

Лѣченіе существенное въ ложномъ воспаленіи легкихъ сходствуетъ съ сомняннымъ лѣченіемъ истиннаго ихъ воспаления, съ разницею соотвѣтственно сущности этого воспаления, котораго главный моментъ не приливъ, а застой крови и скопленіе мокротъ въ легкихъ; поэтому болѣзнь эта очень важна по ея исходамъ и требуетъ въ лѣченіи соображенія съ полнымъ знаніемъ дѣла; слѣдовательно страдающимъ ею должно совѣтовать прибѣгать ко врачу за пособіемъ, а за непмѣніемъ его по близости можно ограничиться слѣдующими средствами:

Если природа, пѣлбнымъ своимъ дѣйствіемъ, видимо, стремится къ освобожденію легкихъ отъ находящихся въ нихъ застоевъ посредствомъ кашля съ большимъ или меньшимъ напряженіемъ, какъ обыкновенно бываетъ въ этой болѣзни, нерѣдко до тошноты и позыва на рвоту, то напередъ должно помочь ей въ этомъ *рвотнымъ* изъ порошка *корня ипекакуаны*, который, взявъ его $\frac{1}{4}$ золотн. и разведя въ теплой водѣ, дать за одинъ пріемъ выпить и запить такою же водою. Черезъ $\frac{1}{4}$ часа, если не послѣдуетъ рвоты, то еще повторить такой же пріемъ ипекакуаны, или рвотно-слабительнаго изъ рвотнаго камня, коего взявъ $\frac{1}{4}$ золотника и, распустивъ въ стаканѣ теплой воды, давать больному черезъ каждыя 5 минутъ по столовой ложкѣ, пока послѣдуетъ рвота, которая всегда облегчаетъ больного. *Рвотный камень* въ этомъ случаѣ многіе врачи предпочитаютъ рвотному корню, потому что онъ не горячитъ и не раздражаетъ, какъ послѣдній, что онъ пмѣетъ, кромѣ того, свойство разрѣшать мокроты, и что послѣ употребленія его за испражненіемъ рвотнаго слѣдуетъ испражненіе низомъ; причеиъ рѣдко бываетъ нужно прибѣгать къ употребленію *слабительныхъ и клистировъ*, которые также полезны въ этой болѣзни. Легкимъ же къ освобожденію ихъ отъ мокротъ онъ не менѣе придаетъ силы, какъ и рвотный

горень. Но если отхаркиваніе и безъ того свободно, приче́мъ безъ особаго усилія и напряженія легко отдѣляется мокрота вязкая, бѣло-желтая, густая, какъ бы состоящая изъ одного вещества, то и рвотныя средства можно счесть въ этомъ случаѣ излишними, а начать лѣченіе съ средствъ, содѣйствующихъ отхаркиванію, каковы: *паръ теплой воды* для вдыханія больнымъ посредствомъ воронки, *кашица изъ перловыхъ крутъ съ медомъ* вмѣсто пищи и лѣкарства, растворъ *аммоніаковой камеди*. Въ сильномъ лихорадочномъ состояніи *ножныя ванны, раздражающія обвертки, натиранія настоемъ шпанскихъ мушекъ и стручковымъ перцемъ*. Нарывныя эти средства и *нарывной пластырь* (№ 58), прикладываемыя заблаговременно или къ затылку, или къ икрамъ ногъ порознь, попеременно, или по всѣмъ этимъ мѣстамъ вдругъ, если обстоятельства того потребуютъ, какъ наприм. чрезмѣрный жаръ и очень трудное дыханіе, въ этой болѣзни дѣйствительны и существенно полезны. Если этого недостаточно и нужно дать направленіе крови къ окружности тѣла, то должно назначать средства разрѣшающія потогонныя, какъ-то: *риверово питье, грудной чай*, растительное *молоко и отваръ проскурняка съ селитрою и другія*, подробно описанныя въ существенномъ лѣченіи воспаления легкихъ истиннаго, равнымъ образомъ, если понадобятся въ этой болѣзни средства слабительныя, то употреблять должно тѣже, какія описаны въ предъидущемъ воспаленіи легкихъ. *Примѣчаніе*. Выздоровливаніе въ этой болѣзни происходитъ медленно; больные поправляются безъ всякихъ критическихъ признаковъ.

Воспаленіе подреберной плевы, колотье.

О п р е д ѣ л е н і е. Воспаленіе подреберной плевы, или колотье, есть кровавое воспаленіе, обнаруживающееся собственно при вдыханіи кашлемъ, сперва сухимъ, а въ послѣдствіи мокротнымъ и нерѣдко кровавымъ.

Примѣч. Колотье однако бываетъ не всегда въ однихъ бокахъ, но случается и въ задней части груди, когда воспаленіе занимаетъ преимущественно заднюю часть; иногда въ однихъ только переднихъ частяхъ груди, почему, какъ воспаленіе подреберной плевы, можетъ быть боковое, правое и лѣвое, спинное или заднее и переднее, такъ и колотье, соотвѣтственно ему, обнаруживается и въ бокахъ, и въ спинѣ, и въ передней части груди. Замѣчено, что это воспаленіе можетъ распространяться и на легкія, равно и наоборотъ, приче́мъ обѣ эти болѣзни могутъ быть смѣшаны одна съ другою, но могутъ существовать и отдѣльно, точно такъ, какъ воспаленіе брюшины бываетъ отдѣльно отъ воспаления кишекъ, и на оборотъ.

П р и з н а к и. Сперва общее лихорадочное состояніе, выражающееся бѣглымъ, непостояннымъ ознобомъ и жаромъ, съ развитіемъ которыхъ, особенно жара въ верху груди и въ рукахъ, развивается потомъ и колотье въ боку и кашель. Къ ночи припадки усиливаются; дыханіе, осо-

бенно вдыханіе, очень затрудняется, колотье въ боку и кашель усиливаются, только послѣдній бываетъ рѣже. Черезъ сутки, иногда ранѣе, а иногда чрезъ двое и трое сутокъ показывается отхаркиваніе въ небольшомъ количествѣ мокроты, содержащей въ себѣ въ видѣ тонкихъ полосокъ розовую кровь, которое мало по малу потомъ увеличивается, а дыханіе затрудняется до того, что больные дышать только верхнею частію груди, впадаютъ въ сонливость, чувства ихъ тупѣютъ, лицо становится темносинимъ, глаза красноватыми, мутными. Если при этомъ не будетъ подана помощь, то больной въ безчувственности умираетъ на 9—12 день отъ внутренняго удара (апоплексія). Таковы признаки этой болѣзни въ высшемъ ея развитіи. Но если воспаленіе бываетъ не такъ велико, то оно, при развитіи мокротно кровяного кашля, мало по малу ослабѣваетъ; лихорадочное состояніе и колотье утихаютъ, но все еще остается трудность вдыханія, которая тоже мало по малу, при болѣе или менѣе явныхъ критическихъ признакахъ болѣзни, вмѣстѣ съ нею проходитъ, и больные совершенно выздоравливаютъ. Но иногда трудное дыханіе остается и послѣ выздоравливанія отъ этой болѣзни съ ощущеніемъ тяжести въ груди и кашлемъ. Это значитъ, что здѣсь произошло или приращеніе легкихъ, или грудная водянка, или то и другое вмѣстѣ, говоритъ Дядьковский.

Причины внутреннія (предрасполагающія). 1) Мужчины сухощавые, полнокровные, холерическаго темперамента, съ твердыми и упругими мышцами, болѣе расположены къ этой болѣзни и подвергаются ей чаще, чѣмъ женщины, освобождающіяся отъ полнокрovia періодическимъ кровоизверженіемъ, равнымъ образомъ и мужчины, имѣющіе поврежденіямъ геморoidalное истеченіе и подверженные поносамъ. Эти послѣднія женщины и мужчины получаютъ расположеніе къ этой болѣзни тогда только, когда у нихъ задерживаются или совсѣмъ останавливаются эти привычныя кровоизверженія. 2) Расположеніе къ этой болѣзни по возрасту начинается съ осьмаго и продолжается до сороковаго года. 3) Кто разъ испыталъ на себѣ эту болѣзнь, тотъ уже сдѣлался расположеннымъ къ ней въ послѣдствіи, причемъ возвраты и повторительныя пораженія ею становятся очень опасными для жизни. 4) Слишкомъ узкая грудь и тонкость кровобіющихъ сосудовъ (артерій) подреберной плевы тоже располагаютъ ее къ воспаленію.

Причины внѣшнія (производящія): удары въ грудь при бояхъ и кулачныхъ бояхъ, непомѣрное тѣлодвиженіе, какъ-то: бѣганье, борьба, скаканье и ношеніе тяжелыхъ ношей, простуда чрезъ неосторожное употребленіе холоднаго питья, особенно послѣ предшествовавшаго разгоряченія, напр. по выходѣ изъ бани, или по окончаніи трудной работы, выходъ въ поту на холодный воздухъ, или погруженіе въ холодную воду, либо окачиваніе ею и питье ея; холодные сѣверные вѣтры; снѣжаніе на вольномъ воздухѣ, на сырой землѣ; мокрое платье, труды въ работахъ, въ походахъ, ѣздѣ и движеніяхъ на открытомъ воздухѣ въ холодное и сырое время. Такъ поселяне работники и

ноденышки, ящички, коноводы, лоцманы, грёбцы, перевозчики, рыбаки, солдаты, пѣшеходы, скороходы. егеря, охотники до стрѣлянія итищъ и звѣрей, звѣриной ловли и травли собаками и т. п., особенно сангвиническаго темперамента, болѣе всѣхъ подвержены этому воспаленію, или колотью; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, остановка каковаго нибудь привычнаго испражненія, какъ-то: застарѣлыхъ вередовъ, фонтанелей или заволокъ, пота ногъ, рукъ или мышекъ, опущеніе срока привычнаго кровопусканія и т. п., вогнанная внутрь какая либо высыпь, какъ-то: короста, корь, оспа; излишнее тепло, какъ по причинѣ ношенія очень теплаго по качеству и по количеству платья, такъ и по причинѣ нагрѣванія покоевъ неумѣреннымъ отопляваніемъ, шнурованія, стягивающія грудь, такъ что она дѣлается узкою и сжатою. Наконецъ весной бываетъ эта болѣзнь примѣтнѣе и чаще, а иногда свирѣпствуетъ эпидемически, такъ что при этомъ причина производящая должна быть какая-то особенная. Эту особенность г. Дядьковскій предполагаетъ въ извѣстной степени электричества и азота въ воздухѣ.

Сущность одинакова съ сущностію другихъ кровяныхъ воспаленій, съ тою разницею, что главный моментъ ея здѣсь есть приливъ крови къ тому мѣсту подреберной плевры, гдѣ больной чувствуетъ колотье.

Распознаваніе воспаленія подреберной плевры отъ воспаленія легкихъ *удобно*: 1) потому что въ первомъ затрудняется вдыханіе, а въ послѣднемъ выдыханіе; 2) потому что при воспаленіи легкихъ мокротныя отдѣленія бываютъ обильны, и притомъ кровь прорывается въ большомъ количествѣ, а при воспаленіи подреберной плевры отдѣленія бываютъ въ маломъ количествѣ, и кровь показывается только въ видѣ полосокъ; 3) потому что при воспаленіи подреберной плевры боль бываетъ сильная, колючая, а именно, большею частію, въ бокахъ, а при воспаленіи легкихъ очень тупая. Еслибы случилось, что объ эти болѣзни были въ одно время, то признаки той и другой дадутъ понятіе объ этой сопряженности.

Предсказаніе относительно опасности жизни при началѣ болѣзни *хорошо*. Относительно продолжительности также хорошо; болѣзнь болѣе 3—5—7 дней вообще не продолжается. Въ частности же относительно продолжительности болѣзни предсказаніе *по различію мѣста*, занимаемаго воспаленіемъ, бываетъ *различно*. Такъ, въ воспаленіи заднемъ предсказаніе бываетъ хуже относительно продолжительности, нежели въ другихъ разностяхъ.

Исходы. Воспаленіе подреберной плевры оканчивается или *разрѣшеніемъ* въ совершенное выздоровленіе, или *отложеніемъ*, которое бываетъ — или пасочное (лимфозное) ссыдающееся, служащее причиною образованія ложной перепонки, посредствомъ которой срастается подреберная плева съ легкимъ, или сывороточное, образующее грудную водянгу, — или *смертію*.

Лѣченіе діететическое состоитъ въ ослабленіи причинъ внутреннихъ — предрасполагающихъ и въ удаленіи причинъ болѣзни выш-

нихъ, производящихъ ее; поэтому оно требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Людямъ *расположеннымъ* къ этой болѣзни, какъ по тѣлосложенію, такъ и по образу ихъ жизни и возрасту, должно *соответствовать избѣгать случаевъ и поводовъ къ ней*, особенно тѣмъ изъ нихъ, которые уже разъ подвергались ей. 2). Они *должны быть умеренны*, какъ въ отношеніи пищи и питья, особенно въ употребленіи спиртныхъ напитковъ, такъ и въ отношеніи тѣлодвиженія на открытомъ воздухѣ, какъ-то: не бѣгать, не бороться, не скакать, не подымать и не носить тяжелыхъ ношей безъ надобности, изъ одной похвальбы своею могучею силою, въ случаѣ же надобности тѣлодвиженія эти дѣлать по силамъ, безъ надсады, безъ надрыва оныхъ, исподволь, съ отдыхомъ, умеренно. *Избѣгать ударовъ, ушибовъ и побоевъ въ грудь*. 3). *Остерегаться отъ простуды*, причемъ съ разгоряченнымъ тѣломъ по выходѣ изъ бани, или по окончаніи трудныхъ работъ, въ поту, изъ тепла вдругъ не выходить на холодный воздухъ, не оканиваться холодною водою, не купаться, и не пить еѣ, не остудившись напередъ какъ слѣдуетъ, и не перемѣнивши потнаго бѣлья сыраго на сухое, чистое; въ трудахъ на вольномъ, открытомъ воздухѣ не спать на сырой землѣ для отдохновенія отъ оныхъ, особенно въ сырое весеннее время и вовремя сѣверныхъ вѣтровъ; обмокшее платье и обувь тотчасъ перемѣнить на сухое. Подверженные кожнымъ сыпямъ, вередамъ, либо привычнымъ отдѣленіямъ, какъ-то: потливости ногъ и рукъ, подъ мышками, геморoidalному истеченію, а женщины во время мѣсячныхъ очищеній, также имѣющіе на себѣ фонтанели или заволоки, должны быть особенно осторожны, чтобы не застудить и чрезъ то не остановить ходъ ихъ и не вогнать внутрь, вопреки лучшимъ намѣреніямъ и благотворнымъ цѣлебнымъ дѣйствіямъ самой природы. Привыкшіе одѣваться и жить тепло не менѣе того должны остерегаться простуды. 4) *Страждущаго* эту болѣзнью должно *содержать въ покое, въ умеренной теплотѣ* отъ 14—16° по Реом. и, сколько возможно, *свободные* и проч. (см. статьи 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго въ истинномъ воспаленіи легкихъ). Для скороходовъ, охотниковъ, земледѣльцевъ, мыловаровъ и др. изложены особыя, сверхъ того, правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное должно вполнѣ соответствовать сущности болѣзни и намѣреніямъ природы, которая цѣлебнымъ своимъ дѣйствіемъ, обыкновенно, стремится къ освобожденію себя отъ этой болѣзни какимъ либо критическимъ отдѣленіемъ: или крови изъ какихъ нибудь частей тѣла, или мокротъ въ видѣ отхаркиванія, или пота, поноса, мутной мочи и проч. Для скорого и точнаго распознаванія пути, который природа пролагаетъ себѣ для этого, чтобы идти въ помощь ей съ нею вмѣстѣ, рука объ руку, нужно знать вполнѣ все устройство человѣческаго организма, порядокъ дѣйствія и причинъ его фабрикаціи, равно и выгоды органической экономіи; поэтому за существеннымъ пособіемъ въ этой болѣзни должно совѣтовать прибѣгать ко врачу, и его

попеченію ввѣрить больного; за отсутствіемъ же его должно поступать слѣдующимъ образомъ: въ легкой степени воспаленія одной грудной подреберной плевы, или плевы и легкихъ, происшедшаго отъ простуды, очень часто бываютъ достаточны: растираніе груди *летучею мазью* (№ 76), *мягчительныя припарки* (№№ 54 и 55), прикладываемыя, подобно какъ изъ сѣнной трухи (№ 122), *горчичники* на бокъ (№№ 88, 89 и 90), теплая *пожарная ванна съ золою* (№ 85), а внутрь *селитра*, или *нашатырь* въ отварѣ просвирокъ *съ солодковымъ сокомъ* (№ 142). При воспаленіи одной грудной плевы, т. е. при колотѣ безъ тяжести въ груди, у людей нѣжныхъ, слабыхъ, достаточны бываютъ: *припускъ* 20—30 *пьявицъ*, потомъ *мушки* на бокъ (№ 58), а внутрь *селитра* въ отварѣ просвирокъ *съ виннымъ камнемъ* (№ 143). Если послѣ пиявицъ на другой день колотье не уменьшается, и пульсъ остается твердымъ и полнымъ, то надобно, или опять приставить пиявицы, или же, вѣрнѣе, *пустить кровь* изъ руки. (При лѣченіи рабочихъ людей нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію). Подробное же описаніе этого ограниченнаго способа лѣченія состоитъ въ слѣдующемъ: такъ какъ главный моментъ сущности колотья есть приливъ крови къ страждущему мѣсту, то если примѣчено будетъ въ началѣ развитія болѣзни, что дѣйствительно больной страдаетъ колотьемъ, какъ воспаленіемъ подреберной плевы, особенно когда имѣлъ привычку открывать кровь, а въ послѣднее время пропустилъ срокъ и не открывалъ, слѣдуетъ допустить открыть кровь изъ вены руки, соимянной съ больнымъ бокомъ. Изъ взрослаго человѣка можно выпустить крови до 1 фунта, а изъ молодаго и нѣжнаго по менѣе, до $\frac{3}{4}$ фунта. Это общее кровопусканіе еще *нужнее* допустить, *если* случится такъ, что *больной страдаетъ заднимъ или спиннымъ колотьемъ*. Вообще, чѣмъ скорѣе открыта будетъ кровь, тѣмъ больному будетъ легче, и замѣчательно, что въ первомъ кровопусканіи гораздо лучше нѣсколько перепустить крови, чѣмъ не допустить, такъ что обильное кровопусканіе, сдѣланное въ началѣ колотья, гораздо болѣе производитъ желанныхъ дѣйствій, нежели малыя кровопусканія, повторяемыя одно за другимъ въ теченіе болѣзни.

Замѣч. Сколько кровопусканіе въ началѣ этой болѣзни полезно, столько же, напротивъ, оно бываетъ вредно, когда назначается неумѣстно. Поэтому въ назначеніи его не слѣдуетъ быть опрометчивымъ и слишкомъ поспѣшнымъ. У мальчиковъ съ 8 лѣтъ нерѣдко являются внезапныя колотья въ бокахъ съ рѣзью и стрѣляющею болью, которые очень скоро и проходятъ или отъ припарокъ, или оттого только, что старики велятъ больному у себя *пососать крестъ*, говоря, что и съ нами это бывало, да скоро проходило. Причиною этой скоропроходящей болѣзни бываетъ неправильное положеніе нижнихъ реберъ, какъ въ отношеніи къ самимъ себѣ, такъ и въ отношеніи къ окололежащимъ частямъ. Чтожь касается до того, что повторять кровопусканіе и продол-

жать его до тѣхъ поръ, пока пропадетъ, что называется, воспалительная плева, или пластина, какъ увѣряютъ рудометы, то это одинъ вредный предразсудокъ: 1) потому что эта плева, или пластина, хотя и называется воспалительною, но не всегда означаетъ воспаление; она бываетъ въ крови, выпущенной изъ больныхъ, страдающихъ и не воспалительными болѣзнями, даже изъ здоровыхъ во время беременности; на это много другихъ обстоятельствъ и исключеній; 2) потому, что не положительно вѣрно дознано, чтобъ состояніе крови на тарелкѣ, или въ сосудѣ, обозначало настоящее ея состояніе въ тѣлѣ; 3) потому что на одномъ признакѣ основываться никогда не должно, а только совокупность можетъ дать болѣе или менѣе точное сужденіе о данномъ предметѣ. Поэтому въ назначеніи кровопусканія нужна эта предосторожность, безъ которой изъ больного можно выпустить всю кровь, а воспалительная пластина всё не пропадетъ, и, ежели кто случайно останется живъ вслѣдствіе этой неумѣренной операціи, то не на радость: такая жизнь хуже смерти; это не жизнь, а одно мученіе—медленный смертоносный ядъ; слѣдовательно напряженность всѣхъ признаковъ, вмѣстѣ взятыхъ, должна только быть руководителемъ на повтореніе кровопусканія. При этомъ должно имѣть въ соображеніи всё то, что замѣчено о кровопусканіи земледѣльцамъ въ истинномъ воспаленіи легкихъ.

Если нѣтъ увѣренности, что это колотье есть дѣйствительно воспаление подреберной плевы, то вмѣсто кровопусканія начать сперва нагрѣвать больныя мѣста прикладываніемъ къ нимъ *мягчительныхъ припарокъ* изъ *сѣнной трухи*, какъ полезнаго, общепотребительнаго противъ этого, народнаго средства (№ 122). Если въ теченіе нѣсколькихъ часовъ это средство не поможетъ, или не сдѣлаетъ облегченія, а если и сдѣлаетъ, то мало, и вскорѣ болѣзнь опять ожесточится, то надо уже приступить къ кровопусканію, а послѣ него опять продолжать припаривать сѣнною трухою. *Кусочекъ фланели*, или *сукна*, какого-бы то ни было, лишь бы былъ чистъ, либо *распоротый шерстяной чулокъ*, также *поротая*, *шерстяная варишкѣ*, въ случаѣ и *салфетки*, обмакиваются въ горячемъ отварѣ сѣнной трухи, слегка выжимаются и прикладываются къ больному мѣсту, какъ и труха, до того теплыми, сколько больной можетъ стерпѣть. По мѣрѣ того, какъ одна припарка простываетъ, должно замѣнять её другою, такою же, или ей подобною. При этомъ строже смотрѣть, чтобы больной не чувствовалъ холода. *Бычій пузырь*, налитый теплыми молокомъ и водою съ перевязаннымъ потомъ вверху отверстіемъ, прикладывается, горячій, къ больному боку, тоже очень полезенъ. *Цвѣты ромашки*, *бузины* и *трава проскурняка*, взятые по ровну, заваренные въ водѣ, какъ обыкновенно завариваютъ сѣнную труху, слегка выжатые и положенные между двумя бѣлыми тряпицами, или въ шерстяномъ чулкѣ, или въ такой же варишкѣ, прикладываются теплыми къ больному мѣсту еще съ болѣею пользою. Припарки эти имѣютъ

ту выгоду, что укрощаютъ боль, ослабляютъ напряженность кровеносныхъ сосудовъ и разрѣшаютъ застой крови и другихъ влагъ. Если ихъ недостаточно, то слѣдуетъ втирать въ больное мѣсто три или четыре раза въ день по чайной ложечкѣ *летучей мази* изъ деревяннаго или миндальнаго масла *съ спиртомъ оленьяго рога* (№ 123). Это дѣлается такъ: наливая нѣсколько капель этой мази на больное мѣсто, разводить по послѣднему теплою, нагрѣтою рукою и втирать до суха, потомъ опять наливать столько же мази и втирать, и продолжать такимъ образомъ, пока вотрется мази съ чайную ложечку. Такия втиранія производить три и четыре раза въ день. Если этого недостаточно, то точно такимъ же образомъ втирается летучая мазь изъ деревяннаго масла *съ нашатырнымъ спиртомъ* (№ 76). Для такого же, но скорѣйшаго и сильнѣйшаго дѣйствія производится втираніе *настойки шпанскихъ мухъ* (№ 117) точно такимъ же образомъ и въ такомъ же количествѣ. Если и это не помогаетъ, и больныя не только не облегчаются, но еще значительно усиливается, или, хотя и облегчается, но мало и медленно, то слѣдуетъ употребить мѣстные кровопусканія посредствомъ *пѣявокъ* или *рожекъ* на больномъ мѣстѣ. Число пѣявокъ назначается отъ 15 до 30, а рожковъ по мѣрѣ того, сколько ихъ нужно, имѣя въ соображеніи рассчитать, что каждая пѣявица высасываетъ крови до 3½ золотн. Отъ этихъ кровопусканій больной получаетъ скорое и благонадежное облегченіе. Когда кровотеченіе послѣ пѣявокъ будетъ остановлено и кровотеченіе изъ пѣявочныхъ раночекъ прекратится, тогда съ большею пользою можно прикладывать горячіе *листья молодой капусты и мать-мачихи*, обращая ихъ нижнею, бѣловатою поверхностію къ тѣлу. Они не только размягчаютъ и ослабляютъ напряженные части тѣла, но производятъ сверхъ того легкую испарину. Если за всѣмъ тѣмъ болѣе все продолжается, то къ больному мѣсту надобно приложить *нарывной пластырь* (№ 58), который держать на немъ, пока натянетъ пузырь; прорѣзавши его и выпустивши матерію, приложить на это же мѣсто *милотный пластырь*; если еще натянется пузырь, то опять прорѣзать и выпустить матерію, а милотный пластырь продолжать прикладывать, перемѣняя его до тѣхъ поръ, пока матерія перестанетъ сочиться. Послѣ того приложить *сукъ* (№ 29), или *свиное сало*, которыя въ случаѣ могутъ замѣнить и *свиное сало*, также *масла: коровье и деревянное*, пока кожа окрѣпнетъ отъ раздраженія. *Замѣч.* При употребленіи нарывнаго пластыря или мушки, нужно имѣть ту особенно осторожность, чтобы въ составъ ихъ непременно входила часть камфоры для приуготовленія остроты шпанскихъ мушекъ, безъ чего отъ нихъ нерѣдко происходитъ трудное мочеиспусканіе съ рѣзью и даже кровавою мочою, а иногда и съ невыносимою болью, при чемъ, если это случится, надобно дать больному принять съ водою камфорный порошокъ (№ 124). *Горчичники* (№№ 88, 89, 90), прикладываемые пониже плеча ко внутренней сторонѣ и повыше кисти на пульсъ

руки, сонмианной больному боку, а въ заднемъ и переднемъ колотѣ къ обѣимъ рукамъ, въ первомъ случаѣ къ лопаткамъ, а въ послѣднемъ къ предплечьямъ, также полезны въ числѣ прочихъ средствъ. Если у больного запоръ, то нужно ставить ему ежедневно *примывательное*, или клистирь, состоящій изъ овсянаго или ячнаго отвара съ отваромъ проскурняка, или съ медомъ, масломъ и въ случаѣ неэффективности оныхъ съ мыломъ, поваренною солью и уксусомъ (№ 95). *Замѣч.* Хотя поселяне, и вообще простой народъ, не павидятъ клистиры, однако въ имѣніяхъ владѣльческихъ, гдѣ больные, большею частію, не остаются безъ врачебной помощи, крестьяне перѣдко до того привыкають къ употребленію ихъ, получая отъ нихъ очевидную пользу, что просятъ о нихъ даже тогда, когда они совсѣмъ не нужны.

Слабительные: *огуречный разсолъ* (№ 7), *толокно съ медомъ и солью* (№ 72), отваръ *чернослова съ медомъ*, патокою и *селитрою* (№ 97) и съ *кремортартаромъ* (№ 99), отваръ *коринки* или *изюма* также съ медомъ и селитрою (№ 98), *сыворотка* съ селитрою и медомъ (№ 100) и *касторовое масло* (№ 101) могутъ въ этомъ случаѣ съ пользою замѣнять примывательное.

При появленіи отдѣленія мокротъ, или мокрото-харканія, надобно помогать лѣкарствами мокрото—разрѣшающими. Для этого полезно пить отваръ *солодковаго корня* (№ 125), разжевывать и проглатывать по-пемногу сгущенный *солодковый сокъ*, или аптечную лакрицу, называемую иначе бабья кожа, пить *чай изъ мать-мачехи*, или принимать *растворъ аммоніаковой камеди* (№ 115) по столовой ложкѣ черезъ часъ. Если больной не только не имѣетъ испарины, но, напротивъ, чувствуетъ жгучій или палящій жаръ на своей сухой кожѣ, то должно давать ему *растительное молоко съ селитрою* (№ 87). Полезно также давать въ этомъ случаѣ по $\frac{1}{8}$ золотн. *нашатыря* въ квасѣ отъ 2 до 4 разъ въ день, а еще лучше попеременно съ вышеозначеннымъ лѣкарствомъ изъ растительнаго молока съ селитрою. Такъ наприм., давши пріемъ селитры, спустя два часа дать пріемъ нашатыря, а спустя еще два часа, опять дать пріемъ селитры и т. д. Употребляется также въ этомъ случаѣ съ большею пользою отваръ *корня сенегги* (№ 119) одинъ, либо съ коричневою водою, если отъ одного дѣлается противно больному, появляется тошнота, позывъ на рвоту и даже самая рвота. Въ такомъ случаѣ и пріемъ его надобно постепенно уменьшать, смотря по тому, какъ желудокъ можетъ выносить его. Это средство помогаетъ отдѣленіямъ, испаринѣ и мочѣ, и въ то же время способствуетъ испражненію низомъ. Въ критическое время болѣзни, когда она достигаетъ послѣдней степени своего развитія, за которымъ слѣдуетъ поворотъ болѣзни къ выздоровленію, что называется переломомъ или кризисомъ, сопровождающимся иногда неимоверною трудностью въ дыханіи, особенно во вдыханіи, неправильнымъ пульсомъ, судорожными движеніями и другими такими признаками болѣзни, которые легко могутъ привести въ

страхъ и ужасъ всѣхъ предстоящихъ, не должно рѣшаться ни на какія дѣйствія съ цѣлью облегчить больного, особенно не пускать кровь и не давать ему какія либо сильныя раздражающія лѣкарства; эти признаки ничто иное, какъ усилія природы побороть болѣзнь. Въ этихъ ея усиліяхъ только мокотно-разрѣшающее питье, напр. чай изъ грудныхъ растений, какъ то: *цветовъ липы, травы буквицы, шалфея* и т. п. *питие* изъ *винныхъ ягодъ, изюма* (№ 114), отвара *ячменя* (№ 113) могутъ вполне соответствовать намѣреніямъ природы и придавать могущество ея усиліямъ. Но если силы больного при этомъ истощены болѣзнію, то въ этомъ случаѣ можно поддержать его небольшимъ количествомъ *сыворотки съ винограднымъ виномъ*.

Воспаленіе сердца и сердечной сумочки *).

Опредѣленіе. Болѣзнь эта есть смѣшанное (бровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся ломотою и щемленіемъ въ сторонѣ сердца, трепетаніемъ его, неправильнымъ жилогіеніемъ и сильною болью при каждомъ сокращеніи и расширеніи сердца; въ самыхъ высшихъ степеняхъ болѣзни бываетъ ощущеніе удара и выстрѣловъ въ сердце.

Признаки этой болѣзни очень разнообразны, смотря по степени ея развитія; если болѣзнь сильна, то признаки ясны; если же болѣзнь слаба и медленна, то напротивъ; самое же легкое воспаленіе совсѣмъ почти незамѣтно. Быстрое и сильное воспаленіе обнаруживается сначала сильнымъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ вдругъ жаръ, и всѣ мѣстные признаки развиваются до того, что послѣ нѣсколькихъ часовъ больной не можетъ дышать, кричить, лицо блѣдное, потъ, особенно на лицѣ. При этомъ болѣзни сопутствуетъ судорожное состояніе, больной лежитъ вытянутымъ, біеніе сердца сильное и безпорядочное, жилогіеніе неправильное, языкъ сухой, дыханіе горячее; отдѣленія и испраженія уменьшены, остановлены и наконецъ больной умираетъ въ судорожныхъ движеніяхъ съ признаками задержанія крови въ головѣ въ теченіи 12. иногда 24-хъ, а иногда 36-ти часовъ. Воспаленію слабому и медленному, вмѣсто судорожнаго состоянія, сопутствуетъ состояніе лихорадочное, именно: жаръ, небольшая боль въ сторонѣ сердца, пульсъ мѣтѣ неправильный. Въ легчайшихъ же медленныхъ случаяхъ этого воспаленія даже едва обнаруживаются мѣстные признаки, и то по временамъ, но только всегда бываютъ воспалительныя признаки въ мочѣ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ полнотѣ крови вообще и въ затруднительномъ поступленіи крови въ легкія въ частности.

Причины внѣшнія (производящія): пораненіе сердца, удары по

*) Отличить эти болѣзни между собою очень трудно, а потому обѣ болѣзни рассматриваются здѣсь вмѣстѣ.

щекамъ, сильный гнѣвъ и другія сильныя страсти, неумѣренное тѣлодвиженіе, напр. во время бѣганія и т. п., дѣйствіе холода на сердечную сторону извнѣ, особенно же холодное питье и не умѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ *).

Сущность этого воспаленія отъ сущности другихъ воспаленій отличается тѣмъ, 1) что моментъ раздражительности въ высшихъ случаяхъ увеличенъ болѣе, нежели въ другихъ, 2) что здѣсь плототвореніе и сѣдаемость мало развиваются, менѣе же всего развитъ моментъ претворенія отдѣленій, потому что въ воспаленіи не очень сильнымъ отдѣленія даже увеличены.

Распознаваніе въ высшихъ степеняхъ *легко*, а въ низшихъ *трудно*. Консультантъ почитаетъ надежнѣйшимъ отличительнымъ признакомъ въ этой болѣзни отъ всѣхъ прочихъ грудныхъ страданій то, что въ ней возможно только горизонтальное положеніе на спинѣ, а въ другихъ болѣзняхъ груди возможно только положеніе сидячее.

Предсказаніе зависитъ отъ степени и мѣстопребыванія болѣзни.

Исходы. Болѣзнь, явственно развитая, безъ пособія не переходитъ въ *здоровье* — не разрѣшается одними усиліями природы, оттого страдающіе въ сильномъ развитіи, безъ врачебной помощи, или получаютъ другую продолжительную *болѣзнь* по причинѣ перехода воспаленія или въ водянку сердечной сумочки, или въ сращеніе сердца съ сумочкою, что однако рѣдко случается, или въ отолстѣніе ушковъ и заслоночекъ сердца, или въ размягченіе и утонченіе сердца, мѣстное и общее; либо умираютъ. Въ такомъ случаѣ переходъ воспаленія въ *смерть* дѣлается отъ чрезмѣрнаго (возвысившагося) раздраженія сердца, истощающаго его силу сокращаться и расширяться, и въ слѣдствіе этого отъ остановки кровообращенія.

Лѣченіе дѣтетическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Должно *беречься* отъ *пораненій* сердца и *потрясеній* его ударами по щекамъ и сильными страстями, особенно непомѣрнымъ гнѣвомъ; 2) *избѣгать* *неумѣренного тѣлодвиженія* во время бѣганія и т. п. *неумѣренного употребленія спиртныхъ напитковъ* и 3) *простуды*

*) 1845 года лѣтомъ, Чистопольскаго уѣзда, села Ялантова одинъ крестьянинъ, крѣпкій тѣлосложеніемъ, большаго роста, 32 лѣтъ отъ роду, выпивши на тощій желудокъ большой ковшъ горѣлки, съ полосьмухи ведра, при благопріятствовавшемъ въ тому случаѣ, пошелъ въ поле жать. За этою работою въ жаркій день онъ вскорѣ почувствовалъ палящій жаръ внутри, говоря что «сердце ему загло» схватилъ буракъ съ холодною водою и выпилъ ее всю. Хотѣлъ было продолжать работу, но не могъ, сѣлъ на землю, согнулся, схватилъ лѣвою рукою себя за лѣвый бокъ у сердца, побѣднѣлъ, закричалъ: «сердце сжало, защемило, застрѣяло, захватило дыханіе» причемъ вскорѣ умеръ. Мнѣ довелось вскрыть его тѣло. Трупозислѣдованіе показало сильнѣйшее воспаленіе въ полостяхъ и существѣ его сердца съ чрезвычайнымъ приливомъ черной и густой, какъ леготь, крови, причемъ и кровеносные сосуды мозга, особенно вены, были напряжены напоромъ въ нихъ крови.

при дѣйствіи холода на сердечную сторону. Земледѣльцы и другіе рабочіе люди, какъ то: носильщики, кирпичники и ямщики въ предохраненіе себя отъ дурныхъ послѣдствій въ слѣдствіе трудныхъ работъ, должны, для смягченія кожи и возбужденія испарины, ходить, если силы позволяютъ, въ баню, что полезно въ ихъ болѣзняхъ; 4) *страдающаго* этою болѣзнію должно *содержать* въ покое, въ *умѣренной теплотѣ* 14—17° по Реом. и, сколько возможно, *свободнымъ*. точно также, какъ и страдающаго истиннымъ воспаленіемъ легкихъ (ст. 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія его діететическаго), съ присовокупленіемъ того, что вѣсныя вещества, какъ въ пищуупотребленіи, такъ и въ питьѣ, при этомъ воспаленіи совсѣмъ не годятся: они вредны.

Лѣченіе существенное въ воспаленіи сердца и его сумочки, явственно развитомъ и трудномъ къ излѣченію, соотвѣтственно сущности и степени болѣзни требуетъ въ пособіе дѣятельнѣйшихъ мѣръ; но какъ моментъ ея служить показаніемъ на безусловное *кровопусканіе изъ вены*, составляющее главный расходъ въ экономіи организма, то благоразуміе требуетъ совершеннаго знанія дѣла въ назначеніи онаго, поэтому непременно нужно совѣтовать въ этомъ случаѣ скорѣе прибѣгнуть ко врачу и дать ему полную свободу дѣйствовать, а за неимѣніемъ его по близости, если болѣзнь очень явственна, больной крѣпкаго сложенія, и говоритъ самъ, что у него сердце жжетъ, щемитъ, горитъ огнемъ, стрѣляетъ, тотчасъ назначить обильнѣйшее кровопусканіе изъ вены лѣвой руки до дурноты и даже обморока, который, если не послѣдуетъ при выпущеніи крови до фунта, продолжать пускать еще полфунта. Въ случаѣ спящей дурноты или обморока, должно больного *впрыскивать холодною водою* въ лицо, которое нужно тотчасъ же обтирать сухимъ теплымъ полотенцемъ. Атлето-бойцевъ лѣчатъ, обыкновенно, кровопусканіемъ, какъ главнымъ средствомъ, потомъ слабительными и строгимъ соблюденіемъ вышеозначенныхъ діететическихъ правилъ, пока продолжается болѣзнь. Къ заплатамъ и подошвамъ ногъ слѣдуетъ попеременно прикладывать *горчичники* (№№ 88, 89, 90). Если на этихъ мѣстахъ негдѣ уже будетъ прикладывать по причинѣ красноты и произведеннаго ими раздраженія, то продолжать прикладывать ихъ къ икрамъ: то къ той, то къ другой, также попеременно. *Хриповники* (№ 90) оказываютъ пользу, подобно горчичникамъ; не должно только ихъ держать на мѣстѣ долѣе произведенной ими красноты, потому что раны, образовавшіяся по причинѣ прикладыванія ихъ, иногда бываютъ продолжительны и трудно заживаютъ. На лѣвый бокъ противъ сердца полезно класть бычачій, телячій, или другихъ домашнихъ животныхъ, *пузырь съ теплымъ молокомъ* или *водою*, или *тѣмъ и другимъ*, смѣшанными по поламъ. Компрессъ, или *веточку*, сложенную вчетверо и *смоченную краснымъ теплымъ уксусомъ*, полезно прикладывать къ тому же мѣсту попеременно, съ припаркою пузыря. Полезны и другія припарки, означенныя въ голотьѣ. Если отъ кровопусканія облегченія въ теченіе сутокъ не было, или было лучше, но болѣзнь опять ожесточилась, то къ лѣвому подре-

берью должно *принудить пиявок* побольше, отъ 15—30; за неимѣніемъ ихъ полезны и *рожки*. Пригрѣванія по бокамъ и у ногъ больного посредствомъ *нагрѣтыхъ кирпичей и кувшиновъ съ теплою водою*, брѣвно замѣнутыхъ, дѣлаютъ также большое облегченіе въ болѣзни. При лѣченіи атлетовъ, или бойцовъ, скороходовъ, носильщиковъ, врючниковъ, бурлаковъ и другихъ рабочихъ людей, подверженныхъ этой болѣзни нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными въ описаніи поселанъ по ихъ быту и званію.

Для внутренняго употребленія очень полезно давать больному *кислая капли* — Галлеровъ элексіръ *съ лавровишневою водою*, или *водою горькихъ миндалей* (№ 126) отъ 10 до 15 капель въ полномъ стаканѣ отварной ключевой воды 2—6 разъ въ день. *Легкія прохлаждающія слабительныя*, какъ то: *отваръ чернослива, коринки, изюма, сыворотка съ селитрою, медомъ или патокою и кремортартаромъ* (№№ 97, 98, 99, 100) употребляются съ большимъ успѣхомъ. Если же болѣзнь не такъ явственно развита, или воспаленіе сердца не такъ велико, то лучше начинать существенное лѣченіе прямо снаружи припущеніемъ *пиявокъ, горчичниками, мягчительными припарками*, втираніемъ *летучей мази, нарывнымъ пластыремъ*, а внутрь: *груднымъ чаемъ*, мокроторазрѣшающими средствами, *растительнымъ молокомъ съ селитрою* и т. п., какъ это описано въ существенномъ лѣченіи воспаления подреберной плевы.

Воспаленіе грудобрюшной преграды.

Определеніе. Воспаленіе грудобрюшной преграды есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся рѣжущею и сжимающею болью при вдыханіи, распространяющеюся по направлению грудобрюшной преграды, въ видѣ опоясыванія.

Признаки. Въ высшей степени воспаленія боль едва выноσιма, особенно при каждомъ движеніи грудобрюшной преграды, какъ-то: дыханіи, кашлѣ, чиханіи и т. п., жаръ и біеніе въ предсердіи; большое, очень трудное дыханіе, вытянутыя подреберья; жестокая горячка и тоска, частая рвота, сухой кашель, напряженный и неправильный пульсъ. Въ легчайшихъ случаяхъ боль бываетъ только при глубокомъ скоропостижномъ вдыханіи, рвота послѣ принятія пищи. Иногда присоединяются и другіе припадки, какъ-то: судороги въ личныхъ мышцахъ, сардоновъ смѣхъ, икота и боль между лопатками, но они, равно какъ и сухой кашель и рвота, составляютъ въ этой болѣзни менѣе существенные признаки.

Причинъ внутреннихъ предрасполагающихъ не видно.

Причины внѣшнія — производящія: простуда извнѣ, холодное питье, употребленіе льда, спѣга, мороженого, напряженіе лёгкихъ при вдыханіи и послѣдовательное задержаніе выдыханія, острая горячительная пища, испугъ.

Сущность. Плототворение и съдаемость не велики. Доказательствомъ тому служить то, что послѣ смерти не находили органическихъ поврежденій.

Распознаваніе *удобно*. Распространеніе боли въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прикрѣпляется грудобрюшная преграда, съ чувствованіемъ стягиванія отъ грудной кости къ спинѣ и поясницѣ, въ видѣ опоясыванія служитъ надежнымъ, отличительнымъ признакомъ воспаленія грудобрюшной преграды отъ всѣхъ прочихъ грудныхъ болѣзней.

Предсказаніе. Хотя Конебургъ считаетъ эту *болѣзнь* очень опасною для жизни и, по большей части, смертельною, но, по новѣйшимъ наблюденіямъ, при врачебномъ пособіи она *не опасна*, только *продолжительна*, что подтверждаетъ и Дядьковский.

Исходъ. Разрѣшеніе.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ *осторожности*: 1) *отъ простуды* извѣтъ, холоднаго питья, особенно употребленія вмѣсто послѣдняго льда и снѣга, что обыкновенно дѣлаютъ поселяне во время пути, и мороженаго у городскихъ жителей, для утоленія жажды въ лѣтніе, жаркіе, знойные дни; 2) *отъ случаевъ напряженія легкихъ* при вдыханіи и послѣдовательнаго задержанія выдыханія; 3) *отъ употребленія острой горьчичной пищи и отъ испуга*; 4) *страждущаго* этою болѣзнію должно *содержать въ покоѣ, умеренной теплоты* 14—16° по Реом. и сколько возможно *свободнѣе*, словомъ: какъ описано въ статьяхъ: 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго въ воспаленіи легкихъ истинномъ, съ присовокупленіемъ, что разговоръ, пѣніе, преполненіе желудка пищею, особенно раздражающею, должно запретить: все это очень вредно; *дышать* больному *совѣтовать* какъ можно *тише*.

Лѣченіе существенное одинаково съ лѣченіемъ воспаленія подреберной плевры, съ тою только разницею, что здѣсь можно обойтись безъ кровопусканія изъ вены, съ однимъ *припущеніемъ пилвоксъ* по направленію боли, опоясывающей грудь, и проч. (о чемъ см. въ соимянномъ лѣченіи подреберной плевры).

Воспаленіе печени.

Опредѣленіе. Воспаленіе печени есть кровяное воспаленіе, обнаруживающееся болью въ правомъ подвздохѣ, затрудненіемъ дыханія и лежанія на лѣвомъ боку, съ явственнымъ разстройствомъ отправления печени.

Раздѣленіе. Воспаленіе печени бываетъ:

- 1) Лихорадочное, или скоротечное;
- 2) Нелихорадочное, или хроническое.

Признаки, выражающіе форму воспаленія печени лихорадочнаго, или скоротечнаго: сперва легкое ощущеніе раздраженія печени, потомъ лихорадочные предвозвѣстники; въ высшихъ степеняхъ раздраженія:

ознобъ и жаръ, сухость во рту, затрудненіе при дыханіи, сухой кашель, острая боль въ верхушкѣ праваго плеча, распространяющаяся часто по ключицѣ и лопаткѣ; нерѣдко тошнота и рвота; запоръ, моча красная и жгучая. Подъ конецъ втораго и третьяго дня болѣзни присоединяется желтизна въ глазахъ, или въ общихъ покровахъ, горечь во рту, языкъ желтый; больной можетъ лежать только на спинѣ. Если болѣзнь до пятаго дня не ослабѣла, то появляется сильная рвота съ изверженіемъ желчи. Наконецъ показываются признаки воспаления легочной оболочки, легѣихъ, грудобрюшной преграды, желудка; появляется гашель съ кровяною мокротою. Болѣзнь оканчивается на 7, или около 10 дня. Въ низшихъ степеняхъ раздраженія, т. е. если воспаление сопровождается только лихорадочными предвозвѣстниками, то къ боли и затрудненію лежать на лѣвой сторонѣ присоединяется тяжесть и боль острая, но сносная, часто печень бываетъ полна и твердовата; языкъ покрывается желтоватою мокротою, вкусъ горькій; запоръ, моча красноватая и вмѣстѣ желтоватая, боль въ правомъ плечѣ легкая, совершенная потеря аппетита, какъ и въ первомъ случаѣ, жажда неутолимая. Лежать бываетъ удобно, большею частію, на правомъ боку. Болѣзнь продолжается до 5—7—12 дней, потомъ всѣ припадки или утихаютъ, и болѣзнь проходитъ, или появляются признаки нагноенія.

Воспаленіе печени нелихорадочное или хроническое бываетъ: *явственное и скрытое*.

Признаки формы нелихорадочнаго, или хроническаго воспаленія печени *явственнаго*: чувство тяжести въ правомъ подвздошѣ, языкъ покрытъ желтою мокротою; вкусъ по временамъ горькій, аппетитъ не такъ хорошъ; позывъ на соленое и кислое; то запоръ, то желчный поносъ; моча мутная, красновато-желтая, больной нетерпѣливъ; лицо, даже вся кожа, или одни бѣлки глазъ желтые; постоянное желаніе уединенія. При изслѣдованіи ручномъ иногда замѣчаются полнота и твердость въ печени, иногда же совсѣмъ ихъ нѣтъ, лежаніе во всякомъ положеніи возможно; боль, большею частію, не ощущается. Болѣзнь можетъ продолжаться мѣсяцы и даже годы.

Признаки скрытаго воспаленія печени: всегдашняя мокротность языка, часто желтая, вкусъ или горьковатый, или, что чаще, острый, похожій на табачный, или перечный, пищевареніе такъ разстроено, что по принятіи пищи чувствуется тяжесть и нерѣдко жженіе подъ ложечкою. Иногда бываютъ отрыжки пищею, или гнилыми яйцами. Испражненія на низъ неправильныя: то запоръ довольно долгое время, то вдругъ на нѣсколько часовъ поносъ. Испражненія нерѣдко сѣрыя, пепельистыя, безъ желчи, безъ запаха, или запаха трупнаго, или слишкомъ жестокия. Больные склонны къ ипохондрическимъ припадкамъ: нетерпѣливости и желанію уединиться. Это воспаленіе можетъ продолжаться очень долго и переходить въ неизлѣчимое затвердѣніе печени, даже окаменѣніе. Лицо, большею частію, подобно лицу долго страдающихъ перемежающеюся лихорадкою, блѣдное, дряблое, нерѣдко желтое въ ви-

дѣ пятенъ, полосокъ или веснушекъ на лицѣ. Съ этимъ вмѣстѣ нерѣдко по всему тѣлу замѣчаются желтыя красныя пятна, переходящія въ лишай.

Воспаленіе печени по мѣстопребыванію бываетъ: наружное, или верхнее и внутреннее или нижнее. Первое находится на наружной, или верхней, выпуклой поверхности печени; а послѣднее имѣетъ мѣстопребываніе свое на внутренней или нижней вогнутой ея поверхности.

Признаки наружнаго, или верхняго воспаленія печени: сильная, колющая острая боль въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ печень, которая увеличивается отъ всякаго движенія грудобрюшной преграды и простирается до шеи и лопатки; оттого вдыханіе бываетъ трудно, а вздохнуть почти невозможно, но выдыханіе легко, сухой кашель, икота, трудное лежаніе на лѣвомъ боку, жибобіеніе полное, твердое или мягкое, не ровное, но вообще скорое. Иногда снаружи примѣтна и ощутительна бываетъ опухоль.

Признаки внутренняго, или нижняго воспаленія печени: тупая, давящая, свинцовая боль въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ печень, которая менѣе увеличивается отъ движенія грудобрюшной преграды, горькій вкусъ, тошнота, рвота, отрыжка, боль въ желудкѣ, желтуха, темная желтошафранная моча, икота, больному легче лежать на правомъ, чѣмъ на лѣвомъ боку.

Замѣч. Въ обоихъ случаяхъ правая верхняя сторона живота подъ ребрами вздута, горяча, при давленіи болитъ и замѣчается воспалительно-желудочная лихорадка. Воспаленіе верхней части печени вообще соблюдаетъ острый, быстрый, а нижній — медленный, продолжительный ходъ.

Причины внутрення (предрасполагающія): холерическій темпераментъ, врожденная раздражительность печени, излишняя дородность, продолжительная перемежающаяся лихорадка *), камни, находящіеся въ печени и желчномъ пузырьѣ, гемороидальное состояніе, суставоленные, подагрическіе и ломотные переносы. Кромѣ того Г. Дядьковский (не безъ основанія) съ вѣроятіемъ допускаетъ за располагающую причину къ воспаленію печени сильное раскисленіе крови, что бываетъ въ низкихъ болотныхъ, особенно жаркихъ мѣстахъ, гдѣ вмѣстѣ съ водородомъ дѣйствуетъ свѣтородъ и теплородъ, говоритъ онъ.

Причины внѣшнія (производящія): механическія насилія на печень; портные, сапожники, тѣачи и тѣачихи преимущественно подвергаются воспаленію печени, сильный, или хотя и не сильный, но часто повторяемый гнѣвъ и досада; холодъ, дѣйствующій, какъ на всю поверхность тѣла, такъ въ особенности на правый бокъ,

*) При вскрытіи мертвыхъ тѣлъ мнѣ часто доводилось замѣчать у страдавшихъ долгое время перемежающеюся лихорадкою, болѣзненное состояніе печени, всегда увеличенной въ объемъ, либо съ затвердѣніемъ въ существѣ ея, либо вмѣстѣ съ тѣмъ и измѣненнымъ въ цвѣтъ.

по этой причинѣ въ концѣ зимы происходятъ даже эпидеміи воспаленій печени; излишнее употребленіе спиртныхъ напитковъ и пищи съ острою горячительною приправою; скоропостижное или насильственное прекращеніе кроваваго и простаго поноса, геморoidalнаго кровоизсраженія, а у женщинъ мѣсячнаго очищенія; большой жаръ, оттого болѣзнь эта очень часто случается въ жарныхъ климатахъ. Въ лѣтнее знойное время въ разныхъ мѣстахъ южной Россіи, вмѣстѣ съ перемежающимися лихорадками, появляется поварьно. Медленное, нелихорадочное воспаленіе печени очень часто бываетъ слѣдствіемъ упорныхъ, перемежныхъ лихорадокъ отъ приливовъ крови къ животу во время лихорадочныхъ приступовъ.

Сущность состоитъ въ большей ссѣдаемости всей массы крови, содержащейся въ печени, но безъ развитія организациі въ печени, потому что кровь, не превращаясь въ органическіе обислы сама, или огустѣваетъ, или превращается въ гной.

Распознаваніе по вышензложеннымъ признакамъ съ большимъ, или меньшимъ затрудненіемъ, *всегда почти возможно*. Воспаленіе печени *сходствуетъ* съ воспаленіемъ подреберной плевры, или *колотымъ*, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что боль въ немъ не такъ остра, что она находится подъ ложными ребрами, что пульсъ не такъ жестокъ, и что больному трудно лечь на лѣвый бокъ. Кромѣ того воспаленіе печени сходствуетъ *съ истерикою и ипохондриею*; но отличается отъ послѣднихъ: 1) лихорадочнымъ состояніемъ, болѣе или менѣе, развитымъ; 2) особеннымъ блѣднымъ и зеленоватымъ цвѣтомъ и желтизною глазъ и кожи. Въ случаѣ же перехода, или распространенія воспаленія печени на другія околележащія внутренности, распознаваніе этой болѣзни очень затруднительно; только долговременная практическая опытность и особая проницательность взгляда на болѣзни можетъ преодолѣть это препятствіе.

Предсказаніе въ отношеніи опасности для жизни зависитъ отъ степени развитія воспаленія и его исходовъ. По свойству печени воспаленіе легко переходитъ въ нагноеніе, или омертвѣніе; смотря по этимъ исходамъ, предсказаніе очень *дурно*. Вообще воспаленіе печени лихорадочное, или скоротечное болѣзнь опасная, особенно если бываетъ соединена съ воспаленіемъ легихъ, или подреберной плевры, или изнурительными кровотеченіями, кровавыми пятнами, бывающими иногда на тѣлѣ, и желтухою. Но ничто такъ не страшно, какъ внезапное прекращеніе боли, хотя бы другіе припадки и продолжались. Это угрожаетъ переходомъ воспаленія въ омертвѣніе (антоновъ огонь). Небольшое кровотеченіе изъ носа по каплямъ служить благопріятнымъ признакомъ; оно облегчаетъ больного. Въ отношеніи продолжительности болѣзни въ формѣ лихорадочной предсказаніе выгодно; въ нелихорадочной — напротивъ. Когда воспаленіе печени переходитъ въ затвердѣніе, или желвакъ, то больной можетъ прожить много лѣтъ, не чувствуя большой боли, лишь бы соблюдалъ приличное пищеупотребленіе; но если

слишкомъ дается спиртнымъ напиткамъ и пищѣ слишкомъ крѣпкой, изъ веществъ животныхъ, то затвердѣніе, или желвакъ, превратится въ ракъ, какъ болѣзнь всегда смертельную.

Исходы. *Разрѣшеніе* болѣзни познается изъ уменьшенія всѣхъ ея признаковъ и выздоравливанія, особенно около 3, 7, 10 и 14-го дней, рѣдко далѣе. Вообще теченіе лихорадочнаго воспаленія печени бываетъ медленное и удобно распространяется на легкія, особенно правое; оно разрѣшается: кровотеченіемъ изъ носа, задняго прохода (открывшимся почечуемъ), рожею на наружныхъ частяхъ тѣла, проливнымъ потомъ, окрашивающимъ рубашку въ желтый цвѣтъ, желчнымъ поносомъ; или же переходитъ въ медленное, хроническое, не лихорадочное воспаленіе, въ заваль печени, оставляющій послѣ себя брюшное полноврѣе, наконецъ въ нагноеніе; гной изливается или въ полость живота, въ кишки, желудокъ, причиняя поносъ, рвоту, или чрезъ брюшную стѣну пробивается наружу въ видѣ нарыва, или наконецъ прокладываетъ себѣ путь чрезъ легкія и производитъ легочную чахотку. *Нагноеніе* познается изъ наступающихъ признаковъ изнурительной лихорадки. *Затвердѣніе* узнается, когда воспаленіе мало по малу исчезаетъ, остается только расстройство въ пищевареніи отъ воспрепятствованнаго отправления печени. Кромѣ того затвердѣніе можно узнать ручнымъ изслѣдованіемъ. *Омертвѣніе* узнается, когда признаки воспаления вдругъ исчезаютъ, появляется изнуреніе силъ, безчувственность и скорая смерть.

Лѣченіе діететическое въ воспаленіи печени требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: Люди, *расположенные къ этой болѣзни*, должны *остерегаться*: 1-е) механическихъ *насилій на печень*, 2-е) сильнаго, или хотя и не сильнаго, но часто повторяемаго, *гнѣва и досады*, 3-е) *простуды* отъ холода, дѣйствующаго какъ на поверхность тѣла, такъ особенно *на правый бокъ*, тѣмъ болѣе подъ конецъ зимы и во время эпидеміи этого воспаленія; 4-е) излишняго *употребленія спиртныхъ напитковъ* и *пищи съ острою горячительною приправою*; 5-е) скоропостижнаго, или *насилъственного прекращенія поносовъ*. Простаго и кроваваго, *геморридальнаго кровоиспращенія*, а у женщинъ *мѣсячнаго очищенія* и 6-е) *большаго жара*, особенно въ жаркомъ климатѣ, гдѣ болѣзнь эта случается чаще; 7-е) *страждущаго* этою болѣзнію должно *содержать въ покоѣ* со стороны души и тѣла, *значительной теплоты* 16—18° по Реом. и сколько возможно *свободнѣе*, точно также какъ сказано въ ст. 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго въ истинномъ воспаленіи легкихъ, съ присовокупленіемъ, 8-е) что обильное *питье прохладительное и разжижающее*, но не кислое, напр. сыворотка, ячная вода, отварная вода, отваръ перловыхъ или овсяныхъ крупъ, такъ полезно, что чѣмъ болѣе будетъ употреблено большимъ, тѣмъ лучше будетъ для него. 9-е) Если при всѣхъ пособіяхъ, или безъ нихъ, собственно отъ запущенія болѣзнь перейдетъ въ затвердѣніе, или желвакъ, то больному надобно распорядиться своею діетою такъ, чтобъ не ожес-

точать болѣзни: воздерживаться отъ излишества мяса; рыбы, отъ спиртныхъ напитковъ, отъ всего очень соленого, или очень приправленнаго. Ему должно *питаться*, большею частію, *растеніями*, какъ-то: плодами, кореньями, *дѣлать тѣлодвиженіе* умѣренное, пить сыворотку, ячную воду, сыворотку послѣ пахтанья и проч. Если онъ жасаетъ напитокъ покрѣпче, то позволить ему одно *легенькое поливцо*, которое не столько горячить, сколько вино и другіе спиртные напитки. Для портныхъ, сапожниковъ и башмачниковъ, ткачей и ткачихъ сверхъ того изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣчение существенное въ воспаленіи печени, хотя бы оно и было лихорадочное, или не лихорадочное, хотя бы наружное, или внутреннее, во всякомъ случаѣ должно быть соотвѣтственно сущности болѣзни, причемъ нужно большое соображеніе съ полнымъ знаніемъ дѣла, а потому благоразуміе требуетъ, чтобы для этого прибѣгали собственно ко врачу, за неимѣніемъ же его по близости должно совѣтовать слѣдующій ограниченный способъ лѣченія: Такъ какъ болѣзнь эта при благопріятныхъ обстоятельствахъ разрѣшается или совсѣмъ незамѣтно, или болѣе или менѣе явственно, и притомъ разными путями: либо чрезъ рѣшительную мочу, испражненіе низомъ, кровотеченіе изъ носа и геморроидальныхъ сосудовъ, потъ, желтую харкотину, или переносы къ наружнымъ частямъ, то при лѣченіи ея необходимо имѣть въ виду эти обыкновенные пути, чтобы удобнѣе располагать и дѣйствовать средствами, смотря по тому, какъ успѣшнѣе въ данномъ случаѣ разрѣшить ее. Если лихорадочное состояніе развилось съ ознобомъ и жаромъ, то въ началѣ болѣзни слѣдуетъ назначить *кровопусканіе* изъ вены правой руки, болѣе или менѣе обильное, смотря по возрасту, тѣлосложенію и привычкѣ больнаго къ кровопусканію отъ 1 до 1½ фунта (отъ 3-хъ до 4½ чайныхъ чашекъ, либо отъ мелкой до глубокой тарелки). Къ больному боку нужно прикладывать почаще *припарки* изъ *сѣнной трухи* (№ 122), или изъ *пузыря съ теплымъ молокомъ* и *водою*, или изъ *мягчительныхъ травъ*, напр. *проскурнячной*, *мать-мачихи*, *рожи*, *цвѣтотъ липы*, *ромашки*, *бузины* и т. п. Послѣ прикладыванія припарокъ противъ больнаго мѣста *втирать* мягчительныя и болеутолительныя мази, какъ-то: *деревянное масло съ камфорою* (№ 71), *летучую мазь* изъ деревяннаго масла съ нашатырнымъ спиртомъ (№ 76) и съ камфорою (№ 77). Если у больнаго испражненіе низомъ недостаточно, то полезно ему наставлять *клизмы*, или промыванія изъ *овсянаго отвара съ медомъ*, для усиленія послабляющаго дѣйствія *съ поваренною*, либо *горькою солью*, а для усиленія дѣйствія прохладяющаго, *съ ренскимъ уксусомъ* (№ 95). Въ случаѣ какихъ либо препятствій къ употребленію клистировъ слѣдуетъ назначать легкія *прохлаждающія слабительныя* внутрь изъ *отваровъ чернослива*, *коринки*, *изюма*, *сыворотки съ медомъ и сметаною* (№№ 97, 98, 99—100) также *огуречный разсолъ съ медомъ и масломъ* (№ 7).

*Тюло*но съ *медомъ* и *солью* (№ 72), *отваръ* коры *крушины* одинъ (№ 79) и съ *горькою солью* (№ 75), *горькую соль* (№ 73), *селитру*, *винный камень*, *отваръ тамариндъ* (№ 144), которые здѣсь доставляютъ большую пользу. Если же, напротивъ, больного слабитъ, и притомъ кровью, то не слѣдуетъ останавливать этотъ поносъ, какъ скоро онъ не расслабляетъ его слишкомъ, имѣя въ виду, что такой поносъ часто бываетъ переломомъ, прекращающимъ болѣзнь. Для внутренняго употребленія полезны здѣсь средства разрѣшающія и прохлаждающія, какъ-то: *отвары: чистотѣла* (№ 127), *одуванчики* (№ 1), *пырея* (№ 3), *мыльнянки* (№ 4), *сенег* (№ 119), *селитра*, очищенная въ порошокъ (№ 86) и въ растительномъ молокѣ (№ 87). Если есть у больного расположеніе къ поту, то должно помогать отдѣленію испарины горячимъ чаемъ изъ *липовыхъ цвѣтотвъ*, *буковицы* и т. п., подобно какъ въ воспаленіи подреберной плевы; равно какъ и въ случаѣ, если покажется увеличенное отдѣленіе мокротъ чрезъ отхаркиваніе, слѣдуетъ помогать этому точно также, какъ означено въ соимянномъ лѣченіи воспаления легкихъ истиннаго. Если этого не достаточно, больному въ продолженіе 3-хъ сутокъ нѣтъ облегченія, лихорадочное состояніе продолжается, и боль въ правомъ боку все еще ощутительна, то слѣдуетъ противъ больного мѣста приставить *пѣвки* отъ 20 до 24, а за немѣніемъ ихъ могутъ быть приставляемы *рожки*. При этомъ по остановленіи крови послѣ припущенія пѣвокъ надобно смотрѣть, чтобы она опять не показалась, и больной не истекъ бы кровью; для этого не излишне запретить ему спать послѣ того. *Ножныя горячія ванны: щелочная* (№ 83) и *горчичная съ солью* (№ 84), температурою въ 27°, въ теченіе 6—8 минутъ доставляютъ больному большую пользу. Если же воспаление печени находится въ слабой степени, лихорадочное состояніе не развивается долѣе предвозвѣстниковъ, то въ такомъ случаѣ вмѣсто кровопусканія изъ вены слѣдуетъ назначать въ началѣ болѣзни при- ставленіе пѣвокъ 10—12 къ правому боку, противъ больного мѣста, а въ геморой, особенно закрывшемся, къ проходу. Потомъ прикладыва- ніе теплыхъ припарокъ, *горчичниковъ*, *нарывнаго пластыря* къ боль- ному правому боку, втираніе мазей, ставленіе ногъ въ горячія ванны: простую, состоящую изъ одной теплой воды, щелочную и горчично-соле- ную, какъ означено выше, съ употребленіемъ тѣхъ же внутреннихъ средствъ.

Воспаленіе печени не лихорадочное лѣчится одинаково, какъ и ли- хорадочное, съ тою разницею, что здѣсь кровопусканіе изъ вены не назначается, а приставляются однѣ *пѣвицы*, или *рожки*. Въ числу прочихъ средствъ должно присоединить въ этомъ случаѣ еще два про- стыхъ, всегда подручныя и очень полезныя средства: *огуречный разсолъ* съ очищеннымъ, свѣжимъ неокисшимъ *медомъ* и *квасъ съ медомъ и солью* (№№ 128 и 129). Во всякомъ случаѣ при лѣченіи какъ тѣачей, тѣачихъ, скороходовъ; сыромятниковъ, такъ и другихъ поселянъ, нуж-

но соображаться съ особыми, изложенными для нихъ правилами, по ихъ быту и званію.

Воспаленіе селезенки.

Опредѣленіе. Воспаленіе селезенки есть кровавое воспаленіе.

Признаки. Въ высшихъ степеняхъ развитія это воспаленіе обнаруживается болью въ лѣвомъ подвздохѣ, особливо при вдыханіи, твердостью селезенки, опухолью, болью въ лѣвомъ плечѣ и ключицѣ, нерѣдко башлемъ, затрудненіемъ дыханія, и сопровождается иногда лихорадочными припадками; но всего чаще болѣзнь бываетъ не лихорадочная, которой признаки почти тѣ же, только въ меньшей степени развитія. Разность зависитъ отъ тѣлосложенія и причинъ производящихъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія): брюшное полнокровіе, продолжительныя перемежающія лихорадки, затвердѣнія и засоренія селезенки.

Причины вѣшнія (производящіяся): 1) механическія насилія; 2) скоропостижное прекращеніе кровоиспражнений естественныхъ, именно мѣсячныхъ, а еще болѣе привычныхъ геморoidalныхъ; 3) перемѣны послѣ лихорадочныхъ болѣзней, особенно накожныхъ; 4) злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ и горячительныхъ кушаній въ особенности производить нелихорадочное воспаленіе селезенки. Ткачи и ткачихи, скороходы и сыромятники особенно бываютъ расположены къ воспаленію селезенки.

Сущность отличается тѣмъ, что моментъ чувствительности мало развитъ, а приливъ крови и сѣдаемость велики.

Распознаваніе по даннымъ признакамъ и припадкамъ *легко*.

Предсказаніе. Относительно опасности для жизни *хорошо*, потому что селезенка мало чувствительна, и потому воспаленіе не такъ сильно развивается. Относительно продолжительности лихорадочное воспаленіе продолжается 12 дней; не лихорадочное продолжается долгое время и *трудно излѣчивается*.

Исходы: разрѣшеніе, нагноеніе, затвердѣніе, омертвѣніе же не замѣчено.

Лѣченіе діететическое въ воспаленіи селезенки требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Каждый* человекъ, *одержимый* брюшнымъ *полнокровіемъ*, или *страдавший* долгое время перемежающеюся *лихорадкою*, либо *имѣющий затвердѣніе въ селезенкѣ*, долженъ особенно *остерегаться* механическихъ *насилій въ лѣвый бокъ*; 2) излишняго употребленія спиртныхъ *напитковъ* и *горячительныхъ кушаній*; 3) скоропостижнаго *прекращенія* мѣсячныхъ *очищеній*, а еще болѣе *привычныхъ* геморoidalныхъ кровоиспражнений и *переносовъ* послѣ лихорадочныхъ *болѣзней*, особенно *накожныхъ*; 4) *страдающаго* этою болѣзнію должно *содержать въ покой, умѣренной теплоты 14—16°* по Реомюру и сколько возможно *свободнѣе*, словомъ: точно также, какъ значится въ статьяхъ: 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго въ воспа-

ленія легких истинномъ. Для ткачей и ткачихъ, скороходовъ, сыромятниковъ и другихъ рабочихъ людей, сверхъ того, изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію, съ которыми нужно соображаться и при существенномъ лѣченіи ихъ.

Лѣченіе существенное воспаленія селезенки точно тоже, какъ и воспаленія печени. Кровопусканія посредствомъ *пѣвокъ*, или *рожекъ*, приставляемыхъ къ лѣвому боку, противъ больнаго мѣста, либо къ заднему проходу. *Кровоусканіе изъ вены* лѣвой руки или лѣвой ноги назначается при общемъ и частномъ брюшномъ полнокровіи, такъ что приставленіе пѣвокъ и рожковъ въ такомъ случаѣ, если потребуется, должно быть послѣ онаго (о проч. см. лѣч. восп. печени).

Воспаленіе желудка.

Опредѣленіе. Воспаленіе желудка есть кровяное воспаленіе, обнаруживающееся жестокою болью и рвотою.

Признаки въ сильныхъ развитіяхъ этого воспаленія слѣдующіе: боль, щемленіе и жаръ подъ ложечкою, тошнота и рвота, особенно по принятіи хотя и малѣйшей пищи, питья, даже простой воды; краснота, сухость и трещины языка, жажда, безсонница, нѣота, тоска, отсутствіе всеобщаго жара, особенно въ конечностяхъ, даже холодъ ихъ; стянутый, малый и дрожащій пульсъ, лицо блѣдное съ холоднымъ потомъ. Разныя судороги, даже водобоязнь, слабость; обмороки при поднятіи головы, при поворотѣ на постелѣ. Таково развитіе лихорадочнаго состоянія желудка. Когда же оно бываетъ не лихорадочное, то общихъ припадковъ нѣтъ никакихъ; мѣстные припадки въ сильнѣйшихъ развитіяхъ явственны, а въ самыхъ низшихъ и мѣстные едва замѣтны; только небольшая сухость языка, который бываетъ болѣе или менѣе нечистъ, непріятное ощущеніе въ желудкѣ, особенно по принятіи пищи, трудное пищевареніе и отрыжка, служатъ признаками воспаленія.

Причины внутреннія (предрасполагающія): излишняя раздражительность желудка, свойственная нѣкоторымъ людямъ, острота желчи, глисты, гнѣздящіеся въ желудкѣ, желудочная грыжа, головныя поврежденія и потрясенія мозга, воспаленія сосѣдственныхъ частей.

Причины внѣшнія (производящія): 1) механическія насплія, какъ-то: удары или пораженія желудка, неудобоваримыя и совсѣмъ не свариваемыя тѣла, наприм. кости и косточки изъ плодовъ, гнилая вредная пища, гнилыя копченныя колбасы, сырая, соленая, испортившаяся бѣлушина; равно острыя раздражающія вещества, какъ наприм. яды, особенно мышьякъ, сулема, мѣдъ (зеленый купоросъ), сильныя рвотныя и слабительныя средства, чрезмѣрное наполненіе желудка; 2) простуда отъ холоднаго питья, глотанія снѣга, льда и мороженаго, особенно на разгоряченное тѣло; 3) остановка мѣсячныхъ очищеній и гемороя и 4) переносы скоропостижно прерванныхъ болѣзней, какъ-то: диктилягры, рожи, острыхъ сыпей, желчнаго и кроваваго поноса, холеры,

кровавой рвоты. Осушатели болотъ, портные, хлѣбники или пекари хлѣба, сапожники и башмачники преимущественно бываютъ подвержены воспаленію желудка.

Сущность отличается большимъ развитіемъ раздражительности мѣстно въ желудкѣ, окружность же тѣла, особенно руки и ноги, находится въ противоположномъ состояніи, такъ что бываютъ очень холодны.

Распознаваніе легко въ лихорадочной формѣ болѣзни; въ не лихорадочной же языкъ есть всегда вѣрный указатель: онъ мохнать, сухъ, шероховатъ, красенъ при тихомъ воспаленіи; при самомъ тихомъ воспаленіи языкъ покрытъ мокротой или весь, или по мѣстамъ, цвѣтъ его мясной, но онъ не сухъ: иногда, какъ бы лоскутами, покрытъ толстою пленкою. Бываютъ такія не лихорадочныя воспаленія желудка, которыя вспыхиваютъ при производящихъ причинахъ; такого рода воспаленіе, происходящее вслѣдствіе переноя, свойственно только желудку и 12-ти перстной кишкѣ. Во всякомъ случаѣ характеристическимъ признакомъ этой болѣзни есть болѣзненное чувство, испытываемое больнымъ всякій разъ, когда онъ проглатываетъ что нибудь твердое или жидкое, а особенно, если его питье или пища слишкомъ горячи, или слишкомъ холодны.

Воспаленіе желудка *сходствуетъ съ желудочною коликою*, происходящею отъ вѣтровъ и спазматическаго состоянія, но отличается отъ нея тѣмъ, что: 1) не имѣетъ той острой рѣжущей боли въ желудкѣ, какая свойственна его коликѣ; 2) не имѣетъ довольно ощутительнаго раздутія и тѣхъ отрыжекъ, которыя свойственны желудочной коликѣ.

Предсказаніе въ лихорадочной формѣ болѣзни опасно для жизни. При общей возвышенной раздражительности и при другихъ неблагоприятныхъ условіяхъ предсказаніе особенно дурно, такъ что, если больной извергаетъ рвотою все имъ проглатываемое, какъ питье, такъ и пищу, если бессонница все продолжается, если есть жгота, если наконецъ пульсъ перемѣшается, и припадки слабости учащаются, то онъ находится въ величайшей опасности. Продолжается болѣзнь не болѣе 7-ми дней; большею частію оканчивается въ 3 дня, иногда въ 24 часа. Предсказаніе въ не лихорадочной формѣ *не опасно* для жизни, если болѣзнь не будетъ предоставлена однѣмъ силамъ природы. Въ отношеніи продолжительности предсказаніе *невыгодно*.

Исходы лихорадочнаго воспаленія; 1) *разрѣшеніе*, обыкновенно прежде 4 дней, если причины скоро будутъ удалены; признаки его слѣдующіе: совершенное послабленіе всѣхъ припадковъ и повсемѣстный потъ; 2) *омертвѣніе*, знакомъ котораго служатъ скоропостижное прекращеніе боли, томленіе и смерть; 3) *растворительное нагноеніе*, познаваемое изъ рвоты съ сукровищею и наступленія припадковъ изнурительной лихорадки. Воспаленіе не лихорадочное переходитъ въ: 1) *разрѣшеніе*; 2) *омертвѣніе мѣстное*; 3) *отвердѣніе* и послѣдующій *скиррръ*; признакомъ послѣдняго служитъ: постоянное давленіе въ сторонѣ желудка,

разстройство пищеваренія и рвота послѣ принятія пищи. и 4) растворяющее нагноеніе.

Лѣченіе діететическое состоитъ въ удаленіи причинъ, какъ внутреннихъ-располагающихъ, такъ и внѣшнихъ производящихъ: для этого требуется соблюденіе слѣдующихъ правилъ: Люди, *подверженные* внутреннему расположенію къ воспаленію желудка, *должны*: 1) *ослабить*, или *совсѣмъ уничтожить* это раздраженіе приличными средствами; такъ напр. если *раздражительность желудка*, свойственная нѣкоторымъ людямъ, неизлѣчима, то полезно открыть и носить на рукѣ искусственную рану (фонтанель), которая, своимъ постояннымъ, безвреднымъ, раздражающимъ дѣйствіемъ, освобождаетъ желудокъ отъ вреднаго, свойственнаго ему раздражительнаго вліянія, какъ на самого себя, такъ и на весь организмъ. Если есть глисты въ желудкѣ, то ихъ слѣдуетъ умертвить и изпражнить (о чемъ значится въ своемъ мѣстѣ). Если острота желчи преимущественно располагаетъ желудокъ къ частымъ воспаленіямъ, то ее слѣдуетъ пригнупить надающими мѣрами и средствами. Въ случаѣ головныхъ поврежденій и воспаленій сосѣдственныхъ частей, само собою разумѣется, напередъ должно излѣчить и возстановить прежнее здоровое правильное состояніе этихъ органовъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, если недостаточно будетъ ограниченныхъ средствъ этого лѣчебника, то должно прибѣгать къ пособію врачей. При всемъ томъ больные должны: 2) особенно *беречь желудокъ* свой *отъ насилій*, какъ то: ударовъ, пораненій, не свариваемыхъ имъ тѣлъ, напр. костей, восточекъ изъ плодовъ, гнилой пищи и т. п., а тѣмъ болѣе отъ острыхъ раздражающихъ веществъ, напр. ядовъ и т. п. сильныхъ рвотныхъ и слабительныхъ средствъ, и отъ чрезмѣрнаго, наполненія желудка: 3) *отъ холоднаго* пштя, глотанія снѣга, льда и мороженаго, особенно на разгоряченное тѣло вообще и преимущественно на разгоряченный желудокъ, въ частности, *чтобы не простудить его*. 4) *Одержимые* болѣзнями дактилагрою, рожею и *острыми сыпями* не должны *вдругъ* и насильственно *прерывать ихъ* во избѣжаніе переносовъ на желудокъ. 5) Женщины свое натуральное *мѣсячное очищеніе*, а мужчины, подверженные геморю, свое привычное *геморoidalное кровоиспращеніе*, должны *охранять отъ всего* того, что *можетъ быть* причиною и *поводомъ къ остановкѣ ихъ*. 5) Страждущаго воспаленіемъ желудка должно *содержать въ покой, умеренной теплоты* 14—16° по Реом. и, сколько возможно, *свободные*, точно такъ же, какъ сказано въ ст. 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго воспаленія легкихъ истиннаго съ присовокупленіемъ: 7) *пищу* должно *давать* ему не иначе, какъ *по немногу*, и такъ, *чтобы она была ни очень тепла, ни очень холодна*. Легкая ячменная, или овсяная, либо манная кашлица, легкій бѣлый грѣпкій хлѣбъ, испеченный и распущенный въ горячей водѣ (въ этой болѣзни малѣйшая кислота бываетъ вредна), либо слабый цыплячій бульонъ, также уха пискарей, ершей, окуней, составляетъ пищу самую приличную, когда воспаленіе желудка не лихорадочное, или хотя и лихорадочное, но зна-

чительно утихло; въ противномъ случаѣ пища совсѣмъ не допускается, а вмѣсто питья должно давать процѣженной сыворотки, ячной воды, настоенной съ хлѣбомъ или сухарями воды, либо настой мягчительныхъ травъ, какъ то: мать-мачихи, рожь, проскурняка, бугвицы, липоваго цвѣта и т. п. 8) Эту діету больной долженъ *соблюдать недѣлю по выздоровленіи*. Для осушателей болотъ, портныхъ, хлѣбниковъ, сапожниковъ и башмачниковъ и др. изложены, сверхъ того, особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное воспаленія желудка должно быть сообразно съ сущностію послѣдняго и причинами, производящими его. Но какъ эта болѣзнь чрезвычайно опасна, течетъ быстро, въ три дня, и часто въ 12 часовъ дѣлается смертельною, особенно когда воспаленіе занимаетъ мѣсто въ правомъ или лѣвомъ отверстіи желудка, отъ омертвѣнія, кроваваго пострѣла, обмороковъ, изнеможенія, то, не медля ни минуты, должно, для подавія врачебной помощи, пригласить врача, которому дать полную свободу дѣйствовать по его усмотрѣнію, имѣя въ виду, что и онъ не можетъ ручаться въ этомъ случаѣ за жизнь больного. За неимѣніемъ же врача по близости, должно ограничиться слѣдующимъ способомъ ея лѣченія.

Если извѣстно, что болѣзнь возникаетъ, или должна возникнуть, по причинѣ проглоченныхъ въ недавнее время какихъ либо острыхъ, механически раздражающихъ желудокъ, веществъ или ядовъ, то, пока воспаленіе не развилось, должно тотчасъ дать больному принимать *рвотное изъ коноплянаго или льнянаго масла съ солью и теплою водою* (№ 112) черезъ каждыя 5 минутъ по столовой ложкѣ, пока произойдетъ достаточная рвота съ изверженіемъ проглоченныхъ острыхъ веществъ. Если этого недостаточно, то, растворяя по одному грану *рвотнаго камня* (количество грана равняется коноплянному зерну) въ ложкѣ теплой воды, продолжать давать черезъ каждыя 5 минутъ до достаточнаго дѣйствія, или по такому же количеству *синяго купороса*, вмѣсто рвотнаго камня, съ теплою же водою. Послѣднія оба средства вѣрнѣйшія и надежнѣйшія для произведенія рвоты въ крайнихъ случаяхъ; но первое, именно рвотный камень, лучше послѣдняго, потому что онъ освобождаетъ желудокъ отъ всего въ немъ находящагося рвотою и потожъ послабленіемъ на низъ. Нерѣдко этимъ однимъ удаленіемъ вредной причины удаляется совсѣмъ и вредное его дѣйствіе, такъ что воспаленіе въ желудкѣ, или совсѣмъ предупреждается, если скоро подана эта помощь, или, если и начало развиваться, то безъ дурныхъ послѣдствій скоро прекращается. Но если воспаленіе уже развилось, и притомъ въ формѣ лихорадочной болѣзни, отъ какой бы ни было причины, то первымъ средствомъ должно быть назначено *кровопусканіе изъ вены руки* 1 до 1½ фунта, смотря по возрасту и сложенію больного, и главное по тому, чѣмъ слабѣ пульсъ и холоднѣе руки, тѣмъ необходимѣе и обильнѣе должно быть кровопусканіе. Потомъ *принуждъ* 30—50 *пиавицъ* къ сторонѣ желудка. Оно только одно есть такое средство, отъ ко-

того зависить успѣхъ. Къ рвотнымъ же средствамъ въ такомъ случаѣ прибѣгать никакъ не должно; они не только бываютъ вредны, но и смертельны. Потомъ точно также продолжать лѣчение, какъ и въ воспаленіи подреберной плевы. Теплыя (но не холодныя и не горячія) и частыя *припарки* изъ *стнной трухи*, *куски фланели*, *сукна*, *шерстянаго чулка*, шерстяной *варежки*, *салфетки*, вчетверо сложенной, обмоченныхъ теплымъ отваромъ трухи, или *мягчительныхъ растений*, *бычьего пузыря* съ теплыми *молокомъ* и *водою*, прикладываемыя противъ желудка, дѣлають большое облегченіе. Хорошимъ вспомоществующимъ этому средствомъ служить *трѣніе* мѣста противъ желудка, именно противъ его впадины *сухою рукою*, или обмоченною въ мягчительномъ отварѣ. Трѣніе это производится всякій разъ, когда прикладываются припарки.

Если этого недостаточно, то *втираніе летучихъ мазей* изъ масла: деревяннаго, льнянаго съ *нашатырнымъ спиртомъ* (№ 76), либо съ *спиртомъ оленьяго рога* (№ 123), доставляетъ значительную пользу. Для скорѣйшаго и сильнѣйшаго дѣйствія этихъ мазей втирають послѣ нихъ *настой испанскихъ мухъ* (№ 117) одинаковымъ образомъ и въ такомъ же количествѣ, какъ и первые, либо, прикладываютъ на это мѣсто (противъ желудка) *нарывной пластырь* (№ 58), *горчичники* (№№ 88, 89, 90), *хрѣмовники* (№ 91). Послѣдніе прикладываютъ, кромѣ того, на руки, ноги и бока. Частое *обмываніе рукъ, ногъ и голеней теплою водою*, также *ножныя ванны горячія* (№№ 96, 83, 84), *горячіе купанья*, *кувшинны съ горячею водою* и другія нагрѣванія подошвъ оказываютъ въ этомъ случаѣ большую пользу.

Если и это не помогаетъ, и болѣзнь не только не облегчается, но еще значительно усиливается, или хотя и облегчается, но мало и медленно, либо только днемъ, а къ ночи опять ожесточается, то должно приставлять противъ больнаго мѣста *пѣвки* отъ 15 до 30, которыя въ случаѣ надобности слѣдуетъ повторить разъ и два въ продолженіе первыхъ 3-хъ сутокъ. *Рожки* же ставить не должно: они раздражаютъ. *Промыванія* (клизмы), составляемыя изъ теплой воды или изъ легкаго овсянаго отвара, въ случаѣ запора, съ коноплянымъ, либо льнянымъ, либо изъ сладкаго миндаля масломъ и медомъ, часто повторяемыя, служатъ вмѣсто внутреннихъ припарокъ, легко послабляютъ животъ и въ тоже время питають больнаго, который часто къ этой болѣзни не можетъ удержатъ никакой пищи въ желудкѣ: слѣдовательно означенныхъ промываній упускать изъ виду не должно, потому что отъ нихъ можетъ зависѣть жизнь больнаго. *Теплая баня*, если только можно ею воспользоваться, также *ванна со щелокомъ*, или *мыломъ съ мягчительными растеніями*, температурою $26\frac{1}{2}$ — 28° по Реом. полезны въ этомъ случаѣ, особенно послѣ кровопусканія; въ ваннѣ должно просидѣть 8—15 минутъ, смотря по силамъ больнаго. *Прим.* При употребленіи припарокъ, бани и ваннъ должно особенно беречься простуды.

Внутрь даются въ этой болѣзни средства двоякаго рода: 1) *обволакивающія*, какъ-то: *масла: деревянное, льняное, конопляное, маковое, сладкоминдальное* и т. п.; *слизи льнянаго стѣмени, вишневаго клѣя, аравійской камеди, салепа, яичный бѣлокъ* и т. п.; *молоко: коровье, козье, кобылье, миндальное, маковое, конопляное* и т. п. Всѣ эти средства даются съ тою цѣлю, чтобы притупить остроту проглоченныхъ ядовъ, или острыхъ, механически раздражающихъ веществъ, когда уже воспаленіе образовалось, и нѣтъ возможности удалить эти вещества, какъ причину болѣзни, изъ желудка рвотными средствами. 2) *Нѣжныя раздражающія, болѣе смягчительныя и прохлаждающія, какъ-то отвары: ямменя (№ 113 и 114), проскурняка, саго, салепа, слизистое питье (№№ 130, 131 и 132).* Слабительныя средства употребляются только тогда, когда воспаленіе желудка бываетъ тихое, нелихорадочное, поддерживающееся особенно запоромъ. Лучшее изъ нихъ въ этомъ случаѣ *клещевидное* (касторовое, пальмовое) *масло*, которое даютъ чрезъ $\frac{1}{2}$ часа, чрезъ часъ, а при тошнотѣ чрезъ два часа и рѣже, по чайной ложечкѣ.

Прим. 1) Внутрь отнюдь не должно давать средствъ раздражающихъ, напр. солей, кислотъ и т. п. 2) Преимущественно обращать вниманіе на причину болѣзни. Въ воспаленіи желудка, по причинѣ срывшейся внутрь сыпи, подагры и проч., требуется скорѣйшее возстановленіе послѣднихъ посредствомъ наружнаго употребленія хрѣновниковъ, горчичниковъ, нарывнаго, теплыхъ ваннъ и припарокъ. Если причиною воспаленія желудка бываетъ прекращенное кровотеченіе, то его должно возстановить, какъ было прежде. 3) Не должно скоро оставлять лѣченіе по прекращеніи болей, а надобно продолжать его по крайней мѣрѣ два или три дня по прекращеніи болѣзни, въ предупрежденіе возврата ея въ сильнѣйшей степени 4) Во всякомъ случаѣ при лѣченіи рабочихъ людей нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Воспаленіе кишекъ.

Опредѣленіе. Воспаленіе кишекъ есть смѣшанное (бровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся чувствованіемъ жара и боли въ кишкахъ, сухостію и краснотою языка, жаждою, запоромъ, иногда рвотою; въ высшемъ развитіи оно сопровождается воспалительно-нервною горячкою.

Раздѣленіе. Воспаленіе кишекъ раздѣляется: 1) *по мѣсту*, имъ занимаемому, на *общее и частное*, а это подраздѣляется на *поверхностное и глубокое*. 2) *По происхожденію*, на *первоначальное и сочувственное*; 3) *по формѣ*, на *простое и сложное*; 4) *по проявленію*, на *явственное и скрытое*. Раздѣленіе воспаленія кишекъ по припадкамъ есть одно изъ лучшихъ; въ этомъ случаѣ оно бываетъ: *лихорадочное*, или скоротечное, и *нелихорадочное*, или хроническое.

Признаки воспаления лихорадочного. Сначала появляется ознобъ, потомъ жаръ, съ развитіемъ котораго развивается сильная, постоянная, жгучая, колючая, или рѣжущая боль въ кишкахъ, увеличивающаяся при давленіи на больное мѣсто и при сильномъ потрясеніи тѣла при кашлѣ, чиханіи и проч.; боль эта часто распространяется по всему животу, который дѣлается напряженнымъ и твердымъ: къ ней присоединяются кромѣ того: сухость и краснота языка, сильная жажда, запоръ, иногда тошнота и рвота; моча красная, жгучая; пульсъ сжатый, напряженный, твердый, ударяющій подобно струнѣ, а чаще слабый, и тѣмъ слабѣе, чѣмъ сильнѣе воспаление; дыханіе короткое; руки, ноги и голова холодѣютъ, не смотря на сильный жаръ въ животѣ; безпокойство и тоска; лицо впалое, блѣдное, по временамъ покрывающееся скоропреходящею краснотою и видимо выражающее страданіе больного; всеобщая слабость; воспаленная часть кишекъ; чѣмъ ближе къ желудку, тѣмъ болѣе замѣчаются: краснота языка, жажда, тоска и щемленіе подъ ложечкою; чѣмъ болѣе бываетъ другихъ сочувственныхъ припадковъ, тѣмъ самая горячка сильнѣе, и въ такомъ случаѣ боль сосредоточивается около пупка. — мѣста, соотвѣтствующаго положенію тонкихъ кишекъ. При воспаленіи же толстыхъ кишекъ боль распространяется по положенію ободочной кишки, или соотвѣтственно прямой, причемъ бываетъ боль въ поясницѣ; запоръ при воспаленіи толстыхъ кишекъ обыкновенно сильнѣе, непрерывное жиленіе, иногда съ изверженіемъ бѣлой и вязкой слизи; спазматическое сжатіе задняго прохода, а иногда выпаденіе прямой кишки: наполненіе и растяженіе геморроидальныхъ сосудовъ; трудное, а иногда и остановленное мочеиспусканіе; горячка при этомъ слабѣе, по причинѣ меньшей чувствительности толстыхъ кишекъ предъ тонкими. Высшую степень воспаления сопровождаютъ: крайняя слабость, икота, бредъ, рвота низовыми испражнениями, лишеніе употребленія языка; наконецъ на 3, 4 или 7 день воспаление оканчивается смертію. Если же оно не достигло высшей степени, и если подана надлежащая помощь, то при постепенномъ уменьшеніи припадковъ болѣзнь переходитъ въ здоровье, а иногда въ хроническую, нелихорадочную форму.

Признаки нелихорадочного воспаления. Ощущеніе тупаго давленія въ кишкахъ, которое при потрясеніи и ощупываніи живота переходитъ въ явственную боль; частые запоры и рвота; трудное мочеиспусканіе, усталость; пульсъ, большею частію, слабый; по временамъ, особенно въ вечеру, бѣглый жаръ и краснота лица, холодъ рукъ и ногъ; въ лицѣ больного выражается что-то особенное: оно представляется багъ бы дикимъ, усталымъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія): брюшное полнокровіе, особенно въ нижней части живота, глисты, упорные запоры, засореніе и затвердѣніе въ кишкахъ, сращеніе ихъ сторонъ съ другими, камень, образующійся въ ихъ каналѣ, грыжа, поносъ простой и кровавый, брюшная водяная болѣзнь.

Причины внѣшнія (производящія): простуда нижней части живота и ногъ во время лежанія животомъ на сырой, голой землѣ, также и во время замоченнаго платья и сырости обуви, очень холодное питье, употребляемое на разгоряченное тѣло; всѣ острые вещества, какъ то: перецъ, пмбпръ, нѣкоторые виды сыра, особенно лимбургскій, незрѣлые плоды, излишнее употребленіе орѣховъ, вѣтругонное пиво, какъ то: старое окисшее, особенно такъ называемый въ народѣ «сынокъ», равно старое, закупоренное въ бутылкахъ пиво или брага, также молодое вино, сильныя слабительныя лѣкарства; разные яды, попавшіе внутрь, излитіе острой желчи, также вещества жесткія и сватывающіяся легко въ шарики, напр. босточки изъ плодовъ, острые подблѣды и разнаго рода механическія насилія, напр. наружныя удары, остановленныя насильственнымъ образомъ привычныя, искусственныя и естественныя испражненія; сюда принадлежатъ: скорое, не постепенное закрытіе искусственныхъ ранъ въ видѣ фонтанелей и завожовъ, остановка гемороя, мѣсячныхъ и родовыхъ очищеній, закрытіе продолжительныхъ язвъ, скрытіе разныхъ наружныхъ воспаленій и сыпей, натужный поносъ, ущемленныя грыжи, завитіе кишекъ, колика всякаго рода, трудные роды. Земледѣльцы и осушатели болотъ преимущественно бывають подвержены воспаленію кишекъ.

Сущность лихорадочнаго воспаленія кишекъ одинакова съ сущностію того же воспаленія желудка, сущность же не лихорадочнаго воспаленія состоитъ преимущественно въ увеличенной сѣдаемости и плотнотворительности кишекъ.

Распознаваніе лихорадочнаго воспаленія *легко*; не лихорадочнаго же, особенно тихаго и притомъ занимающаго не большое пространство, очень трудно; нерѣдко оно не узнается въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ и даже лѣтъ; слѣдовательно должно обращать вниманіе и на самыя малѣйшіе припадки, указывающіе на неправильное состояніе кишекъ. Въ лихорадочномъ воспаленіи кишекъ рвота пометомъ или каломъ означаетъ завитіе ихъ, а рвота желчною, густою, клейкою, большею частию темнозеленоватаго цвѣта, матеріею, опускающеюся при смѣшеніи съ водою на дно сосуда въ видѣ отсѣда такого же цвѣта, служить характеристическимъ постояннѣйшимъ знакомъ въ началѣ этой болѣзни. Но главное должно быть осторожнымъ, чтобы не счесть за воспаленіе кишечную колику, напр. вѣтрную, нервную и др., которыя особенно отличаются отъ воспаленій отсутствіемъ лихорадочныхъ припадковъ и переходеніемъ боли съ одного мѣста на другое.

Предсказаніе, какъ въ лихорадочномъ, такъ и въ нелихорадочномъ воспаленіи, всегда *сомнительно* и очень *часто неблагоприятно*. Въ лихорадочномъ, потому что оно очень быстро развивается; въ нелихорадочномъ потому, что очень трудно распознается, такъ что въ продолженіе распознаванія болѣзни дѣлаетъ такія измѣненія въ кишкахъ, которыя искусство не въ силахъ исправить. Кромѣ того предсказаніе зависитъ отъ бачества причинъ производящихъ, возможности или не-

возможности удалить ихъ, отъ степени продолженія мѣста и пространства воспаленія. Увеличивающаяся опасность жизни опредѣляется по степени боли, рвоты, икоты, тоски, по малому пульсу и холодности членовъ. Надобно остерегаться и не почитать за хорошей признакъ уничтоженія боли при другихъ признакахъ сильной болѣзни. Если рвота только бываетъ по перемежкамъ, а боль переходитъ съ своего мѣста, причемъ промывательныя (клизмы) выходятъ низомъ съ испражненіями, то это служить благопріятнымъ признакомъ. Но ежели больной извергаетъ рвотою промыванія, ежели онъ крайне ослабъ, пульсъ малъ и дрожащій, если онъ блѣденъ, дыханіе его противно и зловонно, то это признаки опасныя, служащіе основательными данными къ заключенію, что болѣзнь кончится трагически. Вязкій потъ, черный и зловонный помѣтъ, перемежающійся пульсъ, совершенное прекращеніе боли — знаки начавшагося уже омертвѣнія и близкой смерти.

Исходы: 1) Разрѣшеніе, по прошествіи 8 дней, совершающееся мочею, испражненіями низомъ, потоми, кровотеченіями изъ геморроидальныхъ сосудовъ. 2) Сращеніе кишекъ между собою и съ около лежащими частями посредствомъ ложной перепонки; образующейся изъ сгущаемой пасоки, отдѣляемой стѣнками кишекъ, въ слѣдствіе чего происходятъ запоры и колики; иногда отдѣлившаяся пасока выходитъ въ видѣ лоскутовъ съ испражненіями. 3) Нагноеніе. Въ этомъ случаѣ боль продолжается, но болѣе тупая, чѣмъ острая; животъ не опадаетъ; испражненіе низомъ бываетъ затруднительно; наступаетъ медленная горячка. Гной или выходитъ низомъ чрезъ заднепроходную кишку, что подаетъ поводъ ожидать совершеннаго исцѣленія, или пробѣдаетъ кишки и изливается въ пустоту живота, послѣ чего слѣдуетъ смерть по причинѣ неизбежной чахотки; либо по причинѣ кишекъ, сросшихся съ мочевымъ пузыремъ, прорывается въ пузырь, изъ котораго гной и испражненіе выходятъ вмѣстѣ съ мочею. 4) Отолстѣніе, которымъ чаще оканчивается воспаленіе хроническое, или лихорадочное. При этомъ бываетъ чувство тяжести или тупаго давленія въ томъ мѣстѣ, гдѣ прежде была боль, затруднительное испражненіе низомъ, сухость во рту, иногда тошнота и рвота каломъ съ судорогами и другими мучительными припадками, оканчивающимися смертію. Это отолстѣніе можно узнать ручнымъ изслѣдованіемъ, особенно у людей худощавыхъ. 5) Омертвѣніе. Оно свойственно только воспаленію лихорадочному, или скоротечному. При немъ совершенно и внезапно прекращаются всѣ боли и мученія; испражненіе низомъ бываетъ противъ воли и въ большемъ количествѣ съ гнилымъ запахомъ; силы ужасно слабѣютъ, хотя чувства души больного бываютъ необычайно веселы и живы, пульсъ дѣлается перемежающійся, едва примѣтный. Исходъ этотъ всегда смертеленъ и происходитъ, большею частію, на 1, 2, 3 день болѣзни, рѣдко позже, чаще случается у людей очень чувствительныхъ и при воспаленіи тонкихъ кишекъ. Однако есть примѣры, что при свертываніи или завитіи кишекъ и ущемленной грыжѣ, омертвѣлыя ихъ части, въ первомъ случаѣ,

извергаются низомъ доскутами, а во второмъ вынимаются чрезъ наружное отверстіе, и жизнь можетъ быть спасена.

ЛѢЧЕНІЕ ДІЕТЕТИЧЕСКОЕ СОСТОИТЪ ВЪ СОБЛЮДЕНІИ СЛѢДУЮЩИХЪ ПРАВИЛЪ: Люди, особенно *кто расположенъ къ воспаленію кишекъ по поводу вышеозначенныхъ внутреннихъ причинъ, должны быть осторожны*: 1) *отъ простуды нижней части живота и ногъ*, холода при замоченномъ платьѣ и сырости обуви; для этого обмоченныя, или отсырѣвшія платье и обувь должно перемѣнять скорѣе на сухія, обтеревъ напередъ животъ и ноги сухимъ полотенцемъ; отъ лежанія на сырой и голой землѣ, также отъ употребленія холоднаго питья на разгоряченное тѣло; 2) отъ излишняго *употребленія всѣхъ острыхъ веществъ*, означенныхъ въ причинахъ вышнихъ, производящихъ эту болѣзнь, старыхъ окисшихъ напитковъ, также веществъ жесткихъ, напр. косточекъ изъ плодовъ и т. п. сильныхъ слабительныхъ лѣкарствъ; 3) *должно избѣгать механическихъ насилій на животъ*, напр. наружныхъ ударовъ, уколовъ, пораненій, или уязвленій, равно случаевъ, производящихъ натужный поносъ, болики всякаго рода, запоры, ущемленіе грыжи, завитіе кишекъ, остановку привычныхъ, искусственныхъ и естественныхъ испражнений, напр. гемороя, мѣсячныхъ и родовыхъ очищеній, закрытія продолжительныхъ язвъ, скрытія разныхъ наружныхъ воспаленій и сыпей, трудныхъ родовъ. 4) *Страждущаго* этою болѣзнію надлежитъ *содержать въ покоѣ* и проч. точно также, какъ и страждущаго воспаленіемъ желудка, и въ отношеніи ухода за больнымъ, и относительно пищи и питья. 5) Больной, *выздоровѣвшій* отъ воспаленія желудка и кишекъ, *долгое время долженъ быть остороженъ въ діетѣ, воздерженъ въ пищѣ*, не употреблять капусты, гороху, свеклы, яблокъ, грушъ, — вообще всякой пищи, развивающей вѣтры въ кишкахъ и располагающей къ рѣзю, поносу, или же разгорячающей, каковы: перецъ и другія пряности, хрѣнъ, горчица; не пить квасу, молодого, кислаго пива, водки; *на животъ носить набедронникъ* изъ фланели, суконки; наблюдать за свободнымъ испраженіемъ низомъ и проч. Для земледѣльцевъ, осушителей болотъ и др. изложены особыя, сверхъ того, правила въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

ЛѢЧЕНІЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЪ ВОСПАЛЕНІИ КИШЕКЪ, какъ болѣзнь изъ числа сильнѣйшихъ и опаснѣйшихъ, которая иногда въ 12-ть часовъ убиваетъ больного, требуетъ непременно, какъ только возможно поспѣшнѣе, помощи врача, которому слѣдуетъ дать полную свободу дѣйствовать по его умотрѣнію, съ полнымъ убѣжденіемъ, что и онъ не всегда можетъ ручаться за жизнь больного; за неимѣніемъ же его по близости должно ограничиться слѣдующимъ пособіемъ противъ сущности болѣзни и причинъ ея. Въ лихорадочномъ (скоротечномъ) воспаленіи кишекъ, такъ какъ главнѣйшій моментъ сущности болѣзни состоитъ въ чрезвычайно возвышенной раздражительности, то назначеніе *кровопусканія* въ этой болѣзни, какъ и въ воспаленіи желудка, необходимо нужно, и тѣмъ нужнѣе, чѣмъ слабѣе и меньше пульсъ; по это-

му, какъ скоро обнаружатся признаки развитія лихорадочнаго воспаленія въ кишкахъ, слѣдуетъ немедленно назначить открыть кровь изъ *вены* руки, сонминой страждущей сторонѣ живота; если боль, обозначающая мѣстопребываніе болѣзни не на срединѣ его — противъ пупка, въ противномъ случаѣ должно открывать кровь изъ вены преимущественно лѣвой руки. Кровопусканіе должно быть обильное, до 1½ фунта (около 4½ чайныхъ обыкновенныхъ чашекъ, или съ обыкновенную глубокую столовую тарелку). Малый, сжатый пульсъ и холодъ конечностей не только не служатъ препятствіемъ къ кровопусканію, но и требуютъ его.

Замѣч. Въ чрезвычайной слабости больного кровопусканіе не одобрается; оно можетъ истощить послѣднія его силы, равнымъ образомъ оно излишне и вредно въ вѣтренной коликѣ, а потому назначать кровопусканіе должно не иначе, какъ съ полною увѣренностію, что это воспаление, а не колика.

Если отъ кровопусканія облегченія не будетъ, то около того мѣста, которое соотвѣтствуетъ внутренней боли, но всегда ниже его, слѣдуетъ припустить *пѣвки* 15—30—40—50, смотря по возрасту, силамъ и степени развитія болѣзни со стороны больного, либо наставлять *рожи* для вытягиванія крови въ соразмѣрномъ количествѣ.

Замѣч. Какъ въ кровопусканіи изъ вены, такъ и пѣвочномъ, нужно тщательно смотрѣть, чтобы наложенная перевязка для остановленія теченія крови не ослабла и не свалилась съ раночекъ, и чрезъ то больной не истекъ бы кровію. Въ предотвращеніе этого больному должно запрещать спать по крайней мѣрѣ около половины сутокъ и даже болѣе, пока увѣрятся въ прочности наложенія перевязки.

А къ тому мѣсту, которое соотвѣтствуетъ внутренней боли, должно приложить *горчичники* (№№ 88, 89, 90). Если, не смотря на постоянное прикладываніе горчичниковъ, краснота скоро пропадаетъ, то въ такомъ случаѣ къ этому же мѣсту должно приложить *нарывной пластырь* (№ 58) на 10—12 часовъ, по истеченіи этого времени снять его и приложить *милотный пластырь*. Образующійся оттого пузырь прорѣзать для испущенія изъ него мокротъ и опять продолжать прикладывать милотный пластырь до совершеннаго заживленія нарваннаго мѣста.

Теплыя *припарки* изъ *спинной трухи* (№ 122), травъ: *проскурняка*, *мать-мачихи*, *рожи* и т. п. также ветошки и суконки, обмоченныя въ теплой водѣ или отварѣ ихъ, прикладываются почаще къ животу противъ больного мѣста, либо къ прочимъ мѣстамъ послѣдняго, оставшимся свободными по припущеніи пѣвокъ и наложеніи нарывнаго пластыря, оказываютъ хорошую пользу. Съ отличнымъ успѣхомъ простой народъ употребляетъ въ этомъ случаѣ припарку изъ *отвара* травы *блѣны*, называемой блекотою; но лучше и безопаснѣе присоединять для этого къ *спинной трухѣ* и другимъ вышеозначеннымъ травамъ *бѣлену*. Она одна, какъ сильный ядъ, можетъ, въ случаѣ излиш-

няго ся употребленія, произвести вредное вліяніе на мозговые и уздоватые нервы. Не менѣе того полезны: частое *обмываніе рукъ и ногъ теплою водою*, прикладываніе *теплыхъ киртичей* или *бутылокъ и кувшиновъ съ теплою водою* къ подошвамъ ногъ, а на пупокъ пузыря съ теплою водою. Эти средства преимущественно важны, когда болѣзнь произошла отъ простуды живота и ногъ, особенно по причинѣ мокраго платья и обуви. *Промыванія* (глистиры), составляемыя изъ ячной, либо овсяной воды съ солью и свѣжимъ коровьимъ масломъ, либо съ масломъ изъ сладкихъ миндалей, а еще лучше составляемыя изъ мягчительныхъ отваровъ, напр. изъ корней *рожи*, или *слизистыхъ нистовъ*, напр. изъ *млянаго съмени* и проч., съ прибавленіемъ, въ случаѣ напряженности боли, въ каждое промываніе по полуголовкѣ и даже по головкѣ *мака*, имѣютъ важность и преимущество своего рода въ этой болѣзни. Ихъ надобно наставлятъ по одному чрезъ каждые два, три часа, и даже чаще, ежели запоръ упоренъ, до дѣйствія. *Масляныя тренія*, состоящія въ натираніи живота теплымъ деревяннымъ масломъ, употребляются въ этой болѣзни съ большимъ успѣхомъ. Производить ихъ должно слѣдующимъ образомъ: взявъ масла деревяннаго, или прованскаго, либо масла изъ сладкихъ миндалей, разогрѣть его въ надлежащемъ сосудѣ. Потомъ, опустивъ въ этотъ сосудъ съ теплымъ масломъ руку, натирать ею животъ больного по всѣмъ направленіямъ. Какъ скоро масло съ руки войдетъ въ кожу, то надобно опять намазать ее и продолжать натирать. Операция эта продолжается чрезъ каждые $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ часа. Иногда животъ смягчается этимъ средствомъ при первой попыткѣ, но часто бываетъ нужно повторять операцию три или четыре раза, черезъ часъ. Если этого недостаточно, т. е. если повторяемыя, надлежащимъ образомъ, тренія останутся безуспѣшными, то полезно назначить больному послѣ того *ванну* съ умѣренною теплою, посадивъ его такъ, чтобы вода доставала до груди, на время, сколько позволятъ его силы: по выходѣ изъ ванны больной долженъ лечь въ *теплую постель*, чтобы отдохнуть и успокоиться, а потомъ, собравшись съ силами, опять сѣсть въ умѣренно-теплую ванну, часа на два, если будетъ можно. Это средство также можно повторять нѣсколько разъ, до желаннаго дѣйствія. Оно такъ смягчаетъ и разрѣшаетъ животъ, что большею частію больные, послѣ того, довольно испражняются низомъ. При этомъ должно обращать вниманіе на причины, производящія болѣзнь; онѣ здѣсь заслуживаютъ особеннаго уваженія. Ежели болѣзнь произошла отъ грыжи, то надобно вправить кишку. Для этого больного слѣдуетъ положить такъ, чтобы голова его была ниже туловища, а крестецъ особенно возвышенъ. Въ этомъ положеніи вышедшая кишка слегка нажимается пальцами и рукою. Ежели это средство, равно промыванія и припарки, останутся неэффективными, то значить грыжа ущемлена, и требуетъ операцию, которую можетъ сдѣлать только опытный хирургъ. Если прекращенныя кровотеченія причиною болѣзни, то слѣдуетъ ихъ возстановить. Внутрь вогнанныя сыпи и другія

болѣзнетворныя остроты помощію нарывныхъ пластырей должно вывести на наружную поверхность. Засоренія, завалы, камень въ кишкахъ разрѣшать приличными средствами. Глисты умертвить и выгнать средствами противоглистными, и пр. Для внутренняго употребленія полезны: *слизистое питіе* (№ 130), *слизистая эмульсія* (№ 131) по одной ложкѣ черезъ часъ; *отваръ салепа* (№ 132) также по ложкѣ черезъ часъ; *эмульсіи: конопляная, маковая и миндальная* (№ 87) только безъ селитры, а съ однимъ золотишкомъ *англійской соли*, употребляются такимъ же образомъ. Коровье, особенно парное молоко даютъ понемногу пить больному съ большою выгодною, *касторовое* (блещевидное, пальмовое) *масло* для прослабленія низомъ вѣрнѣе производить свое дѣйствіе. Оно дается по столовой ложкѣ разъ и два раза въ сутки. Для остановленія рвоты и укрощенія другихъ припадковъ полезны бислоты, и потому надобно *подкисливать питіе* большого *виннымъ камнемъ, лимоннымъ сокомъ*, или, ежели этого не случится, *ренскимъ уксусомъ*.

Въ нелихорадочномъ (хроническомъ) воспаленіи кишекъ *кровопусканіе* изъ вены не нужно, а только *плевочное* и *рожковое*, и то въ маломъ количествѣ. Прочія наружныя и внутреннія средства употребляются тѣ же, какъ и въ лихорадочномъ ихъ воспаленіи, съ тою разницею, что не такъ поспѣшно и быстро смѣняютъ одни средства на другія, какъ въ послѣднемъ. При лѣченіи земледѣльцевъ, осушателей болотъ и другихъ рабочихъ людей нужно соображаться съ правилами, изложенными въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Воспаленіе брюшины.

О п р е д ѣ л е н і е. Воспаленіе брюшины есть кровавое воспаленіе, обнаруживающееся постоянною, острою, колючею и жгучею болью живота; боль отъ прикосновенія, напряженія брюшныхъ мышцъ и лежанія на бокахъ усиливается, и потому страдающіе этою болѣзнію всегда лежатъ на спинѣ.

П р и з н а к и. Сперва легкое подираніе по кожѣ, потомъ ознобъ безпрерывный, или прерывающійся въ продолженіи 12—24 часовъ, съ неприятнымъ чувствомъ, дрожаніемъ и онѣмѣніемъ конечностей; за нимъ слѣдуетъ жаръ, потомъ боль во всемъ животѣ, или въ нѣкоторой его части, острая, постоянная, постепенно возрастающая, жгучая, колючая, не позволяющая дотронуться до живота больного, съ жаждою и палющимъ жаромъ; лежаніе на боку, чиханіе, кашель, испражненіе низомъ и даже дыханіе замѣтно увеличиваютъ боль; дыханіе притомъ короткое, частое, трудное, совершающееся одною грудью, особенно вдыханіе сопряжено съ сильною болью живота, сверхъ того больной чувствуетъ боль въ головѣ. Къ ночи болѣзнь ожесточается, а въ утру послабляется,—становится легче; пульсъ твердый, сжатый и частый; лицо блѣдное, глаза слезащіяся, языкъ влажный и покрытый слизью, или су-

хой и жесткій: моча красная съ жгучею болью при испражненіи ея. Въ высшихъ степеняхъ развитія болѣзни присоединяются: икота, тошнота и рвота, запоръ, безсонница, бредъ, подергиваніе сухихъ жилъ, частыя необыкновенныя движенія головою; если при этомъ не будетъ подана помощь, то больные умираютъ въ теченіе 24 часовъ, или двухъ, трехъ дней при жесточайшихъ боляхъ въ животѣ; или мучительныя боли внезапно превращаются, вмѣсто палящаго жара появляется чувство холода, пульсъ частый, перемежающійся, конечности холодѣютъ, силы мгновенно упадаютъ и при видимомъ развитіи гнилостной горячки вскорѣ слѣдуетъ смерть, въ 9, 12 день. Въ счастливыхъ же случаяхъ, какъ боли живота, такъ и всѣ припадки между 5-мъ и 14-мъ днемъ утихаютъ: пульсъ дѣлается медленнымъ, но полнымъ, является теплота въ кожѣ и испарина, лежаніе на бокахъ дѣлается свободнѣе и всѣ отправления постепенно возстановляются. Переломъ болѣзни совершается легкимъ поносомъ, обильнымъ потомъ, отдѣленіемъ мѣсячныхъ кровей и въ 15, 21 день больные, обыкновенно, выздоравливаютъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) худощавость, при которой брыжейка содержитъ мало жира; брюшное полнокровіе, геморрой, грыжа, беременность, роды женщинъ, по сложенію нѣжныхъ, чувствительныхъ, и привычка къ употребленію спиртныхъ напитковъ.

Причины вѣшнія (производящія): удары, нанесенные животу острымъ или тупымъ орудіемъ, болѣе или менѣе тяжелымъ, и вообще всѣ механическія поврежденія, какова бы вида ни были, ущемленіе пупочной, паховой грыжи, сильная простуда во время лежанія въ полѣ животомъ на сырой землѣ, острые нечистоты кишечнаго канала, задержка отдѣленій и испражнений, особенно очищеній мѣсячнаго и родильнаго, воспаленіе сосѣднихъ частей, особенно матки и кишекъ. Беременность и особенно роды и переносъ молока послѣ родовъ отъ груди — наичае бываютъ причиною этого воспаленія, очень опаснаго тѣмъ, что оно легко сообщается другимъ внутренностямъ.

Сущность этого воспаленія отличается отъ сущности другихъ воспаленій тѣмъ, что въ немъ преимущественно развитъ моментъ раздражительности, и тѣмъ, что отдѣленія здѣсь не только не прекращаются, но усиливаются, за исключеніемъ самыхъ высшихъ степеней этого воспаленія.

Распознаваніе. Воспаленіе брюшины сходствуетъ: 1) съ воспаленіемъ желудка, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что въ послѣднемъ боль чувствуется только подъ ложечкою; 2) съ воспаленіемъ кишекъ, отъ котораго отличается тѣмъ, что въ воспаленіи кишекъ боль занимаетъ сперва небольшое пространство, а потомъ уже распространяется; 3) съ воспаленіемъ матки, отъ котораго отличается тѣмъ, что въ воспаленіи матки боль ощущается только въ нижней части живота и въ тазу. Напротивъ, воспаленіе брюшины сопровождается сильнѣйшею болью всего живота, не терпящею ни малѣйшаго къ нему прикосновенія. Сверхъ того отличительный признакъ этого воспаленія состоитъ въ томъ, что больной лежитъ постоянно на спинѣ и совер-

шенно не может поворачиваться на бока. Но важнѣ всего сходство этой болѣзни: 4) съ кишечною какою либо коликою, напр. вѣтреную, нервную, желчную и др., отъ которыхъ непремѣнно должно отличить воспаление, потому что лѣчение этихъ болѣзней слишкомъ различно, а въ отношеніи къ кровопусканію даже противоположно, такъ что въ воспаленіи брюшины кровопусканіе очень полезно, а въ коликахъ, особенно въ вѣтренной и нервной, напротивъ, оно вредно. Главное, не должно забывать, что въ коликахъ нѣтъ лихорадочныхъ припадковъ, и боль въ животѣ переходитъ съ одного мѣста на другое.

Предсказаніе зависитъ отъ обширности и степени воспаления. Простое воспаление брюшины въ человѣкѣ сильномъ при надлежащемъ и своевременномъ лѣченіи *не опасно*; напротивъ, предсказаніе *не благоприятно*, если воспаление брюшины сопряжено съ воспаленіемъ другихъ брюшныхъ внутренностей, особенно у женщинъ беременных и роженицъ; *очень опасно* также воспаление брюшины, происходящее отъ ранъ живота и при хирургическихкихъ операціяхъ. *Относительно продолжительности* болѣзни предсказаніе *всегда хорошо*: выздоровленіе слѣдуетъ, большею частью, между 15 и 21 днемъ. При худомъ исходѣ также долѣе 21 дня болѣзнь не продолжается, а въ иныхъ случаяхъ больные умираютъ между 9 и 12 днемъ, иногда на 2—3 день, и даже въ 24 и 12 часовъ.

Исходы: Разрѣшеніе, которое есть самое благополучное, бывающее между 5—21 днемъ; но рѣдко оканчивается имъ болѣзнь. Чаше воспаление брюшины въ 8—9 день переходитъ въ отложеніе плотно-ссыдающееся, происходящее отъ *сращенія* между брюшиною и окололежащими частями, или сывороточное, составляющее брюшную водянку; *омертвѣніемъ* (антоновымъ огнемъ) оканчивается воспаленіе брюшины очень часто; этого окончанія всегда должно опасаться при весьма сильномъ скоротечномъ воспаленіи; исходъ этотъ смертеленъ и узнается по внезапному прекращенію сильнѣйшихъ болей, по слабому и перемежающему жилюбіенію; по ощущенію холода и по скоропостижному упадку силъ.

Лѣченіе діететическое состоитъ въ соблюденіи слѣдующихъ правилъ: какъ всѣ вообще, такъ преимущественно люди худощавые, равно подверженные геморою, грыжѣ, женщины беременныя, роженицы и родильницы, особенно же люди, привыкшіе къ излишнему употребленію спиртныхъ напитковъ, должны *беречь себя*: 1) отъ всѣхъ ударовъ и механическихъ *насилій на животъ*, какого бы вида они ни были; 2) *отъ простуды*, какъ и въ воспаленіи кишекъ, по причинѣ мокраго и сыраго платья и обуви, которая всегда должно тотчасъ перемѣнять на сухія, также по причинѣ холода и холоднаго питья на разгоряченное и потное тѣло; 3) *отъ острыхъ нечистотъ въ кишечномъ каналѣ*; 4) *отъ задержанія* отдѣленій и испражнений, особенно *очищеній* *мѣсячнаго* и *родильнаго* и 5) отъ воспаления лежащихъ около брюшины частей, преимущественно матки и кишекъ.

Лѣченіе существенное воспаленія брюшины совершенно одинаково, какъ и въ воспаленіи кишекъ, а потому должно всегда въ этомъ случаѣ прибѣгать къ врачу, за неимѣніемъ же его по близости употреблять тѣ же средства, какія описаны въ существенномъ лѣченіи лихорадочнаго (скоротечнаго) воспаленія кишекъ. Особенно полезны: *принускъ*, даже *неодновратный*, *пйавицъ* къ мѣсту начальной боли, *мягчительныя припарки* и *теплыя примочки* живота изъ *отвара ячмыхъ крупъ*, *просвирокъ*, *льнянаго сѣмени*, *ржаной муки*, *отрубей*, посредствомъ шерстяныхъ ветошекъ, втираніе въ животъ летучей мази съ камforoю, масла бѣлены (блекоты), слабительное изъ кастороваго, деревяннаго, прованскаго, льнянаго масла, мягчительныя клистиры изъ отвара льнянаго сѣмени съ масломъ, теплыя ванны и мушка на животъ. При лѣченіи рабочихъ людей нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными для нихъ въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. это описаніе).

Воспаленіе матки.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Воспаленіе матки есть кровавое воспаленіе, обнаруживающееся постоянно возрастающею болью въ полости таза (въ самой нижней части живота, подъ лобкомъ, гдѣ имѣетъ положеніе свое матка), ожесточающееся при прикосновеніи къ тому мѣсту и сопровождаемое чувствомъ тяжести и палящимъ жаромъ въ этомъ мѣстѣ. При этомъ родовое и мѣсячное очищеніе, если бѣ они въ это время были, останавливаются.

ПРИЗНАКИ. Форма этой болѣзни значительно измѣняется, смотря по тому, будетъ-ли она лихорадочная, или нелихорадочная.

Въ формѣ лихорадочной, болѣзнь начинается лихорадочными предвозвѣстиями, за ними слѣдуетъ ознобъ, смѣняемый жаромъ, который вообще бываетъ сильнѣе въ животѣ; конечности же, напротивъ, становятся холоднѣе, нежели какъ онѣ бывають въ обыкновенномъ правильномъ ихъ состояніи; пульсъ, или полный, крѣпкій, или малый, судорожный, но очень скорый. Иногда при этомъ большая слабость, обмороки, судороги и другіе нервныя припадки, часто бываетъ побужденіе ко рвотѣ. Послѣ того постоянная боль въ сторонѣ матки (отличительный признакъ этого воспаленія). Эта боль иногда предшествуетъ лихорадочнымъ припадкамъ, иногда является вмѣстѣ съ ними и продолжается съ одинаковою силою, сосредоточиваясь въ одномъ мѣстѣ. При быстромъ развитіи этого воспаленія больныя впадаютъ въ глубокую печаль, тоску и пускають частые вздохи; дыханіе короткое, лицо блѣдное и холодное, иногда помѣшательство ума, боли усиливаются и распространяются до самыхъ коленъ, животъ надувается и при прикосновеніи дѣлается болѣзненнымъ. Больная часто перемѣняетъ свое положеніе, ложась то на спину, то на одинъ, то на другой бокъ. Это лихорадочное воспаленіе продолжается до 4 и не долѣе 7 дней. Если имѣ по-

поражается передняя часть матки, то боль чувствуется подь лобковыми костями и поражается самый мочевоу пузырь, моча бываетъ красная, даже кровавая, затруднительное испражнение съ рѣзью и жжениемъ, или даже совершенная остановка. Если же поражается задняя часть матки, то боль простирается къ крестцовой и копчиковой кости, причемъ больная чувствуетъ напряженіе въ прямой кишкѣ, боль и затрудненіе при испражненіи на низъ, или дѣлается совершенный запоръ. При поражении болѣе боковыхъ частей, боль простирается къ пахамъ, бедрамъ и даже до самыхъ стопъ, которыя часто потѣютъ, дѣлаются вялыми и отекаютъ. Когда воспаление занимаетъ болѣе шейку и рыльце матки, боль ощущается въ глубинѣ таза, и при прикосновеніи къ маткѣ и даже къ маточному рукаву она дѣлается сильнѣе; части эти тверды, сухи и напряжены. Но когда воспаление обнимаетъ весь органъ, то всѣ исчисленные припадки бываютъ въ совокупности.

Въ формѣ не лихорадочной исподволь является въ полости таза тупая, жгучая, постоянная боль, особенно при движеніи во время перемѣнъ положенія тѣла, при совокупленіи и т. п., причемъ матка находится опухшею и какъ бы ссѣвшею внизъ отъ излишняго прилива крови. Мѣсячныя очищенія скоро послѣ того дѣлаются безпорядочными, сопровождаются болью и сильною коликою въ животѣ, бываютъ очень обильны и нерѣдко смѣняются бѣлыми. Наконецъ тяжесть, напряженія и рѣжущія боли въ маткѣ распространяются на поясницу, на нижнюю часть живота, на бедра, и на наружныя дѣтородныя части, что зависитъ отъ степени развитія воспаления. Къ этому присоединяются и сочувственные припадки, какъ-то: судорожныя боли въ животѣ, худое пищевареніе, безпорядочное испражнение на низъ. Иногда въ продолженіи болѣзни присоединяется и сильная лихорадка, бывающая по вечерамъ. При такомъ состояніи женщины иногда дѣлаются беременными, и въ этомъ случаѣ воспаление нерѣдко превращается въ острое, особенно если послѣдуетъ выкидышъ, что почти неизбѣжно при постоянномъ раздраженіи матки. Не лихорадочное воспаление продолжается нѣскольکو мѣсяцевъ, и даже до полугода.

Причины внутренней (предрасполагающія): возвышенная раздражительность матки, наступленіе возмужалости, сильное влеченіе къ другому полу, сроки мѣсячнаго очищенія, беременность, роды и послѣродовое время, остроты тѣла: золотушная, лишайная, венерическая, располагають преимущественно къ нелихорадочному воспаленію матки.

Причины внѣшнія (производящія): простуда дѣтородныхъ частей или живота, особенно во время мѣсячнаго очищенія и послѣ родовъ, промочка ногъ; механическія насилія, како-то: удары, наносимые на сторону матки, ушибы при паденіи, грубое и неискусное пособіе бабьиповитухи при трудныхъ родахъ, или при извлеченіи послѣда; сильное стягиваніе живота послѣ родовъ и т. п. остановка отдѣленія молока въ грудяхъ, неосторожное остановленіе кровотеченія изъ матки холодными примочками живота, впрыскиваніями въ матку: сильныя сред-

ства, принятыя съ цѣлью произвести выкидышъ, открыть теченіе мѣсячныхъ кровей (сабуръ, мозжевелевое, янтарное масло, шпанскія мушки); сильныя душевныя потрясенія; хроническое воспаленіе матки можетъ происходить отъ неумѣреннаго совокупленія, отъ выпаденія и выворота матки, отъ продолжительныхъ болей, болѣе или менѣе острыхъ, отъ неосторожнаго лѣченія, по которому онѣ вдругъ останавливаются, отъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ, отъ скрытія какихъ либо накожныхъ сыпей и т. п. Женщины — полотеры и поломоищицы, также роженницы и родильницы преимущественно бываютъ подвержены этой болѣзни.

Сущность. Воспаленіе матки отличается отъ другихъ тѣмъ, что въ немъ преимущественно развито раздраженіе и бываетъ сильный приливъ крови. Что касается до припадковъ нервныхъ: слабости чувствъ, обмороковъ, судорогъ, тоски, блѣдности и холода лица, самаго даже помѣшательства ума, то всѣ они бываютъ по причинѣ возвышенной раздражительности въ маткѣ, именно въ слѣдствіе сильнаго отвлеченія ея отъ нервной высшей системы на страждущій органъ; вся нервная дѣятельность устремляется на пораженную внутренность и какъ бы сосредоточивается въ ней; по той же причинѣ обнаруживается онѣмѣлость, вялость и отеки нижнихъ конечностей. Въ хроническомъ воспаленіи матки болѣе важенъ моментъ возвышенной сѣдаемости, что до-базываетъ затвердѣніе, въ которое оно большею частію переходитъ.

Распознаваніе воспаленія матки не такъ *удобно*. Оно сходствуетъ съ воспаленіемъ брюшины, съ которымъ нерѣдко даже сопрягается; хотя отличить эти болѣзни съ надлежащимъ вниманіемъ очень можно, но еслибъ и было въ этомъ случаѣ распознаваніе сомнительно, то это не важно, потому что лѣченіе этихъ болѣзней совершенно одинаково, равно какъ и въ воспаленіяхъ сосѣднихъ внутренностей, наприм. кишекъ, мочеваго пузыря и проч. Много облегчаетъ распознаваніе этой болѣзни время, въ которое подвергаются этому воспаленію, какъ-то: время появленія мѣсячнаго очищенія, время родовъ и послѣ нихъ. Труднѣе распознать хроническое воспаленіе матки: только безпорядокъ ея отправленія даетъ поводъ подозрѣвать его. Главное, нужно быть осторожнымъ, чтобы не признать за воспаленіе матки кишечную колику, наприм. вѣтрную, происходящую отъ скопленія вѣтровъ, желчную, происходящую отъ изліянія острой ѣдкой желчи, нервную, происходящую у женщинъ отъ истеріи, а у мужчинъ отъ ипохондріи, и другія, которыя требуютъ особаго лѣченія и отличаются отъ воспаленія: 1) отсутствіемъ лихорадочныхъ припадковъ; 2) переходеніемъ боли съ одного мѣста на другое; 3) ворчаніемъ, напряженіемъ живота на подобіе барабана въ колнѣ вѣтреной, въ которой при испущеніи вѣтровъ бываетъ облегченіе.

Предсказаніе въ этой болѣзни зависитъ отъ степени развитія и распространенія воспаленія на окололежащія части; равнымъ образомъ и отъ сложенія больной, чѣмъ раздражительнѣе, полнокровнѣе

большая, чѣмъ обширнѣе и сильнѣе воспаленіе, тѣмъ предсказаніе неблагоприятнѣе. Воспаленіе матки острое, лихорадочное часто бываетъ смертельно; 7-й день въ немъ *самый опасный* и страшный.

Исходы: 1) Разрѣшеніе, при которомъ переломъ болѣзни совершаютъ критическіе: потъ или моча, гноевидная слизь, либо кровотеченіе изъ матки, восстановленіе родового или мѣсячнаго очищенія, съ уменьшеніемъ воспалительныхъ признаковъ. 2) Омертвѣніе, при которомъ вдругъ преобразуются всѣ признаки воспаленія, остаются только: упадокъ силъ, едва ощутительный пульсъ, сильный холодъ въ животѣ, безчувствіе, обмороки, судороги, и затѣмъ слѣдуетъ смерть. 3) Нагноеніе, при которомъ обнаруживаются признаки изнурительной горячки. Въ счастливыхъ случаяхъ гной выходитъ наружу чрезъ маточный рубецъ, оставивъ послѣ себя отвердѣніе, иногда онъ пролагаетъ путь чрезъ прямую кишку, или мочевого пузыря, оттого въ пахахъ происходитъ зыблющаяся опухоль, или въ брюшную полость, причемъ смерть неизбежна. При остромъ состояніи тѣла, наприм. золотушномъ, лишайномъ и венерическомъ, нагноеніе идетъ медленно, переходитъ въ изъязвленіе, которое, распространяясь, причиняетъ смерть. 4) Затвердѣніе, которое преимущественно свойственно не лихорадочному воспаленію матки. При немъ признаки воспаленія исподволь исчезаютъ, а появляются: безпорядочное мѣсячное очищеніе, дурное пищевареніе, позывъ ко рвотѣ и рвота, изнуреніе, зеленовато-желтоватый цвѣтъ, боль при испражненіи на низъ, мочеиспусканіи и совокупленіи, бѣлы, иногда онѣмѣніе бедра и расширеніе венъ въ ногахъ.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: *женщины съ наступленіемъ возмужалости, при усиленной раздражительности матки и сильномъ влеченіи къ другому полу, также во время сроковъ мѣсячнаго очищенія, беременности, родовъ и въ особенности послѣ нихъ, именно родильницы, въ предохраненіе себя отъ этой болѣзни, должны беречь преимущественно дѣтородныя части и животъ:* 1) *отъ простуды* мокрымъ или сырымъ платьемъ, холоднымъ воздухомъ и водою, 2) *отъ механическихъ насилій*, в. т. ударовъ, наносимыхъ на сторону матки, ушибовъ при паденіи, грубаго и неискуснаго пособія бабокъ-повитухъ въ беременности, родахъ и извлеченіи послѣда, въ выпаденіи и выворотѣ матки; 3) *отъ сильнаго стягиванія живота послѣ родовъ* и т. п. 4) *отъ сильныхъ душевныхъ потрясеній*; 5) *отъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ и кровогонныхъ средствъ*; 6) *отъ всякаго случая и повода къ остановкѣ отдѣленія молока въ грудяхъ*; 7) *отъ неумѣреннаго совокупленія, продолжительныхъ острыхъ поджигъ бѣлей и неосторожнаго ихъ леченія*, по которому онѣ вдругъ останавливаются; 8) *отъ скрытія каменныхъ либо накожныхъ сыпей*, которыя не должно вгонять внутрь тѣла вяжущими средствами, в. т. бѣлилами, квасцами, купоросомъ и т. п. 9) *страдающую* этою болѣзнію должно *содержать въ покоѣ, умѣренной теплотѣ 14—16° по Реом.* сколько возможно *свободнѣе* и проч., какъ

сказано въ стат. 4, 5, 6, 7, 8, діететическаго лѣченія въ истинномъ воспаленіи легкихъ.

Лѣченіе существенное въ лихорадочномъ воспаленіи матки, какъ болѣзни, большею частію, смертельной, требуетъ немедленной помощи больной врача; за неимѣніемъ же его по близости должно ограничиться тѣми же средствами и способомъ лѣченія, какъ и въ воспаленіи кишекъ и брюшины, потому что сущность этихъ болѣзней совершенно одинакова. При всеобщемъ полнокровіи, при воспалительныхъ свойствахъ горячки, при остановкѣ мѣсячнаго или родового очищенія, необходимо требуется немедленное *кровоопусканіе*, и притомъ обильное, *изъ вены* руки до 1½ фунта (около 4½ обыкновенныхъ чайныхъ чашекъ, или съ глубокую столовую тарелку). Время въ продолженіе первыхъ трехъ сутокъ болѣзни должно считать важнѣйшимъ пунктомъ для кровоопусканія вообще. Если тѣлосложеніе больной нѣжно и слабо, если съ самаго начала болѣзни появляются нервные припадки, если пульсъ малъ и слабъ, то кровоопусканіе можетъ быть излишнимъ и вреднымъ; въ такомъ случаѣ должно ограничиться однимъ *пѣвочнымъ* или *рожковымъ кровоопусканіемъ*, не теряя впрочемъ времени. Если отъ кровоопусканія не послѣдуетъ надлежащаго облегченія въ болѣзни, то въ слѣдъ за кровоопусканіемъ изъ вены нужно поставить пиявки противъ того мѣста, гдѣ чувствуется внутри боль; при остановкѣ мѣсячнаго или родового очищенія пиявки ставятся къ наружнымъ дѣтороднымъ частямъ, вдоль большихъ губъ, около задняго прохода, къ пахамъ, или ко внутренней сторонѣ бедръ 15—30, либо рожки въ соразмѣрномъ количествѣ пѣвочному кровоопусканію, смотря по возрасту, силамъ, тѣлосложенію и степени развитія болѣзни. Въ случаѣ недостаточнаго облегченія отъ кровоопусканія можно приставленіе пиявокъ и рожковъ повторять.

Замѣч. Больной должно запрещать спать послѣ кровоопусканія, чтобы удобнѣе можно было наблюдать, чтобы она не пошла кровію отъ непрочно наложенныхъ перевязокъ на раночки.

Горчичники, нарывной пластырь, теплыя припарки, обмываніе ногъ, рукъ и дѣтородныхъ частей, равно и впрыскиваніе ихъ теплою водою, прикладываніе теплыхъ кирпичей, или бутылокъ и кувшиновъ съ теплою водою къ подошвамъ ногъ и надъ лобковыми бочками — въ самой нижней части живота — *пузыря* съ теплою водою, также промыванія (*клизмы*), *масляныя втиранія, ножныя и цѣльныя ванны* изъ одной теплой воды и съ мыломъ употребляются такимъ же образомъ и тѣже самыя, какія описаны въ существенномъ лѣченіи воспаленія кишекъ, съ разницею, соотвѣтствующею разности мѣста, занимаемаго страждущимъ органомъ. При этомъ наружными средствами должно дѣйствовать на самую нижнюю часть живота. Сверхъ того здѣсь можно впрыскивать въ маточный рубавъ *мягчительные теплые отвары изъ мянаго стѣмени, проскурнячнаго корня, цвѣтвъ ромашки, коровьяго теплаго молока*. Не должно упускать, главное, изъ виду причины, произведшія болѣзнь. Если воспаленіе матки произошло отъ остановки

очищеній, мѣсячнаго или родового, то должно возстановить ихъ надлежащими средствами, о чемъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Если скоропостижное прекращеніе бѣлей причиною воспаленія матки, то должно ихъ опять открыть частыми теплыми припарками и промываніями теплою водою дѣтородныхъ частей и т. п. Если скрѣпѣ какихъ-либо накожныхъ сыпей причиною этой болѣзни, то должно ихъ вызвать отвлекающими, к. т. горчичниками и нарывными средствами. Мѣстныя причины воспаленія, остановившіеся куски послѣда, полипы, наросты и т. п. лѣчатся по правиламъ акушерства и хирургіи. Внутрь полезно давать *селитру въ порошокъ съ вишневымъ клеемъ* (№ 86) и *въ растительномъ молокѣ* (№ 87) также *въ овсяномъ отварѣ* (№ 133). При лѣченіи женщинъ рабочихъ, напр. полотерокъ, поломоекъ и др. нужно соображаться съ правилами, особо для нихъ изложенными въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. въ концѣ лѣчебника).

Въ лихорадочномъ воспаленіи матки, гдѣ главный моментъ сущности есть болѣе возвышенная ссѣдаемость, чѣмъ приливъ крови, *кровопусканіе* изъ вены не нужно и даже вредно. Употребляется *одно пиявочное*, либо *рожковое* кровопусканіе, приставляется 7—15 пиявокъ. Но также, болѣею частію, въ началѣ болѣзни, когда именно воспаленіе еще не перешло въ затвердѣніе. Прочія наружныя средства употребляются тѣже. При сильныхъ боляхъ въ маткѣ втирается надъ лобковыми костями *летучая мазь съ камфорою* 2—6 разъ въ день по чайной ложечкѣ, а внутрь дается *калѣфорный порошокъ* (№ 134). Если лихорадочное (хроническое) воспаленіе матки зависить отъ остротнаго состоянія: лишайнаго, золотушнаго, венерическаго и проч., то лѣченіе должно быть направлено противъ сопряженности.

Воспаленіе мочеваго пузыря.

Опредѣленіе. Воспаленіе мочеваго пузыря есть смѣшанное (бровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся болью и тяжестью въ пузырь, сопутствуемое труднымъ моченспусканіемъ, а иногда и запоромъ мочи.

Раздѣленіе. Смотра по тому, будетъ ли это воспаленіе сопровождаться лихорадочными припадками или нѣтъ, оно раздѣляется на лихорадочное и нелихорадочное.

Признаки лихорадочной формы: боль по направленію мочеточниковъ до почекъ, щемленіе въ заднемъ проходѣ, запоръ, боли во всемъ животѣ, сильный холодъ конечностей, сопровождаемый холоднымъ потомъ, непрерывная лихорадка, а за нею бессонница, жажда и бредъ. Трудное моченспусканіе, а иногда и запоръ мочи, круглая продолговатая опухоль въ нижней передней части живота, надъ тазомъ, причиняющая боль, которая умножается при ощупываніи живота. Опухоль эта становится жестче при скопленіи и застоѣ мочи въ пузырь: при высшей степени болѣзни — тоска, икота, рвота.

Признаки нелихорадочной формы: затрудненіе и жженіе при мочеиспращеніи, измѣненіе мочи, которая у нѣкоторыхъ бываетъ мутная, у другихъ тонкая и красная.

Причины внутреннія (предрасполагающія): особенная раздражительность мочевого пузыря, мочепузырная грыжа, послѣдствія худо лѣченаго перелоа, какъ-то: отолстѣніе предстательной желѣзы (мочеиспускательный клапанъ), суженіе, или сжатіе мочевого канала.

Причины вѣшнія (производящія), почти одинаковыя съ соппяными причинами воспаленія почекъ, слѣдующія: простуда, особенно промежности, промочка ногъ, злоупотребленіе мочегонныхъ, раздражающихъ средствъ, в. т. шпанскихъ мухъ, нарывныхъ пластырей, насильственное задержаніе мочи, прекращеніе мѣсячнаго теченія, механическія вліянія на мочепузырную сторону; отъ этихъ послѣднихъ причинъ происходятъ сильнѣйшія воспаленія пузыря, беременность, роды и послѣдствія родовъ, переносы на мочевой пузырь ревматизма, подагры, любострастной болѣзни, приливъ къ пузырю геморoidalной крови въ слѣдствіе насильственнаго прекращенія геморoidalныхъ кровотеченій; черви и песокъ, находящіеся въ почкахъ и мочеточникахъ, переходящіе въ мочевой пузырь, камень въ послѣднемъ и перелойное воспаленіе мочеиспускательнаго канала. Кузнецы, слесари, каменщики, печники, маляры, щекатуры, обойщики, оснащики машинъ, плетички, портные, фабричные, работающіе сидя, торгоши, сидящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхи, мотальщицы, швеи, вышивальщицы, кружевницы, штопальницы и всѣ женщины и мастеравые, ведущіе сидячую жизнь, подвержены бываютъ воспаленію мочевого пузыря.

Сущность отличается тѣмъ, что здѣсь отдѣленія часто не только не прекращаются, но иногда увеличиваются, особенно при формѣ нелихорадочной.

Распознаваніе легко, по характерическимъ вышеописаннымъ признакамъ. Главное, одну остановку, или задержаніе мочи не должно считать непремѣннымъ признакомъ воспаленія мочевого пузыря; она можетъ зависѣть не только отъ воспаленія его, но и отъ многихъ другихъ причинъ, причемъ требуетъ особеннаго лѣченія, о чемъ говорится въ своемъ мѣстѣ.

Предсказаніе. Воспаленіе мочевого пузыря, относительно опасности для жизни, *редко* бываетъ *смертельно*, и больной умираетъ не иначе, какъ при прекращеніи мочеиспращенія и невозстановленія послѣдняго, причемъ сонливость считается особеннымъ предшествующимъ признакомъ опасности; но очень часто остаются послѣ него дурныя послѣдствія, напр. такая слабость въ пузырьѣ, что моча течетъ не произвольно, т. е. противъ желанія, или постоянная тупая боль съ трудною мочею.

Исходы: 1) Разрѣшеніе, совершающееся критическимъ испращеніемъ обильной и густой мочи, 2) Омертвѣніе, при которомъ вдругъ всѣ припадки воспаленія утихаютъ, появляются охлажденіе всего тѣла

и изнурение, оканчивающіяся смертію. 3) Нагноение, при которомъ нарывъ освобождается отъ гноя и очищается или по стеченіи его съ уриною, или дѣлается изсушение и разрушеніе мочевого пузыря, называемое его чахоткою. Нерѣдко дѣлаются сквозныя раны (фистулы), или наружу, или въ заднепроходный каналъ и въ маточный рукавъ, чрезъ которыя вытекаетъ моча; а ежели срастается съ задне-проходнымъ каналомъ, то изверженія могутъ выходить вмѣстѣ съ уриною. 4) Отолстѣніе, при которомъ продолжается гнетеніе и тупая боль въ мочевомъ пузырьѣ съ трудною мочою.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Въ предохраненіе* отъ воспаленія мочевого пузыря должно *совѣтовать*, какъ всѣмъ вообще, такъ въ особенности людямъ, *имѣющимъ расположеніе* къ этой болѣзни, к. т. раздражительный мочевой пузырь, его грыжу, послѣдствія худо излѣченного перелома, именно отолстѣніе мочевого клапана и суженіе мочеиспускательнаго канала, *чтобы* они, сколько возможно, *остерегались* и избѣгали всѣхъ вышеозначенныхъ *причинъ*, производящихъ это воспаленіе, и въ случаѣ, если предстоитъ *какая* либо изъ нихъ, должно стараться удалить её отъ себя. 2) *Страждущаго* больного должно *содержать въ покоѣ*, умѣренной *теплотѣ* 14—16° по Реом. и, сколько возможно, *свободнѣе*, по его волѣ; должно только оберегать отъ холода, пока признаки воспаленія будутъ продолжаться. 3) Надобно избѣгать всего того, что имѣетъ свойство разгорячать и раздражать; по этому *пища* для него *должна быть легкая*: легкіе бульоны, сладкія растительныя вещества, напр. кашница изъ крупъ полбы, ячменя, овса, пшеница, гречи и т. п. свѣкла, морковь, яблоки, груши, сливы и т. п. въ варевѣ. 4) *Пить* ему должно *давать вдоволь сыворотки, мятнаго настоя, подслащеннаго медомъ, отвара* изъ корней рожжи, солодкового и изъ ячменя, но понемногу, — *по глоткамъ*, или по маленькимъ чашечкамъ, часто повторяемымъ. 5) *Послѣ* воспаленія мочевого пузыря *долго* (2—4 мѣсяца) *не надобно употреблять* вина, водки, кислыхъ щей, молодого, или охислаго стараго *пива*, браги, *воздерживаться отъ соитія*. Для вышеупомянутыхъ рабочихъ людей изложены, сверхъ того, особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное въ воспаленіи мочевого пузыря, какъ болѣзни важной и очень опасной по упорному нерѣдко задержанію мочи, худымъ оттого послѣдствіямъ и причинамъ, большею частію, поддерживающимъ её, требуетъ приглашенія врача для пособія, за неимѣніемъ же его по близости должно ограничиться тѣми же средствами, какія описаны въ существенныхъ лѣченіяхъ воспаленій прочихъ внутреннихъ живота, съ особымъ примѣненіемъ къ мѣсту, занимаемому мочевымъ пузыремъ, и причинамъ болѣзни, болѣе или менѣе постояннымъ.

Въ лихорадочномъ воспаленіи мочевого пузыря *кровопусканіе* назначается въ началѣ болѣзни, при сильномъ развитіи ея, людямъ силь-

нымъ, полнобровнымъ, возмужалаго возраста и темперамента болѣе сангвиническаго, изъ вены руки или ноги, въ количествѣ около фунта (три обыкновенныя чайныя чашки, или мелкую столовую тарелку). Если кровопусканіе недостаточно облегчаетъ больного, ежели боль и воспаленіе остаются при тѣхъ же условіяхъ, то къ больному мѣсту, именно къ нижней части живота, приставляются *рожки*, а къ заднему проходу *пѣявки* (13—19).

Прим. 1) У людей цынготныхъ, слабыхъ, изнуренныхъ, равно и у тѣхъ, у которыхъ воспаленіе мочеваго пузыря происходитъ отъ постоянно-дѣйствующихъ причинъ, какъ-то: мочепузырной грыжи, отолстѣнія мочеваго клапана, суженія моченспускательнаго канала, червей, песка въ почкахъ и камня въ мочево́мъ пузырьѣ, лучше обходиться въ лѣченіи безъ назначенія кровопусканія, которое можетъ быть изнѣшнимъ и даже вреднымъ. 2) Въ случаѣ кровопусканія изъ вены должно смотрѣть за прочностью перевязки, чтобы больной не истекъ кровью.

Въ нижней части живота противъ больного мѣста надлежитъ прикладывать *обмоченныя въ теплой водѣ веточки, салфетки, или пузыри съ теплою водою* и смѣнять ихъ другими, какъ скоро онѣ будутъ высыхать. Эти пузыри бываютъ еще дѣйствительнѣе если наполнить ихъ *отваромъ изъ цвѣтовъ рожки и ромашки*, въ которой прибавляется немного шафрана, смѣшаннаго съ *третьею долею свѣжаго молока*. *Припарки изъ сынной трухи* (№ 122), *травы проскурнячней, рожки, мать-мачихи, цвѣтовъ и головокъ мака* съ небольшимъ количествомъ *бѣлены* также очень полезны. Теплыя *ножныя ванны, полуванны* (въ первомъ случаѣ ноги по колѣни погружаются въ сосудъ съ теплою водою, а во второмъ погружается нижняя половина тѣла по пупокъ), также обмыванія всего тѣла въ теплой водѣ, повторяемыя чрезъ сутки, оказываютъ большую пользу. *Мягчительныя промыванія, или клистиры изъ отваровъ овса, ячменя, крупъ полбы, риса, саго, пшена и т. п.* должны быть часто повторяемы, а ежели они животъ не слабятъ, то нужно *прибавить* къ нимъ *соли, меду, или нѣсколько манны, либо составъ* (№ 95). Если песокъ, или камень въ мочево́мъ пузырьѣ произвели, или поддерживаютъ болѣзнь, то частое *втираніе теплаго масла изъ сладкаго миндаля*, а за неимѣніемъ его *льнянаго масла* въ нижнюю часть живота оказываетъ большую пользу. Внутрь должно давать *камфору въ эмульсіи* (№ 135), *нашатырь* (№ 136) и *доверовъ порошокъ* (№ 137). Изъ слабительныхъ средствъ *касторовое масло* есть наилучшее (№ 101).

Въ нелихорадочномъ воспаленіи мочеваго пузыря должно употреблять тѣ же средства, только безъ кровопусканія изъ вены и не такъ поспѣшно, какъ въ лихорадочномъ.

Прим. Селитра здѣсь, особенно въ лихорадочной формѣ, не годится, да и всѣ сильныя мочегонныя средства не одобряются. Если всеѣмъ остановится испражненіе мочи, то непременно нужно поставить больному катетеръ, а это должно предоставить врачу или свѣду-

шему фельдшеру. При лѣченіи рабочихъ людей нужно соображаться съ особыми изложенными для нихъ правилами въ росписаніи поселянъ по ихъ быту.

Воспаленіе почекъ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Воспаленіе почекъ есть кровяное воспаленіе, наруживающееся тяжестью и болью въ почечной сторонѣ, уменьшеннымъ и даже прекращеннымъ отдѣленіемъ мочи, сильною болью при мочеиспращеніи, подтягиваніемъ яичка, ломомъ и онѣмѣніемъ бедра страждущей стороны.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Смотри по тому, сопровождается ли оно лихорадочными припадками или нѣтъ, оно бываетъ: *лихорадочное* и *нелихорадочное*.

ПРИЗНАКИ. Въ лихорадочной формѣ къ сказаннымъ въ опредѣленіи припадкамъ присоединяются: чрезвычайный жаръ и сильные боли въ почечной сторонѣ, даже съ стягиваніемъ къ позвоночному столбу, лихорадка, тошнота, рвота, часто сильный запоръ, колика, конечности холодныя, блѣдное и холодное лицо, пульсъ твердый, малый. Болѣзнь продолжается 8—14 дней.

Въ нелихорадочной формѣ часто нѣтъ ни лома, ни онѣмѣнія въ бедрѣ, ни подтягиванія яичка, ни затрудненія при мочеиспусканіи; присутствіе воспаленія узнается по краснотѣ мочи, примѣси по временамъ въ ней крови, по боли при наклоненіи тѣла и давленіи на почечную сторону; чаще поражается лѣвая почка.

ПРИЧИНЫ Внутреннія (предрасполагающія) особенная раздражительность почекъ, черви, песокъ и камень въ почкахъ.

ПРИЧИНЫ вѣшнія (производящія): механическія насилія на поясницу, какъ-то: напряженіе, какъ вообще всего тѣла при подниманіи и ношѣ тяжестей, такъ и въ частности спинныхъ и поясничныхъ мышцъ въ трудныхъ работахъ стоямя, напр. у бузнецовъ, слесарей, каменщиковъ, печниковъ, хлѣбниковъ, маляровъ, щекатуровъ, обойщиковъ, оснасточиковъ машинъ, пильщиковъ, фабричныхъ рабочихъ; сидя — торгашей, пряхъ, мотальщицъ и другихъ, ведущихъ сидячую жизнь; равнымъ образомъ и въ верховой ѣздѣ, особенно въ жаркую погоду, и въ тряской ѣздѣ въ телѣгахъ лѣтомъ, а въ саняхъ зимою, по дурной ухабистой дорогѣ; сюда принадлежатъ прыганье, пляска, ушибы, удары, особливо ногъ, продолжительное лежаніе на спинѣ, очень мягкая постель, продолжительное задержаніе мочи; ломота, прекращенныя, привычныя, особенно геморроидальныя кровоспращенія; злоупотребленіе горячительныхъ мочегонныхъ, какъ-то: можжевеловаго масла, шпанскихъ мухъ.

Сущность отличается тѣмъ, что плототвореніе и ссѣдаемость развиваются мало, раздраженіе возрастаетъ сильно.

Распознаваніе въ высшихъ развитіяхъ болѣзни *легко*, но въ

низшихъ *затруднительно*, особенно у людей мало чувствительныхъ, полносочныхъ, геморoidalныхъ и жирныхъ. Въ этомъ случаѣ одна только моча убазываетъ на присутствіе воспаленія. Воспаленіе почекъ сходствуетъ съ желчною коликою, но отличается отъ нея: 1) мѣстопробываніемъ своимъ (боль назади по сторонамъ поясницы) и 2) труднымъ мочеиспусканіемъ; эти признаки въ воспаленіи почекъ постоянны, а въ желчной коликѣ, напротивъ, случаются очень рѣдко. Воспаленіе почекъ (почечная колика), происходящая по причинѣ песка, камня или каменистыхъ зернушекъ, отличается отъ воспаленія, происшедшаго по другимъ причинамъ: 1) острѣйшею болью отъ движенія камня, песочныхъ и каменистыхъ частей, по причинѣ сильнаго тѣлодвиженія, качкою сaney, повозки и проч.: эта боль постепенно идетъ промежутками и возвращается упорнѣйшею; 2) цвѣтомъ мочи, которая бываетъ кровавою, сопливою и иногда песчанною, или съ каменистыми частицами; 3) онѣмѣlostью ноги того бедра; 4) уходомъ въ пахи ядеръ и болью въ мочеточникахъ; 5) рвотою, появляющеюся при каждомъ приступѣ, который продолжается многіе часы, иногда одинъ, два дня сряду; конецъ предвѣщается истеченіемъ мочи, или выходомъ камня, или песка.

Предсказаніе зависитъ: 1) отъ качества причинны производящей; 2) отъ степени развитія болѣзни. Вообще *болѣзнь эта* всегда *опасна*, какъ скоро соединена съ изнурительною горячкою, или худосочнымъ расположеніемъ, неизлѣчимою, гнойною, брюшною водянкою и почечною чахоткою. Она убиваетъ омертвѣніемъ, которое однако рѣдко случается. Чаше переходитъ въ нагноеніе и нерѣдко служитъ основаніемъ образованія камней въ почкахъ.

Исходы: 1) Разрѣшеніе, въ которомъ при появленіи рѣшительнаго испражненія желтой, слизистой, кровавой мочи съ большимъ отсѣдомъ, всѣ припадки уменьшаются. 2) Нагноеніе, признаки котораго тѣ же, какіе при затвердѣніи, но имъ сопутствуютъ часто возвращающаяся боль, моча съ гноемъ и медленная лихорадка. Оно часто случается и даже можетъ продлиться 10 и болѣе лѣтъ, если бываетъ мѣстное, небольшое. Гной въ такомъ случаѣ выходитъ съ мочею. Еслижъ нагноеніе во всей почкѣ, то гной или открываетъ себѣ путь въ полость живота и производитъ гнойную водянку, или дѣлается свищъ наружу, который можетъ зажить, — черезъ такіе свищи даже выпинали камни, — либо пролагаетъ себѣ путь въ заднепроходную кишку, причемъ также нарывъ можетъ очиститься и исцѣлиться, либо остается заключеннымъ и разрѣдаетъ существо почекъ, отчего больной умираетъ почечною чахоткою. 3) Затвердѣніе, которое обнаруживается утихшею болью и лихорадкою, остающимся болѣзненнымъ давленіемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежатъ почки, именно около поясницы и по бокамъ ея, либо въ самой поясницѣ, простирающеюся даже до бедръ, съ частымъ онѣмѣніемъ ногъ, что мѣшаетъ ходить и стоять, а у взрослыхъ можетъ быть причиною хроманья. 4) Омертвѣніе, которое, по общему мнѣнію врачей, рѣдко бываетъ, а по мнѣнію профессора Дядьковского совсѣмъ не бываетъ.

Лѣченіе діететическое въ воспаленіи почекъ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) какъ всѣмъ вообще, такъ и въ особенности людямъ, по особенной раздражительности почекъ съ подозрѣваемыми въ нихъ червями, пескомъ, камнемъ, или безъ этого *подверженными* частымъ воспаленіямъ почекъ, должно *соизвѣствовать* *оберегать* себя, во избѣжаніе этой болѣзни, отъ механическихъ *насилій* на поясницу, именно отъ напряженія, какъ вообще всего тѣла при подниманіи и ношѣ большихъ тяжестей, такъ преимущественно спинныхъ и поясничныхъ мышцъ въ трудныхъ и продолжительныхъ работахъ стоймя (правила для кузнецовъ, слесарей и проч. см. въ особомъ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію), равно въ быстрой верховой ѣздѣ, особенно въ жаркую погоду, въ тряской ѣздѣ лѣтомъ на телѣгахъ, а зимою на саняхъ по дурной ухабистой дорогѣ, также *отъ ушиба*, ударовъ и поврежденій *поясничныхъ позвонковъ*, внушая при томъ, что отъ всѣхъ означенныхъ причинъ происходитъ воспаленіе почекъ, опаснѣйшее, чѣмъ отъ прочихъ. 2) Они должны оберегать себя *отъ простуды*, особенно ногъ, продолжительнаго лежанія на спинѣ и отъ всего прочаго, что сказано въ причинахъ внѣшнихъ, производящихъ эту болѣзнь. 3) Сверхъ того подверженные частымъ возвратамъ воспаленія почекъ должны *воздержаться отъ употребленія вина*, особенно того, въ которомъ много виннаго камня, *тѣлодвиженіе ихъ должно быть умеренное*. Имъ не надобно ни слишкомъ долго лежать на постели, ни слишкомъ тепло одѣваться на ней; равнымъ образомъ они должны *отказаться отъ пуховиковъ* и мягкихъ постелей, *а ложиться только на набитыхъ шерстью тюфякахъ*, преимущественно *кожаныхъ*. 4) *Одержимаго* почечнымъ воспаленіемъ больного должно *содержать*, какъ относительно покоя, теплоты, такъ и въ отношеніи къ пищѣ и питью точно *также, какъ страдающаго воспаленіемъ мочевого пузыря* (о чемъ см. въ своемъ мѣстѣ). 4) *Послѣ* воспаленія почекъ, какъ и мочевого пузыря, *долго* (2—4 мѣсяца) *не надобно употреблять вина, водки, кислыхъ щей, молодого или окислаго стараго пива, браги, и воздержаться отъ соитія*.

Лѣченіе существенное воспаленія почекъ лихорадочнаго совершенно одинаково съ соимяннымъ лѣченіемъ воспаленія мочевого пузыря, и потому по важности причинъ, производящихъ эту болѣзнь, и по неблагоприятнымъ нерѣдко ея послѣдствіямъ должно заблаговременно соизвѣствовать обращаться за пособіемъ ко врачу; за неимѣніемъ же его по близости, слѣдуетъ ограничиться тѣми же средствами, какія выше описаны отъ воспаленія мочевого пузыря, съ примѣненіемъ наружнаго лѣченія къ мѣсту болѣзни, вмѣсто нижней части живота къ надпочечнымъ сторонамъ поясницы и къ самой поясницѣ. Къ этому надобно присовокупить, что если кто подверженъ песку, или камню въ почкахъ и чрезвычайнымъ страданіямъ, когда песокъ или камень, выходя изъ почекъ, проходитъ въ мочеточникахъ (каналы, чрезъ которые протекаетъ моча изъ почекъ въ мочевой пузырь) и останавливается по узкости

этих баналовъ, то болѣе при этомъ мѣсто надобно тереть масломъ изъ сладкаго миндаля и давать внутрь какихъ нибудь легкихъ мочегонительныхъ лѣкарствъ по рюмкѣ черезъ 1/4 часа, какъ то: легкаго настоя травы *пеструшки*, *можжевельныхъ ягодъ*, *листьевъ медвежьего уха*, подслащенного *проскурнячникомъ* сиропомъ въ небольшомъ количествѣ, или чайною ложечкою *селитрянаго* услащенного спирта на бутылку жидкости. Если же при этомъ остановка камня сдѣлается въ мочепускательномъ каналѣ дѣтороднаго уда, то полезно погружать его въ сосудъ съ теплымъ, или *коровьимъ молокомъ*, либо обкладывать теплыми *мягчительными припарками*, также ветошями, обмоченными теплымъ, нагрѣтымъ *льнянымъ*, *березяннымъ* или *миндальнымъ* масломъ. Втиранія *летучихъ маселъ* (№№ 76, 77) въ болѣзныя мѣста, также *комфорнаго масла* (№№ 71, 82) очень полезны. Теплыя ванны употребляются на 8—10 минутъ, два три и четыре раза въ день, *с отрубями*, *сѣнною трухою*, если лихорадочное состояніе, означающее степень воспаленія, не велико, а боль между тѣмъ сильна. Въ лѣченіи кузнецовъ, слесарей, каменщиковъ, печниковъ, хлѣбниковъ, маляровъ, щекатуровъ, обойщиковъ, оснащиковъ машинъ и пильщиковъ необходимо соображаться съ краткимъ показаніемъ средствъ для ихъ лѣченія въ особомъ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Прим. Отвлекающія нарывныя средства, особенно шпанскія мухи, въ лихорадочномъ воспаленіи почекъ не годятся.

Въ нелихорадочномъ воспаленіи кровопусканіе назначается только привыкшимъ открывать кровь и пропустившимъ на это извѣстный срокъ. *Припарки* прикладываются то къ промежности, то къ лобковымъ костямъ; съ пользою употребляютъ тоже теплые водяные пары, устремляя ихъ на эти мѣста. Постоянныя отвлекающія нарывныя, но не изъ шпанскихъ мухъ, а напр. мазь (№ 79) къ почечной сторонѣ и пониже спины, горчичники (№№ 88, 89, 90), хрѣновники (№ 91), и раздражающая обвертка (№ 116) съ пользою прикладываются къ рукамъ и ногамъ. Мягчительныя, промывательныя и слабительное изъ кастороваго масла (№ 101), въ случаѣ запора на низъ, очень полезны. Внутрь даются тѣ же средства, какія въ воспаленіи мочевого пузыря, именно эмульсія съ камфорою (№ 135), съ нашатыремъ (№ 136), доверовъ порошокъ (№ 137) и сверхъ того свѣжіе соки, морковный и свекольный, приготовляемые посредствомъ паренья ихъ въ закрытомъ сосудѣ, назначаются, какъ лѣкарства, и даются по 3 стакана въ день. *Примѣч.* Д-ръ Чаруковскій не совѣтуетъ давать внутрь никакихъ солей, особенно селитры и нашатыря, но конопляное, сладко-миндальное молоко, льняное масло, отваръ чернослива, тамариндъ.

Ревматизмъ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Ревматизмъ есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся болью, которая преимущест-

венно простирается по направленію мышцъ и нервовъ, ожесточается при движеніи и при прикосновеніи къ пораженнымъ мѣстамъ.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Такъ какъ боль ревматическая бываетъ и въ мышцахъ, и въ нервахъ, то и ревматизмъ бываетъ или *тѣльный*, или *нервный*. Тотъ и другой по происхожденію бываетъ *первоначальный*, происходящій безъ всякаго особеннаго расположенія, единственно отъ простуды, и *послѣдовательный*, происходящій отъ преобразования или ревматизма тѣльнаго, если онъ нервный, или другой болѣзни (см. причины предрасполагающія). Первоначальный ревматизмъ бываетъ *лихорадочный* и *нелихорадочный*.

ПРИЗНАКИ и другія видоизмѣненія ревматизма. Тѣльный первоначальный лихорадочный ревматизмъ начинается общими лихорадочными предвозвѣстниками, къ которымъ присоединяются припадки собственно ревматическіе. Съ развитіемъ припадковъ лихорадочныхъ развиваются и припадки ревматическіе, такъ что эти послѣдніе находятся къ первымъ въ такомъ отношеніи, что при ожесточеніи и послабленіи лихорадочныхъ припадковъ и они ожесточаются и послабляются, чрезъ что ревматизмъ находится совершенно подчиненнымъ лихорадкѣ; поэтому онъ продолжается урочное лихорадочное время, по прошествіи котораго и рѣшается испражненіемъ чрезъ всѣ отдѣлительно-испражнительные органы, преимущественно чрезъ кожу. Рѣшеніе слѣдуетъ въ 5, 12, а въ сильнѣйшихъ случаяхъ въ 21 день. Это зависитъ отъ степени воспаленія оболочекъ (тканей). Вообще, чѣмъ глубже воспаленіе, тѣмъ позднѣе рѣшается. Ревматизмъ, продолжающійся до 21-го дня не рѣдко переходитъ въ нагноеніе собственно подкожной вѣтчатки, такъ что цѣлый членъ окружается гнойнымъ веществомъ, и съ полнымъ образованіемъ этого нагноенія исчезаютъ всѣ ревматическія боли. Этотъ-то тѣльный первоначальный лихорадочный ревматизмъ есть ничто иное, какъ другіе называютъ, ревматическая, ломотная, желудочно-мокротная и желудочно-желчная горячка.

Тѣльный первоначальный ревматизмъ нелихорадочный бываетъ подъ кожей. Обыкновенно является съ одними ревматическими припадками; ожесточается, растетъ, доходитъ до высшаго развитія и при благопріятныхъ обстоятельствахъ оканчивается потомъ. Припадки, которыми онъ обозначается, различно измѣняются. Часть тѣла, пораженная ревматизмомъ, горитъ, болитъ съ чувствомъ щиплющимъ и вѣетъ онѣмѣваетъ, дѣлается нѣсколько красною и нерѣдко припухаетъ; съ возстановленіемъ испарины припадки совершенно исчезаютъ.

Тѣльный послѣдовательный ревматизмъ обыкновенно обнаруживается постепенно, начинаясь самыми легкими, едва замѣтными припадками, болью едва ощущаемою и самымъ легкимъ раздраженіемъ. Потомъ, смотря по обстоятельствамъ, онъ то ожесточается, то послабляетъ до того, что больной и не думаетъ о своей болѣзни. Появляясь такимъ образомъ, наконецъ онъ дѣлается время отъ времени сильнѣйшимъ; ожесточе-

нія его обыкновенно неправильны и зависать единственно отъ степени содѣйствія благоприятствующихъ ему причинъ.

Нервный послѣдовательный ревматизмъ бываетъ *общій* и *частный*. *Общій* называется тотъ, который не ограничивается одною какою либо частію, а распространяется по всему тѣлу; *частный* же тотъ, который ограничивается какою либо одною частію. Общій нервный послѣдовательный ревматизмъ раздѣляется на *поверхностный* и *глубокій*. Подъ именемъ поверхностнаго разумѣется ревматизмъ, поражающій окончанія нервной системы, находящіяся въ окружности (периферіи) тѣла; *глубокій* называется тотъ, который поражаетъ нервы, лежащіе ближе къ центру тѣла, не исключая и самыхъ центральныхъ частей нервной системы. Тѣльный ревматизмъ, по различію поражаемыхъ частей тѣла, получаетъ разныя частныя названія, какъ и частный нервный послѣдовательный ревматизмъ раздѣляется на тѣже самые виды, въ какихъ является тѣльный ревматизмъ. Они псчислены въ существенномъ дѣленіи ревматизма.

Сверхъ того послѣдовательный ревматизмъ, смотря по разности имъ пораженныхъ, частей имѣетъ слѣдующія видовыя его названія: если ревматизмъ поражаетъ надкостную плеву (ткань) то называется ломотою; если поражаетъ около-мышечную и около-сухожильную ткань, то получаетъ названіе мышечнаго; если поражаетъ сочленовыя связи и надхрящевую ткань члено-соединеній, то называется ревматизмъ суставовъ или суставомъ. Если этотъ ревматизмъ сочлененій будетъ въ суставахъ пальцевъ ногъ, то называется подагрою; а если въ суставахъ пальцевъ рукъ, то называется хирагрою. Подагру же и хирагру профессоръ Дядьковскій называетъ приличіе дактилагрою.

Причины внутреннія (предрасполагающія) въ нервномъ ревматизмѣ ускоренная раздражительность и возвышенная чувствительность нервовъ; въ тѣльномъ же и послѣдовательномъ ревматизмѣ особенное къ нему расположеніе при дѣйствіи простуды, иногда очень незначительной, состоитъ, повидимому, въ перерожденіи или ревматизма нервнаго, или другихъ болѣзней, какъ то: венерической, золотухи, лишаяевъ, закрывшихся застарѣлыхъ язвъ, прекращенныхъ болѣзненныхъ, но привычныхъ, отдѣленій и испражнений, напр. бѣлей, слизистаго гемороя, перелоя.

Причины производящія (онѣ же и ожесточающія болѣзнь) въ тѣльномъ ревматизмѣ вообще: 1) Измѣненіе воздуха относительно его тяжести; чѣмъ воздухъ легче, тѣмъ ревматизмъ внѣшнихъ частей легче, а внутреннихъ тяжелѣе. 2) Измѣненіе воздуха относительно теплоты и холода; чѣмъ воздухъ теплѣе, тѣмъ ревматизмъ около-мышечной ткани, около-сухожильныхъ тканей и самой подкожной клѣтчатки болѣе ожесточается, а ревматизмъ надкостной плевы тѣмъ болѣе послабляетъ; напротивъ, чѣмъ воздухъ холоднѣе, разумѣется до извѣстной степени, тѣмъ ревматизмъ частей поверхностныхъ легче, а внутреннихъ сильнѣе. 3) Состояніе электричества воздушнаго; чѣмъ воздухъ болѣе электри-

зованъ положительнымъ, тѣмъ послѣдовательный ревматизмъ болѣе ожесточается, и наоборотъ. 4) Погрѣшность въ діетѣ; чѣмъ болѣе разстроиваются отравленія брюшныя, тѣмъ болѣе послѣдовательный ревматизмъ ожесточается. Въ частности: въ тѣльномъ первоначальномъ лихорадочномъ (остромъ) ревматизмѣ одна изъ главныхъ причинъ есть простуда, происходитъ ли она оттого, что безъ привычки остаются долгое время съ мокрыми ногами, или отъ сырости платья, постели, вновь выстроенныхъ покоевъ, спанья, или только отдыха на сырой землѣ, путешествія во время ночи, скоростигной перемѣны годового времени, скорого перехода изъ тепла въ холодъ и т. п.; во всякомъ случаѣ при этой простудѣ постоянная непрерывная и непримѣтная испарина кожи, отъ дѣйствія на послѣднюю свѣжаго, холоднаго, сызноваго, сыраго воздуха, останавливается: задержанная, испаряемая жидкость бросается на сывороточныя оболочки (ткани) и производитъ въ нихъ или только раздраженіе, или же и воспаленіе; притомъ такъ, что это задержаніе испарины происходитъ или вдругъ и причиняетъ острый лихорадочный, иногда очень жестокий ревматизмъ, особенно у бѣдныхъ, молодыхъ, рабочихъ людей, какъ то: у рыболововъ, банщиковъ, прачекъ, сукновальщиковъ, водоносовъ, ломщиковъ судовъ, ткачей и ткачихъ, охотниковъ, земледѣльцевъ, угольщиковъ, торговцевъ, торговекъ, хлѣбниковъ, или пекарей хлѣба и мельниковъ, — или же она останавливается медленно, постепенно, и тѣмъ развиваетъ тихій, медленный, упорный, не лихорадочный (хроническій) ревматизмъ, у людей нѣжныхъ, слабыхъ, бездѣйственныхъ. Въ нервномъ ревматизмѣ, кромѣ простуды, производитъ его сильное дѣйствіе душевныхъ возмущеній, и, если болѣзнь хотя нѣсколько развилась, ожесточаетъ и какъ бы воспроизводитъ ее. Безпрестанное сидѣніе производитъ на чреслахъ у портныхъ нервный чресленный ревматизмъ. Болѣзнь эта господствуетъ преимущественно въ мѣстахъ низкихъ, сырыхъ, особенно между бѣднѣйшими крестьянами, которые не чисто одѣваются, живутъ въ домахъ низкихъ и холодныхъ, употребляютъ грубую пищу, нездоровую, непитательную и неудобоваримую. По ремеслу подвергаются этой болѣзни живодееры, сыромятники, кожевники, чистильщики ботинковъ, помойныхъ ямъ, садовники, огородники и сѣятели риса.

Мѣсто пребываніе ревматизма тѣльнаго вообще оболочки (ткани): сывороточныя, околомышечныя, околосухожильныя, надкостная, чаще околосвязочная и надхрящевая, особенно въ большихъ сочлененіяхъ; нервного же ревматизма, который рѣже случается, чѣмъ тѣльный, — нервная оболочка и основная вѣтчатка нервовъ.

Сущность ревматизма состоитъ вообще въ смѣшанномъ воспаленіи поражаемыхъ имъ тканей. Воспаленіе это въ ревматизмѣ первоначальномъ всегда бываетъ характера болѣе кровянаго, а въ послѣдовательномъ болѣе пасочнаго, равнымъ образомъ въ ревматизмѣ лихорадочномъ воспаленіе имѣетъ характеръ болѣе количественный; въ нелихорадочномъ болѣе качественный.

Распознавание по вышеописаннымъ признакамъ болѣзни *лѣско*, надобно только сказать, что тѣльный ревматизмъ межреберныхъ мышцъ, проникая до подреберной ткани, очень походитъ на настоящее колотье въ бокахъ. Но различать эти болѣзни и нѣтъ надобности, потому что, чѣмъ болѣе онѣ между собою сближаются, тѣмъ безразличнѣе становится и лѣчение ихъ; тоже должно разумѣть и о другихъ разностяхъ. *Затруднителенъ въ распознаваніи нервный глубокий ревматизмъ*, гдѣ болѣе или совсѣмъ нѣтъ, или, если и бываютъ, то чрезвычайно малыя. Въ высшей степени развитія онъ можетъ быть смѣшанъ съ нервною горячкою; но всѣ нервныя горячки 1) начинаются, болѣе или менѣе, открытыми лихорадочными движеніями; 2) нервныя горячки обыкновенно имѣютъ теченіе безъ мѣстнаго страданія; напротивъ, въ глубокомъ ревматизмѣ бываютъ частныя страданія; 3) если глубокий ревматизмъ нервный доходитъ до такой степени, что больной повергается въ бредъ, то бредъ бываетъ не такой, какой въ горячкахъ, въ которыхъ больной ничего не понимаетъ, напротивъ, при ревматизмѣ онъ судитъ здраво обо всемъ, на все отвѣчаетъ правильно, между тѣмъ предъ его глазами вращаются различныя фантазмы; 4) въ глубокомъ ревматизмѣ во всѣхъ отдѣленіяхъ примѣчается чрезвычайное ослизненіе.

Предсказаніе въ ревматизмѣ тѣльномъ и нервномъ относительно жизни *безопасно*, есть время для лѣченія его. Нервный ревматизмъ, если онъ переходитъ въ лихорадку нервную, или если начинается изъязвленіе, то становится опаснымъ для жизни; въ отношеніи продолжительности различно, смотря по тому, будетъ-ли онъ тѣльный или нервный. Тѣльный ревматизмъ простой, первоначальный, скорѣе можетъ кончиться и никогда не продолжается болѣе 3 дней, развѣ стекутся неблагоприятныя обстоятельства. Напротивъ, ревматизмъ послѣдовательный никогда не излѣчивается скоро, какъ ревматизмъ нервный; болѣею частію онъ продолжается цѣлые мѣсяцы, и даже годы. При этомъ также должно смотрѣть на систему и на часть тѣла, пораженную ревматизмомъ: ревматизмъ первоначальный околмышечной ткани излѣчивается скорѣе, нежели ревматизмъ первоначальный ладоней и подошвъ. Послѣдовательный ревматизмъ сочлененій труднѣе излѣчивается, нежели послѣдовательный ревматизмъ плеча.

Исходы: 1) Разрѣшеніемъ обыкновенно оканчивается очень легко ревматизмъ тѣльный первоначальный, притомъ въ опредѣленные лихорадочные дни, и очень рѣдко переходитъ въ нагноеніе или затвердѣніе. Ревматизмъ тѣльный послѣдовательный гораздо труднѣе оканчивается разрѣшеніемъ и, если разрѣшается, то не въ урочные лихорадочные дни, но соотвѣтственно силѣ врачебнаго искусства; онъ гораздо чаще, нежели первоначальный, переходитъ въ отолстѣніе и отвердѣніе пораженныхъ частей, или сывороточно-пасочное отложеніе, что преимущественно бываетъ въ ревматизмѣ сочлененій; при золотушно-воспалительномъ состояніи переходитъ онъ нерѣдко и въ нагноеніе. Напротивъ, нервный ревматизмъ никогда самъ собою не оканчивается разрѣшеніемъ.

онъ переходитъ въ другія болѣзни, какъ напр: 1) медленная нервная лихорадка; 2) полупараличное и параличное состояніе; 3) изъязвленіе особеннаго рода. Въ нервную лихорадку переходитъ общій и въ особенности глубокій ревматизмъ: въ полное параличное и полупараличное состояніе переходитъ ревматизмъ лица и конечностей; въ изъязвленіе переходитъ ревматизмъ конечностей, лица и общій поверхностный.

ЛѢЧЕНІЕ ДІЕТЕТИЧЕСКОЕ въ ревматизмѣ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: люди, подверженные ревматизму, должны помнитися: 1) о сухомъ, свѣтломъ, чистомъ, тепломъ жилищѣ, избѣгать сырой и холодной погоды и, сколько возможно, главное беречься простуды. 2) Не оставаться на долгое время съ мокрыми ногами, въ сыромъ платьѣ, не спать на сырой постелѣ, тѣмъ болѣе на сырой землѣ, и не ложиться на нее для отдохновенія, не ходить по вечерней росѣ и не предпринимать ночныхъ путешествій, особенно во время скоропостижной переменѣ годоваго времени; не дѣлать быстрыхъ и скорыхъ переходовъ изъ тепла въ холодъ 3). Они должны одѣваться тепло, носить на тѣлѣ фланель и часто тереться сухою суконкою. 4) Въ тѣлодвиженіи трудиться, или работать, соразмѣрно силамъ, до пота и усталости; чрезъ это одно нерѣдко возстановляется и упрочивается здоровье больного ревматика. 5) Равнымъ образомъ въ этой болѣзни необходимо нужно вставать и ложиться спать пораньше; избѣгать всякаго труда во время ночи. 6) При этомъ, главное, нужно содержать себя на діетѣ, которою можно переменить самое сложное до такой степени, чтобы совершенно искоренить упорнѣйшую болѣзнь. Этого рода исцѣленія вполне можетъ ожидать тотъ, кто довольно рѣшителенъ и твердъ въ соблюденіи избранной приличной себѣ діеты, которая должна состоять изъ пищи легкой, усладительной, преимущественно изъ царства растительнаго, какъ-то: сладкихъ кореньевъ, напр. свеклы, моркови, рѣпы, огородныхъ овощей, плодовъ, каковы напр., яблоки, смородина, вареная въ молокѣ, черносливъ въ варевѣ и печеньѣ, соблюдая при употребленіи строгую умѣренность. Пить давать отварную соду, или воду ключевую комнатной температуры, либо сыворотку, или питье, составленное по рецептамъ (№№ 113 и 114). Есть довольно примѣровъ, что многіе, одержимые жесточайшимъ страданіемъ ревматизма, въ слѣдствіе жизненныхъ удовольствій, отказавшись отъ нихъ, съ умерщвленіемъ въ себѣ всѣхъ прихотей, въ благочестивомъ намѣреніи исправить безпорядки, или грѣхи молодости, осудивъ себя на строгій постъ, возвращали себѣ прежнее здоровье. Не менѣе того извѣстно, что многіе ревматики, впавъ отъ непредвидимыхъ несчастій изъ состоянія изобилія въ крайнюю бѣдность, въ которой довелось имъ ѣсть одинъ хлѣбъ и пить только воду, за потерю счастія награждены были совершеннымъ исцѣленіемъ отъ жестокаго ревматизма, который сперва отравлялъ всѣ ихъ удовольствія. 7) Если больной привыкъ къ употребленію спиртныхъ напитковъ, то ему позволяется употреблять настойку, приготовленную съ мятою, душицею, трилистникомъ и зорнымъ кор-

нмѣ. 8) Хорошо каждую весну и каждую осень брать по нѣскольку приёмовъ *бѣлой магнези* и *ревеня*; замѣчено, что поносъ въ этой болѣзни спасителенъ, а магнезія есть средство не только прочищающее, но еще открывающее и разбивающее. Ее слѣдуетъ принимать три раза сряду по золотнику вдругъ чрезъ каждые 12-ть часовъ одну и въ тертымъ *ревенемъ*, прилагая послѣдняго къ золотнику магнези $\frac{1}{4}$ золотника; потомъ, размѣшавъ въ стаканѣ ромашковаго настоя, принять за одинъ разъ. Этотъ приемъ слѣдуетъ повторить два и три раза чрезъ каждые 12-ть часовъ, пока довольно очиститъ. Потомъ нужно употреблять какое нибудь горькое, желудочно-крѣпительное, какъ-то, *настой трилистника, стародубки, ромашковыхъ цвѣтковъ*, или *декоктъ репейнаго корня*. Это дѣлается весною въ мартѣ, а осенью въ октябрѣ мѣсяцахъ. Употребленіе этого настоя можно продолжать двѣ или три недѣли, принимая по два стакана въ день. 9) Источникъ (фонтанель), или безпрестанные нарывные пластыри около мѣстъ, страдающихъ ревматизмомъ, много облегчаютъ страданія больного и даже предотвращаютъ приступы болѣзни.

Лѣченіе существенное въ ревматизмѣ, какъ болѣзни чрезвычайно разнообразной, проявляющейся въ многочисленныхъ формахъ, или видахъ, требуетъ участія и совѣта врача; а за непмѣніемъ его по близости должно ограничиться слѣдующимъ простымъ способомъ его лѣченія, сообразнымъ разности его видовъ:

Въ ревматизмѣ первоначальномъ лихорадочномъ, являющемся въ видѣ ревматической горячки двоякаго свойства: желудочно-мокротнаго и желудочно-желчнаго, натура одна, цѣлительнымъ своимъ дѣйствіемъ, безъ пособія науки поправляетъ здоровье, хотя бы болѣзнь эта не была ничѣмъ пользуема, а вспомогаема только соблюденіемъ вышеописанныхъ діететическихъ правилъ. Средства, употребляемая ею здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ острыхъ болѣзняхъ, состоятъ въ лихорадкѣ, въ кровотеченіи изъ носа, въ испражненіяхъ нзомъ, потомъ или мочею. Въ этомъ случаѣ поселяне прибѣгаютъ къ своимъ простымъ средствамъ, напр. *рѣдечному соку*, *простому вину съ напатыремъ, перцемъ, солью*, *паренью въ банѣ*, *напиранию* въ ней *чистымъ дегтемъ*, *скипидаромъ*, *крѣпкою водкою*, *сѣченію крапивой* и т. п. Отъ этихъ средствъ обыкновенно, большею частію, болѣзнь проходитъ. Тертая свѣжая *свекла*, перетираемая хорошенько въ рукахъ *съ простымъ миломъ*, которою въ видѣ припарки обкладываютъ пораженные ревматизмомъ мѣста, производитъ сначала красноту, потомъ сыпь, и ломота въ членахъ утихаетъ и наконецъ вскорѣ совсѣмъ прекращается. Но если этихъ средствъ бываетъ недостаточно, то надобно обращать вниманіе, какаго свойства при этомъ горячка, — желудочно-мокротнаго, или желудочно-желчнаго.

1) При желудочно-мокротной горячкѣ больного нужно напоить *теплымъ чаемъ* (№ 85), либо изъ *соломы*, подожить въ теплой комнатѣ въ постель и, укрывъ плотно, дать ему пропотѣть порядкомъ, послѣ

чего проходить жаръ и боли. Но если болѣзнь послѣ пота не измѣнилась въ лучшему, то нужно повторить потогонное лѣченіе: въ чай прибавить *миндерерова спирта* (чайную, столовую ложку на чашку воды) а мѣсто болѣе хорошо вытереть *летучею, камфорною мазью* (№№ 76, 77). Кромѣ потогоннаго днямъ давать больному *селистру* (№№ 86, 87, 14), приемъ которой можно увеличивать отъ 1—2—3 золотниковъ въ сутки, а на ночь *доверова порошка* (№ 137). Если горячка прошла, но остаются боли, особенно въ лицѣ (флюсъ), то больное мѣсто нужно продолжать натирать *летучею мазью, камфорнымъ масломъ* и класть на него *мягчительныя припарки* въ теченіе 2—4 часовъ (№№ 23, 106, 122), потомъ остановить ихъ употребленіе на столько же часовъ и опять возобновить; это прерывчатое употребленіе припарокъ дѣлается для того, чтобы не произвести нагноенія, безпрерывно припаривая больное мѣсто. Полезно также прикладывать на это мѣсто ветошку или фланель, либо хлопчатую бумагу, слегка намазанную *деревяннымъ масломъ*, а первые: ветошку или фланель, папитывать *уксусными парами*. Полезны также *тренія щетками, спиртами богородской травы, лавендулы, душицы*. Если боли не унимаются, но останавливаютъ движеніе члена и жестоко беспокоятъ больного, если при томъ больное мѣсто горячо, красно, или по крайней мѣрѣ припухло, то нужно припустить *пѣявицы* (12—24) съ тою осторожностію, чтобъ припустить ихъ въ обружности, а не къ самому центру воспаления; въ противномъ случаѣ легко происходитъ состояніе дурнаго нагноенія или омертвѣнія. Потомъ сдѣлать 2—3 припарки и наконецъ на больное мѣсто поставить мушку (№ 58), которую иногда нужно и повторить на ближайшемъ мѣстѣ, даже 2—4 раза и поддержать въ нагноеніи 1—2 недѣли; а внутрь давать настойку сѣмянъ осенника 12—15 капель черезъ часъ. У людей недостаточныхъ, когда притомъ ревматизмъ уже продолжался 2—3 недѣли, вмѣсто пѣявицъ можно поставить *рожки*, если это позволяетъ больное мѣсто. Если боли умѣренны и уже продолжаютъ 2—3 недѣли, то больное мѣсто можно покрывать *пластыремъ изъ чернаго вара, сощанкою, клеенкою, заячьимъ, кроличьимъ мѣхомъ*, растирать его, особенно въ банѣ, *летучею мазью съ настоякою горчицы, стручковаго или круглаго перца*, или по временамъ прикладывать *горчичникъ* (№№ 88, 89, 90), *цвѣты жабника-жигунца*, или *раздражающую обертку* (№ 116), либо намазывать *наружнымъ раздражающимъ бальзамомъ* *), состоящимъ изъ маслъ: льняна-

*) Этотъ бальзамомъ я излѣчивалъ самые упорные и застарѣлые мѣстные ревматизмы въ завѣдываемыхъ мною больницахъ и въ частной практикѣ. Изъ числа многочисленныхъ успѣшныхъ опытовъ не лишнимъ считаю помѣстить одну исторію ревматизма въ коленномъ суставѣ. Крестьянинъ Прохоръ Алексѣевъ (Чистопольск. уѣзд. сельца Мурасы), тѣлосложенія отъ природы здороваго, темперамента флегматико-сангвиническаго, 18-ти лѣтъ отъ роду, средняго роста, при осмотрѣ мною 15-го іюля (1842 г.) былъ худощавъ собою до изнуренія. Имѣлъ лицо блѣдное, страдальческое, языкъ чистый, но сухой, пульсъ ускоренный, перемежающійся, дыханіе свободное,

го или деревянного, и сѣрной кислоты (№ 145). *Прим.* Относительно разности пораженныхъ частей при лѣченіи ревматизма наружными средствами должно держаться слѣдующаго расчета: чѣмъ чувствительнѣе часть, тѣмъ средства должны быть менѣе раздражающія; напротивъ, чѣмъ часть не чувствительнѣе, чѣмъ кожа, покрывающая эту часть, толще, тѣмъ средства должны быть болѣе раздражающія.

Въ это же время, т. е. когда горичка миновалась, кромѣ выше перечисленныхъ средствъ, употребляемыхъ простолюдинами, они прибѣгаютъ:

голосъ слабый, дрожащій, выражавшій стоить какъ бы умирающаго или сильно страдающаго отъ нестерпимой боли. Руки и ноги тонкія отъ сильной худобы тѣла, въ особенности правая, согнутая въ колѣнѣ нога, которая, ступицею примыкая къ сонному ей вертлугу бедра, была какъ бы высохшая. Правое колѣно снаружи, въ окружности колѣнной кости, очень распухшее, твердое, неподвижное, при дотрогиваніи чрезвычайно чувствительно и до того болѣзненно, что малѣйшаго прикосновенія рукой больной не могъ выносить безъ крика. Боль въ колѣнѣ была почти постоянно острая, то колющая, то рѣжущая, то раздражающая, то сверлящая и т. п. Круглая опухоль праваго колѣна вообще одинаково вездѣ твердая, вся какъ бы костяная, нигдѣ не имѣла ощутительнаго зыбленія. Перемѣны въ цвѣтѣ покрововъ на ней нигдѣ не было. Разогнуть больное колѣно больной никакъ не рѣшался. Онъ очень мало ѣлъ и страдалъ сверхъ того бессонницею. Чувствовалъ по временамъ сильную жажду и лихорадочныя движенія въ видѣ озноба и жара, попеременно смѣняющихся, но пота не имѣлъ, и нога была сухая, урина красная. Производящую причиною былъ, главное, ушибъ колѣна, а предрасполагающею — золотушное расположеніе этого больного, наслѣдственное отъ его родителей. Принявъ въ этомъ случаѣ болѣзни за воспаленіе костныхъ частей въ окружности колѣннаго членосоединенія, и имѣлъ въ виду удалить его противувоспалительнымъ средствомъ. По этому, давъ советъ, какъ содержать больного въ отношеніи диетическомъ, прописалъ ему одинъ этотъ наружный раздражающій бальзамъ, который полученъ больнымъ 20 ч. іюля, а 25 ч. того же мѣсяца онъ почувствовалъ отъ него замѣтное облегченіе. «Какъ намажешь колѣно, говорилъ онъ, сперва сильно зажжетъ это мѣсто, а потомъ скоро и жечь перестанетъ, и боли большой не бываетъ». Ему ѣкарство это понравилось. 13-го августа всѣ острые боли въ больномъ колѣнѣ затихли. Тутъ больной могъ немного разогнуть колѣно, такъ что плюсна ноги съ вертлугомъ и слѣбъ колѣна описывали тупой треугольникъ. Раны на опухоли колѣна, отъ намазыванія наружнымъ бальзамомъ, не произошло; только покровы на ней покраснѣли. Воспаленіе въ опухоли колѣна уменьшилось, а потому я, прописавъ этотъ же бальзамъ, но слабѣе прежняго, состоящій изъ 1 части сѣрной цѣльной кислоты и 2 частей льнянаго масла, велѣлъ продолжать намазывать опухоль колѣна по прежнему, а между тѣмъ частію бедра и голени, согнутой въ колѣнномъ членосоединеніи ноги, что нѣбѣ въкладывать для того, чтобы день ото дня больной могъ разгибать колѣно все болѣе и болѣе. Сентября 17-го острые боли въ колѣнѣ миновались. Больной сталъ спокойнѣе. Сонъ хорошъ. Аппетитъ былъ. На костылѣ больной могъ приподниматься и ходить по пѣдѣ съ согнутою въ колѣнѣ правую ногою. Опухоль колѣна становилась менѣе, но также тверда. Пульсъ правиленъ. Языкъ влажный. Въ мартѣ 1843 года крестьянинъ этотъ, не имѣя никакой боли въ колѣнѣ и будучи совершенно здоровъ пересталъ ѣздить; но по неспособности отъ сильной хромоты къ деревенской работѣ онъ принялся за сапожное ремесло, — шилъ сапоги. Теперь онъ совершенно здоровъ, полонъ, свѣжъ, румянъ, крѣпокъ въ силахъ. Въ походкѣ хромота едва замѣтна на правую ногу, но не препятствуетъ впрочемъ никакой сильной работѣ. Колѣнная кость одна осталась въ незначительной опухоли, какъ бы въ наростѣ, но безъ всякой боли во всякое время и при всякомъ занятіи. Др. Здр. 1848 г. № 2. стр. 13 соч.

къ натиранію пораженныхъ ревматизмомъ частей *терною рыдькою съ солью и медомъ, березовымъ спиртомъ и мазью, также спиртомъ муравейнымъ, землянымъ масломъ и масломъ съ камфорою, либо бодяго (надожникомъ), сокомъ мухомора, особенно въ бань (въ паръ);* держать большія части завернутыми въ свѣже-снятой *овецѣй кожѣ*. кладутъ на нихъ, въ видѣ пластыря, взятую изъ подъ колесъ *густую смолу, листья лопуха, мать-мачихи, лугового или болотнаго лютика*, ложатся во время сушки зерноваго хлѣба на горячую *избяную печь*, моются при удобномъ случаѣ *въ барденной ваннѣ*. При этомъ *сибиряки*, сверхъ того, употребляютъ *листья кошкари*, или катакалета, вмѣсто чаю; прибрежные жители морей: Чернаго и Каспійскаго, закапываютъ себя въ солёныя грязи, а закавказскіе народы обвертываютъ болящія члены въ *парныя кожи*, снятыя съ животныхъ. Д-ръ Грумъ совѣтуетъ части тѣла, одержимыя ревматизмомъ *нелихорадочнымъ*, обкладывать *слоемъ смоленой пакли*, сдѣланной изъ *смоленыхъ канатковъ*, придерживать её бинтомъ и въ случаѣ надобности перемѣнять *). Но запрещается пить отвары: дорогой травы и лопушнаго корня, растворъ сулемы, окуриваться кинноварью по совѣту лѣкаровъ, что можно допустить только въ ревматизмъ послѣдовательномъ, преимущественно сифилитическомъ, и то не иначе, какъ по совѣту врача, о чемъ говорится ниже.

2) При желудочно-желчной горячкѣ, познаваемой изъ того, что больной жалуется на боль подъ ложкою, на горечь во рту, на позывъ къ произвольной рвотѣ, причемъ языкъ его бываетъ бурый или желтый, лѣчение нужно начинать напередъ, если только не опоздали, средствами *рвотными* (§ 112). Но если опоздали начать лѣчение, или встрѣтятся противопоказанія для рвотнаго, напр. слабая грудь, короткая шея, приливы крови къ головѣ и под., то употребляютъ напередъ средства *слабительныя* (§§ 7, 9, 72, 74, 75, 97, 98, 99, 100, 101, 138, 139). Когда по употребленіи этихъ средствъ будетъ произведено достаточное испражненіе низомъ, и послѣднее испражненіе не будетъ обнаруживать желчнаго свойства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и горечь во рту исчезнетъ, языкъ очистится, тогда должно прибѣгать къ средствамъ *потогоннымъ*, какія означены выше, при ревматизмѣ *лихорадочномъ* желудочно-мокротнаго свойства.

Въ ревматизмѣ первоначальномъ *нелихорадочномъ* лѣчение начинается прямо съ тѣхъ средствъ, какія означены въ лѣченіи ревматизма первоначальнаго *лихорадочнаго*, когда въ немъ прошла горячка, а ревматическія боли упорствуютъ. Въ Тверской губерніи простой народъ при ревматизмѣ употребляетъ снаружи преимущественно *бодягу* (надожникъ, стрелельникъ, колотикъ). Сухимъ порошкомъ, или смѣшаннымъ съ *деревяннмъ масломъ* сильно натираютъ мѣсто, пораженное болью, которое отъ этого нѣсколько воспаляется, и боль скоро исче-

*) Др. Здр. 1837 г. стр. 12.

застъ. Дѣлають также изъ свѣжей бодяги припарки, обмачивая ее горячимъ молокомъ. Кроме того, убѣждаясь тѣмъ, что дѣйствительность ея зависитъ отъ летучихъ частей, завязываютъ свѣжую бодягу въ мокрую ветошку, кладутъ въ сырое, назначенное для печенія хлѣба, тѣсто, сажаятъ въ печь и вынимають, когда хлѣбъ испечется. Тогда, растеревъ её въ порошокъ, употребляютъ *).

Въ ревматизмѣ ладоней и подошвъ, который обыкновенно поражаетъ подкожную кѣлѣчатку и самую кожу, лѣченіе труднѣе всѣхъ видовъ его, потому что кѣлѣчатка и самая кожа на этихъ частяхъ чрезвычайно плотны. Въ немъ оказались полезными: многократное погруженіе пораженныхъ частей въ тонкіе *мыльные растворы*, напр. $\frac{1}{4}$ фунта домашнего мыла распусти въ $\frac{1}{4}$ ведра теплой воды и, погрузивъ въ этотъ растворъ руки и ноги, держать въ немъ 8—10—15 минутъ, повторяя это 2—6 разъ въ сутки. Точно также употребляются *щелочные ванны* (№ 83) и *припарки*. Полезно втирать въ ладони и подошвы *масло бѣлены* и *сокъ мухоморовъ съ масломъ и солью*; но лучше всего употреблять ножныя и ручныя *обмыванія вельмутовскимъ мыломъ* (№ 146) по два раза въ день.

Лѣченіе ревматизма головныхъ покрововъ, отличающагося отъ ревматизма другихъ частей тѣмъ, что 1) боль дѣлается чрезвычайно чувствительною, такъ что только прикосновеніе къ волосамъ уже производитъ ее 2) сопровождается значительно большою опухолью по всему пространству головы, такъ что покровы съ сухожильными растяженіями дѣлаются мягкими и зыбкими на подобіе тѣста, — требуетъ средствъ отвлекающихъ, напр. прикладыванія *итанскихъ мушекъ* къ затылку на плечи.

Лѣченіе ревматизма затылочно-шейнаго, отличающагося тѣмъ, что очень легко отъ внѣшнихъ частей проникаетъ къ внутреннимъ и даже въ оболочку становой жплы, отчего и дѣлается больной какъ бы кривошейнымъ и значительно опаснымъ для жизни, — требуетъ обвертѣть шею шерстью для сообщенія ей теплоты, обмывать по 2 раза въ день камфорнымъ вельмутовскимъ мыломъ (№ 146) и наконецъ, если это не поможетъ, обвертывать её *раздражающею обверткою* (№ 116). Если и этого недостаточно, то прикладывать *нарывной пластырь* (№ 58).

Лѣченіе ревматизма личнаго, замѣчательнаго тѣмъ, что онъ въ нѣсколько минутъ производитъ параличъ пораженныхъ частей и часто переходитъ въ нервный, состоитъ въ тепломъ содержаніи страждущихъ частей лица; для этого онѣ покрываются *мышечками* изъ *лежкихъ ароматическихкихъ* и вмѣстѣ *наркотическихкихъ сухихъ припарокъ* (№№ 68, 69) съ прибавленіемъ *хмелевыхъ шишекъ*, а два раза въ день, утромъ и на ночь, умывать лицо *вельмутовскимъ камфорнымъ мыломъ* (№ 146).

Лѣченіе ревматизма зубнаго и челюстнаго (флюсъ). Боль зубная

*) Др. Здр. 1836 г. № 1 стр. 5.

ревматическая отличается тѣмъ, что, не производя никакого измѣненія въ околозубныхъ частяхъ, поражаетъ единственно кѣтъчатку, выстилающую собственно полость зуба, а ревматизмъ челюстный отличается тѣмъ, что сосредоточивается въ мягкихъ частяхъ, покрывающихъ нижнюю челюсть, и очень легко переходитъ въ особое пасочное (лимфозное) нагноеніе, называемое попросту флюсомъ, который, хотя болѣею частію поражаетъ нижнюю челюсть, однако бываетъ и на верхней, и въ такомъ случаѣ распространяется по нѣбу рта. Въ обоихъ этихъ видахъ ревматизма нужно также теплое содержаніе лица посредствомъ подобныхъ мѣшечковъ, умываніе его два раза въ день *вельмуровскимъ камфорнымъ мыломъ и полосканіе изъ ромашки съ цвѣтами лавендулы или съ хмелемъ*. Кромѣ того нужны средства *отвлекающія*, которыя прикладываются на мѣстахъ, соотвѣтствующихъ сторонѣ, пораженной ревматизмомъ, болѣе или менѣе отдаленныхъ отъ мѣста страданія, напр. *горчичники* (№№ 88, 89, 90), *хриновники* (№ 91), втираніе *нарывной мази* пониже плеча на 4 поперечныхъ перста до 2-хъ разъ въ день. пока образуется сыпь въ видѣ гороха, которую потомъ перевязывать *сусункомъ* (№ 29), и прикладываніе *нарывнаго пластыря* (№ 58) за уши и въ затылку, смотря по тому, въ какой сторонѣ болѣе бываетъ боль. (См. еще особо лѣченіе зубной боли въ отдѣленіи второмъ).

Ревматизмъ межреберныхъ и брюшныхъ мышцъ, который замѣчателенъ потому, что легко проникаетъ до самой брюшины, оттого легко переходитъ въ самое воспаленіе ея, а за тѣмъ нерѣдко въ воспаленіе бибекъ, требуетъ особенно припущеніе *пьявицъ* (12—24).

Ревматизмъ спинной, подобно ревматизму межреберныхъ мышцъ, нерѣдко проникаетъ до подреберной ткани, и потому сходствуетъ съ болюемъ заднимъ и гораздо легче ревматизма междуребернаго переходитъ въ настоящее колотье; больной говоритъ, что у него въ спинѣ точно колъ, не даетъ ему ни поворотиться, ни повернуться. Этого рода ревматизмъ лѣчится, какъ заднее колотье, о которомъ описано въ своемъ мѣстѣ, именно въ лѣченіи воспаленія подреберной плевры.

Поясничница и вертлужница, изъ коихъ первая (ревматизмъ поясницы) замѣчательна потому, что сходствуетъ съ болями геморoidalными; отличать можно тѣмъ, что въ гемороѣ прикосновеніе къ поясницѣ не обнаруживаетъ боли, между тѣмъ какъ въ ревматизмъ поясничномъ при давленіи на поясницу, даже при согбеніи тѣла, рождается значительная боль, а ревматизмъ вертлужный — чресленный отличается тѣмъ, что ревматическое воспаленіе проникаетъ весьма глубоко, поражаетъ часто надхрящевую ткань и нерѣдко переходитъ въ отложеніе пасочное (лимфозное), или полупасочное. Оба эти виды ревматизма часто требуютъ употребленія, и нерѣдко повтореннаго, *пьявокъ, рожковъ, или насъчекъ*. Чѣмъ ревматизмъ сильнѣе, тѣмъ болѣе нужно мѣстное кровопусканіе (12—24—36 п.): не взявши этой осторожности, вертлужница переходитъ въ воспаленіе круглой связки и производитъ произвольный вывихъ. Кромѣ того въ вертлужницѣ нужны средства от-

влебающія; для этого на заднюю часть вертлуга накладывается *ишанская мушка* (№ 58) и потомъ *нарывная мазь* (№ 79) до произведенія нарывовъ, или прыщей въ видѣ гороха. Въ поясничницѣ нужно бы- ваетъ также ставить сухія банки (рожки), потому что воспаленіе не- рѣдко проникаетъ до самой поясничной мышцы, отчего дѣлается нагное- ніе, и болѣзнь становится опасною. Простолудины въ пояснично-бедрен- ной боли, которая бываетъ такъ жестока, что усиливается и распро- страняется отъ бедреннаго сустава (вертлуга) сзади ляжки, внизъ поч- ти до самой стопы съ неопредѣленнымъ ослабленіемъ, обкладываютъ поясницу, колѣно и стопу больной ноги *табачными листьями*, пред- варительно *разваренными въ пивныхъ дрожжахъ*; а когда послѣдуетъ у больного головокруженіе или рвота съ поносомъ, то перестаютъ класть листья, а намазываютъ ногу теплымъ *дегтемъ*, или *скипидаромъ*; вмѣ- сто табаку иногда употребляютъ *листья дурмана, омеги или бѣлены* (блекоты). Кромѣ того простонародное, очень дѣйствительное лѣченіе по- ясничной боли состоитъ въ слѣдующемъ: взявъ *рыбачнаго сока* и про- стаго *вина*, каждаго по полустакану, 2 столовыхъ ложки *коноплянаго масла* и 2 золотника превращенной въ порошокъ *горючей сѣры*, смѣ- шавъ все вмѣстѣ, взбалтывая, выпить за одинъ разъ въ банѣ, потомъ сѣсть на полкъ и держаться, нагнувшись надъ тазомъ, или шайгой съ горячею водою, стараясь долѣе дышать надъ паромъ. Выйдя изъ бани одѣться теплѣе и по крайнѣй мѣрѣ сутки не выходить на воздухъ. Въ самой упорнѣйшей, развѣ годичной боли, много что два, три дня сря- ду, нужно бываетъ истопить еще баню и повторить это средство (Со- боловъ. Др. здр. 1845 г. № 14 стр. 107).

Лѣченіе ревматизма послѣдовательнаго, какъ болѣзни сложной, или сопряженной съ другими, большею частію, болѣзнями, неминуемо требуетъ приложенія искусства собственно врачебнаго, не зависимо отъ соблюденія діететическихъ вышеисчисленныхъ правилъ; одна натура сама по себѣ, цѣлбною своею силою, въ рѣдкихъ только случаяхъ, и то при особыхъ условіяхъ по образу жизни, поправляетъ болѣзнь и возстановляетъ здоровье. Лѣченіе въ этомъ случаѣ должно быть соо- бразно съ качествомъ предрасположенія. А такъ какъ предрасположені- емъ къ тому могутъ быть или брюшные застои, или болѣзни: сифили- тическая (венерическая), золотушная, лишаи, или пребратившіяся за- старѣлыя бѣли, перелой, то лѣченіе должно быть сообразно съ каче- ствомъ каждаго изъ этихъ болѣзненныхъ состояній, что составляетъ предметъ большой важности, требуетъ въ этомъ полнаго знанія дѣла, и потому должно совѣтовать лучше въ этихъ случаяхъ обращаться къ врачу, за неимѣніемъ же его по близости слѣдуетъ ограничиться только слѣдующими средствами: — Если замѣчено будетъ, что брюшные за- стои поддерживаютъ болѣзнь, то должно давать внутрь только *разрѣ- шающія* средства и *испражняющія низомъ* (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 33, 63, 64, 65, 74, 75, 97, 98, 99, 100, 127, 128, 129, 138 и 139); а снаружи, кромѣ выше-

означенныхъ мѣстныхъ средствъ, въ общемъ поверхностномъ и глубокомъ нервномъ ревматизмѣ, теплыя цѣльныя ванны съ *отрубями, сыпной трухой, ароматными травами* (№ 53), *мыломъ*, особенно *вельмуховскимъ камфорнымъ* (№ 146), съ *солью, щелокомъ*; *растираніи муравейнымъ, березовымъ спиртомъ, чистымъ березовымъ дегтемъ* преимущественно въ банѣ, и париться послѣ того намыленнымъ вѣшникомъ; или, взявъ *собачью шерсть*, разложить на кускѣ полотна въ такомъ количествѣ, чтобы вышелъ изъ того слой толщиною въ палецъ, потомъ простегать ее такъ, чтобы она хорошо держалась, и наконецъ положить полотно это на голое тѣло, гдѣ боль, укрѣпить повыгоднѣе и носить его день и ночь до тѣхъ поръ, пока боль исчезнетъ *). Если же замѣчено будетъ, что ревматизмъ поддерживаетъ болѣзнь застарѣлая сифилитическая, то должно совѣтовать употреблять внутрь *кровоочищающія decocty* (№№ 4, 5, 6, 20, 21, 22, 147 и 148); а снаружи страдающія мѣста обкладываются теплыми *выварками хмѣлевыхъ или сарсапарельныхъ корней*, либо припариваются: *листьями водянаго лопушника*, называемаго въ народѣ бахтовникомъ, *листьями конского щавеля и хмѣлемъ* (см. сифил. болѣзни). Если предрасположеніе болѣзни золотухи или лишаевъ поддерживаетъ ревматизмъ и дѣлаетъ его упорнымъ и застарѣлымъ, то должно назначить пить траву *череду, мать-мачиху*, какъ чай, дѣлать *отваръ изъ калиновыхъ побеговъ* и пить, подобно какъ изъ хмѣлевыхъ корней. *Лоснящаяся сажа* черныхъ избъ, настоенная въ кипятилѣ (7 золот. на 1 фун. воды) также съ пользою употребляется въ этомъ случаѣ по рюмкѣ раза 4 въ день. Если этого не достаточно, то *ворвань*, или жиръ рыбы трески, употребляемый по рюмкѣ утромъ и вечеромъ, оказываетъ чрезвычайную пользу. Кромѣ вышеозначенныхъ мѣстныхъ средствъ, употребляемыхъ снаружи, полезны въ этомъ случаѣ цѣльныя ванны съ *солью, горючею сѣрою* (по $\frac{1}{4}$ фун. въ ванну), *спиртною печенкою, щелокомъ*, листьями водянаго лопушника, *мать-мачихи, конского щавеля, цвѣтами иванъ и марья* (анютины глазки). Нѣкоторые, одержимые приступами хроническаго ревматизма съ опухолями и тугостію въ болѣнахъ и ступенномъ составѣ, безъ всякой пользы лѣчившіеся различными средствами, излѣчились свѣжими *березовыми листьями*. Наполнивъ мѣшекъ, простиранный отъ пальцевъ ногъ до половины бедра, свѣжимъ березовымъ листомъ, не имѣвшимъ ни малѣйшей влажности, происходящей отъ дождя, росы (условіе существенное), больные вечеромъ, ложась спать, вложивъ свои ноги въ этотъ мѣшокъ такимъ образомъ, что онѣ были покрыты листьями со всѣхъ сторонъ, съ перваго раза спали хорошо ночью; ноги много потѣли, даже до того, что нужно было вложить ихъ въ сухіе листья, причемъ листья нагрѣвались, а ноги такъ потѣли, какъ будто они были подвергнуты дѣйствию водяныхъ паровъ. Это повторяли они нѣсколько разъ и совершенно излѣчились. Штабъ-лѣбяръ

*) Д-ръ Behv. Др. Здр. 1838 г. стр. 28.

Мечь замѣтили, что *березовия почки* во всей Смоленской, а мнѣ извѣстно, что они и во всей Казанской, губерніяхъ, составляютъ народное любимое домашнее средство противъ разныхъ болѣй ревматическаго свойства: ихъ употребляютъ въ видѣ винной настойки, которою натираютъ больныя мѣста, а нерѣдко ее и пьютъ; также изъ нихъ приготавливаютъ чай, которымъ стараются произвести испарину. Но мазь изъ березовыхъ почекъ (№ 166) есть одно изъ лучшихъ наружныхъ средствъ для втиранія въ мѣста, пораженныя ревматизмомъ всякаго рода, даже и въ послѣдовательномъ сифилитическомъ нерѣдко облегчаются страданія больного. Простой народъ съ пользою употребляетъ въ подобныхъ случаяхъ *зсмыляное масло*, которое втираютъ въ больныя мѣста въ теплѣ. *Живые муравьи*, взятыя со всѣмъ гнѣздомъ, какъ они есть въ муравейникѣ, и приложенныя на ветошкѣ къ страждущимъ частямъ такъ, чтобы они не распозлались по тѣлу, либо пораженныя этого рода ревматизмомъ части, хотя бы онѣ были даже въ онѣмѣніи и параличѣ, наприм. конечности (руки и ноги), погружаютъ въ мѣшки, наполненные живыми муравьями съ гнѣздомъ и въверху плотно завязанные, чтобы не выпозлали изъ нихъ муравьи, — считаютъ средствомъ очень полезнымъ. При этомъ кусаніе муравьевъ бываетъ сносно. Держать ихъ надобно день, два и три, и потомъ день отдохнуть, послѣ того, переѣбнувъ муравейникъ, опять продолжать, пока болѣзнь видимо облегчится и наконецъ совсѣмъ пройдетъ *). Простонародное врачебное употребленіе муравьевъ состоитъ еще въ слѣдующемъ: 1) *Муравьиная настойка* (штофъ, до половины наполненный муравьями, доливаютъ полно хорошею водкою и нѣсколько дней настаиваютъ въ теплѣ) въ застарѣлой ломотѣ отъ простуды и запущенныхъ ревматизмовъ для возбужденія испарины и отдѣленія мочи дается съ $\frac{1}{2}$ до 1 столовой ложки утромъ и вечеромъ. 2) *Муравьиная ванна*: а) *водяная*: набравъ въ мѣшокъ въ лѣтнее время достаточное количество муравьевъ чистыхъ или съ гнѣздами, обварить ихъ кипяткомъ, дать нѣсколько времени настояться и потомъ настой этотъ и съ мѣшкомъ вылить въ приготовленную ванну, имѣющую теплоты 25—27° по реомюру. Для усиленія цѣлебнаго свойства ванны кладутъ иногда свѣжихъ березовыхъ листьесвъ, свѣжей ромашки, богородской травы и т. п. б) *паровая*: кладутъ муравьиное гнѣздо въ сосудъ желаемой величины и наливаютъ его кипяткомъ; выходящій отъ этого паръ направляютъ на страждущую часть тѣла: если это рука или нога, то въ нѣкоторомъ разстояніи отъ сосуда лучше накрыть ихъ полотномъ такъ, чтобы оно охватывало вмѣстѣ съ тѣмъ и сосудъ; в) *сухая*, дѣлаемая, какъ выше сказано: или разрываютъ *муравьиную кучу*, кладутъ въ нее страждущій членъ, покрываютъ его еще холстомъ, намазаннымъ съ внутренней поверхности анисовымъ масломъ или медомъ, оставляютъ тамъ страждущую часть тѣла на $\frac{1}{2}$ часа. Еслибъ нужно было дѣйствовать на туловище, то покрыть разрытую кочку ру-

*) Д-ръ Шрейберъ. Др. Здр. 1838 г. стр. 9..

башкой на нѣкоторое время, а послѣ того надѣть ее на больного. Можно такимъ образомъ напитать муравьиною кислотою кусокъ полотна, которымъ обвить потомъ страждущую часть) увеличиваютъ пользу внутреннего употребленія муравьиной настойки; 3) *муравьиное масло* (взявъ 4 части муравьевъ, 1 часть масла деревяннаго или миндальнаго, держать смѣсь эту въ тепломъ мѣстѣ до 20 дней, послѣ выжать ее) натираниемъ страждущей части помогаетъ дѣйствию ваннъ; 4) *муравьиный спиртъ*, продаваемый въ аптекахъ, употребляется также вмѣсто настойки 20—40—60 капель по нѣскольку разъ въ день; а равно снаружи одинъ и съ другими спиртами. Какъ внутреннее такъ и наружное употребленіе муравьевъ продолжать до тѣхъ поръ, пока отъ внутреннего дѣйствія лѣкарства не будетъ происходить обильнаго пота, а отъ наружнаго не покраснѣетъ кожа и не начнетъ слѣзать съ нея верхняя кожа.

Если извѣстно будетъ, что ревматизмъ произошелъ въ слѣдствіе закрытія хроническихъ язвъ (застарѣлыхъ), то прежде всего нужно опять открыть ихъ, растравляя тѣ мѣста непрерывнымъ прикладываніемъ и держаніемъ на нихъ *нарывнаго пластыря* (№ 58), или *нарывной мази* (№ 79); либо замѣнить ихъ новыми искусственными ранами въ родѣ *источниковъ* (фонтанелей) на рукахъ ниже плечъ, съ наружной стороны, или на икрахъ ногъ; потомъ употреблять внутрь средства *кровоочистительныя* (№№ 4, 5, 6, 20, 21, 22, 147, 148). Точно также слѣдуетъ поступать, если предрасположеніе къ ревматизму происходитъ отъ преобразенія другихъ болѣзненныхъ отдѣленій, напр. бѣлей, или перелоя, которыя какъ скоро нельзя опять открыть, то открыть источникъ (фонтанель) на икрѣ ноги посредствомъ прежде нарывнаго пластыря, потомъ нарывной мази и наконецъ *волчьеголыка*; а внутрь назначать употребленіе вышеозначеннымъ кровоочистительныхъ средствъ.

Со времени открытія водолѣченія Пристнищемъ, съ пользою употребляютъ въ застарѣломъ ревматизмѣ *холодную воду*, чистую ключевую въ видѣ питья по 6—21 и болѣе стакановъ въ сутки, купанья, обливанья, обмыванья, дождевыя ванны, струи и проч. Холодная вода не только излѣчиваетъ отъ ревматизма, но уничтожаетъ и расположеніе къ нему, которое очень часто остается у людей, уже разъ ему подвергавшихся; нужно только при этомъ быть осторожнымъ и непременно наблюдать за постепенностью въ температурѣ воды, понижая ее не вдругъ, но по немногу 12—8—5 градусовъ и ходить пѣшкомъ послѣ всякой ванны или купанья до появленія испарины въ кожѣ или пота.

Примѣч. 1) Изъ всѣхъ видовъ ревматизма самый упорный, сильный, частый и по своимъ послѣдствіямъ опасный ревматизмъ бываетъ въ поясничныхъ мышцахъ (боль въ поясницѣ) и въ бедренномъ суставѣ, гдѣ онъ причиняетъ невлаждѣніе ногами, сначала удлинненіе, а потомъ укороченіе ногъ и хроманіе. 2) При лѣченіи поселянъ необходимо обращаться съ правилами и средствами, соотвѣтственно ихъ быту и званію, начертанными въ особомъ описаніи въ концѣ этого лѣчебника.

Минеральныя воды: сѣрныя, кавказскія (въ Пятигорскѣ), сергіевскія (Оренбургской губерніи Бугурусланскаго уѣзда въ Сергіевскомъ посадѣ), желѣзисто-сѣрнокислыя и горько-соленыя солигаллическія (въ Солигаличѣ Костромской губерніи), старорусскія (въ Новгородской губерніи); грязи: Сабскаго солянаго озера (въ Евпаторіи Таврической губерніи) и андреапольскіе (въ Тверской губерніи, Осташковскаго уѣзда) суть дары въ природѣ, данныя Богомъ къ исцѣленію страждущаго чело-вѣчества всѣмъ, особенно застарѣлыми видоизмѣненіями ревматизма. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ есть лѣчебныя заведенія и врачи, куда стекаются, особенно на первыя (кавказскія и сергіевскія воды), страждущіе даже изъ отдаленныхъ странъ Россіи.

Киргизы въ ревматизмѣ сперва натираютъ болящія мѣста солянымъ растворомъ (тузлукомъ), а потомъ мажутъ боровымъ масломъ. Въ поясничной боли употребляютъ мясную пищу, избѣгаютъ вѣтра и содержатъ поясницу въ теплѣ *).

Глазовоспаленіе.

О п р е д ѣ л е н і е . Глазное воспаленіе есть кровяное воспаленіе оболочки (тѣaney) глаза, особенно бѣлочной, обнаруживающееся краснотою, опухолью глазнаго яблока и его покрововъ съ быющеюся, жгучею, стрѣляющею болью и обильнымъ теченіемъ слезъ.

Р а з д ѣ л е н і е . Глазовоспаленіе бываетъ *обыкновенное и египетское*. Обыкновенное глазовоспаленіе бываетъ *первоначальное*, происходящее отъ причинъ, непосредственно подѣйствовавшихъ прямо на глазъ въ здоровомъ тѣлѣ, и *послѣдовательное* (припадочное), происходящее отъ другихъ болѣзней въ тѣлѣ. Обыкновенное первоначальное глазовоспаленіе бываетъ или *во всемъ глазномъ яблокѣ* вообще, или въ какой либо его части, какъ то: во внутреннемъ *глазномъ углѣ*, *слезномъ мышечнѣ*, *слезномъ мясынкѣ*, *слезной желѣзѣ*, *соединительной, твердой, роговой, радужной, сосудистой, сѣтчатой оболочкахъ*, въ *вѣкахъ*, *мейбоміевой желѣзѣ* (ячмень), *глазной впадинѣ*, сумочкѣ хрусталика, сумочкѣ стекловидной влаги. Послѣдовательное глазовоспаленіе бываетъ *простое* (специфическое) и *сложное*. Простое послѣдовательное глазовоспаленіе бываетъ: *катарральное, золотушное, ревматическое* или *ломотное, геморoidalное, скорбутное* (цынготное), *худосочное, сифилитическое, старческое, рожевидное, корьное, скарлатинное, оспенное, чесоточное, лишайное*. Сложное послѣдовательное глазовоспаленіе бываетъ: *катаррально-золотушное* (когда на золотушной почвѣ по причинѣ катарра образуется глазное воспаленіе), *катаррально-ревматическое, геморoidalно-ломотное*.

П р и з н а к и обыкновеннаго, наичаще случающагося воспаленія наружныхъ оболочекъ глаза: боль въ глазѣ поверхностная, давящая, колю-

чая, сопровождаемая нерѣдко чувствомъ, какъ будто въ глазъ попали инородныя тѣла, напр. песокъ, что больной особенно ощущаетъ при закрываніи вѣкъ, чувствительность къ свѣту, краснота равномерно распространенная, живая, происходящая отъ сплетенія, образовавшагося изъ большихъ поверхностныхъ и при давленіи глаза удобосдвигаемыхъ сосудовъ. Чрезъ это сплетеніе сосудовъ глаза просвѣчиваетъ бѣловая оболочка, дѣлается слезотеченіе, и во время ночи изъ краевъ вѣкъ отдѣляется слізъ, либо изъ угловъ глазъ гноевидная матерія, оттого рѣсницы слипаются. По вечерамъ болѣзнь ожесточается, а по утрамъ послабляется. На бряхъ вѣкъ краснота и припухлость. Меньшая степень этого воспаленія отличается легкимъ покрасненіемъ глазъ, легкою болью, а большая — большою краснотою глазъ, опухолью вѣкъ, отдѣленіемъ гнойной матеріи и горячечными припадками. Болѣзнь эта продолжается обыкновенно до двухъ недѣль, а рѣдко долѣе этого.

Признаки первоначальнаго воспаленія *всего глазнаго яблока*: во всѣхъ частяхъ глазнаго яблока больной чувствуетъ давленіе, растяженіе и чувство полноты попеременно съ сильными колющими и потрясающими болями во всей глазной впадинѣ. Эти боли распространяются къ бровямъ, къ передней части головы и вскорѣ занимаютъ всю голову. Онѣ обыкновенно очень скоро усиливаются, причемъ больной чувствуетъ, что въ шарѣ глаза находится горячій уголь, и не можетъ смотрѣть на свѣтъ. Края вѣкъ краснѣютъ и опухаютъ, оболочки глаза тоже, такъ что темно-красноватая и опухшая на подобіе пузыря соединительная оболочка, закрывая часть роговой, выдается изъ глазной впадины. Горячія слезы отдѣляются періодически, ожесточеніе приступовъ бываетъ по вечерамъ, а по утрамъ становится легче. Въ страданіи одного глаза другой, здоровый, принимаетъ участіе, такъ что по сочувствію поражается и онъ, причемъ обнаруживается въ немъ свѣтобоязнь, умѣренная краснота и слезотеченіе. Опухоль больного глаза бываетъ такъ сильна, что вѣки кажутся растяженными и лоснящимися. Больной глазъ не можетъ переносить и легчайшаго прикосновенія; показывается сильная воспалительная горячка, у раздраженныхъ людей съ бредомъ ночью. Это глазное воспаленіе имѣетъ теченіе весьма острое, по послѣдствіямъ очень опасное, потому что оканчивается не иначе, какъ нагноеніемъ, производящимъ безобразіе глаза, потерю зрѣнія и даже всего глазнаго яблока. Должно стараться всегда о томъ, чтобы воспаленію, начинающемуся напередъ въ наружныхъ оболочкахъ глаза, не давать распространяться на другія его ткани по всему глазному яблоку.

Признаки первоначальныхъ воспаленій *прочихъ частей глаза* я считаю излишнимъ выставлять здѣсь особо, потому что лѣченіе ихъ совершенно одинаково съ соимяннымъ воспаленіемъ оболочекъ; чтожь касается до признаковъ глазовоспаленій послѣдовательныхъ простыхъ и сложныхъ, то распознаваніе ихъ и лѣченіе относится къ тѣмъ болѣзнямъ, отъ которыхъ они происходятъ, и безъ излѣченія ко-

горыхъ и они, большею частію, бываютъ неизмѣнны. Египетское же воспаленіе глазъ случается очень рѣдко, особенно у поселянъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) въ первоначальномъ глазовоспаленіи: полнокрое отъ излишне питательной пищи, приливы крови къ головѣ, привычка употреблять въ непомѣрномъ количествѣ спиртные напитки, непомѣрное сладострастіе и привычка полового совокупленія, прекращеніе привычнаго крове-пспражненія, свѣтлые глаза, предшествовавшія операціи глаза и вблизи его. Въ послѣдовательномъ простомъ и сложномъ глазовоспаленіи тѣ болѣзни, отъ которыхъ происходитъ глазовоспаленіе, какъ то: въ катарральномъ — флюсъ, насморкъ, катарръ горловой и грудной, въ золотушномъ — золотуха, въ ревматическомъ ломотномъ ревматизмъ — ломота; въ геморондальномъ геморой (почечуй), въ скорбѣутномъ скорбуть (цынга); въ худосочномъ худосочіе; въ сифилитическомъ сифилисѣ (венерическая, французская болѣзнь); въ старческомъ преклонная старость; въ рожевидномъ рожа; въ корномъ корь; въ скарлатинномъ скарлатина, въ оспенномъ оспа; въ чесоточномъ чесотка; въ лишайномъ лишай и лишайный разѣдающій струпъ; въ геморондально-ломотномъ геморой и ревматизмъ-ломота; словомъ, въ каждомъ послѣдовательномъ глазовоспаленіи сонпянная ему болѣзнь бываетъ причиною предрасполагающею.

Причины вѣшнія (производящія) механическія: песокъ, пыль, опилки деревянныя (у шлищиковъ), желѣзныя и вообще металлическія (у слесарей, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ), каменныя и известковыя частицы (у каменщиковъ, камнетесовъ, кователей мельничныхъ камней), мучнистыя частицы (у рабочихъ на мельницахъ), утренняя роса, сѣверный холодный вѣтеръ (у поселянъ во время работъ въ полѣ), рѣсницы, растущія внутри глаза, и т. п. Химическія: ѣдкія вещества и кислоты — табакъ, перецъ, ѣдкіе пары, ѣдкій дымъ (въ черныхъ избахъ у поселянъ, особенно у черемисъ и вообще у финскихъ народовъ, живущихъ почти всё время весны, лѣта, осени въ курныхъ шалахахъ и просиживающихъ большую часть свободнаго времени у огня при буревѣ), гнилостныя пары нужниковъ (у чистодѣловъ), также всѣ мѣстныя раздражающія лѣкарства, употребляемыя не бстати и т. п.; динамическія: неумѣренное напряженіе зрѣнія, напр. при долгомъ глядѣніи на свѣтъ или другія очень бѣлыя тѣла, на солнце, на свѣтлый огонь, или на другой какой блестящій предметъ, особенно во внезапномъ выходѣ изъ глубокой темноты; но ничто не можетъ такъ скоро произвести воспаленія глазъ, какъ занятія у женщинъ мелкою работою, у мужчинъ при излишнемъ чтеніи, писаніи за свѣчами, лампадою, горящимъ газомъ; еще вреднѣе вліяніе свѣта, соединеннаго съ теплотою, какъ это бываетъ въ кузницахъ, на стеклянныхъ и плавильныхъ заводахъ. Свѣтъ отраженный скорѣе можетъ причинить глазовоспаленіе, чѣмъ прямой отъ свѣтлаго тѣла; ослѣпительный свѣтъ, отражаемый обширными поверхностями обширныхъ песчаныхъ степей есть сильнодѣйствующая причина глазовоспаленія; также люди, пере-

ходя изъ тѣпистыхъ въ жаргія и открытыя мѣста, часто подвергаются воспаленію глазъ. Разсматриваніе яркнхъ красокъ дѣйствуетъ такимъ же образомъ. По этимъ причинамъ подвергаются глазовоспаленію въ особенности: портные, швеи, вышивальщицы, кружевницы, штопальщицы, жнецы и косцы, сырники (дѣлающіе и продающіе сыръ) хлѣбники или пекари хлѣбовъ, брахмальщики, точильщики и пгольщики.

Прим. Въ динамическихъ причинахъ глазовоспаленія привычка много значить; она много ослабляетъ силу вреднаго вліянія съ нхъ стороны.

Сущность состоитъ въ кровяномъ воспаленіи или всего глазнаго яблока, или его оболочекъ, смотря по видамъ этой болѣзни.

Распознаваніе легко для каждаго вида глазовоспаленія, соображая свойственные ему признаки.

Предсказаніе относительно жизни *редко* бываетъ *опасно*; относительно сохраненія зрѣнія зависитъ отъ степени воспаленія, его застарѣлости, сложности, важности поврежденія оболочекъ, т. е. чѣмъ слабѣе будетъ теченіе болѣзни, чѣмъ скорѣе противъ нея будутъ приняты надлежащія мѣры, и поврежденная часть не такъ нужна для совершенія зрѣнія, тѣмъ предсказаніе будетъ лучше.

Исходы. Слабое и наружное глазовоспаленіе всегда обанчивается, безъ вредныхъ послѣдствій для зрѣнія; либо *разрушеніемъ*, либо *нагноеніемъ*; а сильное и внутреннее, большею частію, обанчивается нагноеніемъ съ вредными послѣдствіями для зрѣнія и самой формы глаза, такъ что нерѣдко остаются въ немъ безобразіе, потеря зрѣнія и даже глазъ лопаются и вытекаютъ. Воспаленіе всего глазнаго блока обанчивается, не иначе, какъ нагноеніемъ *съ потерей зрѣнія, безобразіемъ и вытеченіемъ глаза*, нерѣдко даже *съ омертвѣніемъ*.

Лѣченіе діететическое во всѣхъ видахъ глазовоспаленія состоитъ въ соблюденіи слѣдующихъ правилъ: 1) Люди, *подверженные* *глазнымъ* *воспаленіямъ*, должны стараться *оберегать себя отъ* всѣхъ *внѣшнихъ причинъ, производящихъ ихъ*, и *искоренять* внутреннее въ нихъ *предрасположеніе*. 2) *Въ* *случай* частыхъ *возвратовъ* послѣдовательнаго глазовоспаленія совѣтовать имъ *носить* на которомъ нибудь плечѣ *источникъ* (фонтанель); сверхъ того весной и осенью *открывать кровь*, *принимать* *чистительное изъ магнезіи и ревеня* и *соблюдать строгую діету*. 3) *Одержимый* же *глазовоспаленіемъ*, кромѣ соблюденія строгой діеты, *долженъ быть покоемъ и духомъ и тѣломъ, глаза прикрывать* отъ всякаго свѣтящагося предмета; ему должно *опасаться* *смотреть на свѣтъ* восковой или сальной свѣчи, на огонь или на другой какой блестящій предметъ, *укрывать* отъ всякаго вида *дыма, чада, пыли* и отъ всего того, что можетъ понудить его чихать, кашлять или плевать. Если *ресницы* загнулись внутрь, растутъ въ глазу и болятъ его, то ихъ должно *выдергивать* щипчиками, или подстричь. Бомната его должна быть темная. Д-ръ Шобальскій, въ Парижѣ, предлагаетъ *смыканіе* *отъ*, какъ средство противъ хроническаго глазовос-

паленія. Такъ какъ глазъ подверженъ: возбужденію отъ вліянія свѣта, который дѣйствуетъ на сѣтчатую его оболочку, воздуха, который производитъ дѣйствіе на соединительную глазную перепонку, движенію глазнаго яблока и вѣбъ, которые причиняютъ непрерывное треніе, то при воспаленіи въ глазу каждое изъ этихъ вліяній по необходимости усиливаетъ состояніе раздраженія. Свѣтъ производитъ свѣтобоязнь, воздухъ раздражаетъ покраснѣвшую отъ налитія кровью жилочекъ соединительную перепонку, а каждое движеніе глаза и вѣбъ дѣлается нерѣдко источникомъ новаго раздраженія. Для избѣжанія этихъ вредныхъ вліяній надобно глазъ закрыть, и мы въ самомъ дѣлѣ инстинктивно побуждаемся къ тому, какъ скоро у насъ болятъ глаза. Для этого онъ предпочитаетъ слѣпленіе вѣбъ всѣмъ другого рода повязкамъ и покрывшамъ глазъ. Почти во всѣхъ глазныхъ воспаленіяхъ рѣсницы слипаются между собою мейбоміевою влагою, которая засыхаетъ по угламъ вѣбъ. Онъ, въ слѣдствіе своихъ наблюденій, не совѣтуетъ прекращать это слипаніе промываніемъ, а напротивъ поддерживать его, а если слипанія нѣтъ, то производитъ смыканіе вѣбъ приклеиваніемъ англійскаго пластыря къ краю вѣбъ крестообразно, надрѣзанными изъ него ленточками, какъ можно ближе. Для этого въ срединѣ краевъ вѣбъ онъ срѣзываетъ рѣсницы до самой кожи и прирѣзываетъ перпендикулярно на раздвоеніе вѣбъ двѣ тонкія и не болѣе $\frac{3}{4}$ дюйма въ длину ленточки, въ разстояніи на $\frac{1}{4}$ дюйма одна отъ другой; потомъ верхніе и нижніе концы ихъ покрываются поперечно другими, нѣсколько болѣе длинными ленточками пластыря, изъ которыхъ каждая кладется какъ можно ближе къ краю вѣба параллельно съ раздвоеніемъ его. Этотъ способъ слѣпленія гораздо надежнѣе производимаго посредствомъ наложенныхъ крестообразно пластырей, особенно когда англійскій пластырь приготовленъ соотвѣтственнымъ образомъ. Обыкновенный такой пластырь не довольно мягокъ и мало упругъ; высухнувъ, онъ коробится и раздражаетъ своею жестокостію, или совсѣмъ отваливается. Чтобъ пластырь этотъ былъ мягкимъ и эластическимъ, должно жидкую смѣсь изъ равныхъ частей клею и аравійской камеди (рыбьяго и вишневаго) съ прибавленіемъ малаго количества сахара, намазать на тафту и высушить. Приготовленный этимъ способомъ пластырь почти также упругъ и мягокъ, какъ и простая тафта. Въ болѣе сильныхъ воспаленіяхъ глазныхъ, во избѣжаніе тренія, которое больной глазъ терпитъ отъ вѣбъ при движеніи своемъ одновременно съ здоровымъ глазомъ, онъ слѣпляетъ оба глаза. Каждый день, или такъ часто, какъ требуютъ того обстоятельства, пластырь снимается съ глазъ, осматривается и снова слѣпляется. Сперва больной тяготится этимъ, потомъ скоро привыкаетъ и мало по малу находитъ это благопріятнымъ не только для его глаза, но и для расположенія его духа.

При сильномъ судорожномъ смыканіи вѣбъ у дѣтей онъ залѣпляетъ глазныя вѣбъ большими кружками пластыря, такъ что закрывается вся глазная впадина. Эти кружки онъ вырѣзываетъ лучеобразно, что-

бы можно было лучше накладывать ихъ на выпуклость вѣкъ, и снабжать ихъ большими вырѣзками въ сторонѣ внутреннихъ глазныхъ угловъ для стока слезъ. Ихъ надобно перемѣнять по крайней мѣрѣ разъ въ день, лучше всего вечеромъ при слабомъ свѣтѣ свѣчей. Складки вѣкъ надобно, при всякой перевязкѣ, тщательно расправлять, и рѣсницы, если онѣ снова выросли, опять обрѣзывать. Закрытіе тапмъ образомъ глазъ, когда оно хорошо дѣлается и тщательно поддерживается, приноситъ существенную пользу. Своенравнымъ дѣтямъ, которыя безпрестанно трутъ себѣ глаза и чрезъ то срываютъ пластырь, иногда нужно завязывать платкомъ за спиною руки *). Эта мѣра причиннаго лѣченія можетъ быть чрезвычайно полезна въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ глазовоспаленіе поддерживается постояннымъ дѣйствіемъ со стороны вреднаго вліянія виѣшнихъ причинъ, какъ-то: у разныхъ рабочихъ, напр. пильщиковъ, слесарей, кузнецовъ, каменщиковъ, камнетесовъ, мельниковъ, земледѣльцевъ во время работъ въ полѣ, поселянъ, живущихъ въ черныхъ чадныхъ избахъ, особенно у черемисъ, живущихъ почти все время весны, лѣта и осени въ шалашахъ съ бурею, причемъ собственно бѣднѣйшій дымъ дѣлаетъ всѣхъ болѣе или менѣе подслѣпыми — оттого черемисъ называютъ въ Царевобогшайскомъ уѣздѣ, Базанской губерніи, слѣпышами, также у поселянъ южныхъ провинцій Россіи, какъ-то: въ Малороссіи, гдѣ въ знойное лѣтнее время жаркіе и яркіе лучи солнца сильно раздражаютъ глаза во время дневныхъ работъ въ полѣ; преимущественно на Таврическомъ полуостровѣ и въ Крыму глазное воспаленіе, почти всегда зависящее отъ виѣшнихъ условій климата и сходствующее нѣкоторымъ образомъ съ глазовоспаленіемъ египетскимъ, потому что бываетъ заразительно, съ большою пользою и очень у мѣста можетъ быть пользуемо этою мѣрою лѣченія. 4) *Диета* должна быть не мясная, а рыбная и растительная, напр., уха съ кореньями, петрушкою, пастернакомъ, морковью, лукомъ и т. п.; сладкія растенія и овощи въ овсяной кашницѣ составляютъ приличныя кушанья въ этой болѣзни. *Вода* чистая ключевая, сыворотка, также *огуречный рассолъ съ медомъ* (№ 128) и *квасъ съ медомъ и солью* (№ 129), какъ средства, слегка споспѣшествующія испражненію на низъ, составляютъ хорошее питье. 5) Чтожъ касается до поселянъ-рабочихъ и ремесленниковъ, значущихся въ статьѣ причинъ виѣшнихъ, то изложены сверхъ того особыя правила по ихъ быту и званію, въ концѣ этого сочиненія.

Лѣченіе существенное въ глазовоспаленіи всякаго рода требуетъ, чтобы обратили вниманіе прежде всего на: 1) причину его, которую должно напередъ удалить. Если предрасположеніе, или другая болѣзнь причиною глазовоспаленія, то ее излѣчить и искоренить надлежащими, ей свойственными средствами. 2) Степень воспаленія. Слабое глазовоспаленіе начинать лѣчить не споспѣшно и не настойчиво, но соотвѣтственно причинамъ, отъ которыхъ оно произошло, по правиламъ

*) Др. Здр. 1848 г. № 19 стр. 150.

діететическимъ. Сильное же глазовоспаленіе лѣчится настойчиво и соразмѣрно со степенью воспаления: тутъ необходимы пиявицы, мушки, слабительныя, прохладительныя, успокоительныя и примочки, уменьшающія и уничтожающія воспаление и раздраженіе глазъ. 3) Признаки горячки, если они есть, то лѣчить должно, какъ сказано о горячкѣ. 4) Продолжительность или упорность глазовоспаленія. Это зависитъ отъ нелѣченія или несвоевременнаго лѣченія болѣзни; отъ дурнаго или непорядочнаго лѣченія; отъ постояннаго вліянія на глаза болѣзнетворныхъ причинъ; отъ существованія въ тѣлѣ какаго либо худосочія. Во всѣхъ этихъ случаяхъ должно дѣйствовать, если нѣтъ врача по близости, ограниченными, болѣе простыми средствами, соотвѣтственно всѣмъ этимъ причинамъ болѣзни.

Въ обыкновенномъ первоначальномъ глазовоспаленіи употребляются снаружи: *кровопусканіе* изъ вены руки назначается до фунта изъ здороваго человѣка въ сильномъ глазовоспаленіи, преимущественно, когда оно произошло отъ удара, полученнаго въ глаза, или ушиба. Приставленіе *пиявицъ* въ сильномъ глазовоспаленіи всегда необходимо, а иногда его должно и повторить; пиявицъ ставятъ за ушами, къ вискамъ, ближе къ глазамъ, а въ случаѣ нужды и къ ноздрямъ. При этомъ непремѣнно должно имѣть въ виду, что женщинамъ, занимающимся шитьемъ платья, бѣлья, вышиваніемъ, плетеніемъ кружевъ, штопаньемъ, равно и всѣмъ рабочимъ людямъ, у которыхъ зрѣніе въ постоянномъ напряженіи по ихъ особымъ занятіямъ, лучше назначать слабительныя, чѣмъ кровопусканіе, которое, какъ уже замѣчено, въ такомъ случаѣ ослабляетъ зрѣніе, и потому бываетъ болѣе вредно, чѣмъ полезно.

Примѣч. Во время приставленія пиявокъ къ ноздрямъ нужно строго смотрѣть, чтобы ни одна изъ нихъ не вползла глубоко въ ноздрю, и при отпаденіи пиявокъ не давать много падти крови.

Послѣ употребленія пиявицъ приставляется на затылокъ *мушка* (№ 58), прикладываютъ *горчичники* и къ рукамъ пониже плечъ, и къ икрамъ ногъ (№№ 88, 89, 90). *Ножныя ванны*: простая — изъ одной теплой воды, щелочная и горчичная съ солью (№№ 83, 84), состоящая въ томъ, что ноги и голени больного погружаются въ теплую воду одну, или со щелокомъ, или съ горчицею и солью, по нѣскольку разъ въ день. Очень полезна бываетъ *нарывная мазь* (№ 79), втираемая по немногу за ушами, или пониже плеча сомянной стороны воспаленнаго глаза, пока сдѣлается сыпь, похожая на оспины. *Катаплазма* (припарка) изъ *якишиа блага хлѣба* и *молока*, смѣшаннаго съ хорошимъ прованскимъ *масломъ* или съ *свѣжимъ* коровьимъ, приложенная къ глазамъ на ночь, въ томъ случаѣ, когда жаръ и боль въ нихъ бываютъ велики, оказываетъ хорошую пользу; при этомъ поутру глаза промываютъ теплою *смѣсью* изъ *воды* и *молока*. *Кобейная гуаша* употребляется въ народѣ, какъ наружное средство, въ видѣ припарки въ воспаленіи глазъ отъ простудныхъ (катаральныхъ) причинъ. Её кладутъ

теплую въ холстинной тряпочкѣ на больной глазъ *). Но лучше всего уничтожаетъ воспаление и боль глазъ *свинцовая вода*, которую обыкновенно смѣшиваютъ съ *мякншемъ свѣжей булки* и теплую кладутъ на вѣки въ видѣ припарки. Свинцовая вода можетъ быть смѣшиваема по поламъ съ *настоямъ ромашки* для обмыванія вѣкъ и очищенія ихъ отъ гнойной слизи. Желая сдѣлать глазную примочку, надобно взять 4 гра на свинцоваго сахара, выписаннаго изъ аптеки, (гранъ равенъ величиною зерну коноплянаго сѣмени) на полрюмку жидкости, напр. перегнанной изъ розовой воды, къ которой прибавляется нѣсколько слизи изъ вишневаго клея, или аравійской камеди. Чистая тряпочка смачивается такою примочкою, складывается втрое или вчетверо и кладется на болящія вѣки. *Чистая холодная вода* употребляется, какъ примочка, при сильномъ воспаленіи глазъ, происшедшемъ отъ ушибовъ, засоренія глазъ пескомъ, пылью, отъ раздраженія ихъ сильнымъ свѣтомъ, отъ тренія платкомъ, руками и т. п. Къ водѣ должно прибавлять нѣсколько водки, винограднаго вина или камфорнаго спирта. Выбравъ голову два или три раза въ недѣлю и вымывая её тотчасъ холодною водою, при глазномъ воспаленіи, больной чувствуетъ примѣтнымъ образомъ хорошія дѣйствія отъ этого средства. Чистая свѣжая вода оказываетъ очевидную пользу во многихъ случаяхъ глазовоспаленія при внутреннемъ и наружномъ ея употребленіи, особенно у людей, употреблявшихъ спиртные напитки, у которыхъ, сверхъ воспаления, замѣтна еще такъ называемая острота соковъ. Больной всякое утро пьетъ на тощакъ сначала по одному стакану свѣжей воды, потомъ по два, по 3—4 и наконецъ по цѣлому графину просто или съ сахаромъ. Понятно, что такая масса воды, переходящая въ обращеніе крови, разводитъ её и уменьшаетъ раздражающее дѣйствіе на организмъ. Больные такъ привыкаютъ къ этому роду питья, что многіе, излѣчившись отъ болѣзни, продолжаютъ пить воду. Противъ всѣхъ хроническихъ воспаленій глазъ помогаютъ *тепловатыя ванны* и обливанія въ это время головы и лба холодною водою. Это обливаніе надобно производить такимъ образомъ, чтобы, не причиняя сильнаго потрясенія, лить изъ сосуда свѣжую воду на голову и лицо больного, когда онъ сидитъ въ ваннѣ **). Д-ръ Коппъ холодною водою излѣчилъ одно упорное золотушное глазное воспаление, продолжавшееся болѣе года, сопровождавшееся жесточайшею свѣтобоязнью, въ которомъ ничто не помогало: всѣ употребленныя извѣстные средства были бесполезны. Онъ примачивалъ глаза холодною водою три раза въ день въ продолженіе 10 минутъ. Черезъ три дня они открылись и остались въ такомъ состояніи ***). Въ глазномъ воспаленіи вѣкъ (соединительной оболочки вѣкъ), когда при отворотѣ вѣкъ внутренняя ихъ поверхность бываетъ очень красна, нѣтъ лучше и проще

*) Др. Здр. 1844 г. № 11 стр. 82.

**) Д-ра: Москанин и Дему. Др. Здр. 1836 г. стр. 187.

***) Др. Здр. 1840 г. стр. 316.

лѣченія, какъ одинъ или два раза въ сутки (поутру и ввечеру) проводить по воспаленной внутренней поверхности нижнихъ вѣкъ продолговатымъ *кускомъ синяго камня* (синій купоросъ), укрѣпленнымъ въ перо. Больные терпѣливо выносятъ это прикосновеніе камня къ больному чувствительному мѣсту, потому что собственно боли не бываетъ при этомъ, а только пощипываетъ, и то на самое короткое время. После этого больные умываются холодною водою, болѣзнь замѣтно и скоро излѣчивается *). *Коровье молоко* смягчитъ и уничтожаетъ боль, употребляется теплое, какъ примочка, въ сильныхъ воспаленіяхъ, соединенныхъ съ распуханіемъ вѣкъ, отдѣленіемъ гнойной матеріи и жестокою болью. Кромѣ того молоко можетъ служить вмѣсто воды для приготовления припарокъ, особенно съ мягишемъ бѣлаго хлѣба. *Кислая капуста, кислое молоко и простокваша*, приложенныя въ ветошь къ воспаленному глазу, прохладяя и уменьшая жаръ, унимаютъ самое воспаленіе. *Настой шалфея* на молокѣ, или на водѣ, употребляемый для обмыванія глазъ, укрѣпляетъ слабые глаза. *Подушечки*, сдѣланныя изъ *ароматныхъ травъ*, напр. *ромашки, божьяго дерева, богородской травы, иссопу* и т. п. служатъ для уменьшенія опухоли вѣкъ; иногда прибавляется туда нѣсколько *камфоры*. Камфора разбиваетъ красноту и укрѣпляетъ глаза. Если глаза одержимы только одною краснотой, то для уничтоженія ея довольно натереть камфорою небольшія тряпочки и припрѣпить ихъ надъ глазами. *Смѣна чернаго мака* утоляютъ боль; припарка изъ нихъ дѣлается такимъ образомъ, что макъ толкутъ съ *прованскимъ масломъ* до тѣхъ поръ, пока сдѣлается полумягкая кашка: еѣ намазываютъ на тряпочку и кладутъ на вѣки. Для примочки же дѣлаютъ *отваръ* изъ *сухихъ маковыхъ головокъ*. Для отвара берется или молоко, или вода. Въ этотъ теплый отваръ кладутъ иногда нѣсколько *шафрана* для усиленія болеутоляющаго свойства такой примочки. Шафранъ составляетъ превосходное болеутоляющее средство и примѣшивается или къ припаркѣ, составленной изъ мягиша бѣлаго хлѣба, свареннаго съ молокомъ, или просто къ кипяченному молоку. *Чайная вода*, или настой чая китайскаго (цвѣточнаго или простаго) употребляется, какъ дѣйствительное наружное средство, въ примочкѣ, противъ продолжительнаго, даже золотушнаго, воспаленія глазъ, особенно при значительномъ слезотеченіи, одинъ, а безъ онаго пополамъ съ молокомъ. *Чайный настой* вяжетъ, укрѣпляетъ и возбуждаетъ. Сильная боль въ глазахъ очень облегчается отъ держанія глазъ надъ парами чайнаго настоя **). *Глазная примочка* д-ра и заслуженнаго про-

*) Въ 1840 году лѣтомъ въ больницѣ Казанскаго Приказа общественного призрѣнія въ моемъ завѣдываніи было 47 кантонистовъ съ этою болѣзнію, которые всѣ въ короткое время были мною излѣчены посредствомъ одного этого наружнаго средства (сообщено въ Др. Здр. 1840 г. стр. 304).

**) Д-ръ Грумъ. Др. Здр. 1845 г. № 1 стр. 5. Д-ръ Рейпольскій Др. Здр. 1846 г. № 13, стр. 117.

фессора *Булявскаго* изъ *черемуховой воды* (№ 168), которую можно приготовить въ деревняхъ и хранить для употребленія года 2 и 3 безъ потери ея силы, укрѣпляетъ зрѣніе до такой степени, что нѣкоторые пожилые люди, нѣсколько уже годовъ употреблявшіе очки, вовсе оставили ихъ *). *Розовая вода* очень часто употребляется противъ слабаго, а тѣмъ болѣе противъ продолжительнаго воспаления, которое поддерживается лишь слабостію глазъ: вода эта имѣетъ лишь стягивающее свойство и чрезъ то укрѣпляетъ глаза, которые примачиваются или одною ею, или въ смѣшеніи съ другими лѣкарственными веществами, особенно со свинцовымъ сахаромъ и цинковымъ купоросомъ. Цинковый, или бѣлый купоросъ, употребляется тогда, когда уже уменьшится воспаление глазъ отъ противувоспалительныхъ средствъ (отъ свинцовой-гулярдовой воды), но не можетъ пройти отъ нихъ совсѣмъ, а потому лѣкарство это полезно употреблять противъ продолжительныхъ и не сильныхъ воспаленій. Для примочки берутъ на $\frac{1}{2}$ рюмки какой либо жидкости 1 гранъ (съ конопляное зерно) бѣлаго купороса и одну или двѣ капли такой смѣси впускаютъ въ болящій глазъ, или же обмываютъ ею глаза. Средство это полезно также противъ непрозрачныхъ пятенъ на глазахъ. Сюда относятся секретныя глазныя средства, употребляемыя въ Россіи неврачами, какъ-то: *капли* негодіанта *Моллера* (№ 161), *кушцовъ*: *Арешиникова* (№ 162) и *Трофимова* (№ 163); также глазныя средства, употребляемыя врачами, какъ то: *вода и мазь Пленка* (№№ 152, 153), *капли Левизона* (№ 156), *лиментъ Трекурта* (№ 154) и *Губеланда* (№ 157), *примочка Веллера* (№ 155), *вода Рихтера* (№ 158), *Сандерса* (№ 159), *итальянская* (№ 160)**) *Квасцы* полезны въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ воспаления и боли въ глазахъ, а только краснота отъ большой слабости глазныхъ жлоковъ и оболочекъ. Для примочки берутъ $\frac{1}{8}$ ч. золотн. чистыхъ квасцовъ на рюмку ромашковаго настоя. Квасцы затираютъ на яичномъ бѣлкѣ и съ пользою прикладываютъ въ такомъ случаѣ къ больнымъ глазамъ (№ 164). *Примочки* изъ воды ключевой съ *селитрою* и *нашатыремъ* (№ 93), изъ *уксуса*, *мятной воды*, или *мятнаго чая* съ *камфоромъ* (№ 94) оказываютъ большую пользу въ значительныхъ воспаленияхъ глазъ, когда и жаръ, и боль, и краснота въ глазовоспаленіи бывають особенно велики. Фонтанели (источники,гноеточивыя раны) назначаются въ продолжительныхъ и упорныхъ глазныхъ воспаленияхъ, особенно у подверженныхъ золотухѣ: ихъ отгрыбають за ушами, на рукахъ и на ногахъ, и онѣ приносятъ очевидную пользу въ трудно-лѣчимыхъ глазныхъ болѣзняхъ. Послѣ того какъ глазное воспаление прошло, надо, ежели глаза слабы и зрѣніе нѣжно, промывать ихъ утромъ и вечеромъ небольшимъ количествомъ прохладной *воды и водки*, полагая одну часть водки на шесть частей воды. Хорошо вымывать

*) Др. Здр. 1849 г. № 17 стр. 130.

**) Др. Здр. 1842 г. № 46. стр. 364, 365, 366.

весь глазъ этою водою съ водкою и держать на немъ примочку нѣсколько времени; также *вода съ уксусомъ* есть превосходное средство для укрѣпленія глазъ. Внутрь: — *прохлаждающія слабительныя* изъ огуречнаго разсала (№ 7), кремортартара одного (№ 9) и съ магнезіею (№ 10), горькой соли (№ 37), изъ толочна (№ 72), коры брусниці (№№ 74, 75), отвара чернослива съ селитрою и медомъ (№ 97), отвара коринки (№ 98) съ кремортартаромъ и селитрою (№ 99), сыворотки съ селитрою (№ 100), кастороваго масла (№ 101), отвара тамаринда съ горькою солью (№ 138), вѣнское питье (№ 139). Для возбужденія испарины и произведенія пота должно давать *чай* изъ сухой *мяты, липоваго цвѣта, бузины* и т. п. (№ 85). Въ успокоеніе отъ прилива крови къ головѣ, отъ боли глазъ, отъ зуда въѣкъ и безсонницы съ горячечными признаками должно давать *растительное молоко съ селитрою* (№ 87).

Въ послѣдовательномъ глазовоспаденіи, будетъ ли оно простое или сложное, какъ болѣзни, особенно продолжительной, нелихорадочной, упорной, зависящей отъ другой сомнянной ей болѣзни, вмѣстѣ съ которою оно и излѣчивается не иначе, какъ сказано выше, должно совѣтовать обратиться ко врачу.

Золотушныя воспаления глазъ ліонскій врачъ Боннетъ лѣчитъ натираніемъ въѣкъ кускомъ снята купороса, толщиною нѣсколько менѣ мизинца, которымъ, обмокнувъ его сперва въ холодную воду, потираетъ края въѣкъ, сжатыхъ между собою, отъ 20-ти до 30-ти разъ по всей длинѣ краевъ. Онъ повторяетъ это три раза въ день, въ теченіе почти 15-ти дней, стараясь смачивать въѣки отъ времени до времени. Самые непослушныя дѣти легко подчиняются этой операціи; боль при этомъ обыкновенно очень мала, только нѣсколько щиплетъ. Благоудѣтельное дѣйствіе этого средства обнаруживается наиболѣе около 15 дня. Извѣстный брюссельскій врачъ Кюнье давно употребляетъ этотъ способъ лѣченія съ большею пользою, только нѣкоторые воспаления упорствовали, потому что они поддерживались грануляціями (маленькіе прыщики) краевъ въѣкъ, *) которые я всегда уничтожаю малѣйшимъ прикосновеніемъ къ нимъ ляписомъ одинъ разъ въ сутки, и кромѣ пользы съ быстрымъ успѣхомъ никогда ничего не встрѣчалъ.

*) Др. Здр. 1848 г. № 44. стр. 349.

КЛАССЪ ВТОРОЙ.

СЫПИ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Лихорадочными сыпями называются многообразныя отложенія на кожѣ, предшествуемыя и сопровождаемыя лихорадочными припадками и обнаруживающіяся въ 3-мъ періодѣ лихорадочныхъ болѣзней, т. е. послѣ озноба и жара.

ТЕЧЕНІЕ лихорадочныхъ сыпей совершается въ 12 сутокъ. Въ первые три дня бываютъ признаки лихорадки, въ слѣдующіе потомъ три дня, т. е. въ 4—5 и 6-й наступаютъ жаръ (горячка) и періодъ высыпанія, а за нимъ три дня, т. е. 7-й, 8-й и 9-й составляютъ періодъ наливапія, и наконецъ послѣдніе три дня т. е. 10-й, 11-й и 12-й составляютъ періодъ подсыханія. Въ простомъ народѣ такой ходъ лихорадочныхъ сыпей очень хорошо выражается словами: *три дня болитъ, три дня горитъ и высыпаетъ, три дня наливаетъ и три дня подсыхаетъ*. Но это правильное теченіе лихорадочныхъ сыпей не всегда бываетъ одинаково; иногда всё теченіе оканчивается въ 3 дня, а иногда продолжается до 3 недѣль и болѣе. Такая общая разность въ ходѣ лихорадочныхъ сыпей видна изъ частныхъ разностей въ описаніи признаковъ каждой изъ нихъ порознь.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Лихорадочныя сыпи, не смотря на ихъ общее сходство, весьма различны между собою въ разныхъ отношеніяхъ, а именно: 1) По всегдашнему, или не всегдашнему присутствію лихорадки онѣ бываютъ естественно *лихорадочныя*, всегда сопровождаемыя лихорадкою, и *такія, которымъ не всегда сопутствуетъ лихорадка*. Въ первымъ изъ нихъ принадлежатъ всѣ вообще такъ называемыя лихорадочныя сыпи; а ко вторымъ тѣ изъ нихъ, которыя въ низшей степени развитія нерѣдко обнаруживаются безъ предшествующей имъ лихорадки, какъ наприм. вѣтрная оспа, крапивная сыпь и краснуха. 2) Лихорадочныя сыпи раздѣляются на *воспалительныя* и *гнилостныя*. Воспалительныя обнаруживаются всѣми признаками собственно воспалительной горячки; сыпи гнилостныя сопровождаются гнилостною горячкою и мѣстными гнилостными признаками. Изъ всѣхъ лихорадочныхъ сыпей натуральная оспа чаще сопровождается горячкою нервно-гнилостною. Впрочемъ нерѣдко и корь, краснуха и скарлатина, по причинѣ особеннаго тѣлосложенія больного, опредѣленныхъ жизненныхъ условій, видимо способствующихъ развитію гнилостнаго состоянія и качеству эпидеміи, принимаютъ характеръ гнилостный. 3) Лихорадочныя сыпи по вѣшной *формѣ* раздѣляются на: а) *Сосковатыя*, которыя обнаруживаются мелкими сосковатыми пятнами, переходящими въ нагноеніе и оканчивающимися слущеніемъ кожицы, какъ: корь, краснуха и скарлатина. б) *Бугорчатая*, обнаруживающіяся въ видѣ плос-

коватыхъ разнообразныхъ бугорковъ, оканчивающихся безъ нагноенія и слупленія кожицы, куда принадлежитъ крапивная сыпь. с) *Прыщеватия*, у которыхъ прежде правильные, круглые бугорки переходятъ потомъ въ нагноеніе и послѣдующее затѣмъ острупленіе, куда принадлежатъ: натуральная оспа, вѣтрена оспа и просяная сыпь. 4) *По происхожденію* своему раздѣляются на *первоначальныя* и *послѣдовательныя*. Первоначальныя обнаруживаются въ слѣдствіе своихъ особенныхъ внѣшнихъ производящихъ причинъ; сюда принадлежатъ всѣ лихорадочныя сыпи, за исключеніемъ крапивной. Послѣдовательныя образуются въ слѣдствіе особеннаго внутренняго состоянія тѣла, куда принадлежатъ: крапивная сыпь, молочница и всѣ сыпи не лихорадочныя.

Распознаваніе лихорадочныхъ сыпей первоначальныхъ, при полномъ ихъ развитіи, весьма *легко* не только въ періодъ ихъ высыпанія, но даже и въ самомъ періодѣ горѣнія. Если, напротивъ, онѣ будутъ имѣть ходъ неправильный и не будутъ вполнѣ развиты, то распознаваніе ихъ и въ самомъ періодѣ высыпанія *длается* очень *сомнительнымъ*, такъ что нельзя опредѣлительно сказать, горячкою ли страдаетъ больной, или сыпью. Что же касается до распознаванія сыпей послѣдовательныхъ, то оно весьма просто и зависитъ отъ привычной наглядки на свойство самаго сыпнаго отложенія.

Исходы: въ *здоровье*, въ *другія болѣзни* и въ *смерть*.

Причины, сущность, предсказаніе и лѣченіе съ надлежащею точностію могутъ быть изложены при частномъ обзорѣ лихорадочныхъ сыпей, изъ которыхъ у поселянъ наичаще случаются слѣдующія: *Молочница, крапивная сыпь (крапивная лихорадка), пущыричатая сыпь, просяная сыпь, оспа натуральная, вѣтрена, видоизмѣненная (варіолоидъ) оспа предохранительная настоящая, ложная, видоизмѣненная, корь, краснуха, скарлатина.*

Молочница.

Опредѣленіе. Молочница есть сыпь, занимающая большею частію полость рта, распространяющаяся иногда чрезъ пищевагій каналъ, обнаруживающаяся сначала въ видѣ бѣлыхъ прыщей, прежде мелкихъ, потомъ крупныхъ, похожихъ на оспенныя и переходящихъ въ поверхностное изъязвленіе.

Раздѣленіе. Молочница раздѣляется на *первоначальную*, гуньбу, происходящую непосредственно отъ внѣшнихъ причинъ, производящихъ ее, и *послѣдовательную*, происходящую отъ другихъ болѣзней.

Та и другая молочница бываетъ: 1) *ротовая*, которая ограничивается одною полостью рта; 2) *ротожелудочно-кишечная*, если изъ полости рта распространяется по желудочно-кишечному каналу; 3) *кишечная*, которая начинается съ кишечнаго канала и ограничивается имъ однимъ; и 4) *кишечно-желудочно-ротовая*, когда молочная сыпь,

начинаясь въ кишкахъ, распространяется въ верхъ, на желудокъ, пищеварительный каналъ и на самую полость рта.

Признаки молочницы, начинающейся въ полости рта. Языкъ и поверхность полости рта сначала мѣстами бываютъ темно-красныя. Потомъ эти покраснѣвшія мѣста покрываются мелкою сыпью, на подобіе просеянной; далѣе сыпь эта быстро наливается бѣлою полугнойною влагою и представляетъ видъ прыщей, очень похожихъ на оспенныя; при этомъ въ пораженныхъ мѣстахъ появляется особаго рода щипаніе, съ чувствомъ отуплѣнія или онѣмѣнія въ нихъ. Жеваніе, сосаніе и глотаніе, по мѣрѣ развитія сыпи, становятся болѣзненными и затруднительными, особенно, когда прыщи прорвутся и сдѣлается изъязвленіе; тутъ появляются признаки лихорадки, особенно жаръ. При распространѣніи ея на пищеварительный каналъ присоединяется боль по направленію этого канала при проглатываніи пищи и питья; голосъ дѣлается сиповатымъ, появляется кашель, трудное дыханіе, особенно вдыханіе, чувство тяжести въ груди и постоянныя лихорадочныя движенія. При распространѣніи сыпи на желудокъ является сильная жажда, потеря аппетита, чувство тяжести и боль подъ ложкою, тошнота, иногда рвота съ изверженіемъ вязкой мутноватой слизи, поносъ, а иногда запоръ. При распространѣніи сыпи на кишки чувствуется рѣзь въ животѣ и водянистый поносъ (мытъ). Въ молочницѣ кишечной сперва являются боли въ животѣ, сопровождаемыя лихорадочными движеніями, и бываетъ запоръ, а потомъ водянистый поносъ, который впрочемъ появляется иногда и безъ предшествовавшаго запора. При поносѣ въ извергаемой жидкости находятся тваненныя бляшки, явственно указывающіе на находящуюся въ слизистой ткани кишки кожицу.

Въ молочницѣ кишечно-желудочно-ротовой, т. е. при распространѣніи ея отъ кишки на желудокъ, пищеварительное горло и самую полость рта, обнаруживаются послѣдовательно всѣ признаки, свойственные поражению этихъ частей, начиная съ послѣднихъ, восходя къ первымъ, о которыхъ сказано выше.

Причины внутреннія (предрасполагающія) въ первоначальной молочницѣ: ослизненіе всего тѣла и особенно слизистой ткани желудочно-кишечнаго канала. По этой причинѣ молочницѣ болѣе подвержены дѣти и люди мокротнаго тѣлосложенія; скопившіяся же нечистоты въ желудкѣ и кишкахъ, порча соковъ другими застарѣлыми болѣзнями, — ломотою, любострастною, золотушною, составляютъ предрасположеніе къ послѣдовательной молочницѣ.

Причины внѣшнія (производящія) въ молочницѣ первоначальной: неопрятное содержаніе особенно рта; старое окислое молоко, слишкомъ слизистыя, острыя, горячительныя пища и питье. Младенцы, которыхъ не содержатъ въ наружной чистотѣ, у которыхъ не очищаютъ ротъ и желудочно-кишечный каналъ (первые пути), наиболѣе бываютъ подвержены молочницѣ, равно какъ и тѣ, которые сосутъ молоко слишкомъ старое или кислое, или которые засыпаютъ, держа сосокъ титыни

во рту. Множество дѣтей имѣютъ этотъ порокъ, сообщаемый имъ отъ матери или кормилицы. Многіе приучаютъ дѣтей засыпать не иначе, какъ у груди, причемъ, отнимая ихъ отъ груди, кладутъ въ колыбель не прежде, какъ удостовѣрятся, что чрезъ перенесеніе ихъ не разбудятъ. При этомъ отнятіи ихъ отъ груди видна бываетъ текущая у нихъ изъ рта свѣтлая жидкость, которая не иное что, какъ сыворотка свиснувшего молока. Эта сыворотка въ короткое время становится острою и ѣдкою: отъ нея осадниваетъ вся внутренность рта и происходитъ молочница. Сверхъ того младенцы, страдающіе сильнымъ поносомъ во время какой либо лихорадки, подвержены бываютъ молочницѣ; случается, что она обазывается и тогда, когда зубы хотятъ прорѣзываться *). Въ молочницѣ послѣдовательной: теплый и сырой воздухъ, особенно при недостаткѣ тѣлесныхъ упражненій съ существующимъ предрасположеніемъ; неудобоваримыя острыя вещества, напр. разнаго рода болбасы, ветчина, рыба копченая и соленая; слишкомъ жирныя и пряныя похлѣбки, незрѣлые плоды — легко производятъ молочницу, которая появляется въ болѣзняхъ венерической, цынготной, золотухѣ, ломотѣ, въ высшей степени водянки, чахотки, желудочныхъ горячекъ, воспаленій, также послѣ неосторожнаго употребленія ртути.

Сущность состоитъ въ отложеніи пасоки (лимфы) подъ кожей слизистой ткани пораженныхъ частей съ послѣдующимъ поверхностнымъ изъязвленіемъ ея. Въ понятіе о сущности также должно войти, какъ и во всякой болѣзни, понятіе о предрасположеніи, на которое врачующій при лѣченіи болѣзни долженъ обращать большое вниманіе.

Распознаваніе удобно, за исключеніемъ того, когда молочница начинается въ кишечномъ каналѣ, и притомъ ограничивается имъ однимъ (молочница кишечная). Но и въ этомъ случаѣ понятіе о предрасположеніи, опредѣленіе причинъ внѣшнихъ, производящихъ ее, присутствіе въ испражненіяхъ низомъ тканеныхъ клочковъ и отсутствіе условій, при которыхъ образуется водянистый поносъ, служатъ вѣрнымъ руководствомъ къ распознаванію молочницы, словомъ: молочница ротовая, занимающая разныя части рта, легко познается видимою сыпью; молочница въ устьѣ горла и въ самомъ пищепріемномъ горлѣ замѣчается невозможностью глотать, сильнымъ кашлемъ, хрипотою и звукомъ голоса, какъ-бы изъ металлической трубы; молочница въ желудкѣ отличается рвотою и икотою; молочница въ кишкахъ обозначается мытомъ, въ которомъ видны бываютъ подсохлыя струпики молочницы и самое молоко между каломъ. Но если прыщики бываютъ черныя, глубокіе и занимаютъ большое пространство, тогда должно подозревать, что молочница не первоначальная, но послѣдовательная; а ежели струпики простираются до самой кости, то нельзя сомнѣваться, чтобъ они не зависѣли отъ какой нибудь венерической остроты.

*) Буханъ. Томъ IV стр. 248 и 249.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ: 1) отъ степени предрасположенія; 2) отъ силы причинъ производящихъ; 3) отъ степени и мѣста развитія сыпи; 4) отъ сопряженности ея съ другими болѣзнями. Чѣмъ сильнѣе предрасположеніе и развитіе молочницы, чѣмъ чаще и болѣе она возобновляется, чѣмъ важнѣе сопряженная съ нею болѣзнь, чѣмъ она темнѣе, синѣе или чернѣе, чѣмъ болѣе затрудненія въ глотаніи, пищевареніи и дыханіи, тѣмъ она бываетъ опаснѣе. Довольно легко излѣчивается молочница на губахъ, деснахъ, языкѣ, во внутренности щекъ, на небѣ во рту, на языкѣ и на желѣзахъ подлѣ язычка. Труднѣе же въ устьѣ горла, желудкѣ и кишкахъ, а очень трудно вылѣчить ту молочницу, которая изъ горла бидается чрезъ дыхательный каналъ въ легкія; наконецъ самую труднѣйшую къ излѣченію почитается та молочница, которая, начавшись въ кишкахъ, или желудкѣ, пробирается чрезъ пищепріемное горло и въ немъ принимаетъ видъ поросычѣй кожи *).

Исходы. Въ *здоровье* молочница переходитъ при постепенномъ уменьшеніи всѣхъ признаковъ ея и заживленіи язвынокъ. Въ *другія болѣзни*, напр. глубокое изъязвленіе, сопровождаемое часто изнурительною лихорадкою, *омертвѣніе* изъязвленныхъ мѣстъ, особенно кишечнаго канала: при изъязвленіи, тѣмъ болѣе съ омертвѣніемъ желудочно-кишечнаго канала, обыкновенно разстроивается пищевареніе, слѣдуетъ истощеніе тѣла. *Смерть*ю оканчивается молочница при посредствѣ этихъ болѣзней.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: въ молочницѣ первоначальной, которой наибаче подвергаются дѣти, должно: 1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни *содержать ихъ по правиламъ о хожденіи и попеченіи новорожденныхъ младенцевъ* 2) Бакъ вообще все *тѣло*, такъ въ особенности *ротъ ребенка*, сосущаго сосокъ груди, или рожка, *содержать въ чистотѣ*; для этого каждый разъ послѣ кормленія его нужно ему вытирать внутреннюю поверхность щекъ, десны, языкъ и губки пальцемъ, обернутымъ въ тонкую, чистую, мягкую тряпочку, смоченную теплою сахарною водою или настоемъ чая, а тѣло обмывать въ ваннѣ, или въ корытѣ теплою водою съ мыломъ раза три, по крайней мѣрѣ, въ недѣлю; при этомъ наблюдать, *чтобы воздухъ въ комнатѣ былъ чистъ и сухъ, больше перемѣнялось чистое и сухое*. 3) *Не кормить* его *молокомъ старымъ или окислымъ*. 4) При первомъ случаѣ, какъ только обнаружится у него молочница во рту, гдѣ она бываетъ чаще всего и предшествуетъ обыкновенно развитію ея въ другихъ частяхъ, надлежитъ приказывать кормящей его *сварить* хорошо перемытые *листья шалфея* въ водѣ, въ которую можно прибавить немного и *вина* (рюмку на 2 стагана, или на чайникъ отвара шалфея) потомъ, процѣдивъ и под-

*) Буханъ. Томъ IV. стр. 248.

сластивъ нѣсколько *мидомъ*, должна она *обмочить* въ этотъ отваръ *тряпочку*, и, обернувъ ею конецъ своего пальца, тихонько *потрогивать* имъ во рту младенца всѣ тѣ *мѣста*, въ которыхъ примѣтны бѣлыя пятна *молочной сыти*. Эту операцію должна она повторять черезъ часъ, до тѣхъ поръ, пока пятна не пропадутъ совершенно.

Въ молочницѣ послѣдовательно должно стараться, по мѣрѣ возможности, *удалять* предрасполагающія *болѣзненные причины* и *причины* производящія. Для этого одержимому этою болѣзнію должно *совѣтовать*: 1) *вести образъ жизни дѣятельный, опрятный*, съ соблюденіемъ чистоты и освѣженія кожи. Для этого *обмывать все тѣло* тепловатою водою съ мыломъ и *разъ* по крайней мѣрѣ *въ недѣлю ходить въ баню*, принимая всѣ предосторожности отъ простуды, при выходѣ изъ нея. Каждый разъ послѣ обмыванія тѣла и послѣ бани *перемывать бѣлье* на чистое и сухое. 2) *Воздухъ въ жилищѣ имѣть сухой, одѣяніе такое, чтобы постоянно поддерживалась легкая испарина*. 3) *Пищу употреблять тонкую, легкую, удобоваримую*, словомъ: противоположную той, которая означена въ причинахъ, производящихъ эту болѣзнь. 4) *Пить воду сахарную, отваръ сухихъ грушъ, грушиной квасъ, наливку изъ душицы, мяты, богородской травы, ягодъ сухой черники*: достаточнымъ можно пить съ пользою *воду съ краснымъ виномъ*. 5) Привычнымъ къ употребленію спиртныхъ напитковъ можно дозволить употреблять по рюмкѣ передъ обѣдомъ и ужиномъ *настойку вина* на померанцовыхъ и лавровыхъ листьяхъ, также на корѣ померанцовой, горечавкѣ и вышеупомянутыхъ травахъ.

Лѣчение существенное въ молочницѣ первоначальной состоитъ въ очищеніи *молочной сыпи* (пасочнаго отложенія) въ первыхъ путяхъ, какъ то: во рту, *пищепріемномъ горлѣ*, *желудкѣ* и *кишкахъ*, и *заживленіи* поверхностнаго въ нихъ изъязвленія. Для этого самое лучшее, опытомъ дознанное, средство *медокъ изъ буры* (№ 170) для помазыванія во рту. Если этого недостаточно, и молочница не уменьшается, то отличное средство тоже *медокъ изъ бѣлаго купороса* (№ 171) для такого же помазыванія, только помазывать надо слегка, чтобы дитя его не глотало. Внутрь же слѣдуетъ при этомъ давать больному младенцу *слабительные порошки изъ ревеня съ магнезією* (№ 172) для очищенія желудка, особенно тогда, когда ребенокъ мучится рвѣзью въ животѣ, что означаетъ кислоту или сгустившіяся мокроты, отъ которыхъ должно освобождать пищеварительные органы. Если всѣхъ этихъ средствъ недостаточно, то къ наружному медку изъ буры хорошо прибавить *перезжеженныхъ квасцовъ* (№ 173) и помазывать сыпь во рту, а внутрь, если больного тянетъ мокротою, *позываетъ на рвоту* и даже *рветъ*, слѣдуетъ дать *рвотное изъ рвотной соли* (№ 174), или вмѣсто рвотной соли по 6-ти и по 7-ми капель *сурьмянаго вина* въ чайной ложечкѣ воды или легкаго *овсянаго отвара* чрезъ каждую $\frac{1}{4}$ часа, до дѣйствія. Если будетъ замѣчено, что молочница въ желудкѣ и *кишкахъ*, то надлежитъ взять *соку печеной ртуты*, къ которому прибавить не-

много розоваго меда, или розовой воды съ сахаромъ, и давать эту смесь ребенку часто, по ложкѣ. Въмѣсто рѣпнаго сока можно давать и сокъ морковный, который употребляется подобнымъ же образомъ. Сверхъ того кормящая своею грудью мать или кормилица должна принимать раза три или четыре въ день по столовой ложкѣ слабительнаго порошка изъ ревеня съ магнезіею (№ 172). Какъ скоро струпики молочницы начнутъ выходить низомъ, то должно дать младенцу такое очищающее слабительное, которое бы вмѣстѣ и укрѣпляло кишки, и именно *ревенный сиропъ* (№ 178) по двѣ чайныхъ ложечки черезъ три часа, до дѣйствія. Если же младенецъ будетъ мारаться съ кровью, и у него полагается поносъ, тогда надлежитъ давать ему *питіе изъ отвара ячменя съ арабійскою камедію или вишневымъ клеемъ* (№ 130), а при запорахъ съ *пальмовымъ масломъ*. Это питіе употребляется и внутрь, и снаружи въ блистирахъ. Если струпья молочницы начинаютъ чернѣть, поражаться омертвѣніемъ, въ такомъ случаѣ непременно должно прибѣгнуть къ употребленію *отвара хины* (№ 47). Должно чаще примачивать сыпь смоченною этимъ отваромъ тряпичкою на пальцѣ, или мягенькою кисточкою, и давать его младенцу внутрь по 2 чайныхъ ложечки черезъ два часа.

Въ молочницѣ послѣдовательной, зависящей отъ другихъ болѣзней, лѣченіе предпринимается средствами, свойственными той изъ нихъ, отъ которой она происходитъ; но какъ и распознаваніе, и лѣченіе въ этомъ случаѣ требуетъ величайшихъ предосторожностей, то благоразуміе обращаться для оказанія врачебнаго пособія собственно и прямо къ искуснымъ врачамъ.

Крапивная сыпь, крапивная лихорадка.

Опредѣленіе. Крапивная сыпь есть лихорадочная, а нерѣдко и не лихорадочная, сыпь, бугорчатая, сопровождаемая зудомъ и нѣкоторымъ щипленіемъ, не переходящая ни въ нагноеніе, ни въ слущеніе, а единственно въ разрѣшеніе.

Раздѣленіе. Изъ этого видно, что она бываетъ *лихорадочная* и *не лихорадочная*.

Признаки. Крапивная сыпь лихорадочная, большею частію, начинается нерасположенностью въ духѣ, тяжестию и нерѣдко болью головы, потерю вкуса и нерѣдко аппетита, черезъ 3—6—12 часовъ развивается ощущеніе озноба, бѣгло перемѣняющееся съ ощущеніемъ жара, съ появленіемъ которыхъ развивается зудъ въ тѣлѣ, указывающій на мѣста, поражаемая сыпью. Если больной при этомъ терпѣливъ и не чешетъ зудящее мѣсто, то сыпь бываетъ въ видѣ неправильныхъ бѣловатыхъ бугорковъ, похожихъ на бугорки, происходящіе отъ стрѣбанія крапивою. Отъ чесанія, напротивъ, сыпь въ зудящихъ мѣстахъ принимаетъ значительно живую цвѣтъ и представляется во многихъ мѣстахъ розовою, причемъ многіе бугорки сливаются между собою и со-

ставляютъ разнообразныя возвышенія. Въ этомъ видѣ сыпь, продолжаясь не болѣе 2—3, а иногда въ теченіе 12-ти часовъ, и даже цѣлыхъ сутокъ, что бываетъ рѣдко, или съ появленіемъ испарины и вообще всѣхъ отдѣленій и испражнений, или безъ всякихъ перемѣнъ, скоропостижно исчезаетъ и опять не появляется; а иногда чрезъ нѣсколько часовъ, особливо, если больной въ теплѣ, она вновь возвращается на нѣсколько часовъ, потомъ опять пропадаетъ. Это повторяется иногда по нѣскольку разъ, за исключеніемъ лихорадочныхъ припадковъ, которые обыкновенно становятся слабѣе при повтореніи возвратовъ, такъ что при четвертомъ, иногда третьемъ и даже второмъ возвратѣ лихорадочныхъ признаковъ совсѣмъ уже не бываетъ. Не лихорадочная крапивная сыпь появляется, напротивъ, вдругъ, безъ всякихъ признаковъ нелихорадочныхъ движеній; сверхъ того высыпаніе ея бываетъ несравненно постояннѣе и продолжительнѣе, и въ тоже время она легче скрывается при охлажденіи тѣла, нежели сыпь лихорадочная. Наконецъ она отличается и тѣмъ еще отъ лихорадочной крапивной сыпи, что возвраты ея могутъ повторяться недѣли, мѣсяцы и годы.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе въ этой болѣзни состоитъ въ остротномъ всеобщемъ и частномъ ослизненіи желудочно-кишечнаго канала, которое обыкновенно бываетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ тѣло золотушнѣе; оттого дѣти и молодые люди наичаще бываютъ подвержены этой сыпи. Но легко происходитъ она и безъ всякаго видимаго предрасположенія, единственно по силѣ причинъ внѣшнихъ (производящихъ).

Причины внѣшнія (производящія) всѣ тѣ условія, которыя развиваютъ остротное ослизненіе желудочно-кишечнаго канала, каковы напр. всѣ пищевыя и питьевыя вещества, сильно слизистыя, особливо имѣющія притомъ острое качество, напр. копченое и соленое мясо животныхъ и рыбъ, особливо красныхъ, раки, устрицы, изъ ягодъ — земляника, сдобныя печенья, пиво, квасъ, кислые щи, главнѣйшею же причиною бываетъ обыкновенно простуда, особенно у тѣхъ, кто содержитъ себя излишне тепло и бываетъ долго въ сыроватой атмосферѣ. Иногда болѣзнь эта показывается каждый разъ при наступленіи мѣсячнаго очищенія, особенно въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи. Хотя крапивная сыпь бываетъ во всякое время года, однако замѣтно, что поселане подвергаются ей чаще въ концѣ лѣта, и въ это время она нерѣдко пристаётъ къ цѣлому семейству, особенно ежели есть дѣти.

Сущность состоитъ въ вышеозначенномъ остротномъ, какъ всеобщемъ, такъ и частномъ, ослизненіи желудочно-кишечнаго канала и отложеніи этой слизи на кожную систему.

Распознаваніе легко и удобно, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ, гдѣ сыпь, имѣя форму не бугорчатую, а сосокватую, легко можетъ быть сочтена за другую болѣзнь, если не будетъ обращено вниманіе на причины ея.

Предсказаніе относительно опасности для жизни *хорошо*. Бо-

лѣзнь, большею частію, сама по себѣ благотворная. Относительно же продолжительности предсказаніе въ ней *различно*. Лихорадочная граппивная сыпь продолжается сутки, трое сутокъ, рѣдко шесть, а еще рѣже 8 сутокъ, напротивъ, не лихорадочная нерѣдко продолжается недѣли, мѣсяцы и цѣлые годы. Въ послѣднемъ случаѣ предсказаніе относительно продолжительности прежде всего зависитъ отъ степени предрасположенія, такъ что, чѣмъ оно сильнѣе, тѣмъ предсказаніе хуже, и наоборотъ; но при правильномъ лѣченіи, за всѣмъ тѣмъ, въ самыхъ даже сильнѣйшихъ ея случаяхъ предсказаніе дѣлается довольно выгоднымъ, и болѣзнь можетъ окончиться въ шесть недѣль, а чаще оканчивается въ три недѣли.

Исходы бываютъ или въ здоровье, или въ другія болѣзни.

Лѣчение діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предотвращеніе отъ этой болѣзни должно *запрещать каждому, кто расположенъ къ ней* и часто ей подвергается, *всѣ вредныя пищевыя и питевыя вещества*, означенныя въ причинахъ, производящихъ эту болѣзнь. 2) Главное при этомъ *советовать беречься простуды* во всякое время года, особенно поселянамъ въ концѣ лѣта. 3) *Одержимому* ею больному хотя *необходимо* большое движеніе, однако надобно оставаться дома у себя *въ комнатахъ, соблюдать чистоту, умывать все тѣло, особенно руки и ноги, тепловатою водою, ходить чаще въ баню, или садиться въ теплую ванну, перемѣнять бѣлье, употреблять пищу теплую, растительную изъ огородныхъ овощей и плодовъ вареныхъ и печеныхъ, слегка кисловатыхъ, пить воду, сыворожку, снятое молоко, настой мяты, шалфея, липовыхъ цвѣтковъ, сухой малины, богородской травы, душицы (№ 85)*. 4) Но не пить холодную воду и *не купаться въ рѣкѣ*, особенно во время трудныхъ работъ, или вскорѣ послѣ натиранія сыпи отъ зуда какими либо раздражающими средствами, напр. дегтемъ, скипидаромъ, перцовкою, березковымъ спиртомъ и т. п.; равно и послѣ сильного расчеса охлажденіе такого рода тѣла до того можетъ быть вредно, что чрезъ это болѣзнь легко подвергается опасности жизни *).

*) Въ убѣжденію въ этой истинѣ изъ числа нѣсколькихъ моихъ наблюденій не лишнимъ считаю помѣстить здѣсь одно, очень замѣчательное и вѣрное. Одинъ охотникъ до стрѣлянія птицъ, среднихъ лѣтъ, крѣпкаго и мокротнаго сложенія, проводя большую часть свободнаго лѣтняго времени, нерѣдко день и ночь, въ полѣ на охотѣ, каждый разъ неоднократно купался въ рѣкѣ, какъ потому, что онъ, обмывая тѣло послѣ сильного пота, содержалъ себя въ чистотѣ и опрятности, такъ и потому, что купаніе всегда освѣжало его и вновь давало силу и бодрость охотиться послѣ усталости. Это чувство удовольствія и пользы отъ купанья на охотѣ породило въ немъ привычку къ нему. 1850 года въ концѣ лѣта на охотѣ у него обнаружился сильнѣйшій зудъ во всемъ тѣлѣ, отъ котораго онъ почти непрерывно чесалъ себя руками, то тою, то другою, повсемѣстно. Этотъ зудъ каждый разъ на охотѣ выводилъ его изъ терпѣнія. Ему посоветовали брать съ собою бѣлый скипидаръ (терпентинное масло), чтобъ натираться имъ отъ зуда. Въ слѣдующій разъ на охотѣ, по выходѣ изъ воды послѣ купанья, онъ потерся имъ вездѣ, гдѣ

ЛѢЧЕНІЕ СУЩЕСТВЕННОЕ. Рѣдко случается имѣть нужду въ лѣбл-ствахъ отъ этой болѣзни, легко уступающей и одному діететическому лѣченію; однако, если лихорадка усилится, то нужно употребить *промывательныя*, которыя бы послабляли животъ (№ 95), или давать по малымъ приѣмамъ *селитру* и *рвеню*, напр. по $\frac{1}{4}$ золот. того и другаго средства вмѣстѣ съ водою, два или три раза въ день, или еще и чаще, если будетъ нужно, чтобы поскорѣе прослабило. Какъ скоро этими средствами желудокъ и кишки достаточно очистятся, а болѣзнь еще не проходитъ, то должно прибѣгнуть къ совѣту врача, а за неимѣніемъ его по близости совѣтовать тѣ же противолихорадочныя средства, какія показаны въ существенномъ лѣченіи перемежающейся лихорадки.

Пузырчатая сыпь.

О П Р Е Д ѣ Л Е Н І Е. Сыпь эта сопровождается водянистыми пузырями, занимающими преимущественно конечности, прорывающимися и переходящими въ медленное подсыхание.

Зудѣла кожа. Зудъ прошелъ, но явилась такая склонность ко сну, что онъ, возвращаясь съ охоты, сидя въ экипажѣ, безпрестанно засыпалъ и бредилъ съ явленнымъ произношеніемъ словъ и цѣлыхъ выраженій объ охотѣ. «Чтобъ это значило», спросилъ онъ меня? Осмотрѣвъ его, я нашелъ, что у него по всему тѣлу была красноватая сыпь, и сказалъ, что зудъ у него былъ отъ сыпи, а сонливость съ бредомъ оттого, что онъ натеръ ее скипидаромъ. Три дня онъ не былъ на охотѣ и не купался, сыпи у себя болѣе уже не замѣчалъ. На 4-й день побѣхалъ онъ на охоту и по привычкѣ только что погрузился въ воду, какъ тѣло его начало рдѣть и щипать, какъ бы отъ горчичника. Не успѣлъ онъ надѣть бѣлье, какъ ему сдѣлалось дурно; вдругъ зарыбило въ глазахъ, онъ весь поблѣднѣлъ какъ мертвецъ, сдѣлалось головокруженіе, слабость, тошнота, обморокъ, онъ похолодѣлъ какъ ледъ. Его укутали и оттираніемъ привели въ чувство, одѣли, привезли въ домъ, положили. По бокамъ и къ ногамъ приставили нагрѣтые кувшины, одѣли шубою, поили горячимъ чаемъ изъ бузиновыхъ цвѣтовъ съ шафеемъ; тогда онъ сталъ согрѣваться, потомъ пропотѣлъ и уснулъ на 2 часа, послѣ чего опять былъ здоровъ по прежнему. Онъ не хотѣлъ вѣрить, что это произошло въ немъ отъ купанья, а полагаѣтъ, что стоячая, травянистая вода непроточнаго мѣста рѣки, гдѣ онъ купался, была тому причиной. Не прошло недѣли, онъ опять рѣшился купаться въ другомъ проточномъ мѣстѣ рѣки. Съ нимъ сдѣлалось еще хуже прежняго, едва могли помочь подобнымъ же образомъ; въ этотъ разъ съ нимъ было тоже, что бываетъ и въ холерѣ, за исключеніемъ судорогъ; пульсъ былъ совсѣмъ не ощутителенъ; но и тутъ больной не убѣдился, что это произошло съ нимъ отъ купанья, онъ относилъ причину болѣзни къ дурной водѣ. Черезъ двѣ недѣли, пригласивъ меня съ собою на охоту и взявъ съ собою все нужное на подобный случай, онъ рѣшился выкупаться въ лучшемъ мѣстѣ большой рѣки; но едва вошелъ въ воду до половины тѣла, какъ почувствовалъ себя дурно по прежнему. Выходя изъ воды, онъ ослабъ и упалъ на берегу. Лицо почернѣло, изо-рта слюнилась морота, глаза впали, голосъ сдѣлался невнятнымъ. Пульса не было, поносъ жидкій, кожа сдѣлалась гусиною, вся холодная. Укутываніемъ и растираніемъ облегчили больного, а чаемъ съ ромомъ возбудили въ немъ испарину. Онъ уснулъ и, проснувшись, былъ здоровъ. Болѣе въ то лѣто онъ не купался; въ слѣдующее же лѣто (1851 года) онъ опять продолжалъ свою привычку и купался безъ вредныхъ оттого послѣдствій.

Признаки. Прежде появляются лихорадочные предвозвѣстники, потомъ портится вкусъ, пропадаетъ аппетитъ, болить голова, знобить и бросаетъ въ жаръ, при чемъ нерѣдко бываетъ сильная наклонность ко сну. Чрезъ 6, 8, а иногда 12 часовъ, показываются иногда по одному, а иногда вдругъ на разныхъ мѣстахъ, болѣе на рукахъ и ногахъ, красныя, обширныя пятна съ чувствомъ щипленія, быстро переходящія въ пузыри, у новорожденныхъ дѣтей величиною отъ горошины до лѣснаго орѣха, а у взрослыхъ съ лѣсной волжскій орѣхъ, миндаль и даже иногда въ грецкій орѣхъ, наполненные нѣсколько желтоватою, или водянистою сывороткою, которые причиняютъ сильный зудъ и жжение. Нерѣдко бываетъ при этомъ запоръ, или, напротивъ, слизистый поносъ, развитіе вѣтровъ, неваримость пищи и отвращеніе отъ нея. Въ легчайшихъ случаяхъ этой болѣзни пузыри прорываются и постепенно подсыхаютъ, такъ что больной въ 7 или 12 дней совершенно оправляется. Въ сильнѣйшихъ же развитіяхъ ея, когда одни пузыри, налившись, прорываются, другіе вновь постепенно образуются, причемъ и всѣ прочіе припадки не только продолжаютъ, но нерѣдко ожесточаются до горячки, характера нервнаго и гнилостнаго (тифознаго). Въ этомъ видѣ болѣзнь продолжается не менѣе 17 дней, а иногда до 21 дня и болѣе. Случается однакожь, что сыпь эта обнаруживается безъ всякихъ лихорадочныхъ движеній и безъ всякаго расстройства въ желудкѣ и кишкахъ. Въ такомъ случаѣ она бываетъ похожа на хроническую сыпь, называемую водяными пузырями.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе состоитъ въ тонкомъ, какъ бы сывороточномъ, ослизеніи тѣла.

Причины производящія: сырая прохладная погода и водянистая, непитательная пища, особливо же употребленіе застойной воды, какова прудовая и мелкоозерная, у достаточныхъ людей злоупотребленіе виноградныхъ винъ, особенно углекислыхъ и вообще спиртоватыхъ веществъ.

Сущность видимо состоитъ въ сывороточномъ ослизеніи, производящемъ отложеніе подъ кожу.

Распознаваніе. Лихорадочная пузырчатая сыпь отъ водяныхъ пузырей отличается тѣмъ, что первая въ своемъ лихорадочномъ состояніи продолжается только нѣсколько дней, а послѣдніе продолжаютъ недѣли 2 или 3 и болѣе.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, *хорошо;* болѣзнь не опасна, развѣ не доброкачественная горячка (гнилая, нервная) можетъ въ случаѣ угрожать опасностію. Въ отношеніи же продолжительности, предсказаніе зависитъ собственно отъ степени развитія болѣзни, такъ что чѣмъ болѣе развита болѣзнь, тѣмъ предсказаніе хуже, и наоборотъ.

Исходъ единственный въ *здоровье*, за исключеніемъ нервно-гнилостной при ней горячки, оканчивающейся нерѣдко смертію.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ бо-

лѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *внушать* поселянамъ, чтобы они въ предохраненіе себя отъ этой болѣзни во время работъ въ бытность ихъ въ полѣ, *не пили застойной воды*, напр., прудовой и мелкоозерной, особенно въ сырую прохладную погоду и при пищѣ водянистой, не питательной, а *особенно тѣ изъ нихъ которые уже были подвержены этой болѣзни*. 2) *Одержимому* этой болѣзнію должно *советовать* *содержать себя потеплѣе, въ легкой испаринѣ* и, во избѣжаніе переносовъ на внутреннія части, не лѣчить никакими вяжущими лѣкарствами, напр. квасцами, купоросомъ, бѣлилами, сулемою и т. п., потому что она, какъ слѣдствіе благотѣльнаго дѣйствія цѣлебной силы природы, никакихъ особенныхъ средствъ не требуетъ, кромѣ содѣйствія, или вспомошествованія разрѣшить её на мѣстѣ. 3) *Содержать себя въ чистотѣ и опрятности*, для этого обмываться теплою мыльною водою каждагодневно раза 3 въ недѣлю, ходить въ баню, или садиться въ ванну. 4) Въ случаѣ признаковъ лихорадки, или нервной горячки, употреблять пищу и питье, означенныя въ этихъ болѣзняхъ.

Лѣчение существенное. Хотя сыпь эта не требуетъ никакихъ особенныхъ средствъ и болѣзнь эту не должно лѣчить, однако зудъ при ней составляетъ несносный припадокъ, отъ котораго полезна примочка сыпи изъ *дегтярной* (№ 70) и *розовой воды съ слизью вишневаго клея* или аравійской камеди. Доставляютъ пользу помазываніе сыпи маслами: *коноплянымъ, льнянымъ, деревяннымъ, подсолнечнымъ, топленымъ коровьимъ, сметаню*. Когда прорываются пузыри, хорошо перевязывать ихъ *простонародною смягчительною мазью* (№ 144), *спускомъ* (№ 29), *березовою мазью* простою (№ 166) и *дегтярною* (№ 167); также съ пользою можно прикладывать *чесанный ленъ*, или *кудель*, *намыленные простыми мыломъ*. Новорожденнымъ дѣтямъ очень помогаютъ *ванны изъ пшеничныхъ, либо миндальныхъ отрубей*, или изъ *молока, либо сыворотки*. Но, сажая дитя въ ванну и вынимая его изъ нея, надобно стараться, чтобы не сорвать пузырьковъ, для этого осторожнѣе и раздѣвать, и одѣвать его *). Взрослымъ же помогаютъ помазыванія березковою простою и дегтярною мазью и даже чистымъ березковымъ дегтемъ, особенно когда зудъ сыпи силенъ и нестерпимъ. Если одного наружнаго лѣченія не достаточно, то нужно принимать внутрь *разрѣшающіе* и способствующіе испражненію на низъ *отвары*: *одуванчика* (№ 1), *цикоря* (№ 2) одни и съ *мятою* (№№ 18 и 19), *конскаго щавеля* (№ 92), **) независимо отъ употребленія чая изъ *цвѣтотъ липовыхъ, бузиновыхъ* и проч. (№ 85) для возбужденія испарины. При нервной и гнилостной (тифозной) горячкѣ надобно обратиться ко врачу, а за неимѣніемъ его по близости поступать

*) Д-ръ. Грумъ.

**) Д-ръ. и Проф. Дядьковскій.

съ болѣнымъ такъ, какъ съ горячечнымъ, и лѣчить тѣми средствами, какія показаны въ горячкѣ нервной и гнилостной.

Просыная сыпь (Просынка).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Просыная сыпь есть болѣе послѣдовательная болѣзнь, какъ припадокъ лихорадки или горячки, чѣмъ первоначальная или самостоятельная, и есть ничто иное, какъ маленькіе, подобные просу, прыщики или пупырышки, переходящіе въ легкое слупленіе кожицы.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Просынка бываетъ *бѣлая* и *красная*. Бѣлая просынка есть ничто иное, какъ маленькіе пупырки, подобные просу, сливающіеся по нѣскольку вмѣстѣ, налитые жидкостію. Красная просынка состоитъ изъ просовидныхъ пупырышковъ, отличаемыхъ болѣе осызаниемъ, чѣмъ зрѣніемъ; сами они и обружность ихъ кожи бываютъ красны. Бѣлая просынка случается чаще красной; впрочемъ онѣ иногда появляются и обѣ вмѣстѣ.

ПРИЗНАКИ. При лихорадкѣ или горячкѣ предъ высыпаниемъ у больного замѣчается кислый потъ, стѣсненіе въ груди, тоскливое дыханіе, сухой кашель, безпокойство, ознобъ, зудъ въ кожѣ, даже судороги и бредъ; съ появленіемъ сыпи всѣ эти припадки исчезаютъ, но иногда продолжаются и даже усиливаются; высыпаетъ же она то слабо, то сильно, по всему тѣлу, особенно на груди и рукахъ (лицо остается свободнымъ). На 3—4, или на 7—8, либо даже на 8—14 день послѣ начала лихорадки иногда вдругъ скрывается и опять появляется. При высыпи больной чувствуетъ подъ кожей зудъ и боль, какъ бы отъ уколѣнія иглы.

ПРИЧИНЫ ВНУТРЕННІЯ (предрасполагающія): пасочно-слизистая разрѣшимость крови и слабость кожи. Оттого наичаще подвергаются этой болѣзни молодые и старики, чѣмъ люди среднихъ лѣтъ, возмужалые, кромѣ того люди недѣятельные, слабые, флегматическаго темперамента (сидни и увальни) и женщины родильницы.

ПРИЧИНЫ ВНѢШНІЯ (производящія): теплый и вмѣстѣ сырой, особенно спертый воздухъ. У поселянъ эта сыпь бываетъ: 1) отъ неопрятности, задерживающей, или останавливающей отдѣленіе изъ кожи вредныхъ матерій по причинѣ нерадѣнія въ перемѣнѣ бѣлья, жптельства въ теплыхъ и душныхъ избахъ, подобно какъ въ парникѣ, и 2) отъ излишняго разгоряченія кожи, частію отъ внутренняго употребленія горячительныхъ потогонныхъ веществъ, частію оттого, что во всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ они, большею частію, лѣчатся, лежа на горячей печкѣ, укутавшись, а женщины родятъ по обычаю въ банѣ — въ теплой и сырой духотѣ, въ которой родильницы находятся болѣе сутокъ. Кромѣ того дождливыя годовыя времена, излишнее употребленіе зеленыхъ не зрѣлыхъ плодовъ, какъ то: сливъ, вишенъ, огурцовъ, дынь и пр., испортившіяся ягоды, поврежденные отъ дождя и непогодъ, или

лежавшія долгое время съѣстные вещества (сляккля) часто подаютъ поводъ къ этой болѣзни.

Сущность просянки состоитъ въ пасочно-сывороточномъ отложеніи на кожу.

Распознаваніе просянки по формѣ очень удобно и легко. Но еслибы и случилось принять другую лихорадочную сыпь за просянку, то это не вовлечетъ въ большой вредъ, потому что лѣченіе этихъ сыпей почти одинаково, большею частію одно діететическое, которое, главное, состоитъ въ томъ, чтобы поддержать и разрѣшить сыпь на мѣстѣ, а не вогнать внутрь, какъ вредную, изгнанную уже оттуда самую натурю.

Предсказаніе. Такъ какъ уже сказано, что просянка не есть болѣзнь самостоятельная, а болѣе припадокъ или горячка, то она показываетъ собою важность этихъ болѣзней и бываетъ опасна тогда, когда она то появляется, то опять пропадаетъ, равно если появляется она рано или поздно и не облегчаетъ главной болѣзни. Но ее должно почитать благодѣніемъ природы, рѣшеніемъ болѣзни (критическою), если она появляется на 7, 11, 14 день лихорадки и облегчаетъ больного. Напротивъ, величайшею опасностію бываетъ для больного, если она почему либо вдругъ скроется и опять не появляется, отъ этого обстоятельства могутъ произойти: судороги, пострѣлъ (ударъ), задушеніе и смерть.

Исходъ. Сыпь эта, какъ болѣзнь собственно послѣдовательная (припадочная) всегда оканчивается *разрѣшеніемъ*.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ:

1) *Расположеннымъ къ этой болѣзни людямъ должно совѣтовать быть дѣтельными, имѣть достаточное тѣлодвиженіе по роду ихъ занятій, въ жилищахъ поддерживать сухой воздухъ, чистый, содержать себя въ чистотѣ и опрятности, чаще обмываться теплотою водою, ходить въ баню, перемѣнять бѣлье, употреблять пищу здоровую, не испортившуюся, не сляблую, пить воду свѣжую, проточную, ключевую, родниковую, а не стоячую, озерную или болотную. Женщинамъ въ беременности совѣтовать предотвращать запоры въ испражненіи на низъ, а для родовъ избирать мѣстопребываніе въ комнатахъ, съ воздухомъ чистымъ и сухимъ, а не въ банѣ, гдѣ слишкомъ тепло, сыро, душно и тѣсно.* 2) *Одержимаго просянкою всегда нужно преимущественно обрабатывать вниманіе на свойство коренной ея болѣзни, именно на лихорадку или горячку, а потому и должно содержать его, какъ показано въ соимянномъ лѣченіи этихъ болѣзней; чтожь касается до нея собственно, то главною цѣлью имѣть въ виду то, чтобы предупредить скрытіе высыпи внутри и способствовать всему тому, что можетъ ускорить ея разрѣшеніе на поверхности кожи.* 3) *Комнату одержимаго ею больного не надобно держать ни въ излишнемъ теплѣ, ни въ излишнемъ холодѣ, чтобы отъ этого не могло произойти ни разгоряченіе, ни простуда: какъ то, такъ и другое вредно; не должно, кромѣ того, кутать больного многими одѣялами, а болѣе всего содержать его въ покоѣ и развешивать, потому что страхъ и боязнь опасности удобно вгоняетъ*

высыпь внутрь *). 4) Въ пищу слѣдуетъ употреблять крупную кашу изъ саго, риса, манны, овсяную, полбенную, гречневую, пшеничную, ячменную и т. п. иногда супы изъ цыплятъ и курицы. Больной можетъ еще ѣсть хорошия, печенныя предъ огнемъ яблоки, или вареныя съ другими плодами прохладящаго и послабляющаго качества. 5) Въ питье, смотря по силамъ и потребности больного, лучше всего давать ячную воду съ морсомъ, настой съ мятою, сыворотку подвисленную клюквеннымъ, брусничнымъ, лимоннымъ, или померанцевымъ сокомъ и др. п. Можно давать пить, что называется, вдоволь; обильное, теплое питье очень полезно въ сильной степени горячки при высыпи просянки съ чрезвычайною тоскою, бредомъ, бессонницею и сильнѣйшими движеніями; когда больной находится въ постелѣ, оказывается на опытъ очень полезнымъ питье изъ ключевой воды, свареной съ лимоннымъ сокомъ, вишневымъ или сахаромъ (№ 177).

Лѣченіе существенное должно быть направлено противъ сущности той болѣзни, которой просянка бываетъ припадкомъ, напр. лихорадки или горячки (о чемъ значится въ своемъ мѣстѣ), а отъ высыпи, если діететическое лѣченіе продолжается въ надлежащемъ порядкѣ, лѣварства мало бываютъ нужны. Вообще должно принять за правило, чтобы кровопусканія и употребленія средствъ рвотныхъ и слабительныхъ въ этой болѣзни не назначать безъ совѣта врача, имѣя въ виду чрезъ это ту осторожность, чтобъ не произвести въ больномъ слабости и разрѣшенія крови, которыя могутъ быть очень опасны для больного переходомъ болѣзни въ гнилостное состояніе тѣла. Въ важныхъ случаяхъ болѣзни должно совѣтовать больному, для оказанія существеннаго врачебнаго пособія, обращаться ко врачу, а за неимѣніемъ его по близости должно ограничиться слѣдующимъ пособіемъ: отъ тоски и стѣсненія въ груди, появляющихся предъ высыпаніемъ просянки у больного, равнымъ образомъ отъ борчи и судороги, обнаруживающихся послѣ высыпанія, должно прикладывать къ животу и груди припарки изъ стннной трухи (№ 122), лнянаго стмени съ мыломъ (№ 106) и безъ послѣдняго (№ 23), изъ ромашки, зори, донника и проч. (№ 55), а ноги совѣтовать ставить по голени въ теплую воду отъ 8—15 минутъ **) одну, или съ уксуомъ (№ 96). Отъ головной боли и бреда нарывной пластырь (№ 58), прикладываемой къ бритой головѣ, и ножныя ванны доставляютъ большое облегченіе. Мягчительное промыванье, чтобы послабило животъ, изъ дождевой воды съ коровьимъ масломъ безъ соли, или изъ овсянаго отвара (№ 95), также достаточно успокоиваютъ больного. Отъ сильнаго безпокойства и бессонницы, происходящихъ единственно отъ возвышенной раздражительности и чувствительности, простая эмульсія маковыхъ стмянъ (№ 87) безъ селитры, или крѣпкая наливка изъ маковыхъ цвѣтковъ часто бываютъ достаточны, чтобы

*) Буханъ. Томъ II. стр. 230.

**) Консбрухъ. Ч. I. стр. 280 и 281.

успокоиться и уснуть. Ежели просыная высыпь то появляется, то пропадает и опять показывается, безъ всякаго облегченія для больного, то нужно побуждать ее непрерывнымъ прикладываніемъ *нарывнаго пластыря* (№ 58), величиною въ ладонь руки, къ голенимъ и икрамъ, попеременно то къ той, то къ другой, для образованія нарывовъ, въ которыхъ, прорѣзывая ножницами пузыри, перевязывать ихъ *не соленымъ коровьимъ, или деревяннымъ масломъ, или топленнымъ свинымъ, бараньимъ, свѣчнымъ саломъ, либо скусомъ* (№ 29), или *простонародною мазью* (№ 149), но лучше, если можно, *милотнымъ зеленымъ пластыремъ*. Но если высыпь просыная совѣмъ скроется, больной ослабнетъ, чувства притупятся, то должно приложить *несколько* такихъ же *нарывныхъ* (мушекъ) къ упомянутымъ выше мѣстамъ *вдругъ, либо обвертывать ноги раздражающею обверткою* (№ 116), прикладывать *горчичники* (№№ 88, 89 и 90), *хрьновники* (№ 91). Если это скрытіе просыной высыпи произошло отъ простуды, то очень полезно поверхность кожи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ была высыпь, натирать *простонародною раздражающею мазью* (№ 150).

Оспа.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Оспой называется лихорадочная сыпь, состоящая изъ прыщей, или натуральныхъ, происходящихъ отъ особеннаго повѣтрія въ воздухѣ и зараженія чрезъ сообщеніе больныхъ съ здоровыми, или искусственныхъ, т. е. привитыхъ въ предохраненіе отъ натуральныхъ.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Изъ этого видно, что оспа бываетъ натуральная и прививная — предохранительная (вакцина). Та и другая подраздѣляются на: 1) настоящую, 2) ложную и 3) измѣненную.

Оспа натуральная настоящая.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Оспа натуральная есть сыпь лихорадочная, состоящая изъ прыщей, шириною до 4 линій, высыпающихъ постепенно въ теченіе сутокъ, столько же времени наливающихся гнойною матеріею, и потомъ во столько же времени постепенно подсыхающихъ; оспа эта бываетъ у людей, не имѣвшихъ предохранительной оспы настоящей, или имѣвшихъ предохранительную оспу ложную.

ПРИМѢЧАНІЕ. Эта болѣзнь столь обыкновенна, что мало находится людей, которые бы не имѣли ея въ то, или другое время. Она показывается вообще около весны, дѣлается очень частою лѣтомъ, менѣе случается осенью и почти никогда зимою.

ПРИЗНАКИ. Она имѣетъ ходъ правильный, — проходитъ опредѣленно всѣ четыре періода: жара, высыпанія, наливаанія и засыханія; каждый періодъ продолжается около 3 сутокъ, всѣ періоды совершаютъ свое теченіе въ 12 дней, начиная со дня, когда покажутся первые яв-

хорадочные признаки, до того дня, когда начнется засыханіе. Господствует повально, большею частію, отдѣльно; иногда совмѣстно съ другими сыпями, какъ то: корью, краснухой. По свойству очень заразителна и опасна до того, что въ нашихъ странахъ просто бичъ поселянъ, оставляетъ послѣ себя рябины, а иногда безобразные рубцы и разнаго рода поврежденія. Влага, взятая изъ оспины, будучи привита немѣвшему оспы, производитъ на немъ оспенные прыщи, похожіе на ту оспину. Лихорадка, большею частію, постоянна въ видѣ горячки, продолжается три дня: первый разъ предъ высыпаніемъ, второй — послѣ высыпанія, т. е. во время нагноенія оспинъ около 6-го, 7-го и 8-го дней. Высыпаетъ съ 3-го дня постепенно, однообразно, порядочно, сперва на лицѣ около рта, потомъ на шеѣ, груди, животѣ, наконецъ на рукахъ и ногахъ, прежде пятнушками красными, какъ отъ убушенія блохою, постепенно возвышающимися, превращающимися мало по малу въ пупырышки, наполняющіеся свѣтлою влагою съ пупковиднымъ углубленіемъ въ срединѣ, а въ основаніи блѣднорозовую красноту въ видѣ колечка или коемочки. Пупырышки эти наливается съ 6-го дня постепенно влагою сверху внизъ почти всѣ въ одно время и въ теченіе трехъ сутокъ; созрѣвающія оспины имѣютъ величину крупной горошины, разрѣзанной пополамъ, цвѣтъ перламутровый, а потомъ желтоватый. Если оспенные прыщи сливаются между собою по два, по три и болѣе, то оспа называется сливною; если же, напротивъ, они другъ отъ друга значительно отстоятъ, то оспа эта называется разсыпною. Съ 10-го дня оспины засыхаютъ, темнѣютъ, трескаются, изливаютъ гной, который, засыхая, составляетъ струпъ бурочерноватый, по отпаденіи котораго остается темнокрасное зудящее пятно, рябина глубокая, съ зубчатыми угловатыми, нѣскольго возвышенными, краями, звѣздчатой, или стрѣлообразной формы.

Причины. Внутренняя, предрасполагающая есть общая со всѣми лихорадочными сыпями, т. е. *пасочно-сывороточное* (мокротное) *состояніе тѣла*. Оттого собственно дѣти, большею частію, подвергаются ей. Внѣшняя же производящая причина есть особенное воздушное, *повѣтріе и оспенная зараза*, образующаяся въ страждущихъ оспою.

Сущность оспы состоитъ въ *пасочности тѣла*, отлагающейся на *кожу* и *образующей* особенной формы *прыщи*. Въ понятіе о сущности такъ же должна входить сущность сопутствующей горячки.

Распознаваніе по формѣ прыщей очень *удобно*, за исключеніемъ того случая, гдѣ сыпь бываетъ чрезвычайно малая, едва замѣтная и почти безлихорадочная.

Предсказаніе. *относительно опасности для жизни зависѣть отъ степени и качества горячки и отъ свойства самой сыпи*, такъ что, чѣмъ легче горячка и чѣмъ болѣе она характера воспалительнаго, чѣмъ болѣе имѣетъ правильное теченіе (видъ), тѣмъ предсказаніе лучше; при противныхъ обстоятельствахъ оно хуже. *Относительно продолжительности болѣзни, при правильномъ ходѣ и при горячкѣ*

легкой воспалительной, оспа совершаетъ свое теченіе постоянно *въ 12 дней*. При *неправильномъ* ходѣ, при горячкахъ, гнилостной и нервно-гнилостной, оспа продолжается *до 20—30 дней и даже болѣе*. Въ послѣднемъ случаѣ она обыкновенно принимаетъ сущность гнилостной или нервно-гнилостной горячекъ, къ которымъ нерѣдко присоединяются изнурительные поносы. Это вообще, въ частности же: если около 11-го, или 12-го дня на лицѣ опухоль пропадаетъ, а руки и ноги между тѣмъ начнутъ опухать, то это служитъ хорошимъ знакомъ, — больной близокъ къ выздоровленію. Но пурпуровыя черныя пятна, также темныя, занимающія мѣсто между оспенными жемчужинами, означающія гнилостное состояніе крови, составляютъ неблагоприятныя признаки; равно какъ кровавая урина, раздутіе живота, прекращеніе мочеиспусканія, означаютъ худое. Языкъ, покрытый чернымъ иломъ, сильнѣйшій ознобъ, скрежетаніе зубовъ (отъ раздраженія нервовъ, а не отъ глистовъ) сильный потъ въ началѣ оспы, трудность въ мочеиспусканіи, поносъ, запоръ, зеленоватый, очень вонючій пометъ, корча послѣ высыпи, прервавшееся слюнотеченіе у взрослыхъ, прекращеніе поноса у дѣтей, все это такіе признаки, которые могутъ имѣть самыя непріятныя послѣдствія. Если лицо не опухаетъ, а напротивъ опадаетъ прежде, не жели созрѣютъ оспины, то это знакъ, самый неблагоприятный и неутѣшительный.

Исходы. *Въ здоровье, другія болѣзни и смерть.* При *правильномъ* ходѣ оспы съ легкой воспалительной горячкой *больные* обыкновенно *легче выздоравливаютъ*, чѣмъ при *неправильномъ* ея ходѣ, при горячкахъ: гнилостной и нервно-гнилостной, причемъ нерѣдко оспа *переходитъ въ другія болѣзни*, именно въ *воспаленія*, особенно *мозга, легкихъ, кишечнаго канала и глазъ*; въ послѣднія два чаще первыхъ; всѣ эти воспаленія происходятъ *въ слѣдствіе переноса* сыпи на упомянутыя органы, отчего часто приключается и самая *смерть*.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни должно совѣтовать склонять и *убѣждать* поселянъ, чтобы, они заботились о *прививкѣ* заблаговременно дѣтямъ ихъ *предохранительной* (коровьей) *оспы* (вакцины) по наставленію, начертанному при этомъ особо, чрезъ посредство оспопрививателей и другихъ занимающихся оспопрививаніемъ благонамѣренныхъ людей, потому что этимъ только однимъ средствомъ уничтожается предрасположеніе организма къ воспріятію заразы. 2) *Одержимыхъ* натуральною *оспою* никакъ не должно *оставлять* въ пренебреженіи собственно на ихъ произволъ, а всячески стараться *имѣть* объ нихъ *попеченіе, надзоръ и уходъ*, состоящіе въ томъ, чтобы ихъ содержать въ прохладѣ, тишинѣ и покоѣ въ комнатахъ сухой, чистой, умеренно-темной, прохладной, съ свѣжимъ воздухомъ, въ надлежащей опрятности, не выпуская нигуда, обмывая тѣло ихъ, особенно руки и ноги, но осторожнѣе, теплотою водою, съ перемѣною на нихъ потомъ бѣлья. Почти невѣроятно, какое сильное вліяніе имѣютъ эти усло-

вія, особливо прохладное содержаніе больного, на правильный ходъ оспы и на ея благополучное окончаніе; напротивъ того, теплое содержаніе больного, въ перинной постели, душной, нечистой свѣтлой комнатѣ, теплое питье, потогонныя лѣкарства и правильную, доброкачественную оспу дѣлають опасною. Нѣтъ ничего противнѣе, какъ обыкновеніе у поселянъ оставлять больного въ томъ же бѣльѣ во все время этой опасной болѣзни. Они боятся, чтобъ больной не простудился во время перемѣны бѣлья, между тѣмъ отъ этого происходятъ дурныя послѣдствія. Бѣлье, долго несмѣненное, становится жесткимъ, грубымъ, раздражающимъ нѣжную кожу больныхъ. Кромѣ того такое бѣлье издаетъ дурной запахъ, вредный какъ для больныхъ, такъ и для обружающихъ и ходящихъ за ними, къ тому же пометъ и нечистоты, пристающія къ бѣлью, всасываются пораами кожи и входятъ къ сильному вреду ихъ въ составъ крови, тогда какъ каждодневная перемѣна бѣлья освѣжаетъ, ободряетъ больного особеннымъ образомъ; нужно только при этомъ, чтобы бѣлье было сухое и умѣренно теплое. 3) *Не слѣдуетъ принуждать* больныхъ *быть въ постели*; если они могутъ обойтись безъ нея, т. е. когда силы позволяютъ ходить и сидѣть, потому что лежать гораздо хуже; *въ противномъ случаѣ* нужно для больного *назначать особую* постель, на которой бы онъ лежалъ одинъ, порознь отъ другихъ, даже и дѣтей, привыкшихъ лежать и спать вмѣстѣ съ матерью или кормилицею; всячески должно его отклонять отъ этого и не позволять ему этой прихоти, иначе для обоихъ будетъ вредно. Естественная теплота матери или кормилицы неминуемо усилить лихорадку дитяти; а ежели мать или кормилица заразится лихорадкою, какъ часто случается, то хуже и опаснѣе будетъ для обоихъ. Нельзя равнодушно смотрѣть на двухъ или трехъ дѣтей, лежащихъ у бѣдныхъ людей на одной и той же постели, до того покрытыхъ часто оспинами, что кожи ихъ склеиваются вмѣстѣ, и они погибають отъ такого безразсуднаго и безчеловѣчнаго содержанія ихъ. 4) *Пища* должна быть легкая, прохладительная, напр. *кашица* изъ крупъ, *лапша*, *блѣтый хлѣбъ*, варенный съ равнымъ количествомъ воды и молока; хорошія *печенныя* передъ огнемъ *яблоки*, или варенныя въ молокѣ и подслащенные небольшимъ количествомъ сахара и проч., очень умѣстны. При назначеніи пищи больному должно имѣть въ виду, что строгая, почти *голодная діета* *полезна* ему, *чѣмъ пресыщеніе*. 5) *Питіе* должно состоять изъ чистой *воды* одной, либо съ кисловатымъ сокомъ, изъ равныхъ частей *воды* и *молока*, процѣженной *жидкости молочной* (сывотки), *ячмой воды*, *овсяной* и т. п. Когда оспины налились, то *сыворотка* послѣ пахтанья можетъ служить очень хорошимъ питьемъ. Но отнюдь не должно позволять пить горячительное, спиртуозное, напр. вино, пуншъ, водку, какъ предлагаютъ нерѣдко старухи лѣкарки, равно шафранъ, терьякъ и т. п. Они только вредятъ этимъ больнымъ, а особенно малолѣтнимъ дѣтямъ. Справедливое наблюденіе, на которомъ онѣ основываютъ свои убѣжденія къ припятию этихъ лѣкарствъ, «что оспа выходитъ лучше, когда

божа влажна, и что больной тогда находится въ наилучшемъ состояніи, нежели когда она суха», употребляется ими во зло. Потъ тогда только бываетъ полезенъ, когда выходитъ самъ собою, или выходитъ въ слѣдствіе употребленія легкаго, разрѣшающаго, мокротожидительнаго питья, напр. мятнаго настоя, ячной воды, овсяной, процѣженной сыворотки и т. п. Поэтому все то, что разгорячаетъ тѣло, обременяетъ желудокъ больного, ему вредно. 6) Такъ какъ оспа въ послѣднемъ періодѣ своемъ, именно въ четвертомъ (періодѣ подсыхания), подаетъ поводъ къ воспаленію горла, препятствующему глотать, опухоли вѣкъ и воспаленію глазъ, то въ предупрежденіе этого съ самого начала болѣзни надо имѣть діету прохладительную, горячаго ничего не пить, ни ѣсть; для этого вареную пищу напередъ должно остудить до состоянія комнатной температуры, почти непрерывно *глаза промывать полотенцемъ, смоченнымъ теплою смѣсью молока и воды*, или приложить *къ вѣкамъ* по небольшому *жеребейку* самой *свѣжей ветчины*. Эти средства надобно употреблять съ той самой минуты, *какъ скоро примѣчена будетъ опухоль вѣкъ* *). 7) *Выздоровливающимъ* послѣ оспы нужно доставлять *свѣжій, чистый воздухъ, прогулку, кормить болѣе растительною, чѣмъ животною пищею*, особенно не давать имъ никакого мяса, которое легко горячитъ и способствуетъ отложенію оспенной остроты на внутренности и прохожденію въ нихъ воспаления. Выздоровливающіе *послѣ злокачественной опасной оспы* еще долго должны оставаться *подъ врачебнымъ надзоромъ*. Если въ слѣдствіе оспы будетъ кашель, трудное дыханіе и другіе *признаки чахотки*, то тѣмъ болѣе нуженъ хорошій воздухъ, въ пищу же назначать *саламату* (заваренная гречневая мука до густоты каши) *со сметаной, сливками и молокомъ*; въ питье *чай изъ озимей ржаныхъ, ржаной соломы, кумысъ и молоко ослицы* (въ степяхъ) помогаютъ въ этомъ случаѣ.

Лѣченіе существенное настоящей натуральной оспы. Такъ какъ оспу нельзя ни прервать, ни сократить ея хода, какъ это можно сдѣлать съ горячками и воспалениями, то лѣченіе оспы есть собственно діететическое, наблюдательное, состоящее въ обращеніи вниманія на оспенную лихорадку, высыпаніе, наливаніе и подсыханіе оспинъ, равно и на случайные болѣзненные признаки, зависящіе наиболѣе отъ воспаления внутренностей; поэтому *въ правильномъ ходѣ оспы не нужно никакихъ особенныхъ лѣкарствъ*, кромѣ попеченія, надзора и ухода за больнымъ, причѣмъ натуральныя его потребности: жажда, испражненіе на низъ, моча и проч., должны быть въ особенномъ вниманіи. Чтожь касается до случайныхъ болѣзненныхъ признаковъ, зависящихъ наиболѣе *отъ воспаленій внутренностей*, то по появленіи ихъ должно совѣтовать тотчасъ обращаться къ врачу, просить его о пособіи, а за непмѣніемъ его по близости слѣдуетъ ограничиться слѣдующимъ лѣченіемъ во всѣхъ четырехъ ея періодахъ: *Въ первомъ періодѣ* (первые

*) Буханъ. См. его лѣч. томъ 11. стр. 272.

три дня — раздраженіе — лихорадка) правильное *содержаніе* больного, багъ-то: *умѣренная темнота* и *прохлада* комнаты, *свѣжій воздухъ*, тишина, *спокойствіе* больного, *умываніе* рукъ и ногъ *теплой водою*, строгая, почти *голодная діета*, для питья чистая *вода* или съ кагнмъ либо чистымъ сокомъ, и *свободное испражненіе* низою — для дѣтей бываетъ совершенно достаточно одно безъ всякихъ лѣкарствъ, развѣ только въ случаѣ особенныхъ случайныхъ болѣзненныхъ признаковъ можно прибѣгнуть къ употребленію слѣдующихъ средствъ: *противъ запора*, или не свободного испражненія низою, полезны: *снятое*, подслащенное сахаромъ *молоко* пополамъ съ водою, *соки* изъ *свеклы*, *моркови*, *бураковый разсолъ*, *магnezія* (чайную ложечку съ полрюмкою подслащенной сахаромъ или патокою воды, смѣшавъ давать отъ 2-хъ до 4 разъ въ сутки до дѣйствія), *кремортартаръ* (полчайной ложечки, смѣшавъ съ полрюмкою подслащенной отварной воды, давать также багъ и магnezію), *ревенный сиропъ* (№ 176), употребляемый по чайной ложечкѣ отъ 2—4 разъ въ сутки до дѣйствія. *Вкладываніе* продолговатыхъ *кусочковъ мыла* въ задній *проходъ*, *промывательное* (блестиръ) изъ *овсянаго отвара* съ *масломъ* (№ 95).

Прим. Надобно быть осторожнымъ и не назначать слабительныхъ средствъ безъ разбора. Сильныя изъ нихъ вредны тѣмъ, что сильно слабятъ и производятъ поносъ, а слабительныя горячительнаго свойства, напр. *александрійскій листъ*, *отваръ коры крушины*, *борень яланши* и т. п. усиливаютъ внутреннее раздраженіе и часто дѣлаютъ рѣзь въ животѣ, а потому какъ сильныя слабительныя, такъ и слабительныя горячительнаго свойства, вредны въ этомъ случаѣ.

Противъ сильнаго бреда у дѣтей полезны: *горчичники*, величиною въ ладонь руки больного ребенка (№ 88, 89, 90), прикладываемые къ *плечамъ*, *икрамъ*, раздражающія *обвертки ногъ* (№ 116), *ножныя ванны* изъ одной *теплой воды*, со *щелокомъ* (№ 83) съ *горчицею* и *солю* (№ 94), вышеозначенныя *слабительныя* и *промыванія*. Отъ *судороговъ* часто помогаетъ одно *открытіе окна* и впусценіе въ комнату свѣжаго и прохладнаго воздуха. Если при судорогахъ лицо у ребенка блѣдно, руки и ноги холодны, урина свѣтлая, водянистая, то нужно ему сдѣлать *тепловатую ванну*, какъ парное молоко, въ которой бы онъ посидѣлъ около 8-ми минутъ. Если этого недостаточно, поставить *клизтиръ* (№ 95), а къ подошвамъ приложить *горчичники*. Если замѣчаются *нечистоты* въ желудкѣ, познаваемые изъ того, что бываютъ при этомъ: блѣлый, желтый языкъ, горечь во рту, отрыжка, тошнота, рвота, то нужно давать для рвоты прежде *настояй цвѣтовъ ромашки*, или *теплой воды* для очищенія желудка, а потомъ *слабительное*, которое нибудь изъ числа вышеозначенныхъ. Рвота дѣлается иногда и безъ засоренія желудка и бываетъ очень упорна. Тутъ лучше всего помогаетъ приставленіе 2-хъ *пиявицъ* подъ ложечкою и потомъ *припарка*

изъ простой *мяты*, особенно сваренной съ винограднымъ краснымъ *виномъ*, которую класть на животъ *).

Прим. Надобно быть осторожнымъ и безъ назначенія врача нѣбавъ не давать рвотное лѣкарство. Оно вообще бываетъ очень вредно въ началѣ этой болѣзни, за исключеніемъ только рѣдкихъ случаевъ, о которыхъ судить можетъ только одинъ врачъ. Дурно также дѣлають, когда стараются остановить рвоту терьякомъ и разными спиртными и горячительными напитками: это также вредно.

Если больной лежитъ въ *бесчувствіи*, *спитъ*, имѣетъ притомъ *красное лицо*, *горячій лобъ*, то нужно приставить *пѣлвицы* позади ушей, числомъ, соответственнымъ числу лѣтъ ребенка, страдающаго оспою, *обмывать* лицо и лобъ *холодною водою*, а *внутрь* давать *селитру* въ отварѣ коринки, или въ сывороткѣ чернослива съ патокою *одну* (№№ 97, 98, 100) и съ *кремортартаромъ* (№ 99), особенно нужно часто *обмывать глаза* и потомъ *покрывать ихъ* гусочками холодины, *натертой камфорою*, чтобы на глазахъ не произошли оспины. Чтожь касается до взрослыхъ, одержимыхъ натуральною оспою, то въ случаѣ особенныхъ болѣзненныхъ признаковъ воспалительнаго свойства, какъ напр. воспаленія внутренняго головного, воспаленія легкихъ и подреберной плевры, воспаленія желудка, кишекъ, печени и брюшины и пр. (для распознаванія которыхъ надобно имѣть въ виду признаки, въ описаніи каждаго изъ этихъ воспаленій порознь), когда они сильнаго тѣлосложенія и полнокровны, имѣють полный пульсъ, кожу сухую, то въ крайнемъ случаѣ нужно назначить *кровопусканіе* изъ вены руки той стороны тѣла, которая болѣе, повидимому, страждетъ, около фунта (три чайныя обыкновенныя чашки, или мелкую тарелку, — пологую столовую).

Прим. Безъ крайности лучше обойтись безъ кровопусканія, которое только въ случаѣ внутренняго воспаленія въ этой болѣзни бываетъ полезно, а во всѣхъ другихъ случаяхъ, равно какъ и въ самой натуральной оспѣ, оно очень вредно.

Если животъ туго и полонъ, то полезны *легкія слабительныя*: *огуречный разсолъ* (№ 72), *касторовое* (блещевидное) *масло* (№ 101); за неимѣніемъ его *прованское, деревянное, льяное, конопляное и миндальное* могутъ тоже идти въ составъ этого средства. *Магнезія, кремортартаръ* одни (№№ 8 и 9) и въ соединеніи оба эти средства (№ 10), *прохлаждающая слабительная смѣсь* (№ 138), *вишское питье* (№ 139), а всего лучше и полезнѣе *промывательныя* (блестеры) изъ овсянаго отвара съ масломъ и проч. (№ 95), употребляемые по одному и по два раза въ сутки. Они способствуютъ успокоенію головной боли, къ уменьшенію позывовъ на рвоту и самой рвоты, которую вредно чѣмъ либо останавливать, о чемъ сказано выше.

Во второмъ періодѣ болѣзни, именно въ періодѣ высыпанія (слѣ-

*) Д-ръ Грѣмъ. Другъ матерей ч. 2 стр. 118.

дующіе три дня, т. е. 4, 5 и 6) вообще лѣченіе одинаково, какъ и въ предыдущемъ. Въ частности же: если замѣчена будетъ трудность въ мочеиспусканіи, то въ этомъ случаѣ надобно *сводити* больного съ *постели*, и если онъ еще въ силахъ, то *водити* его *босаго* по его *комнатѣ*. Если же силы его этого не позволяютъ, то ему нужно почаше *приподниматься* на колѣни и *силиться* время отъ времени *выпускати урину*. *) Когда эти средства останутся безъ успѣха, то надобно ему давати по половинѣ, а въ случаѣ недѣйствія и по полной чайной ложечкѣ *услашеннаго селитрянаго спирта* (spiritus nitri dulcis) въ рюмкѣ его питья чрезъ каждые полчаса и черезъ часъ, смотря по тому, какъ великъ будетъ напоръ или накопленіе урины въ мочевомъ пузырьѣ, что познается ручнымъ осязаніемъ напряженія и опухоли мочевого пузыря въ нижней части живота надъ лоннымъ мѣстомъ и по соображенію со временемъ, какъ долго не мочился больной, и съ количествомъ употребленнаго имъ въ это время питья, — какъ много онъ пилъ до этого. Это обстоятельство такъ важно, что нѣтъ ничего полезнѣе, ничего выгоднѣе, какъ обильное выпоражниваніе урины. Когда во рту больного вязко, языкъ сухъ и истресканъ, то ему нужно *почаше мыться и полоскати себя ротъ и горло водою съ медомъ* (сытою), буда прибавляется также нѣсколько уксуса, или смородиннаго варенья — сиропу. Если будетъ замѣчено, что прозрачная роговая оболочка глазъ начинаетъ тускнѣть — знакъ появленія на ней оспинъ, то глаза нужно примачивать *холодною водою* или *глазною водою пленка* (№ 152), *Рихтера* (№ 158), *Сандерса* (№ 159), *итальянскою* (№ 160), *Буяльскаго* (№ 168), а между плечами поставить *горчичники* (№№ 88, 89, 90), чтобы туда отвлечь оспины.

Когда появятся между оспинами пятна, пурпуровыя, синія или черныя, то надобно назначить употребленіе внутрь остывшихъ *отваровъ: коры ивы* (№ 43), *коры дубовой* (№ 45), и преимущественно *коры перувіанской* (хины) (№ 47) взрослымъ въ полномъ пріемѣ, или столько, сколько можетъ снести желудокъ, а дѣтямъ, смотря по возрасту, въ половину менѣе. Это средство чрезвычайно полезно въ этомъ случаѣ и ничѣмъ не можетъ быть замѣнено такъ успѣшно. *Прохлажденное содержаніе* больного и частое *возобновленіе свѣжаго воздуха* въ комнатѣ, посредствомъ форточекъ въ окнахъ и самыхъ оконъ на нѣкоторое время, даже зимою, еще необходимѣе въ этотъ періодъ болѣзни, чѣмъ въ другое время. *Пища и питье* для больного должны быть особенно *кисловатыя, укрѣпляющія*. *Вареные и печеные плоды кислаго свойства*, какъ то: *яблоки, вишни, сливы* и другіе составляютъ пріятную и полезную пищу, а *вода простая, свѣжая, ячная, овсяная и сыворотки, подкисленные сокомъ клюквы, брусники, лимона, уксусомъ и сиропомъ смородины*, могутъ быть лучшимъ питьемъ, а если мо-

*) Буханъ. Его лѣчебникъ, томъ II. стр. 259.

жно, то еще лучше будетъ прохладяющее питье изъ *ключевой воды съ лимоннымъ сокомъ и винограднымъ виномъ* (№ 177).

Но когда оспины внезапно опадаютъ, пропадаютъ или скрываются, т. е. когда оспа входить внутрь прежде, нежели созрѣла матерія въ нихъ, т. е. оспины не нагнаиваются, но блѣднѣютъ, вянутъ и опадаютъ вмѣстѣ съ окружающею ихъ опухолью, что особенно явственно замѣчается на лицѣ, тогда предстоитъ большая опасность. Такіе больные рѣдко выздоравливаютъ, а это часто случается въ слѣдствіе излишне теплаго содержанія больного и употребленія лѣкарствъ, вызывавшихъ принужденно матерію наружу прежде надлежащаго ея приготовленія къ тому самою натурою организма. Въ такомъ случаѣ надобно тотчасъ приложить къ кисти рукъ и къ щиколодамъ ногъ *горчичники* (№№ 88, 89, 90) или *хрѣновники* (№ 91), а выше этихъ мѣстъ, къ рукамъ и ногамъ, постоянно прикладывать *мягчительныя припарки* (катаплазмы), теплыя изъ *льнянаго сѣмени* (№ 23) съ *ромашкою* (№ 27), съ *шафраномъ* (№ 28), съ *горчицею* (№ 80) и изъ *сѣнной тины* (№ 122) до тѣхъ поръ, пока покажется опять высыпь оспы. Если этого не достаточно для вызова скрывшейся внутрь оспенной настоящей высыпи къ прежнему ея мѣсту, то нужно бѣсть *горчичники на затылокъ, грудь, руки и ноги*, а теплыя, даже горячія *припарки ко всей груди, спинѣ и животу*: для внутренняго же употребленія *питье изъ воды съ лимоннымъ сокомъ и виномъ* (№ 177) преимущественно полезно въ этомъ случаѣ. *Прим.* Не должно при этомъ смѣшивать натуральной оспы, настоящей (истинной) отъ таковой же ложной (вѣтренной) и видоизмѣненной. Скрытіе внутрь только первой угрожаетъ опасностью жизни, и потому её должно всячески стараться вызвать опять наружу, а послѣднія часто исчезаютъ, пропадаютъ съ поверхности кожи безъ вредныхъ послѣдствій для одержимыхъ ими больныхъ.

Въ третьемъ періодѣ, именно въ періодѣ наливанія, или нагноенія оспинъ (слѣдующіе потомъ еще 3 дня—7—8—9), который есть опаснѣйшій изъ всѣхъ періодовъ, потому что число смертныхъ случаевъ въ немъ самое большое по причинѣ вторичной (нагноительной), бывающей въ немъ, лихорадки, при правильномъ теченіи оспы достаточны тѣ же средства, что и въ первыхъ двухъ періодахъ. При этомъ должно замѣтить, что *прохладное содержаніе* больного *еще нужны* въ этомъ періодѣ болѣзни, особенно при излишне сильномъ нагноеніи, при которомъ мѣста, пораженные прыщами оспы, особенно лица и рукъ, полезно *обтирать настоемъ, или водою, цвѣтовъ: розы, ромашки, травъ: полыни, душицы, богородской, божьяго деревца, зори, сѣмянъ: тмина, оліса, укропа, отваромъ борей: ольхи, ивы, вяза, дуба и т. п. спиртовымъ березковымъ муравьинымъ настоемъ, краснымъ виномъ*. При изъязвленіи очень хорошо помогаетъ народное помазываніе изъязвленныхъ мѣстъ *теплымъ, свѣжимъ, или слегка посоленнымъ, коровнымъ масломъ, сливочнымъ масломъ, сметаною*. Но если оспа дѣлается сливною, если появляется вновь лихо-

радка (нагноительная) воспалительнаго свойства, и развиваются воспаления въ головѣ, груди, животѣ, что узнается по значительной краснотѣ обружности оспы, по сильному жару и жаждѣ, твердому, крѣпкому пульсу, словомъ, по признакамъ воспаления, какъ значится въ первомъ періодѣ раздраженія и первичной лихорадки, то должно поступать точно также, какъ сказано тамъ, съ тою разницею, что здѣсь *дѣтямъ*, не старше 15-ти лѣтъ, должно совѣтовать припустить *пѣвицы противъ мѣста воспаления*, количествомъ вдвое противъ числа лѣтъ, а *взрослымъ* юношамъ совѣтовать *пустить кровь* изъ вены руки отъ 1 до 1½ фунта — около 4-хъ обыкновенныхъ чайныхъ чашекъ. Раздраженіе въ кожѣ должно уменьшать *срѣзываніемъ ножницами*, или *прокалываніемъ*, начинающихъ желтѣть *оспинъ* острою тонкою иглою, повторяя неоднократно эту операцію, по мѣрѣ новаго наполненія оспинъ гноемъ, особенно на *лицѣ, шее, груди и животѣ*. Прорѣзываніе или прокалываніе оспинъ не только не допускаетъ ухода матеріи оспенной въ кровь, но еще уменьшаетъ напряженіе кожи, и чрезъ то особеннымъ образомъ облегчаетъ больного. Бромъ того оно предотвращаетъ на ней рябины, а это обстоятельство не маловажное. Оспенная матерія, находясь долгое время въ прыщахъ, остротою своею съѣдаетъ нѣжную кожу лица, оттого то и случается видѣть людей, до того обезображенныхъ, что они едва имѣютъ образъ человѣческій.

Прим. Хотя эта операція никогда не можетъ вредить, однако должно считать её нужною только тамъ, гдѣ оспа сильная, сливная, матерія оспинъ остра и ѣдка.

Изверженію гноя изъ крови можно способствовать усиленнымъ испражненіемъ на низъ и мочи посредствомъ *кислаго питья*, особенно изъ *кремортарара* (№ 178). Въ этомъ періодѣ и сама натура напрягаетъ свое усиліе помочь больному поносомъ, и ни подъ какимъ видомъ не должно препятствовать ея усиліямъ съ этой стороны.

Слюноотеченіе есть тоже очень обыкновенное выпоражниваніе въ этомъ періодѣ оспы, особенно у взрослыхъ, которое также не нужно останавливать, какъ и поносъ, а, напротивъ, способствовать отдѣленію ея. Для этого служить превосходнымъ средствомъ *галлеровъ элексиръ* (по 10-ти капель на стаганъ чистой, свѣжей, ключевой воды отъ 2-хъ до 4-хъ разъ въ день). Но если въ этой вторичной лихорадкѣ больной подверженъ слабости, если прыщи внезапно становятся блѣдными, если конечности охолодѣли, то надобно приложить *нирвыня* (№ 58) къ тѣмъ же мѣстамъ, къ которымъ назначено прикладываніе горчичниковъ въ предыдущемъ періодѣ и *поддерживать силы больного укрѣпляющими*. *Вино и другіе спиртные напитки* даются иногда въ этомъ случаѣ съ удивительнымъ успѣхомъ *).

Въ четвертомъ періодѣ, именно въ періодѣ подсыхания, (слѣдующіе потомъ 3 дня болѣзни 9—10—11) нужно испражнять изъ гѣла все-

*) Буханъ. Его учебникъ, томъ 11. стр. 267.

савшійся *оспенный ядъ посредствомъ* усиленнаго испражненія *низомъ и мочи*. Для этого, кромѣ вышеописанныхъ легкихъ слабительныхъ средствъ изъ огуречнаго рассола, толокна, сладкой сыворотки, кремортарта, магнези, ревеннаго сиропа, клещевиднаго масла и промывательныхъ (блестир) съ пользою можно употреблять *отваръ сухой коры крушины* (№ 74), *соли: горькую* (№ 73), *глауберову* (№ 34), *одни и съ отваромъ сухой коры крушины* (№ 75), *винское питье* (№ 139). Слѣдуетъ при этомъ соображаться съ возрастомъ дѣтей: чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ менѣе долженъ быть назначенъ и приемъ лѣкарствъ; груднымъ долженъ быть въ половину меньше приемъ противъ взрослыхъ. Въ южныхъ губерніяхъ, особенно въ Малороссіи, *варенныя сливы* дѣтямъ могутъ замѣнять всѣ вышеозначенныя средства, особенно если отваръ ихъ мѣшать пополамъ съ сывороткою и подслащивать сахаромъ или медомъ, либо патокою.

Примѣчаніе. Если все время болѣзни испражненіе низомъ было свободно, то употребленіе слабительныхъ средствъ можетъ быть излишнимъ.

Въ этомъ періодѣ отъ скорого подсыханія оспинъ можетъ произойти опасность, по причинѣ прилива крови и воспаленія въ мозгѣ, съ безчувствіемъ и сонливостію, или въ легкихъ, съ одышкою и кашлемъ: въ обоихъ случаяхъ должно дѣлать тоже, что показано во второмъ періодѣ противъ собрытія внутрь оспинъ; а чаще всего случается у тѣхъ больныхъ, которыхъ пользуютъ горячительными лѣкарствами, кормятъ и поятъ горячею пищею и питьемъ, воспаленіе горла, отъ котораго большую пользу оказываютъ *кисловатыя полосканья* (№№ 102, 103, 104 и 105), которыми должно чаще полоскать во рту и зѣвъ горла, а пищу и питье употреблять должно *прохладительныя*; въ такомъ случаѣ настоящее воспаленіе горла скоро пройдетъ безъ возврата. Не менѣе того отъ теплаго содержанія и укутыванія больныхъ въ оспѣ бываетъ опухоль венъ, воспаленіе глазъ; въ такомъ случаѣ надобно прикладывать *по припаркѣ* (катаплазмъ) изъ *мякиши благо хлѣба и молока*, которую нужно перемѣнять свѣжею и продолжать это до тѣхъ поръ, пока вѣки такъ размявнутъ, что опухоль въ нихъ опадетъ и разрѣшится. По открытіи слипшихъ до того вѣкъ, если замѣтны будутъ пупырышки на сѣромъ кружкѣ глазъ, или бѣловатая опухоль, то должно продолжать эти припарки до произведенія въ этихъ мѣстахъ нагноенія, при которомъ должно вѣсть *на глаза* простые *компрессы*, напитанные напередъ *настоямъ липовыхъ, ромашковыхъ и бузиновыхъ цвѣтовъ*.

Оспа натуральная ложная, — вѣтрена (вѣтреница).

Опредѣленіе. Оспа вѣтрена есть лихорадочная сыпь, состоящая изъ прыщей, очень похожихъ на прыщи настоящей (истинной) натуральной оспы, наполненныхъ полугнойною только влагою и переходящихъ въ засыханіе скорѣе, чѣмъ въ настоящей натуральной оспѣ;

она бываетъ у людей, имѣвшихъ натуральную оспу, или предохранительную настоящую, либо ложную.

Признаки. *Ходъ* имѣетъ *неправильный*. Проходить неопредѣленно всѣ 4 періода. Періоды высыпанія и созрѣванія совершаются не порядочно; всѣ *періоды оканчиваются* въ 4—6 или 8 дней. Господствуетъ *повально*, большею частію *отдѣльно*, иногда *совмѣстно* съ другими сыпями, какъ-то: *корью*, *краснухой*. По свойству *заразительна*, сама по себѣ *не опасно*, *рѣдко* оставляетъ послѣ себя *рябины*, но *никогда* не производитъ *безобразія*. Влага, взятая изъ оспинъ, будучи привита другому, не производитъ оспинъ, подобныхъ ей. Лихорадочные признаки бываютъ одинъ разъ, большею частію превращаются по окончаніи высыпанія вдругъ или понемногу; они или кратковременны и очень слабы, или очень сильны и продолжительны, часто сходятся съ признаками горячки, происходящими отъ простуды. *Высыпаетъ* она по частямъ, *не одинаково*, *не порядочно*, обыкновенно *сперва на туловищѣ рукахъ и ногахъ*, а потомъ *на лицѣ*. Побавившіяся красноватія, маленькія пятнушки превращаются черезъ сутки не въ пупырышки, но въ прыщики, которые скоро наполняются или свѣтлою, или гноевидною влагою. *Прыщики острокопечны*, *не окружены розовымъ колечикомъ и не имѣютъ въ верхушкѣ углубленія*. *Наливаются они, не одновременно и въ теченіи сутокъ влагою, водянистою, либо подобною молоку, иногда гноевидною*. *Засыхаютъ* также *безъ порядка*. Вообще тѣ изъ нихъ скорѣе острѣваютъ, которые появились прежде; чаще всего бываетъ, что *однѣ оспины засыхаютъ, другія еще наливаются влагою*.

Причины. Предрасположеніе, общее со всѣми лихорадочными сыпями, т. е. *пасочно-сывороточное*, мокротное *состояніе* тѣла. Оттого большею частію дѣти подвергаются этой болѣзни. Виѣшняя же производящая причина есть особенное *воздушное повѣтріе*.

Сущность состоитъ *въ пасочно-сывороточности*, отлагающейся *на кожу*.

Распознаваніе по виду прыщей и вышеописаннымъ признакамъ *легко и удобно*.

Предсказаніе и относительно опасности для жизни, и относительно продолжительности, всегда *хорошо*. Вѣтрная оспа не опасна и не продолжительна.

Исходъ единственный *въ здоровье*.

Лѣченіе одно діететическое. Должно совѣтовать только *содержать* больного *въ умеренномъ теплѣ* и по заразительному свойству болѣзни *особо* отъ другихъ, при употребленіи діеты, какъ и въ настоящей натуральной оспѣ. Другія средства рѣдко бываютъ нужны, развѣ при нечистотѣ языка и слабomъ апетитѣ полезно давать легкія *слабительныя изъ разсола* (№ 7), *толокна* (№ 72), *магnezіи* (№ 8), *кремортарта* (№ 9) и *ревеня* (№ 172).

Оспа натуральная, видоизмѣненная (варіолоидъ).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Оспою видоизмѣненною называется лихорадочная сыпь, состоящая изъ прыщей, тоже очень похожихъ на прыщи настоящей натуральной оспы, только меньше послѣднихъ, наполненныхъ полутнойною влагою и переходящихъ въ засыханіе скорѣе, чѣмъ въ настоящей оспѣ, а медленнѣе, чѣмъ въ вѣтреной, имѣющихъ величину съ чечевицу; она бываетъ у людей, имѣвшихъ предохранительную прививную, настоящую или ложную, рѣдко у тѣхъ, которые имѣли натуральную, или не имѣли ея.

ПРИЗНАКИ. *Ходъ ея неправильный.* Проходитъ опредѣленно и порядочно два первые періода, т. е. періоды жара и высыпанія, а неопредѣленно и почти одновременно періоды наливанія и засыханія. Каждый изъ первыхъ двухъ періодовъ обанчивается въ двое и болѣе сутокъ, а два послѣдніе въ трое сутокъ. *Всѣ періоды оканчиваются, большею частію, въ 6 или 9 дней.* Господствуетъ она, большею частію, *совмѣстно съ повальною натуральною оспою*; случается однако, что она бываетъ *и отдѣльно*. По свойству *заразительность* ея еще не совсѣмъ доказана. Она не опасна и не оставляетъ по себѣ рябинъ и безобразія. Влага, взятая изъ оспинъ, будучи привита другому, рѣдко производитъ оспины. *Признаки лихорадки* бываютъ такіе же, какъ въ оспѣ натуральной, но гораздо слабѣе и только *одинъ разъ* — предъ высыпаніемъ; при нагноеніи и засыханіи они не возвращаются. Они сходятся съ признаками легкой горячки, простудной или желудочной, продолжаются *одинъ, много два дня*. *Высыпаніе* постепенно, но не однообразно и *непорядочно*, обыкновенно *сперва на рукахъ и туловищѣ*, потомъ *на лицѣ и ногахъ*. Пупырышки красные, имѣютъ околооспенное красное колечко и наполняются свѣтлою влагою.

ПРИЧИНЫ тѣже, какіе и въ вѣтреной оспѣ. Замѣчательно только то, что *повѣтріе*, производящее эту оспу, очень близко по своему качеству къ повѣтрію настоящей натуральной оспы. Доказательствомъ этого служить то, что видоизмѣненная оспа появляется или *въ самую эпидемію* настоящей этой оспы, или *передъ ней*, или *послѣ* нея. Поэтому *видоизмѣненная оспа есть* не что иное, какъ *настоящая оспа, ослабленная* предварительнымъ прививаніемъ предохранительной оспы, или не вполне развитая, *собственно полуоспа*.

Сущность одинакова, какъ и въ вѣтреной оспѣ.

РАСПОЗНАВАНІЕ по виду и вышеописаннымъ признакамъ очень *легко и удобно*. Хотя этотъ видъ оспенной сыпи, нерѣдко появляющійся теперь повально, болѣе всего сходствуетъ съ настоящею натуральною оспою, и потому даетъ поводъ къ неправильнымъ сужденіямъ, такъ что многіе, не зная, что такое натуральная видоизмѣненная сыпь (натуральный варіолоидъ), случающаяся обыкновенно у тѣхъ людей, которые имѣли предохранительную оспу, думаютъ, что у нихъ была на-

туральная оспа; однако признаки той и другой, сличаемые между собою, ясно показываютъ, какая существенная разница находится между оспою натуральною настоящею и видоизмѣненною. Слѣдовательно появленіе послѣдней въ нынѣшнее время нимаю не ослабляетъ той истины, что настоящая предохранительная оспа почти всегда на всю жизнь предохраняетъ человѣка отъ натуральной оспы. Еслижъ иногда умираютъ люди отъ натуральной видоизмѣненной оспы, то вѣдь они умираютъ и отъ кори, и отъ вѣтреной оспы, которыя гораздо безопаснѣе натуральной оспы.

Предсказаніе *хорошо*. Болѣзнь не опасна для жизни и не продолжительна.

Лѣченіе одинаково, какъ и въ вѣтреной оспѣ, — *одно діететическое, рѣдко* бываютъ нужны другія средства, развѣ при нечистотѣ языка и недостаткѣ аппетита, одни *легкія слабительныя*, какъ и тамъ.

Предохранительная оспа (вакцина).

Опредѣленіе. Предохранительная оспа есть та, которая искусственно производится въ человѣкѣ, посредствомъ прививанія ему оспенной матеріи, взятой отъ коровьей оспы, или изъ оспины дитяти, которому была привита предохранительная оспа.

Раздѣленіе. Предохранительная (прививная) оспа *бываетъ*, подобно натуральной, *настоящая, ложная и видоизмѣненная*.

Предохранительная оспа настоящая.

Опредѣленіе. Правильная оспа настоящая бываетъ у людей, не имѣвшихъ натуральной оспы и имѣвшихъ прививную оспу ложную, которая проходитъ опредѣленно, порядочно въ 4 періода, т. е. періоды: бездѣйствія, высыпанія, наливапія (созрѣванія) и засыханія (острупленія), изъ которыхъ каждый періодъ заключаетъ въ себѣ трое сутокъ.

Признаки. *Теченіе* совершается отъ начала привитія до времени отпаденія струпьевъ *въ 18 или 20 сутокъ*. *Лихорадочные признаки* бываютъ очень *слабы* и у многихъ дѣтей *едва замѣтны*. Въ первый разъ они появляются *на 4-й день* по привитіи, продолжаются неопредѣленное время, но не долѣе *однихъ, или двое сутокъ*. Во второй разъ признаки лихорадки возобновляются *на 8 или 9-й день* и бываютъ *сильнѣе* первыхъ. Тутъ они, обыкновенно, означаются лихорадочнымъ пульсомъ, жаромъ въ тѣлѣ, чувствомъ усталости, жаждою, мутною мочою, а иногда рвотою и поносомъ. Можетъ быть совмѣстно съ другими сыпями, какъ то: натуральною, вѣтреною оспою, корью, краснухою; прививныя оспины въ такомъ случаѣ обыкновенно совершаютъ свое теченіе особо отъ сыпи, существующей съ нею вмѣстѣ, которая также проходитъ свое теченіе обыкновеннымъ порядкомъ. *Первый періодъ* (бездѣйствія), соответствующій періоду жара въ другихъ оспахъ, про-

должается *три дня* и не отличается никакими признаками, потому что привитая оспенная матерія еще не производит видимаго дѣйствія на кожу, оттого и называется періодомъ *бездѣйствія*. *Второй періодъ* (высыпанія) начинается съ того времени, какъ покажется на привитомъ мѣстѣ пупырышекъ, и продолжается до того дня, какъ пупырышекъ этотъ получитъ на верхушкѣ своей свѣтлую влагу, правильное пупковидное углубленіе и около-оспенную розовую, въ видѣ колечка, красноту; онъ продолжается, какъ и первый періодъ, *3 дня* т. е. *4-й, 5-й, 6-й*, считая со дня привитія оспенной материн. Пупырышекъ, обыкновенно имѣющій величину булавочной головки и не содержащій въ себѣ влаги, переходитъ на 4-й день въ *прыщикъ*, уже нѣсколько наполненный влагою; прыщикъ этотъ *имѣетъ правильное, круглое очертаніе, верхушку плоскую, основаніе*, обрубленное легкою розовою краснотою, *въ видѣ колечка*, и на *верхушкѣ* по срединѣ *пупковидное углубленіе*. Въ *третьемъ періодѣ*, т. е. *отъ 7-го до 10-го дня*, образуется *оспинка*, которая постепенно наливается влагою сверху внизъ и распространяется *болѣе въ ширину, чѣмъ въ вышину*. Достигнувъ (*около 10-го дня*) настоящей величины и зрѣлости, *оспинка* бываетъ сочна, упруга, кругла, сверху плоска, вышиною около 1-й линіи, въ поперечникѣ въ 2 или 3 линіи, *цвѣта перламутоваго*, а потомъ желтоватаго. На созрѣвшей оспинѣ пупковидное углубленіе дѣлается плоскимъ; *околооспенная краснота* выступаетъ сплывъ на 8-й или 9-й день и получаетъ *видъ* правильной, однообразной *космочки алаго цвѣта*, шириною въ два и болѣе дюйма: краснота эта держится около двухъ или 3-хъ дней, и постепенно блѣднѣетъ и исчезаетъ. Влага, бывшая сначала свѣтлою, прозрачною, густѣетъ, желтѣетъ, становится мутною, а наконецъ и гнойною. Въ *четвертомъ періодѣ*, т. е. *отъ 10-го до 12-го дня*, начинается засыханіе. На срединѣ верхушки оспины дѣлается желтое пятно, распространяющееся къ окружности, такъ что оспинка превращается вся въ струпъ. Струпъ темнѣетъ, становится черноватымъ, роговиднымъ, на его верхушкѣ видно не большое углубленіе, онъ имѣетъ обыкновенно 3 линіи въ поперечникѣ и отпадаетъ чрезъ 8—10 дней, оставляя по себѣ не большой глубокой рубецъ, сначала красный, но въ послѣдствіи дѣлающійся нѣсколько блѣже цвѣта кожи. Происшедшая рябина кругла, съ зубчатыми краями, въ ней находятся бѣлыя линіи, идущія лучеобразно отъ середины къ окружности, и по мѣстамъ не большія кольцеобразныя точки, похожія, при ближайшемъ разсмотрѣніи, на маленькія, узкія, глубокія ямочки. Эти ямочки не всегда имѣютъ одинакое положеніе: иногда онѣ какъ бы неправильно разсыпаны по кружку всей рябины.

Причина *внутренняя* есть одно *непонятное предрасположеніе*, по которому каждый человекъ въ жизни (за исключеніемъ очень немногихъ) подверженъ воспримчивости оспенной заразы.

Причина *внѣшняя*, производящая, есть одно *искусственное зараженіе* коровьею оспою, съ цѣлью предохранить отъ настоящей, до

того сильной и опасной натуральной оспы, свирѣпствующей повсюду. Дитя, которому была привита предохранительная, или коровья оспа, подвергаясь оттого легкой и всегда безопасной оспѣ, теряетъ способность въ послѣдствіи занемочь натуральною оспою; еслиже послѣдняя иногда и появляется у него, то всегда въ легкомъ видѣ. Прививаніе коровьей оспы основано на томъ наблюденіи, что коровницы, заразившіяся отъ коровъ оспою, которая у нихъ (коровъ) появляется на вымени, никогда не подвергаются натуральной оспѣ.

Распознаваніе настоящей прививной оспы отъ таковой же, ложной и видоизмѣненной, по вышеизложеннымъ признакамъ, *легко*.

Предсказаніе. Она *не заразителна* и при хорошемъ ходѣ никогда *не бываетъ опасною*; не оставляетъ послѣ себя никакихъ послѣдствій, а, напротивъ, исправляетъ слабыя тѣлосложенія, уничтожаетъ нѣкоторые болѣзни. Влага, взятая изъ оспины, будучи привита другому человѣку, производитъ правильныя оспины.

Исходъ единственный — *въ здорově*, рѣдко въ изъязвленіе.

Лѣченіе діететическое въ прививной (предохранительной) оспѣ, А) относительно грудныхъ младенцевъ. Если грудное дитя было здорово до привитія ему оспы, и во все продолженіе ея ничѣмъ видимо не страдаетъ, то не нужно ему ничего давать даже и тогда, еслибъ оно сдѣлалось не веселымъ, капризнымъ или начало нѣсколько горѣть. Это состояніе кратковременно и не опасно, и есть неизбѣжное слѣдствіе благотворнаго дѣйствія оспы на тѣло: нужно только во всякомъ случаѣ соблюдать слѣдующее: 1) *Не купать ребенка* въ ваннахъ, а тѣмъ болѣе не носить его въ баню, *лицо же умывать*, по обыкновенію, чистоту и *опрятность тѣла сохранять* посредствомъ перемѣны бѣлья и платья, ни на минуту не оставлять на дитяти мокраго бѣлья, либо платья, особенно пеленокъ, но тотчасъ смѣнять ихъ сухими и чистыми. 2) *Не переносить* его изъ *теплой* комнаты въ *холодную*, и наоборотъ; *не держатъ* его на сквозномъ вѣтрѣ, или у открытаго окна, или въ дверяхъ, у *топящейся печи*, иначе дитя непременно простудится, а это очень вредно и во всякое другое время прививной оспы. 3) Ни подъ какимъ видомъ *не давать* грудному дитяти *никакой* другой пищи, *кромѣ молока матери или кормилицы*, которое одно только и полезно ему; всякая же другая пища, особенно жвачки, каши, супы и тому подобное, могутъ обременить желудокъ и разстроить пищевареніе, что очень худо для здоровья ребенка и можетъ произвести у него поносъ, рвоту, или желудочную горячку. 4) Наблюдать, *чтобы* у дитяти *было ежедневно испражненіе низомъ*: запоръ на низъ причиняетъ жаръ, безпокойство, бессонницу и другіе болѣзненные припадки. Но запоръ на низъ еще опаснѣе въ такомъ случаѣ, когда принуждены бываютъ привить младенцу оспу во время прорѣзыванія у него зубовъ. 5) Сверхъ того, необходимо, *чтобы мать, или женщина, кормилица дитя грудью, была спокойна духомъ и тѣломъ*: извѣстно, до какой степени огорченіе, гнѣвъ, обремененіе желудка пищею, а тѣмъ болѣе

тяжелую и трудноваримую, хмѣльные напитки, измѣняютъ молоко кормилицы и дѣлають его зловреднымъ для здоровья младенца. И потому хорошо, если кормилица (мать или другая) во все время, пока у ребенка продолжается прививная оспа, какъ можно менѣе употребляетъ мясной пищи, а отъ питья пива, вина, воды, кофе и совсѣмъ отказывается и будетъ довольствоваться только чаемъ съ молокомъ. 6) *Съ ручками ребенка* при пеленаніи и ношеніи его на рукахъ должно совѣтовать *обращаться* какъ можно *осторожнее*; для этого лучше всего, чтобы дитя играло и спало спеленаннымъ и чтобы во время сна оно не лежало на ручкахъ, а во время игры не дотронулась ими до чего либо твердаго, или остраго, отчего оспины легко могутъ повредиться. Хорошо по этому, если дитяти привьютъ оспу вскорѣ по истеченіи 6 недѣль отъ рожденія; въ это время оспины могутъ находиться въ безопасности, отъ поврежденія, по крайней мѣрѣ со стороны дитяти. Б) Относительно не грудныхъ и взрослыхъ дѣтей: 1) по привитіи оспы *беречь ихъ отъ простуды*, не позволять имъ выходить на холодъ, особенно зимою, запретить ходить въ холодныя нужныя мѣста, а приказать имъ сидѣть въ комнатахъ и наблюдать, чтобы они не стояли у открытыхъ окошекъ или въ отворенныхъ дверяхъ, у топящихся печей, — т. е. какъ можно болѣе избѣгали сквознаго вѣтра, который очень вреденъ для здоровья; отъ этихъ причинъ легко можно простудиться. 2) *Пищу* дѣти должны употреблять болѣе *молочную*, чѣмъ мясную, и не давать имъ никакой пищи трудноваримой, какъ то: грутой каши, блиновъ, ветчины и т. п. все это можетъ причинить расстройство пищеваренія, поносъ и самую желудочную горячку. 3) *Пить* давать чистую свѣжую *воду*; а *утромъ* можно позволять *жиденькій чай съ молокомъ и булкою* (кто привыкъ къ нему), но кофе очень вреденъ, даже и для привычныхъ къ нему дѣтей. 4) Въ теченіе всей оспы слѣдуетъ наблюдать, чтобы ежедневно было испражненіе на низъ, и отнюдь *не допускать* до того, *чтобы на низъ не было дня по два сряду*. 5) *Не позволять* дѣтямъ *рѣзвиться и шалить*, хотя бы они были и совсѣмъ здоровы, потому что, рѣзвясь, они легко могутъ повредить себѣ оспины; а отъ сильнаго движенія сдѣлается у нихъ жаръ и другіе подобные припадки. 6) *Сохранимъ* чистоту и *опрятность тѣла* посредствомъ чистой, но осторожной перемѣны бѣлья, однако ни подъ какимъ предлогомъ *не дѣлать дѣтямъ ваннъ и не водить ихъ въ баню*, а только *умывать лицо по обыкновенію*. 6) Если дитя ходитъ въ школу, то *оставить* его на это время дома, не заставляя его учиться и вообще *не занимать его никакой работою*. 7) *Постель* оправлять ему хорошенько, чтобы ребенокъ могъ *лежать спокойно и удобно*. 8) *Не наказывать* дѣтей, *не страшить ихъ угрозами и не пугать ихъ*. 10) *Если въ селеніи будетъ господствовать корь, скарлатина, натуральная оспа, то заботиться о томъ, чтобы дитя, которому привита оспа, всегда находилось въ особой комнатѣ, и чтобы громъ родителей, или няньки дитяти, никто изъ постороннихъ людей не имѣлъ къ нему доступа*. Это правило

очень нужно и важно, потому что если дитя, имѣющее привившую оспу, получить бабью либо другую сыпь, то она можетъ быть не доброкачественною.

Лѣчение существенное въ прививной (предохранительной) оспѣ бываетъ *только случайное* (припадочное) противъ нѣкоторыхъ болѣзненныхъ припадковъ, которые могутъ быть въ продолженіе прививной оспы. Если случится *запоръ на низъ*, то хорошо давать *снятаго коровьяго молока: груднымъ дѣтямъ поутру двѣ или три чайныя ложечки, а взрослымъ на тощагъ одну или двѣ чайныя чашки*; если это средство не поможетъ, то бѣлѣй *отваръ чернослива* давать вмѣсто снятаго молока въ такомъ же приемѣ. Въ Малороссіи *сокъ варенныхъ сливъ* употребляютъ въ этомъ случаѣ съ отличною пользою. Если и этого не достаточно, то давать *ревенный простой сиропъ* (№ 176) груднымъ дѣтямъ по чайной не полной, а взрослымъ по десертной и даже по столовой ложкѣ на тощагъ, одинъ разъ въ сутки, до дѣйствія. Но не столько полезны эти слабительныя средства, сколько *клизмы изъ воды, или изъ настоя ромашки съ деревяннымъ масломъ*.

Случается, что вокругъ того мѣста, гдѣ привита оспа, вскорѣ послѣ того, или тогда, когда вокругъ оспины произойдетъ розовая краснота въ видѣ коемочки, либо вскорѣ послѣ того, какъ оспопрививатель не осторожно достаетъ оспенную матерію изъ оспинъ для привітія ея другимъ дѣтямъ, приключается *рожистая краснота*, занимающая иногда всю руку, которая распухаетъ и сильно болитъ. *Противъ незначительной рожистой красноты не нужно ничего дѣлать*, чаще всего она сама собою проходитъ. Достаточно и того, чтобы при пошеніи и пеленаніи грудныхъ дѣтей какъ можно *осторожныѣе обходиться съ больною ручкою ребенка, обзернувъ ее чистенькою, мягкою, тонкою ветошкой такъ, чтобы не было въ ветошкѣ нигдѣ ни складокъ, ни швовъ. Лучше всегда держать также дитя спеленаннымъ. У взрослыхъ дѣтей руку съ такою краснотою подвязать платкомъ и обернуть ветошкой, заботиться, чтобы не простудить руки и не повредить ея какимъ либо образомъ. При большой краснотѣ, причиняющей сильную боль, больную руку нужно слегка мазать, по крайней мѣрѣ часа черезъ два или три, свѣжимъ сливочнымъ масломъ безъ соли, или миндальнымъ, или чистымъ прованскимъ, либо маковымъ масломъ. Если отъ этого боль не уймется, и будетъ замѣтно, что на томъ мѣстѣ, гдѣ привита была оспа, дѣлается нарывъ, то наложить на всю руку спускъ изъ воска и деревяннаго масла (№ 29), за неимѣніемъ котораго можно употребить простонародную мягчительную мазь изъ свѣчнаго сала съ крупчатою мукою или крахмаломъ (№ 149). Но безъ крайней нужды не должно употреблять ни присыпокъ изъ муки или мѣла, ни мазей, ни сметаны, ни обладываній руки вапустнымъ листомъ, ни другихъ выхваляемыхъ средствъ противъ рожи. Эта рожистая краснота и отъ употребленія этихъ средствъ мало по малу исче-*

заесть, и проходить сама собою большею частію чрезъ 7 дней, или дѣлается нарывъ.

Прим. Если же рожа распространяется по всему тѣлу, въ такомъ случаѣ нужно непременно, ни мало не медля, обратиться къ врачу.

На нарывъ, бромъ спуска и мази, достаточно положить *медовую лепешку* (№ 24) и то тогда, когда уже замѣтно начнетъ собираться въ немъ матерія. Въ случаѣ, если въ немъ окажется сильная боль, то сдѣлать лепешку *изъ истолченного чернаго мака, смѣшаннаго съ деревянными, или сливочными, или маковыми маслами*. Когда уже нарывъ прорветъ, то *продолжать* прикладывать *спускъ* или простонародную смягчительную *мазь* до тѣхъ поръ, *пока матерія совсемъ выйдетъ*. Но не употреблять для мнимаго вытягиванія матеріи какого либо пластыря, потому что кожа у дѣтей очень нѣжна, и въ ней легко можетъ произойти раздраженіе. *На прорѣзываніе же нарыва, въ случаѣ нужды, можетъ рѣшиться только врачъ*.

Случается, что по привитіи оспы дѣлается прыщъ, который лопається, и когда изъ него выйдетъ гнойная матерія, то остается ранка, долго гноющаяся и составляющая потомъ язвину. Она можетъ произойти и послѣ поврежденія оспины, или по отпаденіи струпа. Все это случается у дѣтей, особенно золотушныхъ, или имѣющихъ какую либо сыпь на тѣлѣ, или очень слабую и нѣжную кожу. Такихъ *язвинокъ вообще не должно спускать* заживлять прикладываніемъ для этого разныхъ средствъ, которыя по большей части растрavляютъ ранки и производятъ раздраженіе въ кожѣ. *Лучше всего имѣть терпѣніе и прикладывать вышеозначенную простонародную мазь, а лучше спускъ, и только въ случаѣ нужды присыпать ранки самымъ мелкимъ порошкомъ угля, мѣлу или цинковыхъ цвѣтовъ* (слюда). Когда *ранки* пробудутъ столько времени, сколько для нихъ нужно, то онѣ *заживутъ сами собою*. Если же заживить ихъ преждевременно, то матерія можетъ броситься на уши, глаза, грудь, или сдѣлается сыпь на тѣлѣ.

Оспа предохранительная, ложная.

Опредѣленіе. Предохранительною ложною оспою называется сыпь оспенная, происходящая у людей, которымъ прививаютъ предохранительную оспу въ первый разъ, не имѣющая всѣхъ принадлежностей прививной петинной оспы и совершающая неправильное, обыкновенно, кратковременное теченіе и не могущая предохранить человѣка, имѣющаго такіа оспины, отъ зараженія натуральной оспой.

Раздѣленіе. По различію причинъ и обстоятельствъ, отъ которыхъ происходитъ предохранительная ложная оспа, она бываетъ очень различна, и потому не можетъ быть описана съ точностью; впрочемъ полагаютъ *три вида ложной оспы*: *Первый видъ*: оспина, величинною и видомъ подобная оспинѣ совершенной, но *нѣтъ околооспенной красноты* и другихъ принадлежностей, которыя бываютъ въ настоящей ос-

пнятъ отъ 9 до 10 дня. *Второй видъ*: оспинка видомъ совершенно схожа съ оспенною, но величиною гораздо менѣе ея, и хотя имѣетъ околооспенную красноту, однако она очень темнокраснаго, неровнаго цвѣта и такъ узка, что едва простирается далѣе основанія оспины; *окружность такой оспинки тверда, воспалена и слегка возвышена*. *Третій видъ*: оспинка, *похожая на неправильный прыщикъ*, очень жала, *остроконечна*; околооспенная краснота весьма широка, однако не розоваго или алаго, но темнокраснаго цвѣта. Въ двухъ послѣднихъ видахъ околооспенная краснота показывается отъ 7 до 9 дня и исчезаетъ около 10-го; послѣ этого дѣлается струпь, который не великъ и гораздо неправильнѣе струпа совершенной оспинки; *ялочки не остаются*.

П р и з н а к и. Она бываетъ у людей, не имѣвшихъ натуральной оспы, у которыхъ предохранительная оспа, будучи привита въ первый разъ, не принимается настоящимъ образомъ. *Проходитъ всѣ четыре періода, но неопредѣленно*. Чаще всего *періодъ бездѣйствія* очень *кратковременъ*; въ противномъ случаѣ, оспинка почти всегда показывается гораздо раньше четвертыхъ сутокъ. *Періоды высыпанія, наливаанія и засыханія продолжаются не болѣе, какъ по двое сутокъ, а часто еще менѣе*. Все теченіе оспинъ совершается въ 7 или 10 дней. Вообще, чѣмъ скорѣе она оканчивается, тѣмъ вѣрнѣе, что она ложная. Можетъ быть вмѣстѣ съ натуральною и вѣтреною оспою, корью, краснухой; при такихъ сыпяхъ ложныя оспины совершаютъ свое теченіе обыкновеннымъ порядкомъ, только еще гораздо скорѣе. Иногда бываетъ на одной рукѣ хорошая, на другой ложная предохранительная оспа. Иногда изъ нѣсколькихъ уколовъ однѣ оспины бываютъ хорошія, а другія ложныя; послѣднія несравненно скорѣе засыхаютъ и проходятъ, чѣмъ первыя. *Лихорадочные признаки* часто съ самаго начала дѣлаются *сильные*, потому что вскорѣ по привитіи нерѣдко происходитъ сильная рожистая краснота на томъ мѣстѣ, гдѣ привита оспа. Въ противномъ случаѣ, во все время существованія оспинъ не бываетъ никакихъ переменъ въ тѣлѣ. *Періодъ бездѣйствія* такъ коротокъ, что между временемъ, когда привьютъ оспу, и тѣмъ, когда покажется краснота на привитомъ мѣстѣ, *не проходитъ и сутокъ*, или на рукѣ не показывается ничего, а *дитя начинаетъ горьить и сильно разнемогается*. Въ *періодъ высыпанія*, на первый или второй день послѣ привитія, на уколотомъ мѣстѣ показывается краснота различной ширины и въ слѣдъ за тѣмъ на ея срединѣ показывается не пупырышекъ, но прыщигъ, содержащій въ себѣ влагу. *Прыщикъ имѣетъ очертаніе неправильное, продолговатое, угловатое, на верхушкѣ остроконеченъ, или плосковатъ*, иногда съ неправильнымъ углубленіемъ; *окруженъ околооспенною неодинаковою краснотою*, которая не имѣетъ розоваго цвѣта и *правильнаго кольцевиднаго очертанія*. *Періодъ наливаанія*. Въ 4-й, или 5-й день оспинка достигаетъ своей настоящей величины и зрѣлости. Созрѣвшая оспина не всегда одинакова по величинѣ и виду: тѣмъ и другимъ

иногда она приближается къ оспинамъ истиннымъ, но иногда очень не сходствуетъ съ ними. Вообще *ложная оспинка не сочна, не упруга, всегда меньше истинной, на верху не плоска, но шаровидна, или остроконечна, цвѣтомъ,—или бѣловата, или желта, какъ обыкновенный прыщъ.* Правильнаго углубленія и околоспенной *кромочки* *алой не бываетъ*, или, если есть околоспенная краснота, то она очень краснаго цвѣта и далеко распространяется. *Влага въ оспинѣхъ отъ самаго начала до конца мало измѣняется; обыкновенно она похожа на мочу, и ею наполняется оспинка вся въ одинъ разъ. Периодъ засыханія.* На 6-й, или 7-й день, оспинка засыхаетъ и образуетъ *струпъ желтоватый или желтокрасноватый, неровный, шероховатый и рыхлый; по отпаденіи струпа, образуется иногда новый. Остающаяся потомъ явина неровна, мирициновата, безъ точекъ и полосокъ, или и совсѣмъ не бываетъ явины.* Иногда послѣ отпаденія струпа дѣлается *язвирка*, которая содержитъ въ себѣ гной, иногда злокачественный, и долго не заживаетъ.

Причины довольно разнообразны, иногда очевидны, а иногда все нельзя ихъ узнать; слѣдующія изъ нихъ, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, могутъ способствовать появленію ложныхъ оспинъ: *со стороны прививаемаго:* 1) если человѣкъ имѣлъ уже оспу натуральную, или не совершенную предохранительную; 2) если дитя одержимо какою нибудь особенно сильною болѣзнію; 3) если дитя хило, слабо, истощено, изнурено; 4) если дитя имѣетъ какую-либо сыпь скоротечную, или продолжительную, особенно если, совмѣстно съ нею, бываютъ оспы: натуральная и предохранительная; 5) сверхъ того ложная можетъ произойти отъ внутреннихъ причинъ, скрытыхъ въ тѣлѣ, которыхъ мы не въ состояніи изслѣдовать. *Со стороны оспенной матеріи, употребляемой для привитія:* 1) если берутъ влагу отъ ребенка нездороваго, имѣющаго какое либо худосочіе или сыпь; 2) если берутъ оспенную влагу изъ оспинъ ложныхъ, видоизмѣненныхъ, не въ надлежащее время, особенно слишкомъ поздно; 3) если, по мнѣнію нѣкоторыхъ, собираютъ матерію съ середины верхушки, а не съ боку оспины; 4) если собранную матерію не сохраняютъ самымъ старательнымъ образомъ, подвергаютъ ее дѣйствію воздуха, или излишней теплоты; 5) если оспенная матерія очень давняя, худо береженная; 6) если для привитія размачиваютъ матерію горячею водою, или содержатъ ее надъ горячими парами; 7) если матерію слишкомъ разводятъ водою; 8) если прививаютъ не влагу, а размоченный оспопрививной струпъ; 9) если матерію берутъ изъ перезрѣвшихъ оспинъ; 10) Геймъ утверждаетъ, что ложная оспа бываетъ и тогда, когда взрослому человѣку прививаютъ матерію, взятую отъ дитяти, и на оборотъ. *Со стороны оспопрививателей:* если они не умѣютъ собирать и сохранять оспенную матерію, или худо готовятъ ее для оспопрививанія, или неправильно и небрежно прививаютъ ее, или употребляютъ при этомъ нечистые инструменты. *Со стороны родителей:* если они, изъ предубѣжденія, или не-

рабѣнія, не смотря за дѣтьми, которымъ привита оспа, подвергаютъ ихъ дѣйствию причинъ, которыя могутъ разстроивать здоровье и повреждать оспины.

Распознаваніе предохранительной оспы ложной отъ настоящей (истинной) по вышеописаннымъ признакамъ *легко и удобно*.

Предсказаніе въ ней вообще *хорошо* въ отношеніи къ жизни и здоровью. Она не заразительна и не опасна, только нисколько не предохраняетъ отъ зараженія натуральною оспою. Влага, взятая изъ оспины ея и привитая другому человѣку, не производитъ оспинъ.

Исходъ ея единственный — *въ здоровье*.

Лѣченіе *діететическое одинаково, какъ и въ настоящей предохранительной оспѣ, а существенное не требуетъ никакихъ средствъ, а если встрѣтится въ нихъ надобность, то ихъ можно заимствовать и изъ лѣченія другихъ видовъ оспы, какъ натуральной, такъ и предохранительной*.

Предохранительная оспа видоизмѣненная (прививной варіолондъ).

Опредѣленіе. Предохранительная оспа видоизмѣненная есть прививная сыпь не надлежащаго качества, особаго отъ ложной предохранительной оспы, бывающая у людей, которые имѣли натуральную оспу, или предохранительную оспу настоящую, и которымъ прививаютъ предохранительную оспу во второй разъ.

Раздѣленіе. Есть *два* отличительные *вида* этой оспы: *одны* оспины *очень мало походятъ на настоящія* предохранительныя оспины, а *другія* *очень много*. Въ первыхъ нельзя отличить 4-хъ періодовъ, а вторыя, своимъ видомъ и величиною, очень приближаются къ настоящимъ оспинамъ; проходятъ 4-ре періода, но два послѣдніе періода, т. е. періоды налива и засыханія, бывають гораздо короче, чѣмъ въ настоящей предохранительной оспѣ. *Первыя* оспины *оканчиваютъ свой ходъ отъ 6 до 8 дней, а вторыя отъ 8 до 10 дней*.

Признаки. По привитіи въ первомъ видѣ не бываетъ періода бездѣйствія, а во второмъ онъ продолжается день или два и сопровождается иногда лихорадочными признаками, даже въ родѣ сильныхъ горячечныхъ припадковъ, но всегда только одинъ разъ, чаще безъ всякихъ перемѣнъ въ тѣлѣ. Въ первомъ видѣ на первый день по привитіи начинается высыпаніе: показывается краснота, а потомъ или пупырышки, не подлежащій въ послѣдствіи никакому измѣненію и скоро исчезающій, или острогонечный прыщикъ, содержащій въ себѣ влагу. На 3-й, или 4-й день упомянутый прыщикъ весь, налившись влагою, расширяется, и на 6-й или 7 день достигаетъ величины полуторошины; имѣетъ сперва на верху нѣкоторое неправильное, пупковидное углубленіе и оболочечную точку, которая не имѣетъ настоящаго алаго

цвѣта, не совершенно круга, не ровна и волнисто-ограничена, и часто распространяется очень далеко. Содержащаяся въ оспинѣ влага не представляетъ тѣхъ порядочныхъ измѣненій въ цвѣтъ и густотѣ, какія бываютъ въ настоящихъ оспинахъ. На 8 или 9 день оспинка начинаетъ превращаться въ струпу, подобно настоящей оспинѣ. Но этотъ струпь бываетъ меньше струпа настоящей оспины, и притомъ болѣе или менѣе остроконеченъ, чернаго цвѣта, скоро отпадаетъ и рѣдко оставляетъ послѣ себя рябину. Эта оспа не можетъ быть совмѣстна ни съ натуральною, ни настоящей предохранительной оспою, но можетъ быть вмѣстѣ съ оспою вѣтреною или видоизмѣненною, корью, краснухой. Многие изъ тѣхъ, кому привита во второй разъ предохранительная оспа, на 3, 5, 6, 7, 8 или 9 день чувствуютъ сильный зудъ, или большую боль на мѣстѣ привитія, или въ подмышкѣ, получаютъ сильные горячечные припадки и вообще бываютъ очень нездоровы. Влага, взятая изъ такихъ оспинъ и привитая людямъ, не имѣвшимъ оспы ни натуральной, ни предохранительной, или не производитъ никакого дѣйствія, или почти всегда производитъ оспу ложную.

Причины: бытность натуральной, предохранительной настоящей, вторичное прививаніе.

Распознаваніе по вышеописаннымъ признакамъ легко и удобно.

Предсказаніе. Видоизмѣненная прививная оспа не прилипчива и не опасна. Матерія, взятая изъ оспины втораго вида, будучи привита, можетъ произвести оспины у людей, которымъ прививаютъ въ первый разъ вакцину; но оспины отъ нея бываютъ ложныя.

Исходъ въ здоровье.

Лѣченіе, какъ и въ предъидущей.

Корь.

Опредѣленіе. Корь есть лихорадочная, мелкая, макообразная, сосковатая сыпь, разсыпанная по всѣмъ частямъ тѣла въ видѣ различной величины полосъ, которая оканчивается чешуйчатымъ слупленіемъ кожицы.

Признаки. Умѣренная корь обнаруживается сначала *наморкомъ, краснотою глазъ, съ нѣкоторою слезливостію, носовымъ и горловымъ слизетеченіемъ, сопровождаемымъ нерѣдко кашлемъ.* При этомъ *лихорадочное состояніе* обыкновенно развивается до степени легкой микробно-воспалительной *горячки*, которая ежедневно ожесточается и потомъ ослабляетъ, *съ наклонностію*, болѣею частію, больныхъ къ *сонливости.* Послѣ 3-хъ сутокъ начинаютъ появляться, сперва *по лицу* и *по рукамъ*, а потомъ и *по прочимъ частямъ тѣла, красноватая пятни* или не равномерно распространяющіяся, *въ видѣ* различныхъ *полосъ*, или *устьянная мелкою*, не переходящею въ нагноеніе, *сытъю*; съ увеличеніемъ и распространеніемъ сыпи лихорадочное состояніе утихаетъ, такъ что *къ 8 и 9 дню, когда высыпаніе оканчивается, ли-*

хорадка совсѣмъ исчезаетъ, и больные оправляются *при постепенномъ слупленіи кожицы*, продолжающемся *до 16, а иногда до 20 дней*. Сильная корь, если она характера чистаго воспалительнаго, обнаруживается лихорадкою *въ видѣ воспалительной горячки*, нерѣдко съ сильнымъ бредомъ и тоскливымъ состояніемъ, причемъ и самая сыпь выступаетъ въ большемъ количествѣ и покрываетъ почти всю кожу сплошнымъ образомъ, не исключая иногда и ладоней, и подошвъ, хотя на этихъ мѣстахъ присутствіе ея мало бываетъ примѣтно и доказывається однимъ только послѣдующимъ слупленіемъ съ нихъ кожицы. При этомъ *больные нерѣдко до, во, и по высыпаніи подвергаются носовому кровотеченію*, возвращающемуся иногда *до 3-хъ разъ и болѣе*. Въ такихъ случаяхъ больные *страждутъ иногда сильнымъ, сухимъ кашлемъ*, сопровождаемымъ болѣю дыхательнаго горла и самаго глѣза, причемъ нерѣдко появляется и кровавое отхаркиваніе или въ видѣ полосокъ, или въ видѣ небольшихъ капель. Если же сильная корь будетъ имѣть характеръ нервный, то больные въ 1-мъ періодѣ ея, не обнаруживая большого жара, часто подвергаются сонливости или судорожнымъ движеніямъ, причемъ жиловіеніе бываетъ сжатое, скорое и неровное, моча блѣдная, иногда часто испражняемая; въ періодѣ высыпанія сыпь появляется не дружно, а по временамъ: то выступаетъ, то опять скрывается. При этомъ ходъ сыпи иногда бываетъ по временамъ сильное и часто возвращающееся побужденіе ко рвотѣ и самая рвота, извергающая обыкновенно клейковатую мокроту, нерѣдко съ острымъ запахомъ; случается и то, что больные обнаруживаютъ по временамъ очень трудное дыханіе съ сильнымъ спазматическимъ движеніемъ грудной кѣтки. Вообще количество сыпи въ этомъ коревомъ видоизмѣненіи бываетъ умѣренное и имѣетъ цвѣтъ блѣднѣе, нежели въ прочихъ ея видоизмѣненіяхъ. Наконецъ, если корь будетъ имѣть характеръ гнилостный, то всѣ явленія, обнаруживающіяся въ 1-мъ ея періодѣ, бываютъ совершенно одинаковы съ явленіями, свойственными воспалительно-гнилостной горячкѣ. Въ періодѣ высыпанія къ сыпи присоединяются гнилостныя пятнушки, распространяющіяся по груди, рукамъ и ногамъ, причемъ больные обнаруживаютъ всѣ тѣ явленія, какія, обыкновенно, замѣчаются въ полномъ развитіи гнилостной горячки. Въ такомъ случаѣ, если натура или искусство не помогутъ, то больные при развитіи гнилостнаго и вмѣстѣ нерѣдко кровавистаго поноса, постепенно истощаются, и въ теченіе 7, 12 дней умираютъ. Если же сама натура или искусство перепогутъ болѣзнь, то на 8 или 9 день появляется тонкій, обильный, повсемѣстный потъ, мало по малу состояніе больного улучшается, и наконецъ около 12 или 14 дня начинается слупленіе кожицы.

Зам. Корь съ признаками простой горячки называютъ благопріятною, а съ горячкою нервною и гнилостною — злоторною.

Причины внутреннія состоятъ въ общемъ предрасположеніи съ другими лихорадочными сыпями, по которому каждый человѣкъ, преи-

мущественно въ дѣтскомъ возрастѣ, подвергается одинъ разъ въ жизни кори, какъ и оспѣ.

Причины внѣшнія (производящія) состоятъ въ особенномъ *по-
витріи* (міазма) воздуха, преимущественно *весною* и при туманныхъ
земныхъ изверженіяхъ, поражающемъ людей, большею частію, *въ дѣт-
скомъ ихъ возрастѣ*, какъ и оспа; слѣдовательно корь, подобно оспѣ,
зависитъ отъ особенной заразы, которая, какъ и оспенная, зарождается
въ воздухѣ и развивается въ самомъ больномъ и заражаетъ другихъ чрезъ
воздухъ и чрезъ сообщеніе здоровыхъ съ больными; впрочемъ зарази-
тельность кори меньше, чѣмъ заразительность оспы. Она появляется и
часто (спорадически), на отдѣльныхъ лицахъ, и повально, разомъ на
многихъ людяхъ. Вообще однако корьный ядъ слабѣе и летучѣе оспен-
наго, отчего и самая корь бываетъ вообще легче оспы и не можетъ
быть привита, а потому мы не имѣемъ предохранительной кори. Корь-
ный ядъ дѣйствуетъ исключительно на слизистыя оболочки, и потому
поражаетъ носъ, глаза, дыхательное горло и легкія, а въ періодъ вы-
здоровленія — кишѣи (поносъ); оттого особенно часто замѣчается меж-
ду крестьянскими дѣтьми упорный кровавый поносъ, когда ихъ послѣ
кори рано начинаютъ выносить на воздухъ, простуживаютъ и останав-
ливаютъ испарину кожи.

Сущность болѣзни есть общая съ другими лихорадочными сып-
ми; но въ понятіе о сущности должно входить понятіе о сопровождающей
корь горячкѣ.

Распознаваніе. Корь, какъ видно изъ описанія краснухи,
сходна съ нею, а съ другой стороны похожа тоже и на скарлатину;
есть такіе случаи, гдѣ распознаваніе ея отъ этихъ двухъ болѣзней дѣ-
лается затруднительнымъ. Впрочемъ, принимая въ соображеніе всѣ ска-
занные существенные признаки и припадки ея, равно какъ признаки и
припадки сходныхъ съ ней болѣзней, можно различить ихъ другъ отъ
друга. Прыщи кори отъ прыщей оспы отличаются едва примѣтнымъ
возвышеніемъ, притомъ въ концѣ они сдуваются чешуйками;
напротивъ того, прыщи оспы дѣлаются жемчужинами, нагнаиваются,
подсыхаютъ, превращаются въ струпъ и спадаютъ. Лихорадка, кашель,
трудность въ дыханіи не только не проходятъ послѣ высыпи, какъ это
бываетъ въ оспѣ, но еще и умножаются; однако рвота обыкновенно
перестаетъ; сверхъ того примѣчается кашель и невольное слезотеченіе
въ кори, чего въ оспѣ не встрѣчается.

Предсказаніе вообще *относительно опасности* для жизни за-
виситъ отъ степени развитія болѣзни и ея видоизмѣненій, такъ что
опаснѣе всѣхъ корь энцефалитная и нервная (неправильная, злотор-
ная), *менѣе опасна умѣренная-воспалительная* (правильная, благо-
творная); *относительно продолжительности* — корь *долѣе 12 или
14 дней не продолжается*. Въ частности же умѣренное испражненіе
низомъ, влажность кожи, обильное отдѣленіе мочи составляютъ *при-
знаки благоприятнѣйшіе*; но если лихорадка и трудность дыханія

продолжительны и при этомъ показываются пурпуровыя пятна, то это считаютъ *признакомъ неблагопріятнымъ*. Внезапное же скрытіе внутрь сыпи и появленіе въ слѣдъ затѣмъ бреда у больного означаетъ *величайшую опасность*. Когда красныя прыщики начинаютъ блѣднѣть прежде шестаго или седьмаго дня, когда больной въ сильной слабости подверженъ рвотѣ, безпокойству (ворочанью) и трудности въ глотаніи, тогда эти признаки должно почитать *неблагопріятными*. *Пурпуровыя или черныя пятна*, появляющіяся во время высыпи, очень *опасны*; безпрестанный кашель, соединенный съ охрипlostью въ концѣ болѣзни, заставляетъ опасаться чахотки. *Умираютъ* въ этой болѣзни, большею частію, *въ 9 день*, преимущественно *отъ воспаленія легкихъ*. Почти половина и даже $\frac{2}{3}$ корьныхъ дѣтей умираетъ отъ послѣдствій кори по невѣдѣнію родителей, что ихъ дѣти имѣли корь, и по недосмотру за дѣтьми при выздоровленіи.

Исходы или *въ здоровье*, или *въ другія болѣзни*, или *въ смерть*. Болѣзни, въ которыя она переходитъ, слѣдующія: 1) воспаленія внутреннихъ съ ихъ послѣдствіями, т. е. нагноеніемъ и сывороточнымъ отложеніемъ; 2) подкожная водянка, хотя эта болѣзнь бываетъ несравненно рѣже въ кори, нежели въ краснухѣ и скарлатинѣ.

Лѣченіе *діететическое* противъ кори требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Такъ какъ *корь* составляетъ, большею частію, доброкачественную сыпь, то, если она правильно-умѣренная и не сопровождается смертностію между жителями, не требуетъ никакихъ особенныхъ средствъ, кромѣ содержанія, общаго всѣмъ, одержимымъ бакою либо изъ лихорадочныхъ сыпей, больнымъ; потому что корь, оспа, скарлатина и судорожный кашель, какъ болѣзни, требующія для полнаго своего развитія и окончанія опредѣленнаго времени, не могутъ быть прерваны, остановлены или сокращены въ своемъ ходѣ и лѣчатся одною натурою больного. Но когда болѣзнь эта уклоняется отъ правильнаго своего хода и бросается на разныя внутренности, причиняя въ нихъ воспаленіе, когда она принимаетъ характеръ нервной, или гнилостной горячки, словомъ, *когда корь злокачественная* господствуетъ повально и сопровождается значительною смертностію въ народѣ, тогда нужно сверхъ того *предохранять отъ нея дѣтей*: *удаленіемъ сообщенія здоровыхъ съ больными и содержаніемъ ихъ дома въ сухой, чистой, умѣренно теплой комнатѣ, безъ выхода на наружный, сырой, съ качествомъ повѣтрія воздухъ*; а противъ внутренняго предрасположенія къ этой болѣзни, состоящаго въ изобильной пасочности со стороны ихъ тѣла, д-ръ Дядьковскій совѣтуетъ давать мочегонныя, бальзамическія средства, *баковы настои и отвары изъ можжевельныхъ ягодъ, равно какъ и самаго можжевельнаго дерева, и воду бургундской смолы* *) (варь), которую также можно готовить, какъ и дегтярную (№ 70) съ тою разницею, что эту смолу или варь предъ

*) Практическая медицина Пр. Дядьковского книга 3 стр. 7 стр. 31.

соединеніемъ съ водою должно разогрѣть и сдѣлать жидкимъ, какъ деготь. Пить эту воду можно давать по рюмкѣ и болѣе, смотря по возрасту, два, три и четыре раза въ сутки. Докторъ Грумъ рекомендуетъ въ этомъ случаѣ сѣру, какъ предохранительное средство, которую докторъ Туртуаль прописываетъ въ слѣдующей формѣ: взять сѣрныхъ цвѣтовъ $3\frac{1}{2}$ золотника, сахара въ порошокъ 7 золот., давать отъ 2 до 3 разъ въ день, менѣе, чѣмъ по $\frac{1}{4}$ чайной ложечки *) 2). Одержимаго же корью больного столько же нужно *содержать безвыходно въ постели, на тюфякѣ, подъ шерстянымъ одеяломъ, летомъ два, а зимою три недѣли, на свободѣ и въ прохлаждѣ, при температурѣ 15° по Реом. какъ и въ натуральной оспѣ, равнымъ образомъ пища должна быть легкая, одинаковая, какъ и въ послѣдней, съ тою разницею, что кислыя вещества не такъ хороши въ кори, какъ въ оспѣ, потому что могутъ усилить кашель, даже тонкое полпиво въ оспѣ превосходное питье, а въ кори оно не годится. Приличнѣйшимъ *питьемъ* въ кори могутъ быть *отвары изъ корней: солодкового, рожжи, проскурняка, женьшеня, настоя съ льнянымъ сѣменемъ, липовыми и бузиновыми цвѣтами, съ мятою, пропущенная сывортка, яичная вода и т. п.* 3) *Въ случаѣ запора* каждое *питье* надобно *подслащать медомъ, либо патокою*. Если медъ и патока въ сыромъ видѣ противны желудку больного, то нужно ихъ отваривать, причѣмъ во время кипѣнія снимать и выбрасывать съ поверхности пѣну. 4) Въ комнатѣ, гдѣ лежитъ больной, въ облегченіе страданія глазъ необходимъ *слабый свѣтъ*. Для этого лучше всего занавѣшивать окна зелеными толстыми двойными столами и др. под. 5) *Выздоровѣвшіе* отъ кори больные *должны еще нѣсколько времени быть осторожны въ выборѣ пищи и питья*; всего *лучше имъ продолжать ту же діету* относительно пищи и питья *по выздоровленіи, до совершеннаго ихъ укрѣпленія въ силахъ*, а всего болѣе они *должны опасаться выходить скоро на холодный воздухъ*, потому что оттого можетъ произойти удушье съ кашлемъ, одышка или чахотка.*

Лѣченіе *существенное* въ кори должно быть сообразно съ сущностью ея и характеромъ сопутствующей горячки. Но какъ въ кори умеренной, или благотворной, не требуется никакого лѣченія, кромѣ діететическаго содержанія больного, общаго всѣмъ лихорадочнымъ сыпямъ, а въ сильной воспалительной, нервной и гнилостной (злотворной) требуется врачебная помощь съ полнымъ знаніемъ дѣла, то и должно всегда совѣтовать въ такомъ случаѣ, для оказанія врачебной помощи, страдающимъ больнымъ обращаться ко врачу; за неимѣніемъ же его по близости слѣдуетъ ограничиться слѣдующими простыми средствами: *Въ первомъ періодѣ болѣзни*, — когда именно беспокоятъ больного: насморкъ, глаза и кашель, то *глазное воспаленіе умѣряется темнотою комнаты и теплою примочкою глазъ изъ отвара просвиринаго корня, рожжи, льняныхъ сѣмянъ, теплаго молока; кашель — питьемъ ов-*

*) Другъ матерей, часть 1. стр. 120. стр. 25.

ячиаго отвара съ изюмомъ, коринкою, черносливомъ, со-
лдовымъ корнемъ (№№ 113, 114 и 130); а насморкъ облегча-
ють бани, ножныя ванны, состоящія изъ одной теплой воды, или
съ шлокомъ, для успленія дѣйствія, а еще сильнѣе дѣйствуетъ ванна
съ горчицею и солью (№№ 83, 84). Частыя умыванія ногъ и голени
въ теплой водѣ также способствуютъ къ уменьшенію насморка, лихо-
радки и содѣйствуютъ высыпи. Во время высыпанія боль скрывается
отъ простуды, отъ погрѣшности въ діетѣ (объядѣнія), душевнаго возму-
щенія (страха, испуга, гнѣва, и пр.) въ такомъ случаѣ, если у больного
не видно никакихъ воспалительныхъ припадковъ въ горлѣ или груди,
но замѣчается потъ, густая, осадочная моча, или умѣренный поносъ,
то, кромѣ потогоннаго теплаго чая изъ бузины, малины, липы, —
болѣе ничего не нужно дѣлать: натура сама приняла нужныя мѣры для
предотвращенія вредныхъ послѣдствій отъ скрытія сыпи. Но если по-
являются воспаленія горла (трудное глотаніе), легкихъ (трудное ды-
ханіе, колотье), мозга (бредъ, безчувствіе), или желудка, кишекъ
(рвота и сильная боль въ животѣ), то къ больному мѣсту воспаления
припустить нѣявцы и даже пустить кровь изъ вены руки (16—20-
ти лѣтнему больному), поставить горчичники (№№ 88, 89, 90), или
мушку (№ 58), къ икрамъ и рукамъ, тереть все тѣло, особенно
грудь и животъ, нагрѣтою фланелью и раза два въ сутки натирать
теплымъ деревяннымъ масломъ, сдѣлать ножную ванну, можно еще
приложить къ подошвамъ ногъ и къ ладонямъ рукъ горчицу съ тѣ-
стомъ, а внутрь дать селитру съ камфорою (№№ 124, 134). Если
появится сильный поносъ, то его нужно остановить отваромъ изъ
рисовыхъ, ячнхъ крупъ, маковой эмульсіи (№ 87), корня сапена
(№ 132), маковаго масла, по полной чайной ложечкѣ черезъ часъ,
ревеня (№ 32), по маленькому приему чрезъ нѣсколько дней. Врачи
даютъ 4—6 капель опійной настойки 2—3 раза въ день, пока не оста-
новится поносъ, и отбрываютъ кровь *). Часто рвота много облегчаетъ
больного, и потому, когда сама натура производитъ ее, то не нужно
останавливать, а, напротивъ, должно помогать этому выпораживанію
теплою водою, или настоемъ съ ромашковыми цвѣтами. Для облегченія
высыпанію въ гнилостной кори большую услугу можетъ оказать обти-
раніе тѣла теплымъ винограднымъ виномъ, при бѣглому приклады-
ванію къ различнымъ частямъ тѣла хртна, или горчицы, смѣшанной
съ кислымъ тѣстомъ, или съ чернымъ хлѣбомъ **).

Въ періодъ лупленія кожицы, какъ и при подсыханіи осы, нужно
стараться о выведеніи изъ тѣла борьнаго яда поддержаніемъ испаринъ
испражненія низомъ и мочи. Для этого комната больного должна быть
теплой, и онъ долженъ постоянно оставаться въ постели подъ шер-
стянымъ одѣяломъ, пить теплый потогонный и грудной чай, под-

*) Буханъ. См. его Лѣчебникъ томъ 11. стр. 305.

**) Пр. Дядьковский. См. Практич. Медицина, книга 3. стр. 40.

держивать свободное испражненіе низомъ и мочи водою съ кремортартаромъ и маннезією (№ 10). Если при этомъ покажется воспаленіе горла, легкихъ и проч., то за неимѣніемъ врача должно поступать, какъ вообще при воспаленіи этихъ частей (см. выше). Если по очищеніи кожи остается упорный кашель, то нужно продолжать потогонныя средства, теплыя ванны, поддерживать въ нагноеніи мушкету на груди, сзади между лопатокъ положить смоляной пластырь изъ бурзундской смолы (варъ), на голомъ тѣлѣ носить шерстяную, бланелевую рубашку, пить сладкую сыворотку. *) Если этого не достаточно, и кашель нападаетъ все также часто, больной чувствуетъ сухость въ горлѣ и дышетъ тяжело, то надобно ему держать голову надъ паромъ теплой воды и такой же паръ впускать въ себя посредствомъ воронки, а внутрь время отъ времени давать по ложкѣ масла изъ сладкаго миндаля, съ небольшимъ количествомъ распущеннаго въ немъ леденца. Эти средства улаживаютъ грудь и утоляютъ щекотаніе, производящее кашель. Если около того времени, въ которое прыщи кори начинаютъ блѣднѣть, лнхорадка снова усилится, то нужно назначить пустить ему крови столько, сколько позволяютъ его силы, и приложить нарывной пластырь (№ 58) къ яврамъ, для того чтобы матерія кори не пала на легкія, потому что, если хоть однажды сдѣлается въ нихъ воспаленіе, жизнь больного будетъ въ величайшей опасности. Когда появятся пурпуровыя или черныя пятна, то надобно подслащать питье больного кислыми каплями (галлеровъ элексиръ) по 5-ти капель на стаканъ питья. Если этого не достаточно, и признаки гнилости будутъ умножаться, то нужно дать отваръ коры ивы (№ 43), дуба, (№ 45), хины (№ 47). Если это гниlostное состояніе въ кори обнаруживается еще вмѣстѣ съ нервной горячкой, то означенныя отвары должно давать въ соединеніи съ противунервными средствами, какъ то: камфорною (№№ 44, 46, 48) и гофмановыми каплями (№№ 49, 50), или камфору и гофмановы капли давать особѣ отъ отваровъ (№№ 51, 52). Но, главное, не должно упускать изъ вида понятія о сущности сопутствующихъ кори горячекъ, такъ что, если сопутствуетъ ей горячка воспалительная, то при лѣченіи кори нужно принимать сверхъ того въ соображеніе и существенное лѣченіе воспалительной горячки; если сопутствуетъ ей горячка нервная, то примѣнять къ лѣченію кори лѣченіе нервной горячки; а если сопутствуетъ ей гнилая горячка, то имѣть въ виду и руководство лѣченія послѣдней и употреблять всѣ тѣ средства, какія показаны въ существенномъ лѣченіи всѣхъ этихъ трехъ горячекъ: воспалительной, нервной и гниlostной.

Если кашель, трудное дыханіе и другіе признаки чахотки остаются послѣ кори, то полезно дозволить время отъ времени выпускать у больного нѣсколько крови, сверхъ того надлежитъ предписать ему молоко ослицы, жить на чистомъ воздухѣ, ѣздить верхомъ на лошади важ-

*) Д-ръ Чаруковскій. Народная медицина, часть 7-я. стр. 99.

дый день, употреблять *пищу молочную и растительную*, и, если можно, перемѣнить мѣсто жительства въ *теплую страну*.

Въ Таврической губерніи корь, большею частію, бываетъ злобачественная, отъ которой во всякомъ домѣ немногимъ изъ матерей доводится быть столько счастливыми, чтобы не оплакивать одного, или нѣсколькихъ изъ своихъ дѣтей *).

Краснуха.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Краснуха есть лихорадочная сыпь, обнаруживающаяся мелкими макообразными пупырышками, или сосочками, сопровождаемыми другою также макообразною, но бѣлою прыщеватою, бучками сидящею сыпью, при катарральныхъ признакахъ, свойственныхъ кори.

П р и з н а к и, которыми обнаруживается эта сыпь, почти одинаковы, какъ по сущности, такъ и по ходу своему, съ признаками кори и даже простой скарлатины, но отличается отъ нихъ: 1) тѣмъ, что въ краснухѣ никогда не бываетъ такихъ сильныхъ катарральныхъ припадковъ, какіе бывають въ кори; 2) тѣмъ, что въ краснухѣ краснота и опухоль распространяются гораздо ровнѣе и повсемѣстнѣе, нежели въ скарлатинѣ, и 3) тѣмъ, что въ краснухѣ есть особенная мелкая, бѣлая прыщеватая сыпь, не существующая ни въ кори, ни въ скарлатинѣ. Судя по этому, видно, что всѣ эти три сыпи должны быть по натурѣ своей совершенно однородны, и слѣдовательно легко могутъ быть понимаемы, какъ видоизмѣненія одной и той же болѣзни, что, кажется, и не подлежитъ сомнѣнію; но какъ та и другая изъ этихъ болѣзней обнаруживаются своими отдѣльными эпидеміями, какъ это дѣйствительно бываетъ, то и должны быть разсматриваемы, какъ особыя болѣзни.

П р и ч и н ы внутреннія, составляющія особое прѣдрасположеніе къ краснухѣ, не извѣстны, кромѣ общей, свойственной всѣмъ этимъ сыпямъ, пасочности тѣла.

П р и ч и н а вѣшняя (производящая) есть особенное *повѣтріе*, заразительное, міазматическое качество воздуха, происходящее притомъ, по всему вѣроятію, не отъ частныхъ земныхъ (планетныхъ) измѣненій, но отъ измѣненій всеобщихъ мировыхъ содержаній.

Сущность краснухи видимо состоитъ въ *развитіи сказанной пабачности тѣла и отложеніи* ея въ опредѣленномъ лихорадочномъ періодѣ на кожу.

Р а с п о з н а в а н і е какъ отъ кори, такъ и отъ скарлатины, видно изъ предъидущаго.

П р е д с к а з а н і е относительно *опасности* для жизни, большею частію, очень *хорошо*, за исключеніемъ изрѣдка случающихся эпидемій (повѣтрій) ея, отличающихся своею жестокостію и смертоносностію,

*) Др. Здр. 1837 г. № 14, стр. 107.

близко подходящихъ къ жестокости и смертоносности сильной скарлатинной эпидеміи. Что же касается до предсказанія относительно *продолжительности* ея, то оно *также* почти всегда *хорошо*, такъ что болѣзнь эта не продолжается долѣе 12-ти дней, за исключеніемъ очень рѣдкихъ случаевъ, гдѣ она иногда имѣетъ весьма неправильный ходъ и продолжаетъ повторныя свои высыпанія по 2 и по 3 раза и такимъ образомъ продолжается иногда до 3 недѣль и болѣе. Но эти послѣдніе случаи, т. е. когда она имѣетъ неправильный ходъ, указываетъ только отечественный нашъ писатель г. Дьяковскій *).

Исходы или *въ здоровыя*, или въ *другія болѣзни*, или въ *смерть*, общіе всѣмъ лихорадочнымъ сыпямъ, съ тѣмъ только отличіемъ, что краснуха, въ нѣкоторыхъ своихъ повѣтріяхъ (эпидеміяхъ) очень легко переходитъ въ особенную густо-пасочную, подкожную водянку, выражающуюся не мягкою, какъ бываетъ въ обыкновенныхъ подкожныхъ водянкахъ, а, напротивъ, твердою и упругою опухlostью кожи.

Лѣченіе, какъ діететическое, такъ и существенное, подобно лѣченію другихъ лихорадочныхъ сыпей, съ тою только разницею, что въ краснухѣ слѣдующее за нею подкожное, водяно-пасочное отложение требуетъ своего особеннаго лѣченія, отличнаго отъ лѣченія чисто сывороточныхъ подкожныхъ водянокъ, слѣдующихъ за корью и скарлатиною. Особенность эта въ лѣченіи подкожной краснушной пасочной водянки требуетъ употребленія, вмѣстѣ съ мочегонными, средствъ сильныхъ, разрѣшающихъ, разжижающихъ, напр. дѣлать ежедневно для больного *ванну съ поташемъ, солью и травою полыни или божьего дерева*, либо *душицы* (№ 179) на 8—15 минутъ, а пораженные подкожною водянкою части, особенно послѣ ванны, натирать *нашатырнымъ спиртомъ и спиртомъ богородской травы*, взятыми по равной части. Для внутренняго же употребленія даютъ *отваръ крапивнаго съмени* (8 золотн. сѣм. въ 1 фунтѣ воды кипятить до остатка $\frac{2}{3}$ фунта жидкости и процѣдить) по столовой ложкѣ черезъ два часа для 8-ми лѣтняго возраста.

Примѣч. Въ сѣменахъ крапивы специфическое дѣйствіе зависитъ отъ тонкой проницательности летучей остроты.

Скарлатина (красуха).

Опредѣленіе. Скарлатина есть сыпь лихорадочная, обнаруживающаяся разнообразными рожеподобными пятнами, имѣющими на поверхности своей едва замѣтную прыщеватую сыпь, оканчивающуюся вмѣстѣ съ пятнами листовымъ слупленіемъ кожицы.

Признаки, свойственные скарлатинѣ, заключаются въ ея явленіяхъ, а явленія выражаютъ развитіе и ходъ, который раздѣляется на періоды. *Первый періодъ* (періодъ раздраженія, жара) обозначается

*) Практич. медицина книга 3-я, стр. 34, стр. 15.

тѣмъ, что *дитя* слегка *горитъ*, жалуются болѣе или менѣе на *боль въ горлѣ* и *трудное глотаніе* — самый обыкновенный признакъ скарлатины, — причемъ, если посмотрѣть дитяти въ ротъ, то можно замѣтить *красноту* и легкую *припухлость* мягкаго неба; *кожа* бываетъ въ это время очень *суха, горяча*, и больной чувствуетъ *жгучій жаръ*, особенно *въ ладоняхъ*; *глаза* необыкновенно *блестятъ*; *горячечные признаки* усиливаются *къ вечеру*: тогда же дѣлаются *головная боль* и даже *бредъ*. *Второй періодъ*, т. е. высыпанія, отличается слѣдующимъ: на 2—3 день лихорадки показываются сперва на верхнихъ частяхъ тѣла *пурпуровыя* или кармазиноваго цвѣта *пятна*, величиною сперва въ монету *четвертакъ*, а потомъ въ *цѣлковый*. Если придавить такое пятно пальцемъ, то, по отнятіи пальца, на мѣстѣ придавленія краснота пятна тотчасъ исчезаетъ, но сдѣлавшееся при этомъ бѣловатое пятно вскорѣ опять краснѣетъ отъ окружности своей къ срединѣ, подобно тому, какъ это бываетъ и въ *рожѣ*; *пятна* эти *зудятъ* и производятъ чувство жара и жжения; вскорѣ они распространяются, постепенно сливаются, и поверхность тѣла покрывается равномерною краснотою: тутъ говорятъ: «*дитя красно какъ варенный ракъ*». Впрочемъ краснота бываетъ иногда такъ слаба, что едва замѣтна, и лишь слупленіе кожи въ послѣдствіи доказываетъ, что у дитяти была скарлатина. Этотъ *періодъ* продолжается *дня два или три*. *Третій періодъ*, т. е. созрѣванія, состоитъ въ томъ, что краснота тѣла бываетъ въ полномъ своемъ развитіи и силѣ въ продолженіе нѣкотораго времени. Этотъ періодъ отличенъ по жестокости *горячки*: тогда дитя очень *горитъ*, глаза не могутъ выносить *свѣта*, *вѣки распухаютъ*; *по краснотѣ кожи*: кожа горяча, красна, гладка, лоснится; *по жабѣ*: во рту большая краснота и поверхность рта покрывается кое-гдѣ бѣловатыми пленками; глотаніе очень трудное. Этотъ періодъ продолжается также *день или два*; въ теченіе этого періода скарлатинная *жаба* чаще всего бываетъ очень *сильна* и *опасна*. *Четвертый періодъ*, т. е. слупленія, начинается около 9-го дня со времени появленія болѣзни и отличается тѣмъ, что скарлатинная *краснота исчезаетъ*, *кожица* на тѣлѣ сморщивается и *отдѣляется* въ видѣ перепонокъ различной величины, малыхъ или большихъ; или же *кожица только шелушится*, и кусочки ея отпадаютъ *въ видѣ отрубей*. Это слупленіе продолжается нѣсколько дней, и иногда на одномъ и томъ же мѣстѣ возобновляется по нѣскольку разъ: моча имѣетъ осадокъ, какъ бы составленный изъ отрубей или влчковъ. Таковъ *натуральный, правильный ходъ скарлатины*.

Раздѣленіе. Но какъ вся важность скарлатины зависитъ отъ многихъ случайныхъ обстоятельствъ, именно: отъ свойства ея, степени горячечныхъ припадковъ, присутствія воспаленія, напора крови къ головѣ, къ легкимъ, припадковъ нервной горячки, упадка и истощенія силъ и изнуренія тѣла, расстройства пищеваренія, особенно запора на низъ, то во всѣхъ этихъ случаяхъ ходъ скарлатины бываетъ болѣе или менѣе различенъ, и потому она, будучи подвержена разнымъ видоизмѣ-

неніямъ, бываетъ 1) по свойству: *доброкачественная*, когда проходитъ свои періоды правильно, своевременно, сопровождается свойственными ей припадками, и всегда оканчивается благополучно безъ лѣченія, съ надлежащими предосторожностями; и *злокачественная*, когда она является съ необыкновенными припадками, высыпаетъ не хорошо, или скрывается и производитъ воспаленія въ мозгу, въ легкихъ, въ кишкахъ и т. д., и почти всегда оканчивается смертью. 2) По степени развитія горячки скарлатина бываетъ *простая*, когда признаки горячки, находясь одни и сопровождая ее въ обыкновенномъ своемъ видѣ, дѣлаютъ ее безопасною, какъ бы ни была сильна сыпь, судя по краснотѣ кожи и силѣ горячечныхъ припадковъ, и *сложная*, когда сверхъ того являются признаки воспаленія какой-либо внутренности, особенно воспалительнаго страданія мозга, легкихъ, кишекъ и преимущественно зѣва (скарлатинная жаба), которая опасна и трудно лѣчима. 3) Скарлатина *съ полнокровіемъ*, когда являются признаки напора крови къ головѣ и легкимъ. 4) Скарлатина *нервная*, когда обнаруживаются явленія нервной горячки. 5) Скарлатина *тифозная*, когда являются упадокъ и истощеніе силъ и изнуреніе тѣла. 6) Скарлатина *желудочная* (гастрическая), если ей сопутствуетъ разстройство пищеваренія, особенно запоръ на низъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе тѣла къ скарлатинѣ есть общее съ другими лихорадочными сыпями. Оно уничтожается у тѣхъ, кто уже имѣлъ ее однажды, но не такъ совершенно какъ въ оспѣ и кори, и потому скарлатина бываетъ иногда по два раза у одного и того же человѣка. Нерѣдко случается, что въ одномъ и томъ же семействѣ одни изъ дѣтей заболѣваютъ скарлатиною, во время ея повальнаго господствованія, а другія нѣтъ, не смотря на вліяніе однихъ и тѣхъ же причинъ, со стороны образа жизни и обстоятельствъ. Изъ этого и заключаютъ, что не всякое дитя одинаково заражается скарлатиною, но что къ воспріятію ея оно должно уже имѣть въ своемъ тѣлѣ особое расположеніе къ тому.

Причины внѣшнія (производящія) *двухъ родовъ*: первоначальная, состоящая *въ воздушной* заразѣ (повѣтріе, міазма) и послѣдовательная, которая развивается потомъ въ больныхъ и состоитъ *въ особенной, свойственной сыпи заразѣ*. Вообще скарлатина господствуетъ повально между дѣтьми всѣхъ возрастовъ весною и осенью, а въ прочія времена года она появляется иногда, но не повально, а отдѣльно; притомъ скарлатинная зараза поражаетъ преимущественно горло и кожу рожевиднымъ воспаленіемъ, которое, подобно рождѣ, удобно перемѣняетъ мѣсто, останавливается испарину, и потому легко причиняетъ водянку.

Сущность состоитъ *въ развитіи* особеннаго качественного, свойственнаго этой сыпи, *насочно-сывороточнаго состоянія* и послѣдующихъ за тѣмъ *отложеній на кожу*, сопровождаемыхъ болѣе или менѣе развитымъ, *лихорадочнымъ состояніемъ* и часто *жабою*.

Распознаваніе, кромѣ сказанныхъ легчайшихъ видоизмѣне-

ний этой сыпи, очень *удобно* по свойственнымъ ей признакамъ и признакамъ. Впрочемъ и тамъ, гдѣ она бываетъ необыкновенно легкою, распознаваніе по присутствію эpidеміи совершенно удобно.

Предсказаніе относительно *опасности* для жизни зависитъ отъ *степени* развитія скарлатины и особеннаго качества *видоизмѣненій*, такъ что скарлатина легкая, доброкачественная, равно какъ и скарлатина простая горячечная, даютъ предсказаніе всегда хорошее: напротивъ, скарлатина сильная, сложная, злокачественная, равно и пылющая характеръ нервный или гнилостный (тифозный), или нервно-гнилостный, даютъ предсказаніе или опасное, или и совершенно безнадёжное. Что же касается до предсказанія относительно *продолжительности*, то оно *всегда хорошо*, такъ что болѣзнь эта при самомъ запутанномъ ходѣ своемъ, *редко* продолжается *больше 3 недѣль*, въ противномъ же ходѣ она *не* продолжается *долже 12-ти дней*. Но главное нужно знать, что скарлатина вообще очень *измѣнчива*, измѣнчивѣе оспы и кори, и самая *обманчивая* болѣзнь; иногда она бываетъ такъ легка, что изъ сотни больныхъ ни одинъ не умираетъ; въ другое время смертность отъ скарлатины бываетъ какъ отъ чумы, т. е. едва четвертый выздоравливаетъ. Въ частности: то она убиваетъ въ 12—24 часа, подобно пострѣлу, то причиняетъ смертельное воспаленіе мозга, помертвѣніе въ горлѣ (гнилая жаба), водяную болѣзнь; то, напротивъ, течетъ такъ тихо, что даже не видно на больномъ никакой сыпи и о самой скарлатинѣ можно заключить изъ того, что у больного начинается шелушиться кожа и появляется отѣкъ; даже легкая скарлатина, во время лущенія кожи, вдругъ можетъ обратиться на мозгъ, произвести въ немъ водяную болѣзнь и окончиться въ нѣсколько дней смертію. Въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣти умираютъ отъ жабы съ помертвѣніемъ, они умираютъ собственно отъ скарлатины, хотя бы ее до того и нельзя было замѣтить.

Исходы или *въ здоровье*, или *въ другія болѣзни*, или *въ смерть*. Въ здоровье очень легко переходитъ въ низшихъ степеняхъ развитія, и притомъ такъ, что одержимые ею остаются на ногахъ во всё время ея теченія. Болѣзни, въ которыя она переходитъ, слѣдующія: 1) подожная и другіе виды водянки (большею частію отъ простуды во время скупленія кожицы); 2) изъязвленіе зѣва, оканчивающееся нерѣдко смертельнымъ омертвѣніемъ; 3) хроническій поносъ, сопровождаемый упадкомъ пищеварительныхъ силъ. Смерть происходитъ либо при посредствѣ этихъ болѣзней, либо по причинѣ воспаленій, производимыхъ переносомъ ея на благородные внутренніе органы, либо наконецъ по причинѣ изнуренія, производимаго ею въ видоизмѣненіяхъ ея: нервномъ, гнилостномъ и нервно-гнилостномъ.

Лѣченіе *діететическое* требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Если скарлатина господствуетъ *пояльно*, то должно дѣтей *содержать дома безвыходно* и не допускать *сообщенія* больныхъ съ здоровыми. 2) Сверхъ того въ предохраненіе отъ зараженія дѣтей повальнойю

скарлатиною, или отъ опасной смертности въ слѣдствіе этой болѣзни, должно давать дѣтямъ *сонную одуру* (белладона). Она находится въ такомъ же почти отношеніи къ скарлатинѣ, какъ предохранительная (прививная настоящая) оспа къ натуральной. Лучше всего давать корень белладоны въ порошокъ по $\frac{1}{10}$ или $\frac{1}{4}$ доли грана (смотря по возрасту) на приемъ поутру и вечеромъ въ теченіе цѣлой недѣли (№ 180). Гүфеландъ прописывалъ 1 гранъ экстракта белладоны на 7 золотниковъ коричневой воды: дѣтямъ до 3-хъ, 4-хъ лѣтъ давать въ теченіе дня по 5-ти капель (по 1, 2 и 3 капли на приемъ утромъ и вечеромъ) а тѣмъ дѣтямъ, которые старше этого возраста, прибавлять къ этому приему по 1 капль, соотвѣтственно числу лѣтъ. Вообще, по мнѣнію врачей, белладона дѣйствительнѣе въ меньшихъ приемахъ, чѣмъ въ большихъ. Утверждаютъ, что если при употребленіи белладоны покажутся болѣзненные припадки, похожіе на первоначальные признаки скарлатины, т. е. если покраснѣетъ кожа, то это есть вѣрный признакъ, что у такихъ дѣтей уже уничтожилась восприимчивость къ зараженію, и что не слѣдуетъ продолжать употребленіе сонной одури. Частое, сколько возможно, *обмываніе* всего тѣла *разведенною уксусною кислотою*, составляетъ, по увѣренію американскаго врача Вебстера, наилучшее предохранительное средство отъ зараженія скарлатиною. Напитанною въ такой жидкости губкою проводить нѣсколько разъ въ день по всему тѣлу, пока оно совершенно смокнетъ: при этомъ, само собой разумѣется, въ комнатѣ не должно быть слишкомъ холодно, а уксусъ долженъ быть тепловатый. Это средство весьма просто, можетъ быть не ново, но, какъ увѣряетъ Вебстеръ, очень дѣйствительно *) 3). Такъ какъ скарлатина, подобно всякой скоротечной сыпи, должна пройти свои четыре періода въ определенное число дней, что составляетъ единственное условіе, отъ котораго зависитъ благополучный исходъ болѣзни и здоровье дитяти въ послѣдствіи времени, то при лѣченіи скарлатины необходимо лишь помогать природѣ *правильнымъ содержаніемъ дитяти и устраненіемъ* отъ него всѣхъ болѣзнетворныхъ *причинъ*, которыя могутъ произвести случайные болѣзненные припадки, до начала которыхъ отнюдь не рѣшаться ни на какое лѣченіе: одна природа всего лучше совершитъ исцѣленіе этой болѣзни. Для этого нужно одержимое скарлатиною дитя содержать такъ, какъ сказано въ діететическомъ лѣченіи предъидущихъ лихорадочныхъ сыпей, особенно кори. 4) Должно заботиться, чтобы *не подвергнуть* дитя малѣйшей *простудѣ* въ теченіе 3-хъ до 6-ти недѣль со дня появленія болѣзни; иначе сыпь можетъ или скрыться, или не выстояться правильнымъ образомъ, или сопровождаться другими какими либо особыми припадками, или наконецъ перейти въ водяную болѣзнь. 5) *Пища* всего приличнѣе *легкая*, болѣе *жидкая*, чѣмъ твердая, и *однообразная*, напр. *овсянка* одна или съ черносливомъ. Этимъ устранится возмож-

*) Др. Здр. 1851 г. № 28: стр. 123.

ность разстройства пищеваренія, — условіе, очень важное для правильнаго хода болѣзни. 6) *Для питья* должна быть чистая, переваренная вода, подслащенная и всякій разъ нѣсколько подогрѣтая; такая вода всего лучше содѣйствуетъ природѣ къ произведенію перелома болѣзни. Всякія примѣси къ водѣ, особенно кислотатныя, ослабляютъ благотворное дѣйствіе природы. Преимущественно же бесполезно и даже вредно не своевременное и излишнее употребленіе потогоннаго питья, усиливающаго волненіе крови. 7). *Теплота* воздуха въ комнатѣ должна имѣть 16° по Ресм.; но излишнее укутываніе дитяти очень вредно и ослабляетъ его потомъ, а также усиливаетъ приливы крови къ головѣ, отчего количество крови уменьшается во всемъ тѣлѣ и лишаетъ природу возможности произвести рѣшительный переломъ болѣзни чрезъ надлежащее скупленіе кожицы въ послѣднемъ періодѣ сыпи. Нужно стараться только, чтобы ноги постоянно, какъ днемъ, такъ и ночью, были въ теплѣ. 8) *Чаще* должно *смыкать* ближе на чистое и опрятное на больномъ дитяти, а преимущественно постельное: надѣвать бѣлье всякій разъ подогрѣтое, равно какъ простыни и наволочки. Очень несправедливо мнѣніе нѣкоторыхъ врачей, которые полагаютъ, будто рубашка должна оставаться на дитяти во все время продолженія сыпи, даже и въ такомъ случаѣ, еслибы она была замочена и замарана. 9) Въ теченіе сыпи не умывать дитяти и не дѣлать ваннъ. Гораздо лучше держать дитя въ постели, даже и при слабой сыпи, въ продолженіе первыхъ двухъ, трехъ и болѣе недѣль: это предохраняетъ его отъ простуды. 10) Не доводить предосторожностей, особенно мелочныхъ, до крайностей, которыя могутъ имѣть очень вредное вліяніе на здоровье. Если во время скарлатинной сыпи дѣлается маловажный болѣзненный припадокъ, напр. кашель, легкій поносъ, бессонница, то не надобно стараться тотчасъ прекращать ихъ лѣкарствами: припадки эти проходятъ, большею частію, сами собою, между тѣмъ какъ лѣкарства могутъ измѣнить правильность въ ходѣ болѣзни. Если запоръ на низъ продолжается не болѣе дня, или двухъ дней, но оттого видимо усиливаются жаръ, боль головы, то надежнѣе поставить промывательное, чѣмъ давать слабительныя, по той причинѣ, что излишнее послабленіе на низъ также можетъ препятствовать правильному ходу болѣзни.

Лѣченіе существенное въ скарлатинѣ легкой, простой, доброкачественной не требуется, а злокачественная, сложная, въ первые дни своего появленія требуетъ тщательнаго методическаго лѣченія, возможнаго лишь для врача, за неимѣніемъ котораго въ этомъ случаѣ полезно употреблять слѣдующія простые средства: если причиною злокачественности скарлатины есть недостаточное выступленіе въ извѣстное время скарлатинной красноты по всему тѣлу, и если бываютъ оттого сильный жаръ, судороги, рвота, жестокая боль головы, бредъ, бессонница, безпокойство, то полезно въ такомъ случаѣ натирать все тѣло довольно теплыми деревяннымъ масломъ и повторить это раза два или три, на голое тѣло надѣть длинную фланелевую или другую кабую шерстяную

рубашку и не снимать ее съ тѣла во все продолженіе болѣзни; кромѣ того прикладывать къ рукамъ, ногамъ и спиѣ, на короткое время, небольшіе *мышечки* изъ тонкой вѣтшки, наполненные мелкою *горчицей*, а въ случаѣ надобности *натирать* ею слегка *руки и ноги*. *Внутрь* давать чрезъ каждые два часа *масло* изъ *сымянъ ртуты* одно, а лучше съ *сиропомъ маковыхъ сымянъ*. Если есть сильная рвота, то поставить къ предсердію одну или двѣ *пѣявицы*. Для отвлеченія крови отъ головы полезно *промывать носъ изъ ромашки* съ надлежащимъ количествомъ *уксуса*; для той же цѣли успешно употребляются и *горчичники*, прикладываемые къ ногамъ, на икры, или къ пяткамъ; только никакъ не должно оставлять горчичника на ногахъ долго, черезъ 10, 20 минутъ непременно нужно снимать ихъ. Часто причиною недостаточнаго высыпанія скарлатинной красноты бываетъ переполненіе кишекъ слизистыми и желчными нечистотами (языкъ не чистъ, во рту горько, кашель), отъ этого помогаетъ *смѣсь*, выписанная изъ аптеки, состоящая изъ $\frac{1}{2}$ *фунта перегнанной воды и полуграна рвотной соли*, которую давать по десертной ложкѣ. Это лѣкарство разрѣшаетъ нечистоты въ кишкахъ, слегка слабитъ, усиливаетъ испарину, ослабляетъ судорожное состояніе и полезно противъ кашля. Если замѣчается сильный приливъ крови къ головѣ, а тѣмъ болѣе страданіе мозга, то необходимо немедленно поставить пѣявицы за ушами, или къ вискамъ, или къ ноздрямъ, или къ предсердію, и вообще поступать такъ, какъ сказано въ лѣченіи воспаления мозга. Какъ только уменьшится раздраженіе мозга и сильная горячка, то нужно прекращать вмѣстѣ съ тѣмъ и употребленіе средствъ, дѣйствующихъ противъ нихъ, т. е. оставлять такъ называемое противувоспалительное лѣченіе. Если же причиною недоброкачественной скарлатины есть нервное состояніе и недостаточность дѣятельности жизненныхъ силъ, что нерѣдко бываетъ у дѣтей слабыхъ, истощенныхъ, худосочныхъ и при приближеніи болѣзни къ третьему ея періоду, то необходимо поступать такъ, какъ сказано въ лѣченіи нервной горячки. Впрочемъ здѣсь нужно дѣйствовать болѣе наружными средствами, усиливающими дѣятельность кожи, именно: натирать тѣло спиртами: камфорнымъ, муравьинымъ; но лучше смачивать куски фланели, либо мягкой суконки, этими спиртами и, обвивая ими тѣло дитяти, содѣйствовать такимъ образомъ, сколько возможно, къ тому, чтобы скарлатина могла совершить свое теченіе правильно, а особенно высыпаніе и скупленіе. Для этой же цѣли докторъ Грумъ совѣтуетъ давать внутрь *микстуру Франки*, которая состоитъ изъ $\frac{1}{2}$ до 1 фунта воды и одного грана камфоры, чрезъ часъ по двѣ столовыхъ ложки. Въ скарлатинѣ тифозной хлориновая вода приносить явную пользу. Ее должно давать чрезъ 2 часа по 5—10—15-ти капель въ столовой ложкѣ малинового сиропа, либо одной воды съ сахаромъ. Если есть признаки сильнаго раздраженія брюшныхъ внутреннихъ, вмѣстѣ съ болью живота, запоромъ на низъ, поносомъ, жжениемъ, то необходимо поставить пѣявицы къ животу (2-хъ или 3-хъ

лѣтнему ребенку отъ 3 до 6 пѣвицъ, а взрослому отъ 6 до 10); кромѣ того нужны еще смягчительныя припарки на животъ (№№ 23, 26, 27, 54, 55, 122 и 151); во всякомъ случаѣ при злокачественной скарлатинѣ необходимо самое точное методическое лѣчение, но и оно остается иногда безъ успѣха. Есть такъ много причинъ, отъ которыхъ зависить злокачественность скарлатины. не состоящихъ во власти врачебнаго искусства, или потому, что онѣ еще не извѣстны, или потому, что ихъ трудно предотвратить, что и самое лучшее лѣчение не въ состояніи преодолѣть зловреднаго дѣйствія этихъ причинъ на больного и тѣмъ спасти его. Отъ злокачественной скарлатины дѣти обыкновенно умираютъ внезапно въ самые первые дни появленія болѣзни: лѣчение же ея одинаково, какъ и въ злокачественной кори, кромѣ пораженія въ ней горла жабою.

Въ скарлатинной жабѣ должно обращать вниманіе на воспаленіе въ горлѣ, отъ степени развитія котораго нерѣдко зависить и самая жизнь ребенка. Чѣмъ сильнѣе воспаленіе въ горлѣ, тѣмъ ощутительнѣе и сильнѣе въ горлѣ боль, затруднительнѣе дыханіе и глотаніе, а потому и надобно всегда имѣть въ виду эти три припада, которые у каждаго больного бываютъ въ различной степени жестокости. Во время повальнаго господствованія скарлатины дѣти обыкновенно начинаютъ жаловаться на боль въ горлѣ, и это даетъ поводъ думать: не скарлатинная ли это жаба. Но какъ скоро замѣчено при скарлатинѣ, что ребенокъ трудно дышетъ, при глотаніи ему особенно сильно першить, и онъ не можетъ свободно пить, а тѣмъ болѣе еще, если совсѣмъ не можетъ пить, то все это ведетъ къ тому заключенію, что горло у ребенка воспалено и распухло. Въ такомъ случаѣ, хотя бы скарлатина была, по видимому, и доброкачественная, нужно тотчасъ изслѣдовать зѣвъ. При легкой жабѣ, которая чаще всего бываетъ въ доброкачественной скарлатинѣ, и которая нерѣдко проходитъ сама собою, вмѣстѣ съ болѣзнію, — достаточно *обвернуть шею фланелью, шерстянымъ платкомъ, сукномъ, чулкомъ и т. п.*; иногда очень полезно давать, но уже взрослымъ дѣтямъ, *вдыхать въ себя паръ изъ чайника, наполненнаго горячимъ настоямъ липовыхъ цвѣтзовъ или бузины, смѣшаннымъ съ уксусомъ, или горячій шалфейный настой на молокѣ*; также равно хорошо заставлять по временамъ *полоскать въ горло теплымъ молокомъ, или ромашковымъ настоемъ на горячемъ молокѣ*. Въ сильной жабѣ, бывающей чаще всего при злокачественной скарлатинѣ, надобно дѣйствовать такъ, какъ сказано въ лѣченіи жабы. Между тѣмъ полосканье не лишнее дѣлать сильнѣе, причеиъ могутъ быть употреблены: *настой розовыхъ цвѣтзовъ съ мукою, или льнянымъ сѣменемъ, шалфей, душица, полевая ромашка, дубовая и ивовая кора въ настояхъ и отварахъ*; если коры нѣтъ, то и самое дерево, разваренное не слишкомъ вѣрно съ льнянымъ сѣменемъ: *наливка изъ черноплыльника, полыни въ маломъ количествѣ, въ соединеніи съ отваромъ изъ муки или изъ льнянаго сѣмени*. Полезны также въ этомъ случаѣ *полосканья добтора*

Чаруковского (№№ 140 и 141). При сильномъ воспаленіи зѣва поставить *піявицы* (отъ 2 до 4 и болѣе, смотря по возрасту) къ верхней части шеи и наблюдать за тѣмъ, чтобы не только не текло много крови по отпаденіи піявицъ, но, напротивъ того, тотчасъ же остановить ее, и лучше въ случаѣ надобности повторить приставленіе піявицъ, чѣмъ допустить, чтобы крови вышло неопредѣленное количество, перѣдко опасное для здоровья. По остановленіи крови положить вокругъ шеи тряпочку, намазанную *казанскимъ желтымъ мыломъ*, но такъ, чтобы она кругомъ обхватывала шею вверху; въ самую же шею втирать деревянное масло, въ которомъ распустить напередъ нѣкоторое количество камфоры. Въ упорномъ случаѣ воспаленія, поставить на затылокъ *горчичникъ* (№№ 88, 89 и 90) и даже *лушку* (№ 58), но относительно послѣдней надобно поступать осторожно. Здѣсь же полезны *промывательныя* изъ *мыльной воды, масла и поваренной соли*. Если, по видимому, сдѣлался въ горлѣ нарывъ, то полезно обкладывать шею вдвое сложенными *тряпками*, смачиваемыми въ *тепломъ деревянномъ маслѣ*, а равно *вдыхать* въ себя мягчительные *пары*, какъ сказано выше. Припарки тутъ неумѣстны, потому что при всякой неосторожности можно ими простудить горло.

Въ злобачественной скарлатинѣ, при упадкѣ силъ и страданіи брюшныхъ внутренностей, воспаленіе зѣва (скарлатинная жаба) переходитъ иногда въ омертвѣніе, самое опасное и отчаянное состояніе. Тутъ крайне необходимы внутреннія лѣкарства, которыя впрочемъ, по боли горла и невозможности глотанія, употреблять трудно, а потому и остается одна надежда на *полосканія* горла изъ *отвара хинной корки* (5 зол. на 1 фун.) съ прибавленіемъ 10-ти капель *соляной кислоты и рюмки розоваго меда*. Въмѣсто хинной корки, можно брать *настояй шалфея*, или смазывать во рту и горлѣ кисточкою, обмакиваемою въ *смѣсь* изъ столовой ложки *розоваго меда* и такого же количества разжиженной *соляной кислоты*.

КЛАССЪ ТРЕТІЙ.

ЛИХОРАДКИ ВООБЩЕ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Подъ именемъ лихорадокъ вообще разумѣются тѣя лихорадочныя болѣзни, которыя, обнаруживаясь общими лихорадочными признаками, не сопровождаются ни въ началѣ, ни въ срединѣ своего развитія, какимъ либо однимъ постояннымъ мѣстнымъ матеріальнымъ измѣненіемъ, какъ это бываетъ въ сыпяхъ лихорадочныхъ и катаррахъ.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Главное дѣленіе лихорадокъ вообще состоитъ въ томъ, что онѣ бываютъ: непрерывныя, собственно такъ называемыя

горячки, и перемежающіяся, собственно такъ называемыя *лихорадки*. Горячки отъ лихорадокъ отличаются извѣстною продолжительностію лихорадочныхъ періодовъ. Въ лихорадкахъ всѣ періоды почти равны между собою, такъ что сколько времени продолжается періодъ озноба, столько же, или нѣсколько болѣе и менѣе, продолжаются періоды жара и пота. Въ горячкахъ, напротивъ, періодъ жара продолжается несравненно долѣе другихъ. Различіе это явственнѣе можно видѣть изъ описанія тѣхъ и другихъ порознь.

Горячки.

Опредѣленіе. Горячки такія болѣзни, въ которыхъ періодъ жара бываетъ почти непрерывный, а періодъ озноба очень кратковремененъ; то и другое оканчивается безвозвратно, вмѣстѣ съ уничтоженіемъ припадковъ, если вновь не будетъ дѣйствовать производящая причина.

Раздѣленіе. Главное дѣленіе горячекъ основывается на разности вѣдшихъ производящихъ причинъ и внутренняго предрасположенія тѣла, такъ что люди съ тѣлосложеніемъ нѣжнымъ, раздражительнымъ и чувствительнымъ легче подвергаются горячкѣ нервной; съ тѣлосложеніемъ слабымъ, вялымъ — болѣе горячкѣ гнилой; съ тѣлосложеніемъ крѣпкимъ — горячкѣ воспалительной; по этому три вида наичаще случающихся горячекъ: 1) воспалительная, 2) нервная 3) гнилая.

Лѣченіе. Чернь на Уралѣ отъ всякихъ горячекъ въ началѣ лѣчится *горячимъ квасомъ*: обыкновенно заболѣвшаго поятъ послѣднимъ, и если онъ отъ двухъ или трехъ стакановъ не пропотѣетъ, то прибавляютъ къ квасу одну ложку *кухонной соли*; этимъ средствомъ нерѣдко останавливаютъ дальнѣйшее развитіе горячки. Вообще уральскіе заводскіе жители кормятъ одержимыхъ горячками *взваромъ*, приготовленнымъ изъ *сухой малины*, или *сухой вишни*, съ *медомъ*, или съ *изюмомъ* и *другими сладкими ягодами*, или *варятъ клюкву* и *бруснику* съ *водою*, прибавивъ къ этому иногда часть *душицы* или *лобазника*. Эту траву охотно пьютъ вмѣсто чая отъ простуды. Тамъ чернь очень любитъ лобазникъ и изъ него дѣлаютъ *травяное пиво съ смородиными листомъ* (черной смородины); эту смѣсь онѣ называютъ *травникомъ*. Отъ неумѣреннаго употребленія этого пива часто бываетъ поносъ, и нерѣдко кровавый *). Это простое лѣченіе въ родѣ того пріятнаго питья, какое Гюфеландъ предлагаетъ для одержимыхъ горячкою вообще: взять лотъ *виннаго камня*, варить его въ новомъ горшкѣ съ 6-ю фунтами (1½ штофа) воды до тѣхъ поръ, пока винный камень разойдется; снявъ съ огня, прибавить къ жидкости наръзаннаго *лимона* и нѣсколько лотовъ *сахара*, потомъ разлить ее въ бутылки для употребленія. Также свѣжая холодная *вода* съ малымъ количествомъ *коровьяго молока* вообще для нѣкоторыхъ горячечныхъ больныхъ, особенно дѣтей и жен-

*) Ш. Л. Нечаевъ см. др. здр. 1834 г. № 5. стр. 117.

щипъ, очень пріятна. Ничто такъ не освѣжаетъ впавшихъ въ изнеможеніе, и не облегчаетъ умирающихъ, какъ частые, небольшіе глотки свѣжей воды *). Простонародное, очень дѣйствительное лѣченіе горячечныхъ припадковъ состоитъ еще и въ слѣдующемъ: взять столовую ложку прованскаго масла, смѣшать съ чайною ложечкою лимоннаго сока, подсластитъ сахаромъ и давать больному по такому пріему утромъ и вечеромъ. При этомъ прикладывать, перемѣняя, какъ высохнутъ, — къ вискамъ *распластованную сырую говядину* или *мочения селедки*, — къ запястьямъ (на пульсъ) наръзанные ломотками *соленые огурцы*, и къ подошвамъ *глину*, смѣшанную на подобіе тѣста съ *укусомъ* или *тертую ртуть* **). Въ Казанской губерніи, Ланшевскаго уѣзда, въ селѣ Черемышевѣ, въ мартѣ мѣсяцѣ 1844 года, свирѣпствовали горячки, которыя я пользовалъ съ отличнымъ успѣхомъ при діетическомъ содержаніи въ теплѣ 18° по Реом. на одной кашницѣ съ лучшимъ пшеничнымъ хлѣбомъ, употребленіемъ въ питье теплаго *настоя* изъ *шалфея* съ *бузиною*, взятыхъ по ровну ***). *Примѣч.* У большей части авторовъ въ числѣ горячекъ значутся: ревматическая и катарральная; но ревматическая горячка есть лихорадочный ревматизмъ, а катарральная горячка есть лихорадочный катарръ (см. катарръ).

Воспалительная горячка.

Опредѣленіе. Воспалительная горячка обнаруживается быстрымъ, бѣглымъ, но скоро проходящимъ ознобомъ, сильнымъ, почти безъ послабленія продолжительнымъ жаромъ, со всѣми воспалительными признаками, и оканчивается преимущественно сильными кровотечениями и обильнымъ скоропостижнымъ потомъ, словомъ, это та самая болѣзнь, которая наиболѣе случается и въ простонародіи называется собственно горячкой.

Раздѣленіе. Воспалительная горячка бываетъ троякая: 1) Чистовоспалительная; 2) Желчно-воспалительная (желчная); 3) Мокротно-воспалительная (катарральная).

Признаки чистовоспалительной горячки: съ самаго начала дрожь и спланный ознобъ, потомъ такой же жаръ, скорое, горячее, но свободное и безъ боли дыханіе, твердый, какъ натянутая струна, полный и частый пульсъ, горячая, сухая кожа, красный сухой языкъ, сильная жажда и позывъ на холодное, кислое питье, красное лицо, блестящіе глаза, красная острая моча, испражняемая съ жженіемъ и въ маломъ количествѣ, трудное испражненіе низомъ или совсѣмъ запоръ. Всѣ эти припадки дружно къ утру уменьшаются, а къ вечеру усиливаются, причемъ появляется головная боль, а часто и бредъ ночью; въ теченіе

*) Др. Здр. 1834 г. № 18. стр. 141.

**) Др. Здр. 1845 г. № 14. стр. 107.

***) Др. Здр. 1838 г. № 20. стр. 155.

болѣзни замѣчается точность, правильность и порядокъ: она продолжается 7—14 дней; переломъ бываетъ явный, полный, совершенный, чаще густою, осадочною мочою, проливнымъ, теплымъ потомъ или кровотеченіемъ, особенно изъ носа; иногда переходитъ она въ гнилую или нервную горячку. При ней часто происходятъ и мѣстные воспаления, особенно подреберной плевры (колотье), легкихъ (кашель) и мозга (сильный бредъ) и въ такомъ случаѣ лихорадочныя припадки или совсѣмъ не послабляютъ къ утру, или же послабленіе это бываетъ незначительное, и во время его больной нисколько не чувствуетъ себя лучше; притомъ онъ жалуется на какую либо постоянную боль, и въ немъ замѣчается расстройство въ дѣйствіи болящаго мѣста.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Къ этой болѣзни расположены люди крѣпкіе, полнокровные, молодые, 18—55-ти лѣтъ, такъ что чѣмъ болѣе лѣта уходить за полдень жизни, тѣмъ менѣе бываетъ расположенія къ этой болѣзни; — неумѣренна-употребляющіе пищу питательную, питье возбуждающее, живущіе въ мѣстахъ нагорныхъ, сухихъ, гдѣ обыкновенно воздухъ изобилуетъ кислотворомъ; ведущіе жизнь роскошную, праздную, равно дѣятельную, рабочую, особенно на открытомъ воздухѣ, напр. поселяне, темперамента сангвиническаго, болѣе мужнины, нежели женщины.

Причины вѣшныя (производящія) состоятъ во всѣхъ тѣхъ условіяхъ, которыя могутъ разгорячить тѣло и умножить количество крови. Къ числу такихъ условій принадлежатъ: скоропостижное охлажденіе тѣла при предшествовавшемъ разгоряченіи его, что бываетъ чаще зимою, особенно у мыловаровъ отъ необходимости выходить по временамъ на свѣжій воздухъ изъ мастерскихъ во время денной и ночной работы въ сильномъ жару; неумѣренное тѣлодвиженіе, снѣе противъ солнца лѣтомъ (земледѣльцы, жнецы и косцы); продолжительныя сѣверныя вѣтры, особенное повальное состояніе воздуха; простуда, или остановленная испарина отъ употребленія холоднаго питья и лежанія на мокрой сырой землѣ (охотники, рыболовы, скороходы) сгоряча, также отъ хожденія ночью по росѣ, сырмъ болотистымъ мѣстамъ, причемъ холодѣютъ и зябнутъ ноги; неосторожное, не умѣренное употребленіе въ одинъ разъ горячительныхъ напитковъ; быстрое и сильное развитіе возбуждающихъ страстей, особенно при сказанныхъ условіяхъ. Потрясеніе, ушибъ, раны, мѣстное воспаленіе, (нарывъ, вередъ, рожа).

Сущность воспалительной горячки состоитъ въ раздраженіи, въ усиленной дѣятельности кровяныхъ сосудовъ и сердца, въ быстромъ кровообращеніи, въ густотѣ крови, которая легко створаживается, даетъ много печенки — творогу съ плотною, жирною на верху плевкою, мало сыворотки и легко образуетъ перепонки въ полостяхъ тѣла.

Распознаваніе легко, и трудно смѣшать эту горячку съ баюющею-либо другою, особенно по прошествіи 3—4 дней, потому что въ это время припадки ея болѣе и болѣе возрастаютъ, между тѣмъ какъ въ другихъ видахъ воспалительной горячки въ тоже время припадки

воспалительные начинают уменьшаться, и болѣзнь дѣлается наклонною къ переходу въ гнилостное состояніе. Быстрое и сильное развитіе воспалительныхъ признаковъ очень явственно отличаетъ эту горячку отъ другихъ, даже и въ первыхъ дняхъ ея развитія.

Предсказаніе зависить отъ степени развитія болѣзни, такъ что чѣмъ воспалительное состояніе будетъ сильнѣе, и чѣмъ вообще болѣзнь развита въ высшей степени, тѣмъ предсказаніе опаснѣе, и наоборотъ. Продолжается, какъ выше сказано, отъ 7—14 дней.

Исходы: въ здоровье и въ смерть. Больные, въ слѣдъ за уменьшеніемъ силы всѣхъ припадковъ, при видимыхъ критическихъ испражненіяхъ, скоро выздоравливаютъ, не подвергаясь никакимъ послѣдовательнымъ болѣзнямъ. Напротивъ, при исходѣ болѣзни въ смерть, больные впадаютъ въ изнуреніе съ признаками омертвѣнія въ головной, брюшной, грудной системахъ, и въ теченіе 3—4 часовъ умираютъ.

Лѣченіе діететическое чисто-воспалительной горячки требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Въ предохраненіе* себя отъ этой болѣзни должно *содѣйствовать избѣганію* всѣхъ вышеозначенныхъ причинъ, *производящихъ* эту болѣзнь. всѣмъ юношамъ, сангвиническаго темперамента и крѣпкаго тѣлосложенія, ведущимъ жизнь рабочую на открытомъ воздухѣ, какъ-то: земледѣльцамъ, жнецамъ и косцамъ, охотникамъ, рыболовамъ, скороходамъ и мыловарамъ, (для всѣхъ этихъ рабочихъ поселянъ изложены, сверхъ того, правила въ особомъ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію) равно какъ и живущимъ въ мѣстахъ возвышенныхъ, сухихъ — нагорныхъ 2) *Одержимаго* этою болѣзнію больного должно *содержать въ прохладной комнатѣ*, имѣющей не болѣе 13° или $13\frac{1}{2}^{\circ}$ по Реом. теплоты; въ комнату надобно впускать, особенно въ теплую погоду, свѣжій воздухъ, но только съ нужными предосторожностями, чтобъ больному не было холодно, и чтобъ онъ не простудился. Кутать его одѣялами, подъ предлогомъ возбудить потъ и защитить его отъ холода, вредно; это обыкновеніе умножаетъ жаръ въ тѣлѣ, утомляетъ больного и не только не помогаетъ испаринѣ, но еще препятствуетъ ей. Постель больного должна состоять изъ холщеваго или кожанаго тюфяка, набитаго шерстью, сѣномъ, соломой, (но не перьями или пухомъ), изъ ваточнаго, или шерстянаго не тяжелаго одѣяла, подшитаго холстомъ, и изъ головной подушки, набитой перьями или сѣномъ. 3) Для прохладженія *комнаты* надобно *опрыскивать* ее *уксусомъ* и лимоннымъ сокомъ, или *уксусомъ* и *розовою водою*, за неимѣніемъ этихъ средствъ хорошо и одною *ключевою водою*, либо съ небольшимъ количествомъ распушенной въ ней селитры. Это опрыскиваніе нужно повторять нѣсколько разъ въ день, особенно въ жаркую погоду. 4) *Ротъ* больного можно *прохлаждать*, давая ему *чаще по глотку смѣси* изъ *воды и меду*, съ прибавленіемъ *нѣскольکو уксуса*, либо *отвара винныхъ ягодъ въ ячмѣйной водѣ*. Больной долженъ принимать эти жидкости холодными и перекачивать каждый глотокъ во рту, пока согрѣется, а потомъ выплунуть; это повторять чрезъ каждыя полчаса,

чрезъ часть, чаще или рѣже, какъ ему покажется лучше. Съ этою цѣлью онъ можетъ *сосать мякоть ломтика лимона*, жевать мякоть облупленного *померанца*, жилки котораго онъ долженъ выбрасывать, также *желе смородиновой и яблочной*; но чѣмъ болѣе больной будетъ пить, тѣмъ меньше ему будутъ нужны эти пособія. 5) Если силы больного позволяютъ, то ему *можно время отъ времени* дозволить *посидѣть* (эта перемѣна положенія часто производитъ очень хорошія слѣдствія: она облегчаетъ голову, удерживая быстроту, съ какою кровь стремится къ мозгу), но не на долгое время, и если у больного есть расположеніе къ поту, то лучше оставить его лежать, только бы голова его была нѣсколько приподнята посредствомъ подушекъ; причемъ *горизонтальное положеніе въ постели самое лучшее* для больного: оно сильно способствуетъ натурѣ больного произвести благопріятное окончаніе горячки, и потому составляетъ необходимое условіе ея лѣченія. 6) Кромѣ того *больному нуженъ покой и свобода*, онъ долженъ быть, что называется, *на своей волѣ*. Общество, шумъ, все, что можетъ нарушить душевное и тѣлесное его спокойствіе, ему вредно, потому что такое безпокойство производитъ въ дѣлѣ горячечнаго больного тоже что вѣтеръ въ водѣ, именно: волненіе, приливъ, или напоръ крови къ разнымъ частямъ тѣла, особенно къ головѣ и груди; даже самый свѣтъ и все, что поражаетъ чувства, со всѣмъ стараніемъ должно удалять отъ него. 7) *Число* людей, *прислуживающихъ* ему, должно быть самое *малое*, причемъ не надобно перемѣнять ихъ, если они ему нравятся. 8) Благоразуміе требуетъ *лучше удовлетворять его прихотямъ, нежели противиться имъ*. Нерѣдко одно обѣщаніе льститъ ему столько же, сколько бы польстило самая требуемая имъ вещь. 9) *Питіе* больного должно быть *разжижающее* кровь, какъ то: чистая *вода, квасъ, лимонадъ, клюквенный сокъ* съ водою — гречневая, или овсяная, или ячная вода (въ которой варились греча или овесъ, или ячмень) процеженная сыворотка, отваръ изъ яблокъ, все это подкисленное сокомъ клюквеннымъ, брусничнымъ, смородиновымъ, малиновымъ, лимоннымъ, померанцовымъ и т. п., давать пить въ обильномъ количествѣ, сколько больной хочетъ; сыворотка, сдѣланная изъ молока, съ помощью ложки уксуса, или щепотки виннаго камня, либо лимона, или горькаго померанца, которые, изрѣзавъ ломтиками, варятъ въ равныхъ частяхъ молока и воды, пока творогъ осѣдетъ, есть одно изъ лучшихъ питій въ этомъ случаѣ. Въ случаѣ сильной слабости и начинающагося изнуренія больного, когда именно воспалительная горячка угрожаетъ переходомъ въ нервную или гнилостную, очень полезно бываетъ прибавлять къ этому питію изъ сыворотки въ то время, какъ она отварила и творогъ осѣлъ, двѣ или три столовыя ложки бѣлаго вина. Если у больного запоръ, то надо дать ему *кислое питіе изъ кремортартара* Г. Чаруковскаго (№ 178) либо отваръ, сдѣланный изъ 7 золотн. тамаринды, 14-ти золотн. пшюма, двухъ или трехъ винныхъ ягодъ, вареныхъ въ трехъ фунтахъ воды до тѣхъ поръ, пока останется только четвертая часть. Этотъ отваръ обык-

новенно особенно нравится горячечному, и онъ можетъ пить его сколько ему будетъ угодно. Всѣ эти отвары давать пить нѣсколько горячими, притомъ въ началѣ болѣзни порѣже и поменьше, а потомъ, по мѣрѣ того, какъ она продолжается чаще и чаще — больше и больше. 10) Чтожь касается до пищи, то въ этомъ случаѣ натура сама беретъ свои мѣры, отнимая у больного аппетитъ и вселяя даже въ немъ отвращеніе къ пище: она ему вообще вредна, какъ бы ни была легка и мало питательна, потому что во всякомъ случаѣ можетъ поддерживать болѣзнь даже кашница; бѣлый хлѣбъ, вареный въ водѣ, печеные яблоки съ сахаромъ, или сушеный хлѣбъ съ смородинымъ желе, съ непечеными или сваренными салвами бываютъ нужны и дозволяются только въ случаѣ слабости и изнуренія со стороны тѣла больного; главное, при выздоровленіи, во время котораго является позывъ на ѣду, больной долженъ быть воздерженъ; сначала ему слѣдуетъ давать *жидкую пищу*: похлебку съ крупами, овощью, уху съ мелкою рыбой, овсяный супъ съ кореньями: излишняя пища, излишнее питье и излишнее тѣлодвиженіе могутъ повредить ему. Со стороны расположенія духа ему надобно быть покойнымъ и не обременять себя никакимъ тяжелымъ размышленіемъ. Работники, художники, всѣ поселяне, занимающіеся тяжелыми трудами, не должны по выдержаніи этой болѣзни очень рано приниматься за свою работу: имъ надо забыть свои дѣла, пока возвратятъ большую часть своихъ силъ и свою бодрость, — короче сказать, имъ надобно отдохнуть.

Лѣченіе существенное чисто воспалительной горячки, по различію степени ея развитія, бываетъ различно. Эта разница двоякаго рода: будетъ ли развитіе горячки легкое, слабое, или, напротивъ, сильное, тяжелое для перенесенія больного. Въ слабой легкой степени этой горячки вполне достаточно соблюденія правилъ одного выше-описаннаго діететическаго лѣченія, предоставивъ все остальное свободному дѣйствію самой натуры больного, невидимаго нами врача спасителя и благодѣтеля; не должно мѣшать ея спасительнымъ дѣйствіямъ; въ такомъ случаѣ, даже при несчастномъ исходѣ болѣзни, по какому либо непредвидѣнному обстоятельству, совѣсть можетъ быть покойна на тотъ счетъ, что все сдѣлано по крайнему разумѣнію и не можетъ быть упрека себѣ въ неумѣстныхъ распоряженіяхъ и неумѣстномъ лѣченіи. Въ случаѣ же подозрѣнія, почему либо, что эта легкая, слабая степень горячки угрожаетъ сильнымъ ея развитіемъ, труднымъ къ перенесенію для больного, должно давать ему *рисерво* *питие* (№ 62) черезъ часъ по столовой ложкѣ, одно или съ водою. Кромѣ того полезно давать: *минутіе порошки* (№№ 11, 12), *прохлаждающую селитрянную смесь* (№ 144), либо прохлаждающій порошокъ Г. Чаруковскаго. Если отъ селитры появится поносъ, то вмѣсто ея употреблять точно также *нашатърь*. Сверхъ того полезны *ручьи* и *ножныя ванны*. Для этого больному надобно опускать руки и ноги въ теплую воду по нѣскольку разъ въ день, минутъ на 8—10—15, особенно когда болитъ голова. Если жаръ великъ, то надобно въ эту воду прибавить

укуса (около $1\frac{1}{2}$ фунта на ванну) болѣе или менѣе, смотря по обстоятельствамъ. Въ промежутки этихъ ваннъ, повторяемыхъ по крайней мѣрѣ два раза въ день, полезно прикладывать *салфетки* изъ *холста*, или *фланели*, *опущенной въ теплую воду*, къ бедрамъ, къ голенимъ, къ животу больного, а когда высохнутъ, то перемѣнять другими, а къ бокамъ класть *мягчисто-прохлаждающій составъ* изъ *глины*, *укуса*, *тертой моркови*, *личныхъ бычковъ* и *горчицы* (№ 182). Въ сильной степени жестокой горячки, обозначающейся силою припадковъ: полнымъ, твердымъ пульсомъ, сильнымъ палящимъ жаромъ, жестокою болью головы, бредомъ по ночамъ, — главное средство есть *кровопускание*. Но какъ кровопусканіе должно соответствовать степени болѣзни и сложенію больного — обильное повредитъ, а малое не принесетъ пользы, — то поэтому должно совѣтовать въ такомъ случаѣ обращаться къ врачу за совѣтомъ; но гдѣ нѣтъ врача, тамъ при назначеніи кровопусканія нужно руководствоваться слѣдующими правилами: 1) при необходимости кровопусканія (эта необходимость вѣрнѣе всего опредѣляется крѣпкимъ, твердымъ, скорымъ пульсомъ) кровь нужно пускать немедленно, и чѣмъ раньше, тѣмъ лучше; кровопусканіе, даже умеренное и сдѣланное только одинъ разъ, но въ началѣ болѣзни, часто ее совсѣмъ прерываетъ: но когда она усилится и воспаленіе разовьется, то остается безуспѣшнымъ и неэффективнымъ и большее число кровопусканій, 2) крови надобно пускать столько, сколько нужно для одолѣнія болѣзни, не болѣе, но и не менѣе; впрочемъ выздоровѣвшій больной вознаграждаетъ излишекъ выпущенной крови, когда же пущено крови мало, то къ горячкѣ можетъ присоединиться воспаленіе какой-либо внутренности, и тогда выздоровленіе сдѣлается болѣе сомнительнымъ и легко можетъ остаться поврежденіе воспаленной внутренности: нарывъ, отвердѣніе. Мѣриломъ для кровопусканія можетъ быть пульсъ; мѣра выпущенной крови чашками, тарелками или фунтами не вѣрна: для ослабленія болѣзни одному нужно пустить крови 2—3 чашки, глубокую тарелку, фунтъ, другому 3—5 чашекъ, $1\frac{1}{2}$ фунта, а третьему еще болѣе. По этому, когда больному пущена кровь, то нужно взять его руку, во время кровоточенія, наблюдать его пульсъ и пускать кровь изъ жилъ до тѣхъ поръ, пока твердый, крѣпкій и полный пульсъ въ осязываемой рукѣ не сдѣлается мягкимъ; не ослабѣетъ и не упадетъ; впрочемъ, никогда не нужно пускать крови до тѣхъ поръ, пока у больного не появится блѣдность въ лицѣ, шумъ и звонъ въ ушахъ, круженіе головы и даже обморокъ, потому что при обморокѣ останавливается кровообращеніе; а какъ при воспалительной горячкѣ кровь легко ссѣдается, то въ сердцѣ могутъ произойти сгустки крови (полипы) и даже воспаленіе легкихъ. Такъ какъ обмороки легко происходятъ у робкихъ больныхъ, при сидячемъ ихъ положеніи, то кровь всѣмъ больнымъ лучше пускать въ лежачемъ положеніи, въ постели, и остановить теченіе крови, затворивъ пальцемъ отверстіе жилы, какъ скоро станетъ замѣтно, что пульсъ начнетъ слабѣть, упадетъ и даже пере-

межаться. 3) Кровь изъ жилы должна течь быстро, ровною и полною струею, и для этого отверстіе въ жилѣ должно быть достаточно широкимъ. При такомъ кровотеченіи легко спадаются кровяные сосуды отъ опустѣнія, а это спаденіе умѣряетъ горячку и способствуетъ разрѣшенію воспаленія. Медленное кровотеченіе, особенно посредствомъ выжиганія крови изъ вскрытой жилы, мало приноситъ пользы; напротивъ, быстрое кровотеченіе замѣняетъ даже количество выпущенной крови, т. е. фунтъ крови, вытекшей разомъ, скоро и быстро, равняется и даже превосходить дѣйствіе $1\frac{1}{2}$ —2 фунтовъ крови, выпущенной медленно и въ нѣсколько пріемовъ. При другихъ обстоятельствахъ, кровь пускаютъ обыкновенно изъ вены руки, и притомъ лѣвой, спереди, на локтевомъ сгибѣ. 4) Смѣлѣе можно назначать кровопусканіе, если больной 18—35 лѣтъ, полнокровенъ, крѣпокъ, подверженъ частымъ приливамъ крови къ легкимъ (кровохарканію) или головѣ (тяжести и боли головы) и наступаетъ время кровопусканія, къ которому онъ уже привыкъ; если у него прекратилось привычное кровотеченіе изъ носа, задняго прохода (почечуй), мѣсячное очищеніе у женщинъ; если состояніе воздуха и время года располагаютъ къ воспаленію: зима, сильный морозъ, сѣверовосточные вѣтры, сѣверная часть Россіи, — при этихъ условіяхъ тѣло легче переноситъ лишнюю потерю крови; — наконецъ, если являются признаки мѣстнаго воспаленія въ груди (короткій, сухой или съ полосками крови кашель, колотье въ боку при глубокомъ вдыханіи), въ головѣ (дикій взглядъ, блестящіе глаза, сильная боль, бредъ, бѣшенство и проч.). 5) Это же обстоятельство нужно брать въ соображеніе, когда есть сомнѣніе въ необходимости кровопусканія, а вблизи нѣтъ врача, который бы могъ разрѣшить это сомнѣніе. Въ подобныхъ случаяхъ можно поступать такъ во время кровопусканія: нужно внимательно наблюдать пульсъ, и если замѣтно, что онъ начинаетъ упадать, слабѣть, дѣлаться скорымъ, если больной, не оробѣвшій при началѣ кровопусканія, скоро поблѣднѣетъ, получить головокруженіе, шумъ и звонъ въ ушахъ, то, не смотря на малость вытекшей крови, велѣтъ прекратить кровопусканіе. 6) Однако одного кровопусканія иногда бываетъ недостаточно, особенно у людей крѣпкихъ, полнокровныхъ, 30—40 лѣтъ, привыкшихъ къ нему и одержимыхъ притомъ воспаленіемъ въ груди и головѣ: чрезъ 8—12—24 часа послѣ перваго кровопусканія, припадки горячки опять усиливаются; въ такихъ случаяхъ врачи считаютъ нужнымъ открыть кровь въ другой, третій разъ и даже болѣе, если только бываетъ притомъ твердый, крѣпкій пульсъ, а не дѣлается мягкимъ, скорымъ и слабымъ, и если, сверхъ того, выпущенная кровь бываетъ густа, скоро створаживается и покрывается плотною, жирною, бѣлоблестящею пленкою, хотя, впрочемъ, послѣдняя и не всегда указываетъ на необходимость новаго кровопусканія. *Зам.* Въ настоящее время врачи и не врачи и самые больные часто во зло употребляютъ кровопусканіе, увлекаясь въ этомъ случаѣ скорымъ облегченіемъ, которое оно доставляетъ; но эта временная поль-

за часто бываетъ минимая, и такіе люди въ послѣдствіи много страдаютъ отъ потери крови, которая въ ихъ опустѣлыхъ сосудахъ раздѣляется неравномѣрно; въ одномъ мѣстѣ накапливается больше, причиняетъ тяжесть, жаръ, боль и дѣлаетъ необходимымъ новое кровопусканіе (излѣчивая настоящую, мѣстную болѣзнь, усиливаетъ общее страданіе), а въ другомъ мѣстѣ крови бываетъ очень мало, сосуды его пустѣютъ, тѣло дѣлается блѣднымъ; сосуды такихъ людей должно сравнить съ мѣшкомъ, не полно налитымъ жидкостію и лежащимъ на неровномъ мѣстѣ, отъ чего жидкость скопляется въ части мѣшка, лежащей на отлогомъ, низкомъ мѣстѣ, между тѣмъ, какъ другая часть мѣшка, лежащая на вышемъ мѣстѣ, бываетъ почти пуста. По этому съ кровопусканіемъ нужно поступать осторожно, гдѣ можно совѣтоваться съ врачомъ, постоянно наблюдать пульсъ при кровопусканіи, и если только онъ начнетъ терять свою крѣпость, твердость и полноту, то немедленно останавливать кровотеченіе изъ сосуда. 7) *Піявицы* (а еще менѣе *насычки*, *рожки*), не могутъ замѣнить кровопусканія изъ вены (жилы) крови, руды) хотя бы приложено было 4—8 піявицъ, или 20—40 рожковъ, и хотя бы онѣ высосали подкожной крови болѣе, чѣмъ при кровопусканіи; притомъ піявицы и рожки бываютъ полезны только тогда, когда при горячкѣ находится и мѣстная боль (воспаленіе). 8) Послѣ кровопусканія, перевязавъ раненый сосудъ, больному нужно дать отдохнуть, а если онъ захочетъ, то пуснуть, оставивъ при немъ человека для наблюденія за раненою рукой относительно кровотеченія. Потомъ дать слабительный отваръ изъ тамаринды съ изюмомъ и вишневыми ягодами, вышеописанный въ діететическомъ лѣченіи, или прохладительную слабительную смѣсь (№ 138), такъ чтобы больного послабило 3—4 раза въ сутки; послѣ того давать ему селитру, которой онъ долженъ принять въ сутки около 2 золотн. (№ 144). Но если животъ крѣпокъ, туго, запертъ, то напередъ должно употреблять ежедневно промываніе, составленное изъ половины воды и молока, небольшого количества соли и ложки деревяннаго масла, или малаго количества свѣжаго коровьяго масла, до тѣхъ поръ, пока животъ ослабнетъ, смягчетъ, разрѣшится и отопрется, и если это промываніе не будетъ имѣть желаннаго дѣйствія, то надо прибавлять время отъ времени въ питье больного по чайной ложечкѣ магнезій, или виннаго камня. 9) При употребленіи этихъ средствъ и сказанномъ содержаніи больного (см. выше) припадки горячки уменьшаются, и появляется переломъ осадочною мочою, проливнымъ потомъ, бакою либо сыпью, нарывомъ. При появленіи сыпи, больного можно посадить въ теплую простую ванну и потомъ напоить его теплымъ же потогоннымъ чаемъ изъ бузиноваго, липоваго цвѣта, сухой малины, мелиссы, ячменной соломы, а нарывъ привести въ нагноеніе теплыми мягчительными припарками. 10) Но если горячка продолжается и даже усиливается и послѣ 6—7 дня, и не появляются рѣшительныя (критическія) испраженія, то больному нужно дать (лучше всего на ночь) столовую ложку миндере-

рова спирта для направлѣнія перелома на кожу и произведенія пота. 11) Когда и это не помогаетъ, а, напротивъ, больной становится уныль, пульсъ его слабѣетъ болѣе и болѣе, дыханіе становится труднымъ или тяжелымъ, съ опѣмѣніемъ членовъ, съ дрожаніемъ нервовъ, съ припрыжками сухихъ жилъ и проч., то не безъ причины можно опасаться несчастнаго послѣдствія, и тогда надлежитъ прикладывать *паривныя* (№ 58) къ затылку, или къ икрамъ, или къ лядвеемъ, или къ чему другому и проч., смотря по обстоятельствамъ, къ подошвамъ ногъ *горчицу съ тѣстомъ* (№ 90), а къ бокамъ груди и живота *простонародный мягчительно-прохлаждающій и раздражающій составъ* (№ 182). Киргизы, около Новоалександровскаго укрѣпленія, что въ средней Азіи, на сѣверовосточномъ берегу Каспійскаго моря, воспалительную горячку лѣчатъ тѣмъ только, что пьютъ отваренный въ водѣ или настоенный въ винѣ, высушенный трехгодовалый *сморожденный корень*, называемый киргизами чухуръ и растущій у нихъ въ изобиліи.

Примѣч. При лѣченіи земледѣльцевъ, жнецовъ, косцовъ, охотниковъ, скороходовъ, мыловаровъ, рыболововъ и другихъ рабочихъ, подверженныхъ этой болѣзни, непременно нужно соображаться съ особыми для нихъ правилами, изложенными въ росписаніи рабочихъ поселеній по ихъ быту и званію, преимущественно относительно назначенія бровопусканія.

Горячка желчно-воспалительная.

О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е. Желчно-воспалительная горячка есть та, которая соединена съ частымъ и обильнымъ отдѣленіемъ желчи въ испражненіяхъ низомъ, или верхомъ — рвотою.

П р и з н а к и. Въ первый день болѣзни, у больныхъ, кромѣ признаковъ чистовоспалительной горячки въ низшей степени, языкъ покрывается желтою слизью, вкусъ дѣлается горькимъ, больные жалуются на боль подъ ложечкою и тошноту, причемъ является позывъ къ рвотѣ и самая рвота, которою нерѣдко извергается значительное количество желчи. На 3 или 4 день у больныхъ появляется желтизна въ глазахъ и присутствіе желчи въ мочѣ. Полость рта и языкъ сохнутъ. Черезъ 5—7 дней нерѣдко является поносъ, съ изверженіемъ вещества или мокротно-желчно-кровянистаго, или мокротно-желчнаго, сопровождаемый раздраженіемъ въ кишечномъ каналѣ, иногда жиленьемъ. Послѣ этого, если болѣзнь склонна къ разрѣшенію, всѣ сказанные припадки, мало по малу, уменьшаются, и больной выздоравливаетъ; въ противномъ случаѣ (опасномъ) мокротныя отдѣленія и испражненія увеличиваются, потъ дѣлается густымъ, клейкимъ, моча бываетъ густая, мокротная, мутная, похожая на мочу рабочаго скота; отдѣленіе въ полости рта увеличивается, языкъ, десны, зубы покрываются темноватою мокротою, лицо дѣлается мутнымъ, темнымъ и покрывается сальнистымъ, клейкимъ потомъ; въ слѣдъ затѣмъ появляются по тѣлу красновато-темныя пятна,

превращающіяся потомъ въ цвѣтъ или темный, или синеватый. Силы больныхъ видимо упадаютъ, бредъ дѣлается тихимъ, несвязнымъ. и обнаруживается иногда въ видѣ саморазглагольствія. Вскорѣ потомъ является подергиваніе сухихъ жилъ, сползаніе больного съ подушекъ. трясеніе колѣнъ, скошеніе глазъ, непроизвольный поносъ, и за тѣмъ, при чрезвычайномъ изнуреніи силъ, слѣдуетъ смерть.

Причины внутреннія, предрасполагающія къ этому виду воспалительной горячки, отличаются отъ причинъ горячки чисто-воспалительной только тѣмъ, что здѣсь внутреннимъ расположеніемъ бываетъ особенное развитіе раздражительности печени, будетъ ли оно врожденное или приобретенное. Къ желчно-воспалительной горячкѣ расположены люди темперамента холерическаго (желчные), у которыхъ раздраженіе въ печени легко развивается въ жаркое время, особенно при переходѣ изъ сухой температуры въ сырую.

Причины внѣшнія (производящія). Кромѣ причинъ, общихъ съ чисто-воспалительною горячкою, особенная причина, производящая горячку желчно-воспалительную, есть слѣдующая: жаркіе лѣтніе дни, смѣняемые холодными сырыми ночами, отчего эта болѣзнь обыкновенно и оказывается въ концѣ лѣта и проходитъ въ началѣ зимы, преимущественно въ жаркомъ климатѣ, особенно, гдѣ грунтъ земли болотистъ, и ежели за сырою ненастною дождливою погодою послѣдовали большія засухи, притомъ наипаче на людяхъ, работающих на вольномъ воздухѣ, живущихъ въ полѣ, выходящихъ на ночной воздухъ и росу, словомъ: на земледѣльцахъ, жнецахъ, косцахъ.

Сущность желчно-воспалительной горячки отличается отъ сущности чисто-воспалительной тѣмъ, что въ первой находится чисто-воспалительное состояніе печени, сопровождаемое умноженнымъ отдѣленіемъ желчи, изліяніемъ ея въ желудокъ и разлитіемъ нерѣдко по всему тѣлу.

Распознаваніе. Хотя желчно-воспалительная горячка въ началѣ похожа на чисто-воспалительную, но изліяніе желчи въ желудокъ и кишки и происходящее въ нихъ раздраженіе довольно ясно отличаютъ ее отъ чисто-воспалительной, особенно по прошествіи 7, 9 и 10 дней, когда воспалительно-желчная горячка уже принимаетъ гнилостный характеръ. Гнилостнымъ характеромъ этотъ видъ воспалительной горячки отличается отъ чисто-воспалительной, а разлитіемъ желчи отъ горячки мокротно-гнилостной.

Предсказаніе въ воспалительно-желчной горячкѣ относительно опасности для жизни всегда *хорошо*, потому что болѣзнь при благоприятныхъ условіяхъ весьма легко излѣчивается, особенно если лѣченіе начато своевременно. Но если болѣзнь запущена и перейдетъ въ значительно-гнилостное состояніе, то предсказаніе дѣлается *сомнительнымъ* и даже *опаснымъ* (чѣмъ жарче климатъ тѣмъ опасность встрѣчается чаще потому что болѣзнь въ этомъ періодѣ рѣдко уступаетъ и сплѣмъ на-

туры, и лѣкарствамъ; относительно продолжительности болѣзни должно сказать, что она можетъ продолжаться 12, 17 и до 21 дня.

Исходы. Горячка эта, кромѣ исходовъ въ *здоровье* и *смерть*, часто переходитъ въ *другія болѣзни*, а именно въ раздраженіе пищеварительныхъ органовъ, особенно печени, и во всеобщее изнуреніе силъ, такъ что больные послѣ горячки долго страдаютъ разстройствомъ пищеваренія, наклонностію къ рвотѣ и поносу; а потому и силы ихъ возстановляются медленно.

Лѣченіе діететическое этой болѣзни требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Люди холерическаго темперамента, въ концѣ лѣта, въ жаркіе дни, смѣняемые холодными ночами, особенно живущіе въ жаркомъ климатѣ южной Россіи, при болотистомъ грунтѣ земли, въ предохраненіе себя отъ этой, свойственной имъ болѣзни, должны соблюдать осторожность и въ жизни, и въ работахъ на открытомъ воздухѣ; они должны имѣть *жилище* по мѣрѣ возможности *теплое* и *сухое*, изъ котораго не выходить ни поздно вечеромъ, ни слишкомъ рано утромъ, а особенно ночью, пока не провѣтрится сырость въ воздухѣ и не обсохнетъ ночная роса. Что же касается тѣхъ, которые уже были подвержены этой болѣзни и страдаютъ болѣе и менѣе разстройствомъ пищеваренія, то имъ нужно подъ осень, для укрѣпленія желудка, употреблять въ продолженіе нѣкотораго времени передъ обѣдомъ и ужиномъ по рюмбѣ *настоянки полыни, тरेфолы*, а еще лучше *жины*; привыкшимъ къ водкѣ пить настоящую на простомъ винѣ, а не привыкшимъ — употреблять холодный водяной настой (§ 183); сверхъ того воздерживаться отъ дурныхъ плодовъ, отъ новыхъ напитковъ и вѣтругонной пищи, какъ напримѣръ: сырыхъ огородныхъ овощей: рѣпы, гороха, брюквы, бочней капусты и т. п.; 2) *Одержимаго* этою болѣзнію больного должно *содержать* точно такъ же, какъ и одержимаго чисто-воспалительною горячкою (см. выше въ діететическомъ лѣченіи чисто-воспалительною горячки), причемъ въ этой болѣзни надлежитъ давать ему соленое *питіе*, какъ напримѣръ изъ *огуречнаго рассола* и т. п.; 3) Кромѣ того для земледѣльцевъ, жнецовъ и косцовъ изложены особые правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное въ воспалительно-желчной горячкѣ требуетъ средствъ противу-воспалительныхъ, испражняющихъ и разрѣшающихъ желчь. Для этого должно совѣтовать обращаться къ врачу, а за неимѣніемъ его по близости поступать слѣдующимъ ограниченнымъ образомъ. Какъ скоро больной занеможетъ воспалительною горячкою, съ появленіемъ у него горечи во рту, желтоватой слизи на языкѣ, боли подъ ложечкою, тошноты и позыва къ рвотѣ, слѣдуетъ немедленно способствовать рвотѣ употребленіемъ внутрь *теплой воды, теплаго ромашковаго чая и щекотаніемъ пальцами* въ глоткѣ (неба), такъ чтобы вырвало раза три желтоватою или зеленоватою мокротою. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно для произведенія рвоты въ достаточномъ количествѣ, то дать *домашнее рвотное изъ коноплянаго, или льня-*

наго масла съ солью и теплою водою (№ 112). Если и это не подѣйствуетъ, то дать *рвотное* изъ *рвотнаго камня* въ растворѣ (№ 184). Когда больного начнетъ рвать, то для облегченія рвоты давать ему пить по чашкѣ теплой воды, или теплаго ромашковаго чая. Если больной полнокровенъ, крѣпокъ, чувствуетъ сильную боль въ головѣ и около желудка (подъ ложечкою), то предъ рвотнымъ нужно прикусить *пѣсокъ* подъ ложечкою (6—12—24), смотря по степени болѣзни, сложности и возрасту больного; иначе во время рвоты можетъ произойти пострѣлъ (ударъ); притомъ же у полнокровныхъ послѣ кровопусканія и самая рвота происходитъ скорѣе и легче. Но если въ желудкѣ скопилось много нечистотъ (послѣ объяденія) и онѣ оставались тамъ долго, отчего и желудокъ сдѣлался нечувствительнымъ, или же появился водянистый поносъ, то нужно дать полное *рвотное* разомъ изъ $\frac{1}{4}$ золот. *рвотнаго корня*—*ппекагуаны* (а не камня). Послѣ этого, для возбужденія желудка, можно положить противъ него, на животъ, *горчицу съ тѣстомъ* (№ 90), а чтобы унять поносъ, давать *нашатырь въ квасъ* ($\frac{1}{8}$ часть золотника на рюмку кваса) черезъ каждые 2 часа. Во всякомъ случаѣ, послѣ очищенія желудка отъ желчи, нужно давать внутрь *разрѣшающіе отвары одуванчика, цикория, пырея, мыльнянки* (№№ 1, 2, 3 и 4), прибавляя каждый разъ на стаканъ отвара по чайной ложечкѣ очищенной *тамаринды*. Въ случаѣ развитія вѣтровъ (бурчаніе въ животѣ, бурборизмъ) эти отвары должно употреблять сверхъ того *съ мятою* (№№ 17, 18, 19 и 20), либо пить мяту особо, въ видѣ чая (№№ 15 и 16). Эти корни полезно отваривать съ тапнуъ же количествомъ *чернослива*. Снаружи въ правое подреберье противъ печени нужно втирать *летучую мазь съ нашатырнымъ спиртомъ* (№ 76). Если кожа горяча, жгуча, и больной не можетъ потѣть, то для возбужденія испарины нужно давать ему три или четыре раза въ день по столовой ложкѣ *миндерерова спирта* въ стаканъ обыкновеннаго его питья. Во всемъ прочемъ лѣченіе сходствуетъ съ лѣченіемъ чисто-воспалительной горячки (см. выше). Когда желчная горячка перейдетъ въ нервную или гнилую, или же будетъ соединена съ ними, какъ это случается довольно часто, то въ такомъ опасномъ случаѣ слѣдуетъ немедленно прибѣгнуть къ врачу, или лѣчить эту болѣзнь какъ горячки: нервную и гнилую (см. особо).

П р и м ѣ ч а н і е. При лѣченіи рабочихъ людей, какъ-то: земледѣльцевъ, косцовъ и жнецовъ, непременно нужно соображаться съ особыми изложенными для нихъ правилами въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію, преимущественно же при назначеніи кровопусканія.

Горячка воспалительно-мокротная.

П р и з н а к и. Эта горячка отличается отъ горячки чисто-воспалительной тѣмъ, что съ развитіемъ припадковъ, свойственныхъ чисто-воспалительной горячкѣ, весьма слабо обнаруживающихся, появляется

мокротность въ полости рта, языкъ бываетъ влаженъ, покрытъ блестящею перловою, или темновато-сѣрою мокротою, причемъ больные жалуются на отсутствіе вкуса въ томъ отношеніи, что имъ все кажется травянымъ. Съ этимъ вмѣстѣ бываютъ: тяжесть подъ ложечкою, тошнота, умѣренная жажда, а если большая, то больные требуютъ питья соленого. Запоры на низъ не такъ упорны, хотя бываютъ и велики, какъ въ чисто-воспалительной горячкѣ; кожа не сухая, но мягкая. Болѣзнь продолжается до 7 дней, если же по прошествіи ихъ она не получитъ лучшаго направленія, то присоединяются еще признаки гнилостные: изнуреніе, тихій бредъ, волнистый пульсъ, моча блѣднѣетъ, съ большою мокротностью, испражненія часты и съ водянистою слизью, кожа покрывается пятнами, скоро переходящими въ темный цвѣтъ, и жизнь больного превращается въ такомъ случаѣ точно такъ же, какъ и въ желчно-воспалительной горячкѣ, съ тою разницею, что здѣсь поносъ бываетъ собственно отъ слабости, безъ раздраженія и изъязвленія въ кишечномъ каналѣ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ ослабленіи нервной системы, (слабость нервовъ), въ уменьшеніи плотности твердыхъ частей (дряблость тѣла) и плототворительности, но въ препозитивн образванія сгущенной пасоки (лимфы). По этому къ этой болѣзни въ особенности расположены люди флегматическаго темперамента, ведущіе постоянно праздную жизнь и употребляющіе слизистую пищу.

Причина внѣшняя, производящая эту горячку, есть сырой холодъ, бывающій въ весеннее и осеннее время.

Сущность этой горячки отличается отъ другихъ видовъ воспалительной горячки тѣмъ, что здѣсь слизистыя тѣани переполняются сгущенною пасокою.

Распознаваніе мокротно-воспалительной горячки отъ двухъ предъидущихъ видовъ довольно *легко*: 1) по очень легкому обнаруженію признаковъ воспалительныхъ; 2) по скорому ея переходу въ гнилостное состояніе, который бываетъ на 8—6—5 и даже 3 день, чего въ чисто-воспалительной горячкѣ не случается; отъ желчно-воспалительной же она отличается отсутствіемъ разлитія желчи и цвѣтомъ мокроты, покрывающей языкъ больного.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, если болѣзнь будетъ захвачена заблаговременно, *хорошо*; но если лѣченіе будетъ упущено, то предсказаніе для жизни больного *сомнительно*; при переходѣ болѣзни въ высшее гнилостное состояніе, совершенно *опасно*, и больные, при самомъ правильномъ лѣченіи, выздоравливаютъ весьма рѣдко.

Исходы. Кромѣ обыкновенныхъ исходовъ этой болѣзни въ здоровье и смерть, она переходитъ и въ другія болѣзни, — именно во всеобщее изнуреніе силъ, медленно возстановляющихся, въ отеки, въ водянку и въ перемежающіяся лихорадки.

ЛѢЧЕНІЕ ДІЕТЕТИЧЕСКОЕ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Люди сырые*, мокротные, флегматическаго темперамента, ведущіе жизнь праздную и охотники до слизистой пищи, для предохраненія себя отъ этой болѣзни *должны* особенно *беречься простуды* отъ холодной сырости, преимущественно въ весеннее и осеннее время. 2) *Одержимыхъ* этою болѣзнію больныхъ должно *содержать* точно такъ же, *какъ* и въ *чисто-воспалительной горячкѣ*, съ тою разницею, что *пища* для нихъ должна быть *малопитательная и нѣсколько согрѣвающая*, при томъ же *прѣсная*, какъ напр. уха, слегка приправленная лавровымъ листомъ и укропомъ: — но можетъ быть употребляема и пища кислая. При легкомъ развитіи воспалительнаго состоянія можно давать больному бульонъ изъ телячьихъ ножекъ, или изъ головы, или изъ курицы, также приправленной лавровымъ листомъ, или укропомъ, или же миртовыми ягодами — средствомъ *вкуснымъ*, побуждающимъ и разводящимъ. Можно употреблять печенные яблоки и вареный черносливъ. Хлѣбъ лучше употреблять въ видѣ гренковъ, которые, при питательности своей, будутъ дѣйствовать какъ средство противу-мокротное. 3) *Лучшими питьями* въ этой болѣзни могутъ быть: сырая *ключевая вода*, а также *огуречный* или *капустный рассолъ*, разведенный до надлежащей степени ключевою водою.

ЛѢЧЕНІЕ существенное этого вида воспалительной горячки въ первомъ періодѣ ея, т. е. воспалительномъ, одинаково съ лѣченіемъ горячки чисто-воспалительной, съ тою только разницею, что въ мокротно-воспалительной всѣ средства, употребляемыя по указаніямъ въ чисто-воспалительной горячкѣ, должны быть употребляемы съ меньшею настойчивостію и постоянствомъ. Здѣсь, главное, нужно растворять слизь и способствовать ея испражненію какъ изъ кишечнаго канала, такъ и изъ другихъ органовъ. Для этого въ крайнихъ случаяхъ, за неимѣніемъ по близости врача и больницы, кромѣ общихъ противу-воспалительныхъ средствъ, означенныхъ въ чисто-воспалительной горячкѣ, нужны еще въ частности слѣдующія ограниченныя средства. Очень полезно давать больному внутрь *паштеты* въ *хорошемъ квасѣ*, полагая 1 золотн. перваго на рюмку или стаканъ послѣдняго, раза 4 въ день, для разведенія мокротъ и уменьшенія горячки. Въ случаѣ усиленнаго жара съ запоромъ на низъ, полезно присоединять къ этому средству *кремортартаръ* и *рвель* (№ 65); послѣдній можно замѣнять высушеннымъ и стертымъ *корнемъ конскаго щавеля*. Если есть наклонность къ вѣтрамъ и раздутію живота — состоянію, вредному для больныхъ, то нужно пить больнаго *чаемъ* изъ *мяты*, (№№ 15 и 16), *аниса*, *укропа*, *мелиссы*, либо давать *мятные капли* (№ 66), *глауберову соль* (№ 34); если же этихъ средствъ будетъ недостаточно для преодоленія запора и развитія вѣтровъ, то ставить ежедневно по нѣсколько разъ *промывательное* (№ 95) и давать *отваръ коры крушины* одной, либо съ горькою солью и *семенами тмина* (№№ 74, 75). Сверхъ того, чтобы болѣзнь изъ состоянія воспалительнаго не приняла дурнаго направленія и

не перешла въ гнилостную горячку, нужно взять за правило давать средства, возбуждающія заранѣе, не дожидаясь упадка силъ, даже если у больного колющій жаръ, жажда, пульсъ скоръ, великъ и быстръ, языкъ сухъ, — то уже можно начать давать: корни *дягиля* (№ 67) и *зимовникъ* (№ 37) одинъ и съ мятою и корнемъ *валеріаны* (№№ 38, 39, 40), корку *хинны* одну (№ 47), съ *калфоророю* (№ 48), *гофманскими* *каплями* (№ 49), порознь и въ общемъ соединеніи; послѣднее гораздо лучше и сильнѣе дѣйствуетъ въ случаѣ видимаго приближенія, или уже начавшагося упадка и изнуренія силъ (№ 50). При этомъ камфору и гофманскія капли можно давать и порознь, и попеременно съ которымъ нибудь изъ вышеозначенныхъ отваровъ (№№ 51, 52). Въ случаѣ совершеннаго перехода болѣзни въ другія, должно лѣчить её подобно той, въ какую она перешла.

Гнилая горячка.

Опредѣленіе. Гнилою горячкою называется та, которая обнаруживается, большею частію, упадкомъ силъ, ослабленіемъ всѣхъ отвлеченій и развитіемъ гнилостныхъ признаковъ, вскорѣ слѣдующихъ за признаками воспалительными, обнаруживающимися въ началѣ этой болѣзни, и нерѣдко бываетъ заразительною.

Признаки. Гнилая горячка начинается подъ видомъ воспалительно-мокротной, особенно желчной, либо нервной, а потомъ обнаруживается собственными припадками, которые суть: высокая слабость, изнеможеніе, слабый, малый, скорый, легко сжимаемый пальцемъ пульсъ, ѣдкая, жгучая теплота (такъ что послѣ прикосновенія къ тѣлу больного въ пальцахъ прикасающагося человѣка надолго остается непріятное чувство жженія); испарина и дыханіе издають воинщій запахъ, который еще болѣе чувствуется въ калѣ и мочѣ; — первое бываетъ притомъ жидкое, темное, черное, а послѣдняя мутная, бровая и легко разлагается, издавая острый пашатырный запахъ; — на животѣ и груди появляются на кожѣ краснобагровыя, синія, темныя пятна, холодный, клейкій потъ, кровотеченіе изъ носа, рта, десенъ, легкихъ, задняго прохода; на плечахъ, спинѣ, крестцѣ образуются пролежни, на рукахъ и ногахъ помертвѣніе (антоновъ огонь); истекающая кровь бываетъ черная, жидкая, не разлагается на творогъ и сыворотку, но остается въ видѣ жидкой каши. Кромѣ того въ гнилой горячкѣ замѣчаются: головокруженіе, обмороки, бредъ, судороги, черныя, сухія, потрескавшіяся губы и языкъ, покрытые плотною корою засохшей слизи, въ началѣ болѣзни рвота желчью, а къ концу поносъ съ произвольнымъ, вонючимъ испражненіемъ кала и мочи.

Причины внутреннія (предрасполагающія): слабость силъ, худое состояніе крови и плототворенія, худосочіе, завалы внутренностей, цынга, водяная, любострастная болѣзнь, злоупотребленіе ртутію,

предшествовавшія горячки и лихорадки, угнетающія страсти, напр., печаль, заботы и т. п.

Причины ви́шнія (производящія) нечистый, спертый воздухъ въ тѣсномъ, сыромъ, грязномъ жилищѣ; теплота съ сыростію въ душныхъ землянкахъ, казематахъ, тюрьмахъ, бѣдность, непомѣрные труды, дурная пища; а также когда больного горячечнаго или лихорадочнаго, ошибочно полагая поддержать его, насильно заставляютъ ѣсть мясную пищу, пить крѣпкое вино, бутають въ одѣяла для защиты отъ простуды, держатъ на печкѣ и пр. При неурожаяхъ, общемъ голодѣ, холодѣ, гнилая горячка развивается повально и бываетъ даже заразительна. Изъ рабочихъ поселянъ всего чаще бываютъ подвержены гнилой горячкѣ тѣ, которые ходятъ за больными, тряпичники, расчесывальщики шерсти.

Сущность гнилой горячки вообще состоитъ, какъ видно изъ предыдущаго, во всеобщей слабости силъ и худомъ кровотовереніи и плототвореніи.

Распознаваніе гнилой горячки отъ видовъ воспалительной, переходящихъ въ гнилостное состояніе, весьма *легко*: въ послѣднихъ воспалительный періодъ бываетъ сильнѣе и продолжительнѣе, напротивъ, въ гнилой горячкѣ періодъ этотъ бываетъ менѣе развитъ и скорѣе переходитъ въ гнилостное состояніе.

Предсказаніе въ гнилой горячкѣ вообще относительно опасности для жизни зависитъ отъ степени развитія болѣзни и отъ силы причинъ предрасполагающихъ и производящихъ: чѣмъ болѣе развита болѣзнь, чѣмъ сильнѣе причины, тѣмъ и предсказаніе *хуже*. Относительно продолжительности болѣзни, предсказаніе таково: если болѣзнь будетъ захвачена въ началѣ, то при хорошихъ условіяхъ можетъ кончиться въ 12 и даже 7 дней; напротивъ, если она запущена и притомъ произошла отъ сильныхъ причинъ предрасполагающихъ и производящихъ, то можетъ продолжаться до 21 и 27 дней. Въ частности: *счастливыми* и благоприятными признаками признаются: 1) Легкій поносъ около 4-го или 5-го дня, сопровождаемый легкою теплотою и умѣренной влажностью на тѣлѣ; когда же поносъ, теплота и влажность продолжаютъ не малое время, то часто уносятъ съ собою самую болѣзнь, а потому не слѣдуетъ ихъ останавливать, 2) маленькіе пузырьшки, чечевиче подобные, проявляющіеся между краснабагровыми пятнами, какъ тотъ видъ коросты, которою покрываются губы и носъ въ исходѣ болѣзни; 3) когда отъ употребленія вина или другаго чего либо крѣпительнаго возвышается пульсъ, а припадки болѣзни уменьшаются; 4) глухота, случающаяся около исхода болѣзни, особенно съ нарывомъ въ ушахъ, равно опухоли и нарывы въ пахахъ и подчелюстныхъ желѣзахъ у молодыхъ людей. — *Несчастливыми* и опасными признаками считаются: поносъ, съ животомъ жесткимъ и надутымъ, широкія пятна, черныя или синія на кожѣ, прыщики во рту, холодный и блѣдный потъ, черная вода въ глазахъ или ослѣпленіе (послѣдній признакъ, именно

слабѣноту одну, безъ прочихъ признаковъ, нельзя еще считать дурнымъ: она иногда со временемъ переходитъ и такъ же скоро, какъ и самая болѣзнь); перемѣна голоса, темное и блуждающее зрѣніе, трудность при глотаніи, дрожаніе языка и невозможность высунуть его изъ рта; постоянное желаніе больного открыть себѣ грудь. — Наконецъ *смертельными признаками* или предвѣстниками смерти признаются: когда потъ и слюна кровавы, моча черна, или даетъ черный осадокъ; подергиванія сухихъ жилъ, помѣтъ зловонный и сукровичный (свѣтлый, очень водянистый), непронзвольный, съ холодомъ въ конечностяхъ.

Раздѣленіе. По различію видовъ воспалительныхъ припадковъ *гнилая горячка* бываетъ *различна*. Если она обнаруживается первоначально подъ видомъ воспалительной желчной горячки, то ее называютъ горячкой *желчно-гнилой*; если она является подъ видомъ воспалительной мокротной горячки, то называется горячкой *мокротно-гнилой*, если же проявленіе ея имѣетъ видъ первой горячки, то называется *горячка нервно-гнилая*.

Признаки горячки желчно-гнилой, отличающейся отъ другихъ раздраженіемъ печени и увеличеннымъ отдѣленіемъ желчи, суть: предвѣстники лихорадки, ознобъ, иногда бѣглый непостоянный жаръ, головная боль, шумъ въ ушахъ, потеря аппетита, отвращеніе отъ мясной пищи, позывъ на кислое и соленое, потомъ сухость во рту, жажда, тоска и волненіе во всемъ тѣлѣ, сухость и жаръ кожи, пульсъ полный, твердый, крѣпкій, нерѣдко неровный, запоръ на низѣ, моча красная, тонкая, языкъ мохнатый и покрытый желтоватою мокротою, нерѣдко тошнота, побужденіе къ рвотѣ и самая рвота, большею частію, клейковатою, смѣшанною съ желчью, мокротою, а иногда частою желчью. При ощущеніи болѣзненное чувствованіе въ правомъ боку. Къ вечеру болѣзнь ожесточается, къ утру ослабѣваетъ. Далѣе языкъ темнѣетъ, лицо блѣднѣетъ, глаза мутятся, въ углахъ вѣкъ нерѣдко замѣчается густая бѣлая мокрота, жаръ кожи колющій, непостоянный, моча мутная, часто слизистая. Къ ночи болѣзнь вновь ожесточается, является бредъ, а къ утру опять ослабѣваетъ съ наклономъ къ усыпленію и безчувственности. Къ слѣдующей ночи снова ожесточается, но на 4, иногда на 6—7 сутки являются признаки гнилостные: красно-сипеватыя пятна на кожѣ, какъ бы отъ укушенія блохъ, съ центральною точкою, силы упадаютъ, больной лежитъ на спинѣ; пульсъ слабый, неровный, дрожащій, нерѣдко подергиваніе сухихъ жилъ, поносъ желчною мокротою съ смердящимъ запахомъ, моча густѣетъ и имѣетъ также смердящій запахъ, сальноватый или клейковатый потъ; ротъ и зубы запекаются тягучею мокротою, чувства тупѣютъ, дрожаніе кожныхъ, спознаніе съ подушекъ, непронзвольный поносъ, и на 14, 17 или 21 день наступаетъ смерть.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Къ желчно-гнилой горячкѣ расположены люди съ печенью, раздраженною или отъ природы,

или отъ предшествующаго разстройства ея, а также люди, часто предающиеся гнѣву.

Причина вѣшняя (производящая) есть продолжительный жаръ. Поэтому желчно-гнилая горячка такъ часто случается въ лѣтнее жаркое время. Зловонныя частицы въ салотопняхъ перѣдко повергають въ эту болѣзнь свѣчниковъ и салотоповъ.

Сущность желчно-гнилой горячки состоитъ въ худомъ бровотвореніи и плототвореніи, при раздраженіи печени и обильномъ отдѣленіи желчи.

Исходы. *Въ здоровье* желчно-гнилая горячка переходитъ или быстро, къ 12 и даже къ 7 дню, или медленно. Въ первомъ случаѣ рѣшеніе происходитъ чрезъ обильныя испражненія низомъ, чрезъ потъ и отложеніе въ мочи бѣлагомучнистаго осадка. Во второмъ случаѣ болѣзнь переходитъ въ здоровье, при постепенномъ уменьшеніи ея и возстановленіи силъ. Желчно-гнилая горячка переходитъ *въ хроническое раздраженіе печени и худое пищевареніе*. Исходъ *въ смерть* бываетъ двоякимъ образомъ: или при скоропостижномъ развитіи всѣхъ гнилостныхъ припадковъ и чрезмѣрномъ испражненіи низомъ, а равно проливномъ потѣ, или при медленномъ истощеніи силъ и питанія, что бываетъ, когда болѣзнь продолжается долго.

Признаки горячки мокротно-гнилой, отличающейся ослизненіемъ желудочно-кишечнаго канала и присутствіемъ слизи во всѣхъ отдѣленіяхъ и испражненіяхъ, слѣдующія: припадковъ раздраженія печени нѣтъ, — языкъ покрытъ бѣловатою мокротою, безвкусна, срокъ воспалительнаго состоянія бываетъ короче, почти всегда на 2 или на 3 день переходитъ въ гнилостное, слизистыя испражненія низомъ и мочою, кожа съ самаго начала болѣзни не только не суха и не горяча, а напротивъ бываетъ покрыта обильнымъ потомъ; гнилостное состояніе развивается гораздо быстрее. При смертельномъ исходѣ болѣзнь обанчивается на 12 или 14 день и очень рѣдко продолжается далѣе 17 дня.

Причины: предрасполагающая — мокротное тѣлосложеніе, врожденное или пріобрѣтенное въ слѣдствіе употребленія слизистой пищи и питья. Производящая состоитъ въ продолжительномъ дѣйствіи сыраго, значительно холоднаго и теплаго воздуха. По этому мокротно-гнилая горячка чаще свирѣпствуетъ въ осеннее и весеннее время, а равно при продолжительныхъ зимнихъ оттепеляхъ, особенно у тѣхъ, кто употребляетъ слизистую пищу.

Сущность мокротно-гнилой горячки состоитъ въ худомъ бровотвореніи и плототвореніи съ болѣзненно-умноженнымъ развитіемъ слизи въ желудочно-кишечномъ каналѣ и легкихъ.

Исходы. *Въ здоровье* мокротно-гнилая горячка переходитъ медленно, при постепенномъ уменьшеніи признаковъ и припадковъ. *Другія болѣзненные состоянія*, въ которыя она переходитъ, большею частію поносы и отеки. *Въ смерть* переходитъ медленно, при постепенномъ развитіи признаковъ гнилостныхъ, притомъ за долго до смерти

появляется вздутіе живота, или, если этого не бываетъ, не произвольныя провянистыя испражненія изъомъ.

Признаки горячки нервно-гнилой, отличающейся съ начала развитія нервными припадками съ медленнымъ развитіемъ признаковъ гнилостныхъ, суть слѣдующіе: предвѣстники болѣзни: за день, иногда за два, нерасположенность въ духѣ, тяжесть головы, тупость чувствъ, блѣдность лица, нѣкоторое охлажденіе всего тѣла, потеря аппетита. Потомъ вдругъ бѣглый, непостоянный холодъ, преимущественно въ туловищѣ, на 2—3—5 часовъ и болѣе; далѣе начинается сохнуть во рту, жажда, чувство жара, языкъ бѣловатый, иногда позывъ на рвоту, моча бѣловатая, мутная или водянистая, къ ночи сильный жаръ, а днемъ нерѣдко бываетъ мѣстный потъ то на тѣхъ, то на другихъ конечностяхъ, либо на одной головѣ, или на одной груди; тяжесть во всѣхъ чувствахъ, а иногда и ломота въ передней части головы и въ глазахъ. Другую ночь больные проводятъ покойнѣе, но или совсѣмъ не спятъ, или же засыпаютъ короткимъ сномъ съ бредомъ. Въ третій день больные бываютъ еще покойнѣе, но силы ихъ видимо слабѣютъ, лицо блѣднѣетъ, глаза мутятся, тѣло холодѣетъ (особенно конечности), жажда и аппетитъ пропадаютъ, чувства тупѣютъ, такъ что больные не понимаютъ и самыхъ обыкновенныхъ вопросовъ, впадаютъ въ состояніе безпечности, не думая ни о самихъ себѣ, ни о предметахъ, заслуживающихъ ихъ вниманія. Это состояніе съ изнуреніемъ силъ, продолжаясь 5—6—12 дней, болѣе и болѣе развивается, больной днемъ и ночью часто бредитъ въ видѣ саморазглагольствованія, причемъ нерѣдко представляются ему различныя фантастическія явленія, принимаемыя имъ съ твердою увѣренностію за истинныя. Послѣ этого срока, замѣчательнаго по тупой раздражительности, мало уступающей всѣмъ раздражающимъ и возбуждающимъ средствамъ, начинаютъ появляться признаки гнилостныя: темныя пятна на тѣлѣ, отдѣленія и испражненія увеличиваются и бываютъ мутныя, силы болѣе и болѣе слабѣютъ, вмѣсто бессонницы является сонливость, глаза впадаютъ, пульсъ малый, медленный, нечувствительность ко всему, въ лицѣ частыя судорожныя движенія, подергиваніе конечностей, а иногда и туловища, увеличиваются, дыханіе дѣлается медленнымъ, рѣдкимъ, неровнымъ, наконецъ предсмертное улучшеніе на короткое время, и потомъ слѣдуетъ смерть, при судорожномъ движеніи всего тѣла.

Причины внутреннія. Предрасположеніе къ нервно-гнилой горячкѣ состоитъ въ слабости нервовъ и всѣхъ подлежащихъ ей системъ и органовъ со стороны тѣла.

Причины внѣшнія (производящія): непрерывный страхъ, отчаяніе, сильное и продолжительное не удовлетворяемое желаніе, продолжительная досада, особенно при худомъ содержаніи; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ въ видѣ перепоя, особенно если этому будутъ содѣйствовать и другія условія.

Сущность состоитъ въ болѣзненно-возвышенной чувствитель-

ности и слабой раздражительности нервной системы, при худомъ кровопротѣкѣ и плототвореніи.

Предсказаніе во всѣхъ этихъ трехъ видахъ гнилой горячки, относительно опасности для жизни, таково: самая опасная есть нервно-гнилая, она трудно лѣчится оттого, что требуются два противоположныхъ способа лѣченія; за нею слѣдуетъ желчно-гнилая, а менѣе опасна горячка мокротно-гнилая. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе таково: горячки нервно-гнилая и желчно-гнилая, болѣею частью, оканчиваются къ 12 дню, а мокротно-гнилая обыкновенно продолжается долѣе.

Исходы. Въ *здоровье* переходитъ или скоро, рѣшаясь сильнымъ продолжительнымъ всеобщимъ потомъ, или медленно, даже на 27 день, при совершенно неравномѣрномъ уменьшеніи болѣзни. *Болѣзни*, слѣдующія за нервно-гнилою горячкою, суть: продолжительная слабость нервной системы, особенно въ отношеніи къ движенію, мѣстные онѣмѣнія и нерѣдко разстройство душевныхъ способностей. Въ *смерть* переходитъ или скоропостижно, съ признаками разстройства мозговой системы, или медленно, съ признаками разрушительности и уменьшенія силъ.

Лѣченіе діететическое въ гнилой горячкѣ во всѣхъ ея видахъ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Какъ вообще всѣмъ, такъ особенно людямъ, подверженнымъ этой болѣзни по внутреннему расположенію, означенному выше въ причинахъ внутреннихъ, предрасполагающихъ, для предохраненія себя должно совѣтовать по возможности избѣгать всѣхъ вышеописанныхъ внѣшнихъ причинъ, производящихъ гнилую горячку во всѣхъ ея видахъ, преимущественно же имъ должно строго наблюдать чистоту и опрятность, жить въ жилищѣ сухомъ, на хорошемъ мѣстоположеніи, имѣть тѣлодвиженіе на вольномъ воздухѣ, употреблять пищу здоровую и умѣренно, пить хорошіе напитки, а во время повальнаго свирѣпствованія гнилой горячки болѣе всего стараться избѣгать заразы, не сообщаясь съ людьми, одержимыми ею. Въ случаѣ, если кто усумнится, или будетъ опасаться, не заразился ли онъ, то ему надобно тотчасъ принимать домашнее *рвотное* изъ масла съ солью и теплою водою (§ 112), или рвотное посильнѣе въ растворѣ изъ рвотнаго камня (§ 184), а потомъ употреблять *чай* изъ *цельтиса романики*. Эти средства, въ случаѣ продолжающагося опасенія, должно продолжать употреблять чрезъ день или два, а передъ сномъ сверхъ того пить по нѣскольгу рюмокъ хорошаго вина. Прибѣгать къ кровопусканіямъ и слабительнымъ безъ особой побудительной причины къ употребленію ихъ совѣтовать отнюдь не должно, потому что эти средства не только мало могутъ предохранить отъ зараженія, но часто, истощая силы, только умножаютъ опасность. Что касается до людей, которые пользуются заразительныхъ больныхъ, равно и тѣхъ, которые ходятъ за ними, то они должны носить при себѣ грецкую губбу, или платокъ, пахнущій уксусомъ или лимоннымъ сокомъ, для нюха-

нія во время приближенія къ больному и обтиранія тотчасъ рукъ, прикасающихся къ нему, его одеждѣ, постели и вообще ко всѣмъ предметамъ, лежащимъ около его. По выходѣ отъ больного, прежде нежели пойти въ другое общество, слѣдуетъ вымыть себѣ руки и, ежели возможно, перемѣнить платье. Независимо отъ этого, для тѣхъ, кто ходитъ за больными, для тряпичниковъ, свѣчниковъ, салотоповъ, расчесывальщиковъ шерсти, изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Больныхъ, одержимыхъ гнилою горячкою, или которымъ либо изъ видовъ ея, должно содержать: въ чистой, сухой, свѣтлой комнатѣ, умѣренно прохладной (13° — 14° по Реом.) и наполненной свѣжимъ, чистымъ сухимъ воздухомъ, и въ случаѣ заразы удаленной отъ жилыхъ покоевъ, поить ихъ часто, но по немногу, чистою водою, или съ уксусомъ, кислымъ сокомъ; голову примачивать холодною водою съ уксусомъ, тѣло почаще обмывать губкою, намоченной въ холодной водѣ, простой, или съ уксусомъ; въ комнатѣ курить слегка уксусными парами одними (либо съ мятою); на накаленный кирпичъ, или сковороду кладется пучекъ травы мяты и поливается уксусомъ; освѣжать воздухъ въ комнатѣ отвореніемъ форточки, топлениемъ печки безъ закрытія трубы, прысканіемъ воды, уксуса на полъ, на стѣны. Уксусъ, сверхъ того, полезно почаще подносить къ носу больного. Больного надлежитъ покрывать легко, голову класть на постели возвышенно; наблюдать за чистотою въ постелѣ и послѣ всякаго испражнения перемѣнять замаранное бѣлье, одѣяло и матрасъ, или подстилку, предоставить ему свободу и покой; малѣйшій шумъ можетъ поразить его голову и малѣйшее неосторожное движеніе въ состояніи привести его въ сильный обморокъ. 3) Никогда не должно оставлять больного долгое время безъ пищи и питья, особенно кисловатаго; хотя малое количество ихъ, но даваемое часто, поддерживаетъ силы и противодействуетъ склонности тѣлесныхъ соковъ переходить въ гніеніе. Пища должна быть легкая, питательная, наприм. каша, хорошо уваренная на бульонѣ, хлѣбничекъ (бѣлый хлѣбъ обдается кипяткомъ воды, которая тотчасъ же сливается, и на хлѣбъ наливается тепловатое, но не кипяченое, либо парное коровье молоко). Если больной слабъ и унылъ, то прибавлять нѣсколько винограднаго бѣлаго вина, или сантуринскаго, мадеры, лиссабонскаго и т. п. Полезно и пищу подслащать клюквеннымъ, смородиннымъ, брусничнымъ, ежевичнымъ, вишневымъ, лимоннымъ сокомъ и т. п. Сверхъ того больной безъ всякой опасности можетъ ѣсть испеченные въ печи или передъ огнемъ плоды, не только зрѣлые, но даже сырые, какъ-то: яблоки, смородину, вишни, сливы и проч.

Лѣченіе существенное въ гнилой горячкѣ, какъ болѣзни самой опасной, отъ которой выздоравливаютъ немногіе, и притомъ всегда очень медленно, требуетъ приглашенія врача и, такъ какъ гнилая горячка всегда есть слѣдствіе общаго несчастія — неурожая, голода, пожара, войны, причемъ она оказывается разомъ на многихъ людяхъ, по-

важно, — то въ такихъ случаяхъ, по распоряженію начальства, для леченія больныхъ присылаются изъ ближайшихъ мѣстъ врачи, къ которымъ и должно обращаться за помощью. Для этого надо всегда совѣтовать, склонять, убѣждать родителей и старшихъ въ селеніи людей, чтобы они, для оказанія пособія страждущимъ этою болѣзнію, лучше прибѣгали къ врачамъ, какъ лицамъ, болѣе свѣдущимъ, посвятившимъ всю жизнь свою на врачеваніе больныхъ. Въ случаѣ же неимѣнія врача, или если врачъ не можетъ часто навѣщать больныхъ прихожанъ священника, послѣдній можетъ помогать имъ въ этой болѣзни слѣдующими простыми средствами. Въ началѣ болѣзни больного надо пить *чаемъ* изъ *мяты* (№№ 15 и 16) *шалфея*, *богородской травы*, *буковицы*, *сухой малины*, *цветовъ липовыхъ* и особенно *ромашковыхъ* (№ 85) съ сахаромъ или медомъ и съ небольшимъ количествомъ *клюквеннаго сока* для пріятнаго кисловатаго вкуса. Но если больному все кажется горько и противно, особенно если онъ при этомъ жалуется на горечь во рту, тошноту и позывъ къ рвотѣ, то напередъ даютъ *рвотное* въ растворѣ изъ рвотнаго камня (№ 184) пока больного начнетъ рвать, или слабѣть, или у него явится потъ, но никогда не продолжаютъ употреблять это средство до тѣхъ поръ, пока больной ослабнетъ. Это рвотное средство въ началѣ болѣзни производитъ почти всегда хорошее дѣйствіе, но если болѣзнь продолжается уже нѣсколько дней, и припадки сильны, то рвотныя бываютъ не надежны. Однако животъ слѣдуетъ всегда держать на свободѣ посредствомъ *промываній* (№ 95) или *слабительныхъ* изъ *кремортарта* (№№ 9 и 178), такъ чтобы больной имѣлъ свободныя испраженія vizomъ одинъ, два и три раза, но не болѣе въ сутки, и не былъ подверженъ запору, большею частію случающемуся у больныхъ въ началѣ болѣзни и вредному для нихъ. Снаружи голову во время боли припачивать, а все тѣло обтирать раза два въ сутки тепловатымъ простымъ или ароматическимъ *уксусомъ*, либо *уксусомъ*, смѣшаннымъ пополамъ съ *виномъ*, смотря по степени развитія болѣзни. Но когда у больного бредъ, то надо чаще *припачивать* ему руки и ноги крѣпкимъ *настоемъ* изъ *ромашковыхъ цветовъ*, либо *отваромъ* коръ: *ивы*, *дуба*, *вяза*, *ольхи*, а всего лучше *хины*. Эти припачки не только облегчаютъ голову, расширяя сосуды конечностей, но еще, взошедши внутрь и проникнувъ въ бровь, противугнилостнымъ свойствомъ своимъ могутъ содѣйствовать разрушенію гнилости соковъ. При этомъ къ подошвамъ ногъ должно прикладывать теплые *горчичники* (№№ 88, 89 и 90), пока не произойдетъ отъ нихъ краснота и нарывающая сильная боль. Если этого недостаточно, то нужно давать внутрь черезъ два часа по рюмкѣ горячаго настоя изъ *ромашки*, прибавляя каждый разъ въ рюмку по 5-ти *кислыхъ капель*. (Галлеровъ элебспръ), либо съ чайною ложечкою *краснаго лучшаго вина*, или *бѣлаго* винограднаго. Если и это не подѣйствуетъ, и болѣзнь видимо переходитъ въ гнилостное, плоторазрушительное состояніе, съ обнаруживающимися на тѣлѣ пятнами, то одно изъ лучшихъ средствъ есть слѣ-

дующій составъ: взять 7 золотн. лучшей хины, истолочь ее въ мельчайшій порошокъ, всыпать его въ $\frac{1}{2}$ фунта воды, прибавить столько же краснаго вина, 30 капель галлерова элексира и рюмку или полторы лимоннаго сиропа. Этой микстуры должно давать по двѣ столовой ложки чрезъ каждые два часа и чаще, если желудокъ можетъ перенести ее. Для тѣхъ, кто не можетъ принимать хины въ порошокъ, должно напередъ настоять ее въ продолженіи 3-хъ и 4-хъ дней въ винѣ, потомъ, процѣдивъ, соединить съ прочими средствами. Если у больного уже открылся сплывшій поносъ, то ему надобно сварить *хины въ красномъ винѣ съ корицею*, и подкисливъ кислыми каплями (№ 185) давать по двѣ ложки чрезъ каждые два часа. Нѣтъ ничего дѣйствительнѣе въ этомъ видѣ поноса, какъ лѣкарства кислыя, принимаемыя въ большихъ приемахъ, подобно какъ и всѣ средства, могущія возбудить легкую испарину. Если больной мучится позывами на рвоту, или рвотою, то надо давать ему *углекислый натанъ въ красномъ уксусѣ* ($\frac{1}{8}$ ч. золотн. поташа на рюмку уксуса) съ сахаромъ, во время кинѣнія, повторяя приемъ каждый разъ, какъ будутъ опять являться эти позывы. Къ пролежнямъ хорошо прикладывать на ветошкѣ *мазь изъ свиного сала съ квасцами*, ($\frac{1}{2}$ золотн. квасц. стереть съ 7-ю золотн. сала) Въ случаѣ обмороковъ нужно давать нюхать уксусъ, нашатырный спиртъ, которые полезно давать и внутрь съ водою (1 часть уксуса, 2 части воды), либо 5 капель нашатырнаго спирта въ рюмкѣ воды, если больной можетъ глотать, въ противномъ случаѣ чаще примачивать голову и обтирать лицо водою съ уксусомъ, или съ небольшимъ количествомъ нашатырнаго спирта, а *къ подониванію ногъ приложить нагрѣтые кирпичи*, либо плотно заткнутые узкогорлые *кувшинны съ горячею водою*.

Лѣченіе желчно-гнилой горячки отличается отъ предъидущаго тѣмъ, что при первомъ развитіи болѣзни нужны противовоспалительныя средства болѣе сильныя, потому что желчно-гнилая горячка въ началѣ своемъ имѣетъ довольно сплывшій воспалительный характеръ съ особеннымъ отношеніемъ къ печени и изліянію желчи въ желудочно-кишечный каналъ; по этому здѣсь прежде всего бываетъ нужнѣе *лигистное кровопусканіе* посредствомъ *пѣвонкѣ*, приставляемыхъ къ правому боку (6, 12 и 24), смотря по возрасту, тѣлосложенію больного и степени развитія болѣзни. За кровопусканіемъ даютъ *рвотное*, какъ въ предъидущей горячкѣ, въ растворѣ (№ 184), пока больного вырветъ желчною мокротою и прослабитъ изверженіемъ желчи; потомъ дать пить *кислое питье* изъ *кремортар-тара* (№ 178) или *тамаринды*, также сваренной съ *черносливомъ*, а въ правое подреберье втирать болеутоляющую и разрѣшающую *летучую мазь* (№ 77). *Камфорное масло*, втираемое по чайной ложечкѣ въ правый бокъ 2, 6 разъ въ сутки, смотря по степени чувствуемой боли, приноситъ также очевидную пользу и облегченіе, особенно вскорѣ послѣ употребленія *мягчительныхъ припарокъ* изъ *сильной трухи* (№ 122), *мыльного смени* съ *ромашкою* (№ 27) *душицею*, *донникомъ* (№ 54), *съ зорью*, *маковыми цветками* (№ 55), даже *съ горчицею* (№ 80), для

произведенія снаружи легкой красноты. Если отъ этихъ средствъ нѣтъ облегченія болѣзни, то должно давать для внутренняго употребленія разрѣшающіе угрѣпляющіе *отвары* корней: *одуванчика*, *цикоря*, *пырея*, *мыльнянки* одни (№№ 1, 2, 3 и 4) и *съ мятой* (№№ 17, 18, 19 и 20), приправленные бислымъ, клюквеннымъ, лимоннымъ сокомъ и т. п. Во всемъ прочемъ лѣченіе этой болѣзни сходствуетъ съ лѣченіемъ предыдущей гнилой горячки (см. выше), особенно въ послѣдствіи, когда эта болѣзнь начнетъ входить при своемъ развитіи въ періодъ гнилостный, въ которомъ, кромѣ средствъ, перечисленныхъ выше въ лѣченіи гнилой горячки, можно въ случаѣ крайности прибѣгнуть къ употребленію *отваровъ* корней: *змиевика* одного (№ 37) и *съ корнемъ валеріаны* (№ 88), корь: *ивы* (№ 43), *дубовой* (№ 45), *хинной* (№ 47), какъ внутри такъ и снаружи, въ видѣ теплыхъ припарокъ для конечностей, во время бреда и подергиванія сухихъ жилъ, также для обтиранія всего тѣла во время клейкаго, изнурительнаго пота, смердящей мочи и поноса.

Лѣченіе мѣротно-гнилой горячки имѣетъ ту особенность и только тѣмъ и отличается, что требуетъ средствъ, препятствующихъ развитію слизи въ желудочно-кишечномъ каналѣ и во всемъ тѣлѣ; по этому въ этой болѣзни нужно давать больному внутрь *магнезію* (№ 8) *раковис жертвовки* въ порошокъ по чайной ложечкѣ 2—4 разъ въ день съ водою, или въ обыкновенномъ его питьѣ, а главное *уголь*, истолченный въ мелкій порошокъ и просѣянный чрезъ частое сито, по десертной ложкѣ такимъ же образомъ, для очищенія желудочно-кишечнаго канала отъ слизи, и *поджаренный* тертый *ревень* одинъ (№ 31) и *съ магнезією* (№ 32). Во всемъ прочемъ лѣченіе одинаково, какъ и въ гнилой горячкѣ (см. выше.).

Лѣченіе нервно-гнилой горячки имѣетъ ту особенность и отличается тѣмъ, что преимущественно требуетъ средствъ, собственно успокоивающихъ нервную систему; для этого въ числѣ прочихъ средствъ, вышеописанныхъ въ гнилой горячкѣ, особенно нужно давать больному *валеріану* въ капляхъ (№ 36), или въ *отварѣ* корня *змиевика* (№ 38), *гофманскія капли*, камфору, одни (№№ 51, 52) и *съ отваромъ хины* (№№ 48, 49, 50), или *съ отваромъ кори ивы* (№ 44). Если болѣзнь произошла съ перепоя, то необходимо давать *довгеровъ порошокъ* (№ 137). Во всемъ прочемъ лѣченіе этой болѣзни одинаково съ лѣченіемъ гнилой горячки (см. выше).

Прим. При лѣченіи рабочихъ поселянъ, какъ то: ходящихъ за больными, трапичниковъ, свѣчниковъ, салотоповъ, чесальщиковъ шерсти и другихъ страдающихъ гнилою горячкою и ея видоизмѣненіями, непремѣнно должно соображаться съ особыми правилами, изложенными для нихъ въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Горячка нервная.

Опредѣленіе. Подъ названіемъ нервной горячки разумѣется

та, которая обнаруживается признаками пораженія нервовъ, сообщающихъ свое страданіе мозгу, подобно какъ въ воспалительной горячкѣ страданіе кровяныхъ сосудовъ и крови сообщается сердцу и легкимъ.

Признаки. Сперва легкая дрожь, особенно въ спинѣ, чередующаяся съ летучимъ жаромъ, боль и круженіе головы, временное одурѣніе, иногда обморокъ, грусть, уныніе, чувство большой слабости, дрожаніе рукъ и ногъ, позже появляется обморокъ, бредъ, сонливость, судороги, пульсъ скорый, малый, слабый, легко прижимаемый пальцами, иногда же медленный, но не полный и не твердый, перемѣчивимый и не согласный съ дыханіемъ; при очень скоромъ пульсѣ дыханіе натуральное и даже медленное; вообще всѣ припадки непостоянны и перемѣчивимы; моча то красная, то блѣдная и прозрачная; то запоръ, то поносъ, сухость во рту безъ жажды, горячая кожа при чувствѣ больнымъ озноба, горчичникъ, мушка не причиняютъ боли въ кожѣ; не смотря на жестокость болѣзни, больной чувствуетъ себя какъ бы здоровымъ. Послѣ видимаго ослабленія болѣзни, она, безъ всякой причины, вдругъ ожесточается, или же опасные припадки (обморокъ, бредъ) вдругъ исчезаютъ, и больной приходитъ въ память, но не надолго.

Предсказаніе. Нервная горячка вообще есть болѣзнь опасная, тѣмъ болѣе, что она, по своимъ припадкамъ, обманчива: при видимой безопасности больной вдругъ можетъ умереть, а отчаянный больной, напротивъ, выздоровѣть, и потому, для опредѣленія опасности болѣзни, нужно особенно смотрѣть на 1) *пульсъ*: чѣмъ онъ скорѣе, слабѣе, неправильнѣе, менѣе чувствуется подъ пальцами, какъ тонкая нитка, тѣмъ болѣе опасности; но чѣмъ онъ натуральнѣе, спокойнѣе, правильнѣе, тѣмъ болѣе надежды на выздоровленіе; 2) *на мочу*: совершенно прозрачная, водянистая, либо густая, мутная, красная моча съ облачкомъ сверху, или съ осадкомъ на днѣ сосуда, между тѣмъ какъ на срединѣ она мутна,—опасна; напротивъ того, если мутная моча начнетъ дѣлаться прозрачною, въ ней сначала появляется облачко, а потомъ и густой осадокъ, то можно надѣяться на выздоровленіе; 3) *на голову*: чѣмъ явнѣе и постояннѣе сонливость, безпокойнѣе сонъ, тѣмъ рѣже, и то на короткое время, больной приходитъ въ себя, мало, или совсѣмъ не жалуется на свою болѣзнь, его рѣчь невнятиѣе, труднѣе высовываніе языка и глотаніе, чѣмъ произвольнѣе испражненіе мочи, кала, значительнѣе судороги, дрожаніе языка, губъ, рукъ, чѣмъ безпокойнѣе онъ мечется въ постели, перебираетъ и какъ бы что то ловитъ руками, особенно если сползаетъ съ подушекъ внизъ голову, — тѣмъ опаснѣе болѣзнь; но чѣмъ долѣе больной остается въ памяти, яснѣе говоритъ, спокойнѣе спитъ, лежитъ въ постели, держится головою на подушкахъ, — тѣмъ болѣе надежды на выздоровленіе; 4) *на кожу*: сухая, морщиноватая липкая кожа, не вездѣ равномерно теплая, мѣстами покрытая просовидною сыпью, синими пятнами, клейкимъ, холоднымъ потомъ, опасна; очень опасны: упорный поносъ, кровавая моча и калъ, смрадный вонючій запахъ отъ больного, пролежни на спинѣ.

Кромѣ того: если около девятаго, десятаго или двѣнадцатаго дня языкъ будетъ увлажняться, если мокрота будетъ становиться обильною, если покажутся на низѣ легкія испражнения, или небольшая сырость на кождѣ, или если случится какое нибудь нагноеніе въ томъ или другомъ ухѣ, или какіе нибудь широкіе чирьи на губахъ или на носу, то это такіе признаки, которые обѣщаютъ счастливый переходъ болѣзни. Но если у больного непомѣрный поносъ и проливной потъ, за которымъ слѣдуютъ частые приступы сильнаго обморока, если языкъ дрожитъ, конечности охолодѣли, пульсъ дрожащъ, или при ощупываніи его чувствуется какъ бы ползучій червь, если у больного есть подергиванія сухихъ жилъ, зрѣніе и слухъ почти пропали, онъ нѣхотя извергаетъ свой пометъ, — то это такіе признаки, которые угрожаютъ неблагоприятнымъ (трагическимъ) исходомъ болѣзни, именно близкою смертію.

Раздѣленіе. Смотри потому, каковыя преимущественно припадками сопровождается нервная горячка, нервными ли собственно или вмѣстѣ съ воспалительными, или гнилостными, она бываетъ трехъ родовъ: 1) *чисто-нервная*; 2) *воспалительно-нервная*; 3) *гнилостно-нервная*.

Признаки горячей чисто-нервной (бѣлая горячка), отличающейся непримѣтнымъ развитіемъ силъ до неистощимости, при отсутствіи болѣзненнаго жара въ тѣлѣ съ оупленіемъ душевныхъ способностей, суть слѣдующія: нерасположеніе ко всему, потеря аппетита, нерѣдко жажда, сонъ малый, прерывчатый, а иногда бессонница; сильная тяжесть и боль головы, особенно спереди; тупость зрѣнія, слуха и другихъ чувствъ. Это бываетъ сначала болѣзни до 2—3, даже до 6 дней. Потомъ больной, теряя сознаніе о многихъ предметахъ, погружается въ забывчивость, тихо бредитъ; лицо, за исключеніемъ нѣкоторой блѣдности, и глаза представляются здоровыми, языкъ чистымъ, пульсъ правильнымъ, моча и испраженія на низѣ также правильными; теплота въ тѣлѣ почти натуральная, нѣсколько увеличенная, что продолжается отъ 2—3 дней, сопровождаясь иногда подергиваніемъ сухихъ жилъ. Далѣе является у больного желаніе, при хорошемъ состояніи силъ, лежать, бредъ увеличивается иногда съ острыми и сильными вскрикиваніями; тѣло, начиная съ конечностей, болѣе и болѣе холодѣетъ, такъ что руки и ноги дѣлаются совсѣмъ холодными, ногти синѣютъ, лицо, прежде блѣдное, дѣлается живымъ, глаза свѣтлыми, блестящими, пульсъ или замедляется, или дѣлается волнистымъ, оставаясь довольно полнымъ, или бываетъ очень малый, сжатый и рѣдкій; испраженія на низѣ приостанавливаются, моча нерѣдко малоколичественна и большею частію свѣтлая, иногда красная; безпокойство, безпрестанное ворочанье и крикъ. Бредъ бываетъ то въ видѣ саморазглагольствія, то въ видѣ неудовольствія, гнѣва и самаго бѣшенства. Такое состояніе продолжается отъ 14—21 дня, считая отъ начала болѣзни. Наконецъ настаетъ безпамятство, лицо темнѣетъ, глаза заволакиваются подъ лобъ, скашиваются, является смѣхъ (сардоническій), нерѣдко съ хохотомъ, подергиваніе сухихъ жилъ въ рукахъ и даже во всемъ тѣлѣ, пульсъ стано-

вится неощутительнымъ, дыханіе труднымъ и рѣдкимъ: холодный потъ то на одной головѣ, то на всемъ тѣлѣ, истощеніе силъ — и смерть, при корчевыхъ движеніяхъ всего тѣла.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ особенной крѣпости нервной системы, при тупой раздражительности всѣхъ подлежащихъ ей системъ, особенно кровотворительной и плототворительной. Люди флегматико-меланхолическаго темперамента расположены къ этой болѣзни.

Причины внѣшнія (производящія): 1) Особенное повальное состояніе воздуха, свойственное преимущественно лѣтнему времени. 2) Продолжительное дѣйствіе страстей возбуждающихъ. 3) Злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, особенно при содѣйствующей простудѣ. 4) Особенная зараза, образующаяся въ больныхъ этою горячкою и легко сообщаемая здоровымъ (рѣдко).

Сущность чисто-нервной горячки состоитъ въ излишне-возвышенной, напряженной раздражительности нервной системы и особенно мозговой, съ неистощимостію силъ, такъ что больные, оставаясь долгое время безъ сна и пищи, сохраняютъ довольно крѣпости и въ ослабѣвшей оттого раздражительности и бездѣйствіи всѣхъ подлежащихъ ей системъ, за исключеніемъ отдѣлительныхъ. Больные въ такомъ состояніи не чувствительно переносятъ сильный холодъ и жаръ, даже жесточайшіе удары, безъ поврежденія въ тѣлѣ *).

Распознаваніе чисто-нервной горячки очень удобно; стоитъ только обратить вниманіе на бредъ и поступки больного, обнаруживающіеся безъ присутствія жара.

Предсказаніе въ чисто-нервной горячкѣ относительно опасности для жизни очень неблагоприятно, особенно когда средства, употребляемые со всею точностію и расчетливостію, не производятъ желаемого дѣйствія, какъ то бываетъ съ средствами наружными раздражающими, которыя, будучи приложены на нѣсколько часовъ, или совѣзмъ не оставляютъ по себѣ никакой красноты, или оставляютъ очень малую и на самое короткое время. Продолжается болѣзнь во многихъ случаяхъ до 42 дня, а при сильнѣйшемъ развитіи дѣлается смертельною въ 21-й день, 17 и даже въ 12 день. Если больной пережилъ 21 день, то съ большею вѣроятностію можно ожидать счастливаго исхода болѣзни въ 42 день. На что кромѣ того слѣдуетъ обращать особое вниманіе вообще для опредѣленія опасности болѣзни, упоминается въ предсказаніи нервной горячки вообще (см. выше).

Исходы. *Въ здорově* нервная горячка переходитъ хотя медленно, но съ явными критическими признаками, появляющимися въ урочное

*) Въ 1841 году одна изъ моихъ больныхъ этою болѣзнію, лѣтъ 40 отъ роду, была заперта въ комнатѣ третьяго этажа высокаго каменнаго дома, бросилась изъ окна внизъ на землю и не только не ушиблась, но, упавши, встала и пошла не чувствуя боли; отъ такого паденія никакихъ для нея вредныхъ послѣдствій не было.

времени, какъ-то: мочею, потомъ, а иногда носовымъ кровотеченіемъ. *Большии*, въ которыя она переходитъ большею частію, суть: *политическое ума, разстройство* одного или нѣсколькихъ чувствъ, продолжительное *изнуреніе силъ*, или частное *паралитическое состояніе*. *Смертнѣю* болѣзни оканчивается большею частію въ 12, 17, 27 и 42 день быстро, при предшествующемъ погруженіи больного въ безчувственность, при остановкѣ всѣхъ отравленій и при судорожныхъ движеніяхъ или во всемъ тѣлѣ, или только въ нѣкоторыхъ его частяхъ.

П р и з н а к и воспалительно-нервной горячки, отличающейся припадами, свойственными чисто-воспалительной и чисто-нервной горячкѣ, суть слѣдующіе: сперва лихорадочные предвозвѣстники на короткое время, а иногда вдругъ бѣглый, непостоянный ознобъ и потомъ жаръ, но не непрерывный, а съ послабленіемъ и перемежками: то утромъ, то среди дня, то вечеромъ; точно также и другіе припадки, какъ-то: жажда, цвѣтъ тѣла и проч. развиваются постепенно и исчезаютъ. Такое состояніе продолжается 7—14 дней, потомъ жаръ исчезаетъ, силы больного упадаютъ, появляется клейкій и сильный потъ, кожа холодѣетъ, испражненія мочи и кала дѣлаются непроизвольными, ротъ занекается темноватою, иногда клейковатою мокротою, лицо сжмается, глаза дѣлаются мутными, нерѣдко наполняются гнойвидною матеріею, безчувствіе, подергиваніе сухихъ жилъ или цѣлыхъ частей тѣла, нерѣдко икота, иногда вспучиваніе живота, часто тонкія, едва замѣтныя на кожѣ пятна гниостнаго свойства. Это продолжается рѣдко далѣе 21 дня, а если продолжится, то къ 27 дню за истощеніемъ силъ слѣдуетъ смерть, которая, не смотря на крайнее истощеніе больныхъ, на ихъ непоправимое лицо, приближается медленно, потому что плотворительность и зависящая отъ него жизнѣдѣтельность еще очень долго держатся.

П р и ч и н ы внутреннія (предрасполагающія) воспалительно-нервной горячки состоятъ вообще въ возвышенной чувствительности нервной системы, при значительной раздражительности системы кровоносной. Воспалительно-нервной горячкѣ подвержены болѣе юноши, равнымъ образомъ расположены къ ней люди и другихъ возрастовъ, имѣющіе тѣло рыхлое, дряблое, съ возвышенною чувствительностью нервовъ, словомъ: люди слабого, нѣжнаго тѣлосложенія, очень чувствительные, бѣлокурые, женщины, особенно роженицы и дѣти.

П р и ч и н ы внѣшнія (производящія) одинаковы, какъ и въ предъидущей чисто-нервной горячкѣ; разница только та, что въ произведеніи воспалительно-нервной горячки онѣ дѣйствуютъ не такъ сильно и не поражаютъ нервы отупеніемъ, но возбуждаютъ ихъ, раздражая въ тоже время кровоносную систему.

С у щ н о с т ь воспалительно-нервной горячки отъ сущности предшествовавшей отличается тѣмъ, что нервная система поражена въ меньшей степени и притомъ не находится въ состояніи отупенія, а напротивъ, въ состояніи раздраженія и неправильной, безпорядочной дѣятель-

ности. Сверхъ того въ воспалительно-нервной горячкѣ явственно раздражена кровеносная система, чего не бываетъ въ горячкѣ чисто-нервной.

Распознаваніе воспалительно-нервной горячки по существеннымъ ея признакамъ не трудно.

Предсказаніе относительно опасности для жизни, въ высшемъ развитіи болѣзни, особенно при перевѣсѣ нервнаго характера, и притомъ, если болѣзнь будетъ запущена, нерѣдко дѣлается очень сомнительнымъ и даже совсѣмъ дурнымъ. Степень опасности бываетъ тѣмъ болѣе большая, чѣмъ сложнѣе болѣзнь. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе таково: если болѣзнь не запущена и не такъ сильна, то можетъ кончиться въ 12 и много въ 21 день; въ противномъ случаѣ можетъ продолжаться до 27 дня; сверхъ того для опредѣленія опасности болѣзни см. выше въ предсказаніи нервной горячки вообще.

Псходы. Переходъ этой горячки *изъ здоровья* совершается или постепеннымъ уменьшеніемъ всѣхъ существенныхъ ея признаковъ, что бываетъ въ продолжительномъ ея теченіи, или, напротивъ, явственными критическими признаками чрезъ потъ и мочу, что бываетъ при кратковременномъ ея теченіи. Но случается, что критическіе признаки, только менѣе полные, появляются и въ 21 день болѣзни. *Болѣзни*, въ которыя переходитъ обыкновенно эта горячка, суть: продолжительное *изнуреніе*, *головная слабость и боль*, *разстройство*, впрочемъ не важное, *пищеварительныхъ органовъ* и расположеніе къ перемежающимся лихорадкамъ. *Смертію* болѣзнь оканчивается или при развитіи признаковъ нервнаго страданія, особенно разстройства головы, или, напротивъ, при признакахъ возрастающаго изнуренія силъ и разрѣшимости крови.

Признаки гнилостно-нервной горячки, отличающейся небольшимъ развитіемъ припадковъ, свойственныхъ чисто-нервной горячкѣ, и послѣдующимъ за тѣмъ развитіемъ припадковъ, свойственныхъ гнилой горячкѣ, суть слѣдующія: сперва, или предвозвѣстники лихорадочные, или вдругъ бѣглый ознобъ, смѣняющійся жаромъ, съ тяжестью и болью головы, которыми больные страдаютъ въ теченіи 1—3 сутокъ. Жаръ потомъ развивается, но въ небольшой степени и бываетъ непостояненъ. Такое состояніе продолжается 7—12—14 дней. Далѣе силы слабѣютъ, являются: тихій бредъ, слизистый, нерѣдко тяжело-пахучій потъ и охлажденіе тѣла, поверхность котораго, начиная съ груди и конечностей, покрывается темными пятнами, часто въ видѣ полосъ; лицо дѣлается темнымъ, не чистымъ; испраженія низомъ непроизвольныя, темнаго, или бурога цвѣта, точно также и моча съ противнымъ запахомъ; такое состояніе, если оно начинается съ 7 дня, продолжается до 14; если съ 14, то до 21, нерѣдко даже до 32 дня. При этомъ наступаютъ: безчувствіе, не ощутительный пульсъ, рѣдкое и тихое дыханіе, томленіе и смерть.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Сырое, мокротное

тѣлосложеніе, возвышенная чувствительность, напряженіе и изнуреніе тѣла физическими и умственными трудами, разныя угнетающія страсти: горестъ; печаль, безнадежная любовь, потеря крови и другихъ соковъ (у женщинъ неумѣренное мѣсячное очищеніе, у мужчинъ потеря сѣмени чрезъ частое совокупленіе половъ, или рукоблудіе); кромѣ того всякая лихорадка, чрезъ изнуреніе больного, располагаетъ его къ этой горячкѣ, особенно у простаго народа, живущаго въ тѣсныхъ, темныхъ, грязныхъ, курныхъ избахъ, въ подвалахъ, гдѣ цѣлые десятии мужиковъ, часто съ женами и дѣтьми, съ трудомъ размѣщаются на полу, на лавкахъ, палатахъ, печкахъ и проч.

Причины вѣдѣнія (производящія): 1) Употребленіе худобащественной пищи и питья, что бываетъ особенно въ неурожайное, голодное время, равно и во время военное; такъ напр. въ 1812—13 годахъ горячка эта свирѣпствовала не только въ войскахъ, но между жителями тѣхъ мѣстъ, гдѣ армія Наполеона проходила въ Москву и обратно. 2) Продолжительная сырая погода въ весеннее, особенно въ зимнее время. 3) Неопрятныя жилища поселянъ, особенно темныя, сырыя и холодныя, съ спертыхъ, нечистыхъ, напитанныхъ животными испареніями воздухомъ, или зловредною пылью у расчесывальщиковъ шерсти. 5) Сырые вѣтры, дующіе чрезъ близъ-лежащія гнилыя болота. 5) Павальное (заразительное) свойство воздуха и особаго рода заразы, образующаяся въ тѣлѣ больныхъ, есть одна изъ губительныхъ причинъ, по которой гнилостно-нервная горячка иногда свирѣпствуетъ, не щадя ни возраста, ни пола, ни тѣлосложенія.

Сущность гнилостно-нервной горячки состоитъ въ томъ, что чувствительность и раздражительность высшей нервной системы хотя и бываютъ возвышенны, но не въ такой степени, какъ въ чисто-нервной горячкѣ, и органическая матерія имѣетъ видимо большую наклонность къ плоторазрушенію.

Распознаваніе этой болѣзни отъ горячекъ чисто-нервной и воспалительно-нервной, очень легко, особенно въ дальнѣйшемъ ея развитіи. Но отъ горячки нервно-гнилостной распознаваніе очень трудно. Различіе между ними слѣдующее: 1) въ горячкѣ нервно-гнилостной перевѣсъ бываетъ на сторонѣ гнилостнаго характера, а въ горячкѣ гнилостно-нервной на сторонѣ характера нервнаго, такъ что въ горячкѣ нервно-гнилостной спльнѣе развиваются припадки матеріальные, плоторазрушительные, припадки же динамическіе бываютъ слабѣе, и причина поражающая падаетъ болѣе на систему плототворительную и кровеносную, менѣе на нервную; въ гнилостно-нервной горячкѣ бываетъ на оборотъ. а потому въ ней сильнѣе развиваются припадки динамическіе, а матеріальные въ низшей степени. 2) Сверхъ того причины производящія между ними довольно различны.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, очень невыгодно; опасность тѣмъ больше, чѣмъ сильнѣе причины и чѣмъ далѣе ушла болѣзнь. Относительно продолжительности болѣзни оно сход-

ствуетъ съ предсказаніемъ въ предшествовавшихъ горячкахъ. На что вообще должно обращать при этомъ вниманіе, о томъ значится въ предсказаніи нервной горячки вообще (см. выше).

Исходы гнилостно нервной горячки почти *сходны* съ исходами чисто-нервной горячки. Разница заключается только въ томъ, что отъ гнилостно-нервной горячки больные умираютъ скорѣе. При значительномъ развитіи гнилостнаго характера смерть слѣдуетъ въ 12—13 день, а при характерѣ болѣе нервномъ въ 21—42 день.

Лѣченіе діететическое во всѣхъ видахъ нервной горячки требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Людямъ, расположеннымъ ко всѣмъ видамъ этой горячки или къ которому либо изъ нихъ, должно совѣтовать въ предохраненіе себя избѣгать всѣхъ причинъ внѣшнихъ, производящихъ при данномъ предрасположеніи опредѣленный видъ нервной горячки. Разчесывальщикамъ же шерсти совѣтовать соблюдать особенныя, изложенныя для нихъ правила въ особомъ описаніи рабочихъ поселянъ по ихъ быту и званію 2) Во время повального свирѣпствованія нервной горячки въ какомъ либо изъ вышеозначенныхъ видовъ должно настойчиво совѣтовать, всѣмъ возможными мѣрами, убѣждать, чтобы больные съ здоровыми не мѣшались и отнюдь не сообщались, а, напротивъ, были совершенно удалены одни отъ другихъ. 3) При уходѣ за больными и ихъ лѣченіи, всѣмъ близко подходящимъ и прикасающимся къ нимъ слѣдуетъ соблюдать тѣже предохранительныя мѣры, какія показаны въ сопянномъ лѣченіи гнилой горячки, т. е., подходить, нюхать намоченныя укусомъ губку или платокъ, обтирать имъ руки, но уходъ скорѣе обмывать ихъ и даже перемѣнять платье. 4) Больного, одерживаемаго нервическою горячкою, какого бы она вида ни была, должно содержать на свѣжемъ воздухѣ, въ покоѣ: малѣйшее движеніе отягчитъ его, обезпокоитъ и подвергнетъ обмороку. Кромѣ того нужно ободрять его духъ, оживлять и ласкать надеждою скорого выздоровленія; ничего нѣтъ вреднѣе, какъ представлять нервическому больному ужасы, и чрезъ то настраивать воображеніе его на печальный ладъ. 5) Силы больного поддерживать и укрѣплять питательною пищею и питьемъ, напр. хорошою кашницею, похлебкою, супомъ, приправленными лавровымъ листомъ, перцемъ, миртовыми ягодами и т. п. которые лучше давать почаще но понемногу, нежели рѣдко и въ большемъ количествѣ. Къ кушаньямъ полезно прибавлять понемногу краснаго или бѣлаго винограднаго вина, особенно въ чисто-нервной горячкѣ (бѣлая горячка). Питье самое лучшее въ этомъ случаѣ — свѣжая ключевая вода, сыворотка съ виномъ, лимонадъ; для возбужденія испарины въ тѣлѣ: теплый чай изъ соломы, бугвицы, сухой малины, цвѣтовъ липовыхъ и бузиновыхъ съ чайною ложечкою винограднаго вина или рома, особенно въ бѣлой горячкѣ; при недостаткѣ этихъ средствъ можно употребить простое подпаленое вино, подправленное медомъ, имбиремъ, калганомъ и даже перцемъ, варенуха, квардакъ, (вареное пиво съ виномъ), глинтвейнъ и обыкновенный обитень, особенно приправленный корицею,

гвоздиною, и т. п. составляют полезное питье, если будутъ употреблены умеренно и не болѣе, какъ разъ и два въ сутки, соразмѣрно свойству и напряженности припадковъ. 6) Въ сильной степени болѣзни, когда больные, теряя сознание, ничѣмъ не выражаютъ своихъ нуждъ, надо смотрѣть за ними внимательно и при всякомъ движеніи рта, шевеленіи губъ, подносить имъ питье простой воды, съ уксусомъ, кислымъ сокомъ, виномъ, а во время обмороковъ подносить къ носу нюхательный спиртъ (нашатырный), или платокъ, или конецъ полотенца, намоченный крѣпкимъ уксусомъ, а лицо освѣжать обтираніемъ водою пополамъ съ уксусомъ, или виномъ. Во всемъ прочемъ поступать такъ же, какъ съ больными, одержимыми гнѣлою горячкою (см. діет. лѣч. гн. гор.) 7) Такъ какъ больные выздоравливаютъ отъ этихъ болѣзней большею частію очень медленно, то нужно строго смотрѣть, чтобы они при этомъ не простудились, не разстроили желудка пищею, не были встревожены чѣмъ либо душевно. Во избѣжаніе этого должно давать имъ, и во время выздоравливанія, съ осторожностію и въ маломъ количествѣ, легко вареную пищу (похлебку, супъ изъ курицы, уху, яйцо въ смятку, молоко), для питья — воду съ виномъ; занимать ихъ легкими пріятными разсказами, гдѣ можно чтеніемъ, почаще и подолѣе доставлять имъ случай дышать свѣжимъ, чистымъ воздухомъ.

Лѣченіе существенное. Ко всякому, страдающему нервною горячкою больному нужно пригласить врача, или же отослать его въ больницу, но если нельзя сдѣлать ни того, ни другаго, то въ этомъ лѣченіи можно ограничиться слѣдующими простыми средствами:

Въ чисто-нервной (бѣлой) горячкѣ, съ цѣлью возбудить дѣятельность въ отдѣлительно-испражнительныхъ органахъ и чрезъ то отвлечь раздраженіе отъ высшей нервной системы (мозговой), даютъ въ началѣ болѣзни (въ теченіе первыхъ трехъ или четырехъ дней) *рвотное* изъ *рвотнаго* корня около $\frac{1}{8}$ золотника въ мелкомъ порошокѣ съ тепловатою водою, или чаемъ изъ ромашки; а если больной чувствуетъ тяжесть и боль въ желудкѣ, позывъ къ рвотѣ, то съ пользою даютъ *рвотное* изъ *рвотнаго* камня въ растворѣ (№ 184), пока вырветъ больного раза два и три. Въ первомъ случаѣ рвотное производитъ благотворное потрясеніе во всемъ тѣлѣ, испарину и другія превосходныя дѣйствія, а въ послѣднемъ оно, извергая не нужное и вредное содержимое въ желудкѣ, восстанавливаетъ отдѣленія и испражненія. Эти рвотныя, въ случаѣ надобности, когда первое рвотное не произвело желаемого успѣха, повторяютъ разъ и два въ теченіе первыхъ трехъ или четырехъ сутокъ болѣзни; но если кто изъ больныхъ не пожелаетъ рѣшиться почему-либо на принятіе рвотнаго, то должно дать *слабительное* изъ сухой *коры крушины* (№ 74), *тертаго ревеня*, настоеннаго въ сывороткѣ съ виномъ (1—2 зол. ревеня, 1—2 рюмки сыворотки и вина поровну, настоявъ нѣсколько часовъ, давать по рюмкѣ, до дѣйствія), либо изъ *александрійскаго листа* одного (№ 118), и съ *черносливомъ* (№ 185). Если у больного тяжесть и боль въ головѣ, то нужно примачивать ее тепловатымъ виннымъ ук-

сусла пополамъ съ *настоями мяты* или *ромашки*, посредствомъ сложенной въ четверо и намоченной ими ветошки; либо надѣвать на голову *колпакъ* съ легкими *ароматическими травами*: *ромашкою*, *душицею*, *мятою* и *хмелемъ* въ случаѣ бессонницы. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, и больной впадаетъ въ бредъ, то необходимо приложить *нарывной пластырь* къ затылку (№ 58) и даже въ крайнихъ случаяхъ къ обритой головѣ. Въ случаѣ опасности, особенно когда больной приходитъ въ состояніе безчувственности отъ онѣмѣнія мозговыхъ нервовъ, нарывныя средства нужно поддерживать непрерывно, прикладывая этотъ пластырь то къ затылку, то къ головѣ, то къ тому, то къ другому мѣсту ея. Ни въ какой болѣзни не бываютъ такъ нужны и полезны эти послѣднія средства (нарывныя), какъ въ этой. Они одни нерѣдко бываютъ спасеніемъ больного. Они не только возбуждаютъ кровообращеніе своимъ раздраженіемъ, но еще, производя отвлеченіе болѣзни отъ внутреннихъ центральныхъ, пораженныхъ ею частей, способствуютъ критическимъ отдѣленіямъ и испражненіямъ, а иногда и замѣняютъ ихъ, какъ рѣдко бывающія въ этомъ видѣ горячки. Для внутренняго употребленія въ этомъ случаѣ полезна *хлориновая вода* (№ 186). Если болѣзнь, видимо, произошла съ перепоя, то необходимо, сверхъ того, давать *доверовъ порошокъ* (№ 137); онъ успокоиваетъ раздраженные и напряженные нервы, располагаетъ къ испаринѣ, ко сну и восстанавливаетъ равномерную жизнедѣятельность во всемъ организмѣ. Въ бѣлой горячкѣ, въ слѣдствіе запоя и другихъ болѣзней, у людей, преданныхъ спиртнымъ напиткамъ, необходимо давать больному, какъ лѣкарство, привычную для него *водку съ водою* (1 стаканъ вина на 1 фунтъ или 3 стакана воды) и предоставить ему пить ее вдоволь, сколько захочетъ, причемъ сверхъ того Шрейберъ совѣтуетъ давать больному и *пищу, приправленную водкою*, и запираетъ его въ комнатѣ. Въ теченіе перваго дня больной обыкновенно напивается до безчувствія и впадаетъ въ продолжительный сонъ, но около 5-го дня онъ получаетъ такое сильное отвращеніе отъ водки, что навсегда излѣчивается отъ пьянства. Бребель рекомендуетъ *смѣсь* изъ $\frac{1}{2}$ золотн. *крепкой спиртной кислоты*, 1 золот. *экстракта квасцовъ* и $\frac{1}{2}$ фунта (до $1\frac{1}{2}$ стакана) *виннаго спирта*—давать больному 4—6 разъ въ день по столовой ложкѣ; онъ увѣряетъ, что эта смѣсь, производя отвращеніе отъ водки у людей, пьющихъ запоемъ, совершенно излѣчиваетъ ихъ отъ пьянства. Гауровицъ отдаетъ преимущество *богородской травѣ*, употребляя ее въ наливкѣ, которая готовится изъ 7 золотн. травы на 1 фунтъ (3 стакана) кипятку, настаивается часъ и дается каждыя полчаса по чайной чашкѣ. По наблюденіямъ Целлера бѣлая горячка проходитъ также отъ употребленія *сусла* изъ плодовъ или *муста* *). Въ Малороссіи, гдѣ большое изобиліе плодовъ, съ незапамятныхъ временъ употребляютъ съ успѣхомъ въ этомъ случаѣ сусло изъ плодовъ, которыхъ поятъ

*) Др. Зпр. 1815 г. № 44. стр. 349 и 350.

вдоволь больного. Нѣкоторые даютъ въ этомъ случаѣ *вино* пополамъ съ *деревянныиъ масломъ*. (рюмку вина и рюмку масла въ стаканъ). за одинъ пріемъ является сонъ и больному бываетъ легче. Въ моей практикѣ удачнѣе были успѣхи: отъ дѣйствія *рвотнаго камня*, употребляемаго по способу Ш. Л. Зейдера въ *растворъ съ виномъ* (№ 201); при этомъ нужно знать: 1) что чѣмъ болѣе расположенъ больной къ рвотѣ, тѣмъ меньше долженъ быть пріемъ рвотной соли, и на оборотъ; и 2) что примѣшиваніе этого средства къ вину должно быть тайною отъ больного, чтобы онъ не зналъ и даже не подозрѣвалъ, что въ винѣ, которое онъ пьетъ, есть лѣкарство; въ противномъ случаѣ все будетъ испорчено, больной пить вино не будетъ и станетъ доставать себѣ другаго укрادкою отъ окружающихъ, либо будетъ заблаговременно запасать себѣ въ потайномъ мѣстѣ водку къ приближающемуся сроку запоя и пить ея тоже укрادкою отъ приближенныхъ. Отъ означеннаго выше средства происходитъ рвота и такое неимовѣрное отвращеніе къ водкѣ, что больной долгое время не можетъ даже смотрѣть на сосудъ, въ которомъ оно обыкновенно бываетъ, безъ того, чтобы его не отвратило и не стошнило при этомъ. Тотчасъ послѣ рвоты онъ обыкновенно перестаетъ пить водку (говоря, что утроба его не принимаетъ), выздоравливаетъ послѣ перваго лѣченія, отъ запоя большею частію на три мѣсяца; послѣ втораго такого же лѣченія (тоже секретнаго), выздоравливаетъ на $\frac{1}{2}$ года; а послѣ третьяго такого же лѣченія на годъ, и даже и совсѣмъ перестаетъ пить водку навсегда, при этомъ однако необходимо нужно, чтобы и секретъ лѣченія былъ навсегда для него тайною, въ противномъ случаѣ онъ опять примется пить съ болѣшимъ ожесточеніемъ.

Если въ теченіе болѣзни у больного будетъ запоръ, то для восстановленія свободнаго испражненія низомъ нужно наставлять чрезъ каждые два дня *промывательное* (глистиръ), составленное изъ *молока* пополамъ съ *водою* и съ небольшимъ количествомъ сахара. Если этого будетъ недостаточно для произведенія желаемаго дѣйствія, то надобно прибавить въ глистиръ ложку обыкновенной поваренной *соли*. Но ежели, напротивъ, у больного сдѣлается сильный поносъ въ родѣ мыта, то надлежитъ давать ему въ маленькихъ пріемахъ *терьякъ*, взятый изъ аптеки, нѣсколько разъ въ день, или вмѣсто обыкновеннаго питья давать ему *отваръ мыла* (№ 187), или даже и одинъ мѣлъ въ порошокъ, ежедневно по 7 золотниковъ съ водою. Во время слабости и изнуренія тѣла нужно обтирать больного почаще тепловатымъ ренскимъ или простымъ *уксусомъ* пополамъ съ *виномъ*; обтираніе это освѣжаетъ и подкрѣпляетъ его силы. Но не должно безпокоить больного ничѣмъ изъ лѣкарствъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ, когда замѣчено будетъ, что наступаетъ переломъ болѣзни (*кризисъ*) потомъ ли (влажная сырая мягкая кожа), мочею ли, сыпью ли чечевиче-подобною, выступающею иногда около 9-го или 10-го дня, — чтобы не воспрепятствовать цѣлебному дѣйствію самой природы, и слѣдуетъ лишь поддер-

живать больного діететически надлежащимъ содержаніемъ, приличною пищею и питьемъ. Если горячка видимо то ослабѣваетъ, то опять ожесточается и больному бываетъ то лучше, то хуже, съ перемежками, что очень часто случается въ исходѣ болѣзни, въ такомъ случаѣ нужно давать больному третью *кору ивы*, настоенную *въ водѣ* или виноградномъ *винѣ*, подобно *какъ хину*, либо самую хину (№ 183), по рюмкѣ, три или четыре раза въ день, если желудокъ больного можетъ споспѣть ее, въ противномъ случаѣ — распустивъ хинной соли $\frac{1}{8}$ золотн. въ бутылкѣ отварной воды, давать точно также больному по рюмкѣ. Въ Псковскомъ уѣздѣ и самомъ Псковѣ, въ 1836 году, съ февраля по іюль, повально господствовала нервная горячка по причинѣ непостояннаго весенняго состоянія атмосферы, и распространялась между простымъ народомъ отъ недостаточной въ количествѣ и качествѣ пищи. При строгомъ соблюденіи діететическихъ правилъ лѣченіе простымъ и дешевыми средствами было очень успѣшно. При засореніи желудка приносила пользу *рвотная соль* (рвотный камень), въ малыхъ приемахъ, въ наливкѣ *бузины, ромашки, мяты, липоваго цвѣта*, иногда *съ миндереровымъ спиртомъ*, для возстановленія правильной испарины; снаружи хорошо помогали *горчичники, хръгъ*; въ отчаянныхъ случаяхъ *обмываніе холодноватою водою* всего тѣла и преимущественно частое *примачиваніе* головы. При переходѣ горячки въ чисто-нервное состояніе рвотная соль употребляется въ настоѣ *валеріаны* (мауный корень), *со спиртомъ селитро-сладкимъ*, рѣдко *съ гофманскими каплями*, пеще рѣже *съ камфорою*. *Хлоровая вода* употреблялась въ семинарской больницѣ съ отличнымъ успѣхомъ внутрь и ею обтираемо было тѣло больныхъ, одержимыхъ тифозною горячкою *).

Въ горячкѣ воспалительно-нервной должно давать больному въ началѣ болѣзни *прохлаждающія слабительныя изъ чернослива, изюма, сыворожки съ селитрою* (№№ 97, 98, 99, 100), либо *порошки изъ нашатыря съ кремортартаромъ и ревенемъ* (№ 65). Въ то же время все тѣло обтирать *уксусомъ съ водою*, взятыми по ровну. Въ страданіяхъ головы прикладывать *горчичники* (№№ 88, 89, 90) къ рукамъ противу пульса, къ икрамъ ногъ; къ спинѣ, попеременно то къ тому, то къ другому мѣсту, а къ бокамъ живота или къ подреберьямъ мягчительный, *простонародный* прохлаждающій *составъ изъ глины съ уксусомъ*, чернымъ *яблочемъ, яичными бѣлками, тертою морковью и горчицею* (№ 182). Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то представить *плевницы* къ вискамъ или за ушами 6—12, смотря по тѣлосложенію, возрасту больного и степени его болѣзни, а голову постоянно примачивать *уксусомъ съ водою и мятнымъ настоемъ* посредствомъ намоченной, въ четверо сложенной, ветошки. Вообще лѣченіе этой болѣзни во всемъ сходствуетъ въ первомъ срокѣ ея (въ періодѣ призна-

*) Тифозными горячками называются горячки гнилостно-нервные и нервно-гнилостныя. (Др. Здр. 1837 г. № 10 стр. 80).

ковъ воспалительныхъ), съ лѣченіемъ воспалительной горячки, (за исключеніемъ кровопусканія изъ вены), а въ срочѣ, обнаруживающемъ болѣе страданіе нервовъ, съ лѣченіемъ нервной горячки, такъ что средства для существеннаго лѣченія этой болѣзни нужно заимствовать изъ соимяннаго лѣченія горячекъ: воспалительной и нервной, съ частнымъ примѣненіемъ къ данному случаю по соображенію свойства болѣзни.

Лѣч е н і е горячки гнилостно-нервной сходствуетъ съ соимяннымъ лѣченіемъ горячки нервно-гнилостной съ тою разницею, что здѣсь нужно дѣйствовать средствами болѣе противу-нервными, взятыми изъ лѣченія чисто-нервной горячки, чѣмъ противу-гнилостными. Для избѣжанія затрудненія въ соображеніи и выборѣ средствъ на этотъ случай, гораздо лучше ограничиться однимъ діететическимъ лѣченіемъ и наружными средствами, которыя совершенно одни и тѣже, какъ и въ предшествовавшихъ горячкахъ. При этомъ надобно только избѣгать употребленія шпанскихъ мухъ, потому что послѣ ихъ легко слѣдуетъ омертвѣніе. Въ случаѣ крайности *нарывной пластырь* съ шпанскими мухами должно соединять съ большимъ количествомъ *камфоры*. Бромъ того здѣсь особенно нужно и полезно обтирать все тѣло почаще простымъ *виномъ съ камфорой*, или *французскою водкою*, а также употреблять *ванны изъ барды*.

Прим. При лѣченіи поселянъ-рабочихъ, какъ то: расчесывальщиковъ шерсти и другихъ, подвергшихся этой болѣзни, непременно нужно соображаться съ особыми, изложенными для нихъ, правилами въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лихорадки.

Раздѣленіе. Лихорадки по способу ихъ происхожденія бываютъ вообще двоякаго рода: или отъ причинъ собственно со стороны организма, безъ всякаго почти участія внѣшнихъ вліяній, или отъ причинъ собственно со стороны внѣшнихъ вліяній, безъ всякаго почти участія организма. Въ первомъ случаѣ лихорадки называются *припадочными*, а въ послѣднемъ *перемежающимися*.

Лихорадки припадочныя.

Опредѣленіе. Лихорадками припадочными называются тѣ, которыя происходятъ отъ причинъ собственно со стороны организма, безъ всякаго почти участія внѣшнихъ вліяній, обнаруживаются лихорадочными припадками, неравномѣрно продолжающимися, и состоятъ преимущественно изъ періода жара и пота.

Распознаваніе. Если жаръ и потъ у больного бываютъ то по утру, то вечеромъ, то два раза, то пять разъ въ день, продолжаются то очень короткое, то значительно долгое время, и притомъ ознобъ бываетъ небольшой, кратковременный, напротивъ того, жаръ значитель-

ный и потъ проливной,—то все это ясно выражаетъ лихорадку припадочную.

Причины динамическія: тоска, особенно по отчизнѣ, отчаяніе, безнадежная любовь, сильное честолюбіе, сильныя душевныя занятія, непомѣрныя тѣлесныя тяжелыя работы, неумѣренныя половыя отправления, особенно въ видѣ рукоблудія, нищета, разнаго рода лишенія и старость; *органическія:* послѣдствія другихъ болѣзней въ тѣлѣ, затвердѣнія, отолстѣнія, нагноенія, изліяніе сыворотки, также кроющіяся въ тѣлѣ худосочія: золотушное, ревматическое, цынготное, любострастное.

Раздѣленіе. Сообразно этимъ причинамъ припадочныя лихорадки бываютъ трехъ родовъ. 1) *Нервная медленная:* въ ней не замѣчается никакого мѣстнаго страданія, но общая слабость тѣла, слабый пульсъ, моча то свѣтлая, какъ вода, то мутная, чувствительность къ холоду, чаще ознобъ нежели жаръ, рѣдко потъ, уныніе, грусть, ипохондрическіе или истерическіе припадки, особенно по утрамъ, на тощахъ, ожесточеніе лихорадки въ это время и послабленіе ея послѣ обѣда. Эта лихорадка особенно замѣчается послѣ нервной горячки, неумѣренности въ соитіи половъ, большой потери крови, послѣ бѣлей, поноса, пота, умственныхъ занятій и причинъ динамическихъ; при ней больной таетъ какъ снѣгъ, безъ видимой явной боли. 2) *Чажоточная:* при ней замѣчается мѣстное страданіе, кашель съ обильною мокротою, обширное нагноеніе при ранахъ, язвахъ, нарывахъ, сверхъ того она отличается отъ нервной тѣмъ, что въ ней замѣчается явный жаръ, наклонность къ воспаленію; лихорадка ожесточается послѣ обѣда, причемъ на щекахъ видѣнъ багровый румянецъ, а ладони и подошвы горятъ: къ утру появляется клейкій, кислый, обильный потъ и безъ особенной, явной причины происходитъ изнурительный поносъ, сначала кратковременный, потомъ продолжающійся нѣсколько дней и даже недѣль, испражняющій низомъ бѣловатую, питательную жидкость. 3) *Изнурительная,* сходящаяся съ нервной и отличающаяся отъ нея тѣмъ особенно, что въ ней лихорадочныя пароксизмы бываютъ правильнѣе и постояннѣе, притомъ сильно развивается жаръ, чего въ нервной медленной лихорадкѣ не примѣчается, зависитъ отъ значительной степени отвердѣнія и расстройства внутренностей, заваловъ въ печени, селезенкѣ, въ кишечныхъ желѣзахъ, бугорковъ въ легкихъ, расширенія сердца или большихъ кровяныхъ сосудовъ, золотухи, любострастной, цынготной, водяной болѣзни, застрѣлаго ревматизма, разныхъ сыпей, чесотки, лишая, болтуна и проч.

Лѣченіе діететическое. Припадочныя лихорадки, какъ слѣдствія другихъ болѣзней, рѣдко излѣчиваются, потому что ихъ причины или неизвѣстны, или ихъ нельзя удалить; согласно этому нужно начинать лѣчить ихъ по предварительному совѣщанію съ врачомъ. Въ нервной лихорадкѣ, главное, слѣдуетъ удалить причины болѣзни, если онѣ извѣстны, будетъ ли такая причина изъ числа вышеозначенныхъ

динамическихъ, или органическихъ; прекратить умственные занятія, изнурительныя работы, плотское совокупленіе половъ, рукоблудіе, поселить больного въ свѣтлой, сухой комнатѣ, между пріятными для него людьми, почаще выводить его на свѣжій воздухъ въ теплое время: по утрамъ и вечеромъ на солнце, а днемъ подъ тѣнь въ садъ, лѣсъ, рощу; совѣтовать ему дѣлать прогулки пѣшкомъ или путешествія съ хорошими людьми, особенно на богомолье (ничто такъ не успокоиваетъ и не укрѣпляетъ духъ, какъ усердная молитва), и въ мѣста, имѣющія теплый здоровый климатъ; движеніе на воздухѣ освѣжаетъ и укрѣпляетъ слабые нервы. Пищу ему должно употреблять хорошую, легковаримую, питательную, въ питье — свѣжую, чистую ключевую воду съ виномъ краснымъ, бѣлымъ и всѣми сортами ихъ, особенно въ странахъ, изобилующихъ ими, напр. въ Крыму и т. п. Въ Малороссіи наливки: вишневая, черешневая и другія, такъ хорошо приготовляются, что замѣняютъ въ этомъ случаѣ виноградныя вина. Въ степяхъ Оренбургской губерніи кумысъ въ этомъ случаѣ есть единственный цѣлебный напитокъ; тамъ его пьютъ много, и онъ нерѣдко замѣняетъ даже самую пищу, потому что очень легко и питателенъ.

Лѣченіе существенное должно состоять въ употребленіи *теплыхъ ваннъ съ отрубями, солодомъ съ ароматными травами*, какъ то: *душицею, ромашкою, полынью, тредолью* и т. п. (2—5 ф. на каждую ванну). Жители винокуренныхъ заводовъ съ пользою употребляютъ въ этомъ случаѣ *ванны съ бардою*, а въ Липецкѣ и на Кавказѣ *железныя минеральныя воды* оказываютъ хорошее цѣлебное дѣйствіе какъ въ питьѣ, особенно съ молокомъ, такъ и въ ваннахъ, приготовляемыхъ изъ нихъ каждодневно поутру и вечеромъ. Кромѣ того общепринятое народное употребленіе *настоекъ* на водкѣ изъ травъ: *полыни, тредоли*, корня *аира, горячавки*, оказываетъ въ этомъ случаѣ нерѣдко видимую пользу, но этого же рода настойки могутъ быть полезны и на водѣ. Чтожъ касается до *хины*, то *отваръ*-ея (№ 47), равнымъ образомъ холодной водяной *настой* (№ 183), употребляемый по рюмкѣ 2—4 раза въ сутки, суть наилучшія для этого средства. Привыкшіе къ употребленію водки могутъ точно также готовить этотъ настой хины и на простомъ очищенномъ, либо пѣнномъ, винѣ.

Ч а х о т н а я лихорадка не требуетъ никакого особеннаго лѣченія, кромѣ лѣченія болѣзни, отъ которой она зависитъ и съ которой она и обанчивается — *смертію, рѣдко выздоровленіемъ*.

Лѣченіе медленной лихорадки также зависитъ отъ лѣченія самой болѣзни — золотухи, цынги, ревматизма, ломоты, заваровъ и проч. Въ этихъ обоихъ видахъ лихорадки бесполезна и питательная діета, пока не прекратится главная болѣзнь.

Лихорадка перемежающаяся (лихоманка, тряска, тетка, бѣдница).

О п р е д ѣ л е н і е. Лихорадка перемежающаяся, или собственно лихорадка, обнаруживается ознобомъ, жаромъ и потомъ, продолжающимися извѣстное время, потомъ исчезающими, въ опредѣленное время опять возвращающимися, и опять исчезающими и т. д. При этомъ появленіе припадковъ называется *приступомъ*, или лихорадочнымъ *пароксизмомъ*, продолжающимся отъ 4 до 6—12 часовъ, а отсутствіе ихъ до слѣдующаго приступа *перемежкой*.

П р и з н а к и. Правильная лихорадка начинается предвѣстниками: потяготою, зѣвотою, лѣнью и усталостію, потомъ дрожью, переходящею въ ознобъ, смѣняемый жаромъ, который оканчивается теплымъ, повсемѣстнымъ потомъ; во время дрожи и озноба пульсъ бываетъ твердый, скорый, сжатый, въ жару — полный и скорый, а при потѣ мягкій; моча при ознобѣ блѣдая, свѣтлая, при жарѣ красная и свѣтлая, а послѣ пота мутная, съ осадкомъ кирпичнаго цвѣта; во время озноба больного томить жажда, во время жара мучить головная боль. У людей молодыхъ, полнокровныхъ, впервые подвергшихся лихорадкѣ, ознобъ бываетъ очень сильный, такъ что тѣло сжимается какъ бы отъ стужи, кольца спадываютъ съ пальцевъ, больной стучитъ зубами, какъ сильноозябшій, подпрыгиваетъ на кровати и не можетъ нагрѣться въ теплой печкѣ, подъ шубами и перинами; на столько же силенъ бываетъ и жаръ; отъ больного пышетъ, какъ отъ нагрѣтой печки, онъ изнемогаетъ отъ внутренняго жара, стонетъ, мучится, не терпитъ никакого покрова и сильно страдаетъ отъ головной боли. Съ появленіемъ теплаго пота сначала на лбу, потомъ на груди, спинѣ, животѣ и наконецъ на всемъ тѣлѣ, и иногда до того обильнаго, что промокаетъ все бѣлье и постель, всѣ припадки лихорадки прекращаются, больной забывается, засыпаетъ и пробуждается какъ бы совсѣмъ здоровымъ.

Р а з д ѣ л е н і е. 1) *По приступамъ*: приступы (пароксизмы), которые обыкновенно появляются правильно въ извѣстное время разъ въ сутки, чрезъ 24 часа (лих. *ежедневная*), разъ въ двое сутокъ, чрезъ 48 часовъ (лих. *трехдневная*), и разъ въ трое сутокъ, чрезъ 72 часа (лих. *четырёхдневная*, и даже чрезъ семь дней (лих. *еженедѣльная*). Иногда въ извѣстное время, т. е. въ теченіи 24—48—72 часовъ бываютъ два приступа въ такомъ порядкѣ, что первый приступъ, по времени его появленія и по припадкамъ, соответствуетъ третьему, а второй четвертому. Такая лихорадка называется *двойною*. 2) *По проявленію формы*, болѣе или менѣе явственной и правильной, лихорадки перемежающіяся бываютъ: *явные*, правильныя, доброкачественныя, состоящія изъ явныхъ припадковъ, которые легко распознаются и легко излѣчиваются, и *скрытныя*, неправильныя, маскированныя, злокачественныя, появляющіяся въ неправильной формѣ и подъ видомъ боли

въ головѣ, въ зубахъ, животѣ, спинѣ, рукахъ, ногахъ, онѣмѣнія, паралича, сонливости, безгласія, безчувствія, глубокаго обморока, пострѣла, судорогъ, поноса съ рвотою на подобіе холеры, болю въ груди, воспаленія глазъ, легкихъ, печени, — и узнаются только по тому, что сказанные припадки появляются въ извѣстное время, потомъ проходятъ, опять возвращаются въ тоже время и т. д., и что послѣ нихъ приступа въ мочѣ замѣчается осадокъ кирпичнаго цвѣта. Маскированные лихорадки, появляющіяся подѣ видомъ сонливости, безчувствія, глубокаго обморока, пострѣла, паралича, судорогъ, встрѣчаются въ южныхъ мѣстахъ Россіи въ Малороссіи и въ Новороссіи, въ Бессарабіи, въ Крыму, по обѣимъ сторонамъ Кавказа, въ Подольской губерніи и Астрахани. 3) *По времени* года перемежающіяся лихорадки бываютъ: *весеннія*, которыя свирѣпствуютъ преимущественно съ марта мѣсяца (со времени таянія снѣга) до конца іюня, и *осеннія*, которыя свирѣпствуютъ преимущественно съ августа до декабря (до заморозокъ). Весеннія и осеннія лихорадки не составляютъ особенныхъ болѣзней, но, по свойству своему, онѣ бываютъ различны и заслуживаютъ нѣкотораго особаго вниманія. Эта особенность состоитъ въ томъ, что весеннія расположены къ воспаленію и большею частію бываютъ воспалительнаго свойства, а осеннія расположены къ гнилости и бываютъ большею частію свойства гнилостнаго.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ слабости силъ и изнуреніи тѣла. Такъ, обыкновенно подвергаются этимъ болѣзнямъ люди, поправляющіеся послѣ продолжительныхъ изнурительныхъ страданій, подверженные засоренію желудочно-кишечнаго канала, зависящимъ отъ малодѣятельности; также люди, находящіеся подѣ влияніемъ угнетающихъ страстей, ослабляющихъ нервы, и преданные сильнымъ продолжительнымъ тѣлеснымъ (рабочіе) и умственнымъ (ученые) трудамъ; завалы въ животѣ, худосочіе ломотное, любострастное, цынготное, золотушное; наконецъ сама лихорадка, долго продолжавшаяся, оставляетъ большое къ себѣ расположеніе и легко возвращается при малѣйшей неосторожности въ пищу и проч. Такіе люди имѣютъ болѣзненный, блѣдно-желтый, даже грязный цвѣтъ лица, опухоль въ животѣ, отеки ногъ, скоро устаютъ и неспособны ни къ какому продолжительному занятію.

Причины внѣшнія (производящія) земныя болотныя испаренія; по этому лихорадки бываютъ зимою, когда замерзла вода и земля, также въ холодныхъ гористыхъ песчаныхъ странахъ въ сухое время; но обыкновенно появляется въ прочія времена года, въ сырыхъ, низменныхъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ тепломъ климатѣ, въ дождливое, пасмурное, туманное время года, послѣ наводненія. По этому въ нѣкоторыхъ странахъ лихорадка есть собственно мѣстная болѣзнь, особенно между жителями по берегамъ рѣкъ, озеръ, болотъ. Тутъ она лѣтомъ, въ знойное время, дѣлается повальною, и во время полевыхъ работъ крестьяне, кочующіе на открытомъ мѣстѣ, на землѣ, занемога-

ють ею въ такомъ большомъ числѣ, что даже останавливаются полевья работы. Разстроенное пищевареніе, объяденіе, трудно-варимая пища (весною жирная рыба), сонъ послѣ обѣда на сырой землѣ, въ саду (при-спать лихорадку), у воды. простуда, промоченіе на дождѣ, купанье въ холодной водѣ, — все это бываетъ причиной лихорадокъ, почему ей особенно и подвержены *земледѣльцы, жнецы, косцы, олошники, рыболовы, баньщики, прачки, красильщики, садовники, огородники, стѣпатели риса, чистильщики и продавцы пеньки и льна, осушители болотъ, кирпичники, ткачи и ткачихи*. Поселяне, занимающіеся послѣдними тремя ремеслами, т. е. осушиваніемъ болотъ, дѣланіемъ кирпича и тканьемъ, страждутъ большею частію злокачественными лихорадками.

Сущность перемежающихся лихорадокъ состоитъ въ приливѣ крови отъ поверхности тѣла къ внутреннимъ его частямъ и въ отливѣ крови отъ этихъ частей опять къ кожѣ. Этотъ приливъ и отливъ крови сопровождается ознобомъ, жаромъ и потомъ; во время прилива кровь отъ кожи устремляется къ головѣ, груди и животу, и отъ того кожа пустѣетъ, дѣлается блѣдною, морщиноватою, сухою, жесткою, и появляется ознобъ; послѣ того цѣлительная сила больного противодействуетъ этому напору крови, силится прогнать её опять къ окружности тѣла, и наступаетъ жаръ, полнота въ кожѣ; наконецъ это возненіе крови, приливъ и отливъ, оканчивается потомъ, которымъ и рѣшается лихорадочный приступъ, опять появляющійся въ определенное время и въ прежнемъ порядкѣ.

Распознаваніе легко, исключая тѣхъ случаевъ, когда перемежающаяся лихорадка удвоится или утроится, и такимъ образомъ дѣлается похожею на горячку, особенно если удвоеніе случится въ лихорадкѣ перемежающейся ежедневной.

Предсказаніе въ перемежающейся лихорадкѣ, сравнительно съ предсказаніемъ въ горячкахъ, вообще лучше, особенно въ отношеніи опасности для жизни: потому что очень рѣдко случается, чтобъ перемежающаяся лихорадка оканчивалась смертію. Эти рѣдкіе случаи относятся или къ перемежающимся лихорадкамъ маскированнымъ злокачественнымъ, которыхъ пароксизмъ состоитъ не изъ озноба, жара и пота, а изъ другаго какого-либо припадка, опаснаго для жизни, — или къ органическимъ расстройствамъ, которыя находятся въ сопряженіи съ лихорадкою. Относительно продолжительности вообще ничего нельзя сказать опредѣлительнаго: иногда лихорадка оканчивается въ 1, 2 и 4 пароксизма, а иногда тянется мѣсяцы и годы, прекращается и опять возвращается. Въ частности же: *лихорадка явная, правильная, обнаруживающаяся въ настоящемъ своемъ видѣ, не опасна* и называется доброкачественною, потому что люди, страдавшіе до лихорадки расстройствомъ желудка и завалами брюшныхъ внутренностей, иногда избавлялись отъ этихъ болѣзней именно чрезъ лихорадку, которая вообще производитъ въ тѣлѣ больного сильный переворотъ, въ особенности ли-

хорадка *весною*, бывающая сверхъ того по благопріятному времени и *непродолжительною*; *осенній* лихорадки *опаснѣе* весеннихъ и тѣмъ упорнѣе, чѣмъ позже начинаются, такъ напр. сентябрскія и октябрскія бываютъ продолжительнѣе іюльскихъ и августовскихъ. *Четверодневныя, продолжительныя, упорныя*, перемежающія *лихорадки* также *опасны* по своимъ послѣдствіямъ, къ которымъ принадлежатъ: завалы брюшинныхъ внутренностей, худосочіе, водянка, разные нервныя болн.

Лѣченіе діететическое лихорадокъ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе себя отъ нихъ должно избѣгать всѣхъ вышеозначенныхъ производящихъ причинъ, особенно же должны быть осторожны люди, имѣющіе къ нимъ внутреннее предрасположеніе (см. выше). Во время работъ въ полѣ, если вода, какъ обыкновенное питье земледѣльцевъ, жнецовъ и косцовъ, бываетъ не хороша, отзывается вкусомъ дерева, травы, болота, — то, чтобы отнять у воды этотъ вкусъ, надо процѣживать ее сквозь угольный порошокъ, или наливать въ деревянное внутри выжженное ведро и прибавлять къ ней небольшое количество уксуса или водки, или то и другое вмѣстѣ. Сверхъ того, вышеупомянутымъ въ статьѣ причинъ вѣншихъ рабочимъ поселянамъ должно совѣтовать исполнять изложенныя для нихъ особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Страждущаго лихорадкою должно содержать такъ, чтобы приступъ заставлялъ его съ пустымъ желудкомъ, который въ это время не можетъ ничего переварить: по этому за 3, 4 часа до приступа онъ ничего не долженъ ѣсть, хотя бы и имѣлъ позывъ на ѣду; предъ приступомъ нужно развлекать вниманіе больного другими предметамъ, чтобы онъ мало думалъ о лихорадкѣ, приступъ которой отъ этого бываетъ легче; въ этомъ отношеніи полезно обманывать больного, переставивъ часы или солнечную замѣтку времени впередъ, и увѣрить его тѣмъ, что время приступа уже прошло. 3) При появленіи первыхъ признаковъ лихорадки, больной долженъ лечь въ постель и хорошо укрыться. Для утоленія жажды давать больному часто, но понемногу, пить воду, чай изъ бузины, ромашки, мяты, мелиссы. Во время жара содержать больного прохладнѣе; но не давать ему совсѣмъ раскрываться, чтобы не замедлить появленія пота: потъ его квасомъ, сливодоусъ кислымъ сокомъ, лимонадомъ. При появленіи пота, больного должно тщательно укрывать, защищать отъ простуды, вѣдѣть ему лежать въ постели спокойно, дать ему выпить теплаго чаю изъ липоваго цвѣта, бузины, соломы. позволить встать съ постели и переѣхать бѣлье не прежде, какъ совсѣмъ прекратится потъ; воздухъ у больного долженъ быть умѣренной температуры. Чѣмъ строже больной наблюдаетъ эти предосторожности въ приступѣ, тѣмъ лучше онъ себя чувствуетъ во время перемежки, отъ пренебреженія же ими и перемежка бываетъ несовершенна и приступъ жестокъ. 3) Во время приступа больному полезно также давать пить вдоволь ячный, овсяный отваръ или жиденькій настой ромашки. Если больной чувствуетъ унылость, то пусть пьетъ сыворотку въ виноградномъ винѣ, приправленномъ ли-

моннымъ сокомъ. Каждое изъ этихъ питій должно быть теплое, чтобы чрезъ то помочь появленію пота и уменьшить напряженность приступа.

4) Между приступами, т. е. во время перемижия, нужно поддерживать больного умѣреннымъ количествомъ пищи самой питательной, какъ-то: телячьими или цыплячьими бульонами, кашницею съ малымъ количествомъ вина, легенькими похлебками и т. п., но при ежедневной лихорадкѣ пища должна быть умѣренно питательная, а питье возбуждающее — согрѣвающее, какъ-то: вода съ медомъ, винограднымъ виномъ, бѣлымъ или краснымъ, приправленнымъ кислымъ сокомъ, клюквеннымъ, лимоннымъ, померанцовымъ, а иногда и слабенькій пуншъ. 5) Если больной въ состояніи въ хорошую погоду пройтись или прокатиться на лошади, то это для него полезно, но и дома онъ долженъ быть дѣтеленъ, потому что тѣлесное упражненіе принесетъ ему пользу. Ни отъ чего столько не длится лихорадка, какъ отъ неподвижности, бездѣйствія и унынія. Сонъ больного долженъ быть умѣренъ; послѣ полудня, до ночного, обыкновеннаго для сна времени, спать ему не должно. 6) Во все время лихорадки и потомъ еще въ теченіе шести недѣль соблюдать строгую діету: не ѣсть вообще рыбы, особенно щуки, налима, линя, сомины, молога, творогу, сметаны, масла, яицъ, особенно крутыхъ, свинины, ветчины, солонины, картофеля, мягкаго хлѣба, блиновъ, пироговъ съдобнаго тѣста; избѣгать простуды, купанья, житья около воды, обращенія съ женщинами; не употреблять безъ разбора слабительныхъ лѣкарствъ, а свободное испражненіе низомъ поддерживать промывательными, кускомъ сала или мыла, вводимымъ въ задній проходъ, растираніемъ живота и въ крайности ревенемъ. Многіе вылѣчиваютъ себя трехдневнымъ постомъ, т. е. въ теченіе трехъ сутокъ ничего не ѣдятъ и не пьютъ, кромѣ чистой ключевой воды, и вылѣчиваютъ себя прочно безъ возврата, нерѣдко отъ самыхъ продолжительныхъ, упорныхъ лихорадокъ. Вообще приличное и благоразумное содержаніе себя по вышеннеложеннымъ правиламъ очень часто излѣчиваетъ лихорадку одно безъ всякаго лѣкарства, если она не злокачественна, а мѣсто жительства больныхъ сухо и хорошо провѣтриваемо. 7) Но если силы больного видимо уменьшаются, если приступы дойдутъ до такой степени жестокости, что возбуждаютъ опасенія за жизнь больного, или хотя бы и не было видимой опасности, но болѣзнь совершенно открылась и больной выдержалъ уже многіе приступы лихорадки (по крайней мѣрѣ 4—6), то немедленно должно прибѣгнуть къ существенному ея лѣченію, но не къ лѣкарствамъ, предлагаемымъ шарлатанами и знахарями, которые только обѣщаютъ, но не доставляютъ излѣченія; гораздо лучше для больного не дѣлать ничего, нежели обращаться къ помощи шарлатановъ.

Лѣченіе существенное. Приступая къ лѣченію лихорадки, какого бы она свойства и вида ни была, нужно стараться *узнать и удалить* ея *причину*, чтобы не было вреднаго отъ нея дѣйствія на болѣзнь, потомъ при назначеніи средствъ противу-лихорадочныхъ имѣть

въ виду два различные срока, именно во время приступа (пароксизма) и во время перемижия, по которымъ лѣченіе бываетъ различно. Выждавъ 4—6 приступовъ лихорадки и удостовѣрившись чрезъ то, что натура сама собою при одномъ діететическомъ содержаніи больного не въ силахъ преодолѣть болѣзнь, нужно непременно помогать ей средствами существенными, но не иначе, какъ по ея указанію на нихъ; въ противномъ случаѣ отъ лѣкарствъ будетъ вредъ, а не польза. Такъ напр., если языкъ нечистъ и у больного горечь во рту, (ибо обыкновенно въ этой болѣзни желудокъ бываетъ засоренъ вязкими мокротами и очень часто больного рветъ большимъ количествомъ желчи), — то эти усилія природы ясно показываютъ нужду въ рвотныхъ, которыя считаются главнымъ дѣломъ при пользованіи лихорадки, чтобы очистить первые пути; послѣ ихъ дѣйствія не только употребленіе лѣкарствъ надежнѣе, но и они сами бываютъ дѣйствительнѣе. Для этого *рвотный корень* (ипекакуанна) есть одно изъ лучшихъ средствъ, соотвѣтствующее этому показанію. Взявъ порошка этого корня $\frac{1}{4}$ золотника, всыпать на дно рюмки, потомъ налить нѣсколько капель тепловатой воды, настоя ромашки, или ячнаго отвара и т. п., растереть ложечкою, пальцемъ, или чѣмъ удобнѣе, чтобы порошокъ распустился, еще прибавить той же жидкости, еще растереть, и т. д., пока рюмка будетъ полна и порошокъ совершенно распустится, и затѣмъ дать взрослому больному выпить въ одинъ пріемъ за 2—3 часа до приступа лихорадки. Когда больной, выпивши это лѣкарство, почувствуетъ позывъ на рвоту, тогда давать ему разъ за разомъ по двѣ или по три рюмки воды, настоя, или тепловатаго отвара. Послѣ того какъ его въ первый разъ вырвало, вторично давать ему по рюмкѣ того же рвотнаго питья чрезъ полчаса, пока не будетъ чувствовать позыва на рвоту, а послѣ всего этого дается больному одинъ бульонъ безъ всякой другой пищи, только чтобы это было по крайней мѣрѣ за часъ до слѣдующаго приступа, потому что позже больному не бываетъ нужды ни въ чемъ. Это рвотное можно повторять, ежели встрѣтится въ томъ надобность, въ лихорадкѣ ежедневной на другой день, а въ другихъ спустя два или три дня. Рвотное въ такомъ случаѣ не только очищаетъ желудокъ, но сверхъ того возбуждаетъ испарину и усиливаетъ другія отдѣленія и испражненія, которыми натура старается удалять все не нужное и вредное изъ тѣла; поэтому дѣйствіе его столько важно, что оно одно, часто безъ всякаго другаго лѣкарства, излѣчиваетъ лихорадку. Но если больной имѣетъ отвращеніе отъ рвотнаго средства, равнымъ образомъ если онъ принявъ его, но у него послѣ рвотнаго, даже во время перемижия (въ приступѣ), всё чувствуется во рту дурно, если его отвратило отъ пищи, если есть боль въ поясницѣ, въ чреслахъ, если онъ беспокоенъ, — то въ томъ и другомъ случаѣ нужно ему очистить кишечный каналъ слабительнымъ изъ *ревеня съ нашатыремъ и кремортартаромъ* (№ 65) во время перемижия, т. е. когда не бываетъ приступа, или за 7 часовъ передъ нимъ. Послѣ достаточнаго очищенія желудочно-кишеч-

наго канала, больной безъ всякой опасности можетъ принимать *хину* (царскую, красную), какъ одно изъ лучшихъ противулихорадочныхъ средствъ; она употребляется такъ: въ свободное отъ лихорадки время взрослый больной принимаетъ ее въ мелкомъ порошокѣ по $\frac{1}{2}$ золотника: въ лихорадкѣ ежедневной чрезъ 2 часа, въ тридневной чрезъ каждые 3 часа, въ четверодневной чрезъ каждые четыре часа, такъ чтобы во время перемежки между приступами принять около 7 золотн. хины; если же давать *хинную соль*, то больной въ такое же время долженъ ее принять отъ $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ золотн., принимая около 1—2 гранъ съ сахаромъ въ порошокѣ (№ 188), смотря по возрасту. Каждый приемъ хины принимать въ рюмкѣ краснаго вина, или въ чайной чашкѣ настоя ромашки, овсянаго отвара и т. п., либо сдѣлать изъ этихъ приемовъ такое же число катышковъ посредствомъ достаточнаго количества лимоннаго сиропа. Если хина или ея соль производятъ поносъ, то это означаетъ что онѣ не перевариваются, что желудокъ нечистъ; въ такомъ случаѣ уменьшить приемъ хины, соединить ее съ *нашатыремъ* (№ 189), или ея соли (№ 190); но если хина производитъ запоръ, то она соединяется съ *ревенемъ* (№ 191), а когда причиняетъ давленіе въ желудкѣ, жемленіе, тошноту и даже рвоту, то смѣшивается съ порошкомъ *корицы*, *имбиря*, *мушкатнаго орѣха*, а достаточный больной можетъ въ такомъ случаѣ порошокъ хины принимать въ винѣ (мадерѣ, портвейнѣ, водкѣ). Въ большей части случаевъ это лѣченіе бываетъ успѣшно: при немъ лихорадка, постепенно ослабѣвая, послѣ 3—4 приступа лѣченія прекращается, но, не смотря на то, должно продолжать это противулихорадочное лѣченіе, уменьшая его постепенно, такъ чтобы въ первомъ промежуткѣ времени послѣ прекратившагося приступа употребить весь приемъ порошковъ, какъ бы въ ожиданіи приступа, во второмъ — половину, въ третьемъ — одну треть, а въ четвертомъ — четверть полнаго приема. По этому лѣченіе лихорадки можетъ продолжиться 8—14 дней и даже болѣе, особенно если лихорадка продолжалась уже нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, либо возвращалась неоднократно. Кто не можетъ глотать хину въ порошокѣ, долженъ принимать ее въ водяномъ настоѣ (№ 183), въ настоѣ на бѣломъ винѣ, точно такимъ же образомъ приготовленномъ, или въ отварѣ (№ 47), къ которому хорошо прибавлять по немногу краснаго вина. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лихорадки, особенно тридневныя, четверодневныя, наиболѣе свирѣпствуютъ осенью и въ началѣ зимы, и бываютъ упорны, особенно когда погода дождлива, дома мокры, избы сыры, для людей пожилыхъ флегматич. темпер., чтобы усилить дѣйствіе хины, очень полезно соединять ее съ корнемъ *виригійской серпентаріи*, имбиремъ, бѣлою корицею, или другимъ какимъ-либо ароматическимъ растеніемъ (№ 192). Но когда приступы бываютъ очень часты и очень сильны, такъ что лихорадка дѣлается похожа на состояніе воспалительное, близко подходящее къ состоянію горячки, (преимущественно весенняя ежедневная), то въ такомъ случаѣ надобно смѣшать съ хиною, вмѣсто имбиря и др., *виннокаменную соль* (кремор-

тартаръ) (№ 193). Въ случаѣ какихъ-либо неудобствъ лѣчить лихорадку этими внутренними средствами, можно дѣйствовать противъ нея промывательнымъ изъ хины (№ 198).

Примъ ч. Хина есть единственное надежное и безвредное лѣкарство во всѣхъ перемежающихся лихорадкахъ. Народныя сужденія, что будто бы она портитъ желудокъ, производитъ завалы или засоренія, водянки, — только одни предразсудки. Если эти болѣзни происходятъ въ лихорадкахъ, то не иначе, какъ въ слѣдствіе долговременности болѣзни, собственно отъ свойства ея, а хина и ихъ испѣляетъ въ такомъ случаѣ, т. е. когда онѣ произошли оттого, что ея не употребляли, словомъ хина есть наивозможный лучшій спецификъ въ лихорадкахъ. Если нельзя достать хины, или больной очень бѣденъ, то можно употреблять средства, отчасти замѣняющія хину. Эти средства суть всѣ почти растенія, имѣющія горькій вяжущій вкусъ, какъ-то: *кора ивовая* (вербная, ветловая), *каштановая*, *дубовая*, *калиновая*, *ясеневая*, *терновая* или *терновниковая*, *померанцевая*, *грецкихъ ореховъ*, *корень аира* (лепѣшника), *горячавка* (стародубка), *кофе*, *тримлистникъ* (трефоль, вахта), *золототысячникъ* и *тысячелистникъ*, *полынь*, *перецъ*, *паутина*. Всѣ эти средства даются въ порошокъ отъ $\frac{1}{3}$ —1 золотника на приемъ, въ отварѣ (борни), или наливѣѣ (борни и травы), полагая $3\frac{1}{2}$ или 7 золотниковъ на $\frac{2}{3}$ фун. или на фунтъ воды, уваривая до $\frac{1}{2}$ и до $\frac{2}{3}$ жидкости, и давая по одной или по двѣ столовые ложки въ лихорадкѣ ежедневной чрезъ каждые два часа, въ тридневной чрезъ каждые четыре часа, но всегда во время перемежекъ болѣзни, т. е. въѣ приступа ея, а не во время онаго. *Паутина*, прежде очищенная, дается въ водѣ, или на хлѣбѣ съ масломъ, во время перемежки до $\frac{1}{2}$ золотника, или, собравъ чистую паутину, сдѣлать изъ нея два батышка величиною въ лѣсной орѣхъ (6—8 гранъ); одинъ изъ нихъ дать тотчасъ послѣ лихорадочнаго приступа, а другой на слѣдующій день въ то время, когда лихорадкѣ должно возвратиться. *Хрѣнъ* свѣже-натертый, 3—4 чайныя чашки, настоять въ бутылкѣ винограднаго вина или хорошаго пѣнника; для большей крѣпости прибавить къ нему еще лотъ померанцевой корки. По окончаніи лихорадочнаго приступа, пить по рюмкѣ вина три или четыре раза въ день. Средства это особенно полезно для отвращенія возвратовъ лихорадки. *Квасцы* и *мушкатный орѣхъ*. Взять каждаго по золотнику, превратить ихъ въ порошокъ, раздѣлить на 10 равныхъ частей и принимать по порошокъ каждый часъ или каждые два часа, во время перемежекъ. *Стѣнной мохъ*, растущій на старыхъ пняхъ деревъ, черепичныхъ кровляхъ, цвѣта почти оранжеваго; собравъ его, высушить, превратить въ тонкій порошокъ и давать на подобіе хины, одинъ или въ соединеніи съ другими веществами, отъ $\frac{1}{2}$ до цѣлаго золотника чрезъ каждые два часа, либо сдѣлать отваръ изъ 7 золотн. мха и 1 фунта воды, и принимать по половинѣ чайной чашки — чрезъ каждые 2 часа. Въ упорныхъ случаяхъ прибавлять по грану *чернильныхъ орышковъ* на каждый приемъ. *Пе-*

реце дается три раза въ день, поутру натощая, передъ обѣдомъ за часъ и вечеромъ предъ ужиномъ, зернами по 8—10—15 штукъ на пріемъ, или въ порошокъ, либо въ настойкѣ, — перчиковка. *Черный* перецъ оказался болѣе другихъ дѣйствительнымъ противъ лихорадокъ, особенно продолжительныхъ. *Черный кофе*, если пить его съ лимоннымъ сокомъ, горячій, не за долго до приступа лихорадочнаго озноба, часто быстро уничтожаетъ послѣдній, и надо повторять его, пока прекратится болѣзнь. Многіе приписываютъ *черемуху* цѣлебную силу противъ лихорадокъ, даже осеннихъ, четверодневныхъ и двойныхъ тридневныхъ. Для этого даютъ сухую кору въ порошокъ, или въ видѣ каши, прибавивъ къ ней нашатыря съ медомъ или патокою, а другіе употребляютъ отваръ изъ коры *). Соколовъ и Метаньевъ наблюдали, что *поджаренная поваренная соль* оказываетъ хорошее дѣйствіе противъ лихорадки; изъ 150-ти больныхъ $\frac{1}{5}$ ч. излѣчена однимъ пріемомъ (столовой ложки соли, растворенной въ стаканѣ воды), даннымъ предъ началомъ пароксизма. Другія двѣ пятыхъ больныхъ требовали повторенія 2, 3 и 4 раза того же пріема соли; а у остальныхъ двухъ пятыхъ соль вовсе осталась безъ замѣтнаго дѣйствія **). Н. Соколовъ въ простонародной его практикѣ прерываетъ перемежающуюся лихорадку однимъ пріемомъ слѣдующаго дешеваго средства: взять $\frac{1}{4}$ золотн. *селитры* и $\frac{1}{2}$ зол. *нашатыря*, растворить въ стаканѣ отварной воды и давать по рюмкѣ или чайной чашкѣ на пріемъ, за часъ до наступленія лихорадочнаго приступа. Онъ увѣряетъ, что отъ перваго же пріема лихорадка часто исчезаетъ вовсе ***). Шт. лек. Рындовскій въ Казани употреблялъ съ успѣхомъ въ перемежающейся лихорадкѣ *смѣсь* изъ *роснаго ладона* и *горчицы* въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нашатырь, горькія лѣкарства, хинина и прочія средства вовсе не приносили пользы. Онъ давалъ предъ пароксизмомъ порошокъ, составленный изъ $\frac{1}{4}$ зол. роснаго ладона и $\frac{1}{2}$ зол. черной горчицы, въ полрюмкѣ краснаго винограднаго вина или водки. Для дѣтей половинный пріемъ. Обыкновенно достаточно одного пріема, рѣдко нужно бываетъ два, такъ что у 113-ти пользованныхъ имъ этимъ средствомъ больныхъ лихорадка безвозвратно проходила отъ одного пріема. *Животная студень*, приготовляемая изъ ногъ и головъ телячьихъ и говяжьихъ, изъ дичи, изъ оленьяго рога и т. п., употребляется какъ лѣкарство, по ложкѣ чрезъ $1\frac{1}{2}$ часа. Она оказывается очень полезною и даже необходимою при лѣченіи лихорадокъ въ мѣстахъ сырыхъ, болотистыхъ, приморскихъ. Скоропостижное *обливаніе холодной водою*, или *погруженіе* всѣмъ тѣломъ въ воду предъ пароксизмомъ (приступъ), съ пользою употребляется для простаго народа. Дѣйствіе холодной воды въ этомъ случаѣ есть возбуждающее и уравнивающее.

*) Др. Здр. 1834 г. № 28, стр. 220.

**) Др. Здр. 1851 г. № 1, стр. 3.

***) Др. Здр. 1845 г. № 14, стр. 107.

щее противодѣйствіе нервной системы на всѣ прочія, подлежащія ей системы и органы.

З а м ѣ ч а н і е. При этомъ нужно имѣть ту осторожность, чтобы послѣ того тѣло не было на поверхности сыро и не охладѣло. Во избѣжаніе этого, тотчасъ послѣ обливанія водою или погруженія въ воду, должно всё тѣло оберечь полотенцемъ на сухо, потомъ, одѣвшись, походить и затѣмъ напиться чаю изъ липовыхъ цвѣтовъ, ромашки, бузины, шалфея, мяты и т. п. Приступъ лихорадки иногда удается отвратить умѣренно плотнымъ *перевязываніемъ рукъ и ногъ* въ ихъ верхней части, такъ, чтобы затруднить только восхожденіе крови въ подкожныхъ венахъ, но не остановить кровообращеніе въ рукахъ и ногахъ, не произвести въ нихъ охладѣнія и бровотеченія носоваго и горловаго, оказывающихся послѣ тугой перевязки (въ этомъ нужна большая осторожность и расчетливость). Эта перевязка препятствуетъ приливу крови отъ рукъ и ногъ къ груди и животу, а тѣмъ отвращаетъ и самый приступъ, который иногда можетъ быть подавленъ и напряженнымъ воображеніемъ, особенно отвлеченнымъ на другіе предметы, причемъ больной, совершенно забывая о предстоящемъ пароксизмѣ (приступѣ), не ожидаетъ его.

Много есть еще средствъ, употребляемыхъ противъ лихорадокъ, какъ то: *вино съ перцемъ, съ солью, чистый березовый деготь*, который пьютъ больные по рюмкѣ во время озноба, нерѣдко съ видимою пользою; но нерѣдко бываетъ и то, что лихорадка, и преимущественно ежедневная, оттого переходитъ въ горячку. По этому нужно давать эти средства, какъ сильно возбуждающія и воспаляющія, въ должной пропорціи, сообразуясь съ возрастомъ, тѣлосложеніемъ, привычкою къ употребленію горячительныхъ напитковъ и временемъ года (въ весеннихъ лихорадкахъ эти средства не бываютъ такъ удачны, какъ въ осеннихъ).

Чесночный и луковый сокъ. Заболѣвая трехдневною лихорадкою, очень многіе поселяне излѣчиваются въ зимнее время лукомъ и водкою. Березовый деготь лучше употреблять такъ: сдѣлать съ порошкомъ ирнаго корня катышки величиною съ горошину, обсыпать ихъ порошкомъ изъ того же корня и принимать три раза въ день отъ 3—5 катышковъ. *Горькій миндаль* — предъ пароксизмомъ принимать по двѣ горькія миндалинки. *Яичный бѣлокъ.* За часъ предъ пароксизмомъ два яичныхъ бѣлка сбить въ пѣну, соединить ихъ съ 10-ю гранами корицы и выпить.

Между простымъ народомъ употребляются *дубовая и ивовая кора* въ отварѣ *блонъ*, или *лыко* съ *рябины*, также въ отварѣ, или въ упрѣломъ настоѣ. Или: больной выходитъ *на зоръ*, когда еще никто не черпалъ воды, на рѣчку съ ложкою и пьетъ натошагъ *ложку воды*, чтобы никто не видалъ, на другой день пьетъ *два*, потомъ *три* ложки и т. д. Повѣрье утверждаетъ, что лихорадка покидаетъ больного между третьей и девятой ложками. Или еще: въ *мочѣ* больного *варягъ* три куриныя *яйца*, выносятъ ихъ, вмѣстѣ съ горшкомъ, на муравейникъ, разбиваютъ тамъ горшокъ и зарываютъ его вмѣстѣ съ яйцами; дня черезъ

трп, говорить повѣрье, когда муравьи уничтожаютъ яйца, лихорадка отстаетъ. Есть также обычай *обливать* больного въ то время, когда его трясетъ холодной *водой*, *черезъ оглоблю*: больной становится внутри оглобель и подымаетъ одну изъ нихъ во весь ростъ, а товарищъ стоитъ снаружи и окачиваетъ его. Въ другихъ мѣстахъ *наметываютъ* нѣсколько зеренъ пшеницы во время веснянки, или внешней лихорадки, потомъ больной носитъ ихъ въ продолженіе лихорадки на голой ладони, въ перчаткѣ, или рукавицѣ; затѣмъ должно ихъ посяять, а когда они взойдутъ, хорошенько раздавить ногой: это средство едва ли не лучше для того, чтобы учить больного благому терпѣнію. Въ иныхъ мѣстахъ *«завязываютъ»* лихорадку, то есть больной ѣдетъ при самомъ началѣ озноба въ лѣсокъ, связываетъ надъ собою двѣ березки, согнувъ ихъ дугой, и говоритъ: «покинешь, отпущу, не покинешь, сама сгинешь». Вскорѣ лихорадка, испугавшись этой угрозы, покидаетъ, будто бы, человѣка, который съ своей стороны обязанъ непременно отпустить согнутыя и связанные березки, иначе будетъ худо. Есть множество подобныхъ таинственныхъ средствъ, называемыхъ *симпатическими*, какъ то: *привѣсокъ*, *подвязокъ*, *заговорковъ*, и запасъ ихъ, въ особенности противъ лихорадки, безконечно богатъ. О дивныхъ привѣскахъ и бумажныхъ пилюлькахъ отъ лихорадки извѣстно слѣдующее: пишутъ на лоскутѣхъ бумажки *«абрака-дабра»* треугольникомъ, или тѣмъ же порядкомъ имя больного, или же коротенькую молитву; иные дѣлаютъ привѣску, другіе катаютъ пилюльки и заставляютъ принять, но больной не долженъ знать, что принимаетъ или носитъ, если же посмотритъ, то средство не поможетъ. Также употребляютъ слово: *«коларіусъ»* какъ лѣкарство, каждую букву этого слова, написанную на особой бумажкѣ, закатываютъ въ хлѣбъ и принимаютъ въ видѣ пилюли, либо носятъ у себя на груди вмѣстѣ съ крестомъ, какъ и *частички воска*, отнимаемыя отъ *горящей свѣчи* во время заутрени, либо великой пятницы, при чтеніи Евангелія 12 разъ, либо Воскресенія Христова, при каждомъ обходѣ священника между православными съ возгласомъ: Христосъ воскресъ! Берутъ также съ больного *жлогъ волосъ*, остригаютъ ему *ногти*, и, собравъ все это вмѣстѣ, идутъ въ лѣсъ, просверливаютъ въ осинѣ дыру, затыкаютъ ее этимъ снадобьемъ и заколачиваютъ камешкомъ 1, 2, 3. — Внезапный испугъ во время начала приступа, какъ извѣстно, иногда прекращаетъ лихорадку; народъ употребляетъ для этого окачиванія холодной водой, либо сажаетъ больному или больной, нечаянно, лягушку за пазуху, и т. п. Главное и удивительное средство слѣдующее: берутъ внутреннюю *пленку* изъ *сыраго яйца*, наблевавъ сперва осторожно скорлупу: пленкой этой обертываютъ не туго до половины лѣвый мизинецъ, но закрывая всѣ мѣста и накладывая заплатки тамъ, гдѣ кожа лопнетъ. Она облипаетъ и скорѣ присыхаетъ. Наперстокъ этотъ устраняетъ лихорадку, а проносивъ его въ продолженіе трехъ лихорадочныхъ припадковъ, можно его снять, и дѣло кончено. Докторъ В. Даль, говоритъ, что онъ испыталъ это средство на себѣ и

на другихъ, и что изъ 30-ти случаевъ въ 20-ти оно оказалось вѣрнымъ; притомъ одинъ случай былъ очень замѣчателенъ тѣмъ, что отчаянная лихорадка угрожавшая за каждымъ приступомъ кровавымъ ударомъ, и неуступавшая никакимъ средствамъ (хинину въ большихъ приемахъ и даже мышьяку), была исцѣлена яичной пленкой. Дѣйствіе пленки: въ то время, когда бы слѣдовало начаться лихорадочному пароксизму, мизинецъ начинаетъ остывать, нѣмѣть, холодъ тянется отъ него вверхъ, по внутренней сторонѣ локтевой кости и бываетъ болѣе или менѣе чувствителенъ не только для больного, но и для посторонняго наблюдателя. Затѣмъ слѣдуетъ боль, начинается ныть, щемить и стрѣлять вверхъ по рукѣ, иногда до самаго плеча; боль эта бываетъ въ иныхъ случаяхъ незначительна, въ другихъ сильнѣе, и крѣпкіе мужчины иногда плачутъ, какъ малые ребята, и срываютъ пленку. Появленіе боли и отсутствіе пароксизма есть знакъ, что средство дѣйствуетъ и принесетъ пользу; въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не помогаетъ, пароксизмъ появляется своимъ порядкомъ, а боли въ мизинцѣ нѣтъ. Въ послѣднемъ, вышеописанномъ замѣчательномъ случаѣ надобно было удивляться, говорить В. Даль, сильной волѣ слабой женщины, которая, видя сама гибельное положеніе свое, выдерживала въ продолженіе 16-ти часовъ (столько длился обыкновенно приступъ), неимоვნую жестокую боль и стрѣльбу отъ мизинца до самаго плеча. Боль утихаетъ мало по малу въ слѣдующій приступъ, а за третьимъ обыкновенно уже вовсе не значительна. На мизинцѣ нерѣдко остаются на долго слѣды этого средства: подкожныя кровавыя пятна, а въ послѣдствіи—сходить божица. У здороваго же человѣка эта пленка никакого дѣйствія на мизинцѣ не оказываетъ *).

Успѣхъ, если только онъ бываетъ отъ употребленія этихъ таинственныхъ средствъ, основывается на полномъ къ нимъ довѣріи больного, производящемъ сильное впечатлѣніе на нервную систему. Нѣтъ старухи, которая-бы не знала какого нибудь секрета для пользованія лихорадки, и простачи охотно вѣрятъ тому. Больные съ радушіемъ обращаются ко всѣмъ людямъ, обѣщающимъ скорое излѣченіе; но въ пользованіи болѣзней кратчайшій срокъ рѣдко бываетъ успѣшенъ по пословицѣ: «скоро не споро»; чаще же бываетъ то, что лихорадка отъ подобнаго лѣченія дѣлается изъ правильной неправильною, маскированной, либо совершенно скрытою, перерождающеюся въ другія продолжительныя упорныя болѣзни, и тогда общее состояніе здоровья, какъ бы желтушное, видимо хилѣетъ, а при частномъ изслѣдованіи оказываются завалы, особенно въ правомъ боку, съ расположеніемъ къ отекамъ и водянкѣ, почему надобно употреблять всѣ возможные средства для совершеннаго искорененія болѣзни прежде, нежели повредятся соки и испортится тѣлосложеніе.

Въ Тамбовской губерніи перемежающіяся лихорадки, особенно

*) Журн. М. В. Д. 1843 г. книж. 8-я стр. 174.

осенью, господствуют повально и универсальное простонародное средство под названіемъ «*чудное лекарство*», оказываетъ тамъ, видимо, отличную пользу. Оно состоитъ изъ *сабури*, *нашатыря* и *критикой водки* (каждаго по 3 золотн.) растворенныхъ въ штофѣ воды или вина. Больные пьютъ его по большой рюмкѣ 2 раза въ день охотно, не смотря на непріятный его вкусъ. Увѣренность въ него очень располагаетъ ихъ къ нему. Послѣ нѣсколькихъ испражнений низомъ, слѣдующихъ по принятіи этой слабительной микстуры, больные или совсѣмъ освобождаются отъ новыхъ приступовъ лихорадки, или уже не подвергаются сильнымъ пароксизмамъ *).

Лѣч е н і е лихорадокъ во время приступа (пароксизмъ) бываетъ различно по различію періодовъ послѣдняго. Въ періодъ предвозвѣстниговъ и озноба (первый періодъ) оказываютъ пользу средства возбуждающія, горячительныя, какъ то: спиртныя и масляно-смолистыя; поэтому простонародное обыкновеніе лѣчить лихорадки *виномъ съ солью*, *перцемъ индійскимъ* и *стручковымъ*, также *перцовкою* и *чистымъ березовымъ дѣгтемъ*, или *дегтярною водою* (№ 70) въ этомъ періодѣ приступа болѣзни очень бываетъ у мѣста; должно только стараться о томъ, чтобы пріемъ этихъ средствъ былъ соразмѣренъ возрасту, тѣлосложенію, степени болѣзни и привычкѣ больного къ горячительнымъ напиткамъ. Взрослымъ, крѣпкимъ, привычнымъ къ вину, въ сильной дрожи и ознобѣ достаточно принять внутрь рюмку этихъ средствъ, потомъ такими же спиртными веществами *тереть снаружи все тѣло*, покрытое теплымъ одѣяломъ. По недостатку въ спиртныхъ веществахъ полезно тереть все тѣло *сухими суконками* и *теплыми руками*. Равнымъ образомъ *обливаніе* холодною водою въ -5° или 6° но не болѣе, производимое быстро (поспѣшно) съ обтираніемъ потомъ всего тѣла на сухо, употребленіе *чая* изъ *цвѣтковъ ромашки*, *липовыхъ* и *бузиновыхъ*, и *теплая постель* всегда нужны и полезны въ это время болѣзни. Въ періодъ жара (второй періодъ), напротивъ, должно употреблять средства охлаждающія и отвлекающія жаръ отъ важныхъ наружныхъ частей, а преимущественно внутреннихъ органовъ, каковы: голова, грудь и животъ, мозгъ, легкія, сердце, желудокъ и кишки. Для этого употребляются: *обтиранія* всего *тѣла водою* комнатной температуры не менѣе 15° и не болѣе 20° , особенно *съ уксусомъ*, *примачиваніе* этою же смѣсью *конечностей* въ видѣ мокрыхъ обвертываній; *ножныя ванны* простыя, состоящія изъ одной теплой воды и для усиленія дѣйствія въ соединеніи *съ уксусомъ* (№ 96), *щелокомъ* (№ 83), *горчицею* и *солью* (№ 84); *горчичники* (№№ 88, 89, 90), *хрѣновники* (№ 91), прикладываемые къ разнымъ частямъ тѣла, какъ то: подошвамъ, икрамъ ногъ, на пульсъ и къ предплечьямъ рукъ, къ бокамъ, между лопатокъ и къ затылку, смотря по тому, какая часть и какіе органы изъ вышеозначенныхъ болѣе страдаютъ и находятся въ жару; даже и

*) Инспект. Вр. Ул. Вишневскій. Др. Здр. 1837 г. № 9 стр. 66 и 67.

нарывной пластырь (мушка № 58) бываетъ необходимъ для приравленія къ затылку (при тяжести, боли и жарѣ въ головѣ), къ груди (при трудномъ горячемъ дыханіи). Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, особенно владѣльческихъ Чистопольскаго уѣзда, дворовые люди себѣ и другимъ во время лихорадочнаго жара прикладываютъ горчичникъ къ запястью рукъ (на пульсъ), а большею частію цвѣты *жабника огненнаго* (жегунца), и держатъ до тѣхъ поръ, пока общій жаръ въ тѣлѣ пройдетъ а мѣстное жженіе на пульсѣ увеличится до невозможности болѣе выносить его. Увѣряютъ, что отъ этого одного средства нерѣдко лихорадка проходитъ безвозвратно. *Промывательныя* прохладяющаго свойства (№ 95), *кислое питье* изъ кислаго, блюбвеннаго, брусничнаго сока, изъ бремортарта (№ 178); *риверо* *питие* черезъ часъ по столовой ложкѣ (№ 62) или *содовые порошки* (№№ 11 и 12). Но если лихорадка неправильная, т. е. если періодъ озноба такъ коротокъ и малъ, что едва замѣтенъ, а жаръ силенъ и продолжителенъ, пота же совсѣмъ не бываетъ, и она угрожаетъ такимъ образомъ переходомъ въ воспалительную горячку; если при этомъ больной крѣпкаго тѣлосложенія, полнокровенъ, привыченъ къ кровопусканію и пропустилъ срокъ на него, особенно если эта лихорадка въ весеннее время, — то, хотя и не одобряется кровопусканіе въ лихорадкахъ вообще, — но въ частности, при такихъ показаніяхъ, слѣдуетъ допустить открыть больному кровь въ такомъ же количествѣ, въ какомъ до того ему открывали. Но лучше, если есть возможность, слѣдовать это съ совѣта врача. Бываютъ случаи, что лихорадка поддерживается этою только потребностію и до тѣхъ поръ не уступаетъ никакимъ средствамъ, пока не будетъ открыта кровь. Въ періодъ пота (третій періодъ), какъ частнаго рѣшенія (переломъ) болѣзни, нужны средства, поддерживающія и усиливающія это цѣлебное набожное отдѣленіе, а если его нѣтъ, то открывающія оное; во всякомъ случаѣ они должны состоять изъ употребленія внутрь *чая* изъ вышеозначенныхъ *цвѣтцовъ*: *ромашки*, *бузины* и *липовыхъ*, либо *сухой малины* и т. п., и *теплой постели*. Послѣ этого должно обтереть тѣло на сухо, переменить бѣлье и приступить опять къ употребленію средствъ, кагія выше описаны въ лѣченіи во время перемежки (внѣ пароксизма). Д-ръ Штюрмеръ употреблялъ съ блистательнымъ успѣхомъ противъ перемежающихся лихорадокъ *челибуху*; онъ давалъ её каждые четыре часа по $\frac{1}{12}$ доли грана въ порошокъ, безъ различія, во время приступовъ (пароксизмъ) и въ перемежкахъ, и не только удачно прерывалъ лихорадку, но, какъ онъ говоритъ, при такомъ лѣченіи ему никогда не случалось замѣтить страданія селезенки. Это дѣйствіе челибухи подтвердилось въ 160 случаяхъ. Взявъ порошка челибухи 1 гранъ (количество, равное зерну коноплянаго сѣмени), сахару 1 золотн., какъ возможно тщательно стереть вмѣстѣ съ челибухою, и раздѣливъ на 12 равныхъ частей, давать больному класть на языкъ по одному изъ нихъ, черезъ 4 часа*).

*) Др. Здр. 1848 г. № 12 стр. 95.

Лѣченіе въ возвратѣ и упорствѣ. Излѣченная лихорадка возвращается наипаче: ежедневная на 7—14, а трехдневная на 21 день отъ послѣдняго приступа. Эти возвраты происходятъ отъ недостаточнаго приѣма хины и ся соли, отъ погрѣшности въ пищу, отъ продолженія тѣхъ же вліяній, какія и прежде причинили лихорадку, отъ занятія обычною работою прежде, нежели бывшій больной достаточно укрѣпится въ силахъ. Определить всѣ эти причины возврата можно только внимательнымъ изслѣдоваеніемъ положенія больного. Возвратная лихорадка лѣчится такъ же, какъ и первоначальная: при нечистотѣ желудка — *рвотнымъ*, кишекъ — *слабительнымъ*, и потомъ *хиною* или *ся солью*; но лѣченіе хиною должно быть продолжительнѣе, и въ 7—14—21 день отъ послѣдняго приступа хину давать такъ, какъ бы въ эти дни дѣйствительно были приступы. Во время лѣченія возврата нужно наблюдать очень строгую діету и употреблять крѣпительную пищу: мясо, дичь, *хорошее вино, горькія настойки, кофе настоящий или желудочный*, безъ сливокъ; всячески стараться не разстроить пищеваренія и не изнурить силъ больного. Если возвратъ зависить отъ мѣстности обитаемой страны, то нужно, если можно, *перемѣнить мѣстопробываніе* на то время, пока свирѣпствуетъ повально лихорадка. Хинная соль скорѣе хины прекращаетъ лихорадку, которая однаго послѣ хинной соли и легче возвращается; посему въ упорныхъ лихорадкахъ нужно предпочитать чистую красную хину въ порошокъ, а по прекращеніи приступовъ въ винномъ или спиртномъ настоѣ, полагая 7—14 золотн. порошка хины на бутылку вина, настаивая ее долго въ вольномъ духу и употребляя такое вино два раза въ день по рюмкѣ, или на случай перемѣны, когда одно и то же лѣкарство очень надоедаетъ и опротивляется, равнымъ образомъ когда натура видимо привыкаетъ къ одному и тому же лѣкарству, — взять *ирнаго корня* и *девясильнаго* по 14 золотн., листьевъ *золототысячника* горсть, *железныхъ опилокъ* (не изъ ржаваго желѣза) 14 золотн., смѣшать все это и настоять на холодѣ, въ теченіе 6—8 дней, въ четырехъ фунтахъ бѣлаго вина (2 двойныя бутылки). Если кто захочетъ сдѣлать этотъ настой скорѣе, то можно сосудъ съ нимъ настаивать такъ же, какъ предшествовавшій, въ вольномъ духу, и употреблять такимъ же образомъ. Какъ осеннія и первозимнія лихорадки вообще бываютъ упорнѣе весеннихъ и лѣтнихъ, то посему, въ предотвращеніе возврата, нужно продолжать употребленіе лѣкарствъ долѣе въ первыхъ, нежели въ послѣднихъ, и преимущественно хину, какъ значится выше. Тѣ, которые перенесли лихорадку въ началѣ зимы, должны, особенно когда погода бываетъ дождливая, для предупрежденія возврата, принимать по рюмкѣ въ день хиннаго виннаго настоя до весны, хотя бы болѣзнь казалась совсѣмъ пропавшею; причемъ должны также избѣгать сыраго воздуха, особенно когда дуютъ холодные восточные вѣтры.

Лѣченіе неправильныхъ, маскированныхъ, злокачественныхъ, какъ самыхъ опасныхъ лихорадокъ, обнаруживающихся подъ видомъ

сонливости, безчувствія, удара или пострѣла, обморога, судорогъ (столбняка), поноса съ рвотою, удушья, колотья и проч., должно быть самое дѣйтельное и скорое: здѣсь дорогъ каждый часъ, потому что смерть можетъ послѣдовать во второмъ, а навѣрное въ третьемъ приступѣ. Поэтому какъ скоро, послѣ подобнаго припадка, въ мочѣ больного замѣчается осадокъ кирпичнаго цвѣта, то немедленно, если нѣтъ врача по близости, нужно давать больному *хининую соль* (№ 188) и притомъ въ такомъ количествѣ, чтобы онъ до слѣдующаго припадка принялъ ее $\frac{1}{4}$ золотника; послѣдній приемъ предъ приступомъ долженъ быть двойной, т. е. состоящій изъ двухъ порошковъ, и притомъ для взрослого соединенъ съ *опіемъ* (№ 193).

Въ лихорадкѣ подъ видомъ пострѣла (удара) опій также есть главное средство и его должно давать больному черезъ два часа 1—2 грана (№ 194) до тѣхъ поръ, пока онъ не придетъ въ память. Если же больной не можетъ глотать, то ему ставится *клизмизъ* съ 1—2 чайными ложечками *опійной настойки*. У людей молодыхъ, полнобровныхъ, нужно *пустить* немного (отъ $1\frac{1}{2}$ до $2\frac{1}{2}$ чайныхъ чашекъ или отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ фунта) *крови*; у всѣхъ такихъ больныхъ растирать тѣло суконками, щетками, къ головѣ прикладывать *холодныя примочки*, при сонливости опрыскивать лицо холодною водою, при обморокѣ класть къ груди *теплыя припарки* (№№ 54, 55, 56, 122 и 151), при колотѣ, удушѣ, давать внутрь *шипучіе порошки*, при рвотѣ (№№ 11 и 12) и все это продолжать дѣлать съ настойчивостію во все время приступа.

Въ Подольской губерніи, съ нѣкотораго времени, характеръ лихорадокъ до того измѣнился, что ихъ называютъ молдавскими, отъ которыхъ онѣ отличаются тѣмъ, 1) что не соединены съ брюшными страданіями и 2) зависать отъ господствующей уже нѣсколько лѣтъ не постоянной погоды; противъ нихъ лучше всего помогаетъ *хининъ* въ растворѣ; или въ чистой водѣ, въ количествѣ 31—35 или *въ черномъ кофе*; принимать каждые полчаса, во время самой малѣйшей перемежки, не обращая вниманія на продолжающуюся лихорадку и подобные припадки. Растворъ хинины въ черномъ кофе потому превосходенъ, что онъ производитъ испарину и успокоиваетъ нервы. Рѣдко нужно бываетъ повторять этотъ приемъ. Маленькимъ дѣтямъ прибавляютъ къ микстурѣ даже немного сливокъ, потому что они съ этою примѣсью принимаютъ его охотнѣе. Имъ, обыкновенно, достаточно раствора 5—10 гранъ хинной соли; только при очевидномъ засореніи первыхъ путей, особенно у дѣтей, имѣющихъ припадки глистные, тутъ всего лучше помогаетъ растворъ *рвотной соли съ нашатыремъ и горькимъ экстрактомъ въ какойнибудь ароматической жидкости*. Замѣчено, что отъ употребленія этихъ средствъ лихорадки проходили безвозвратно *).

Въ Киевѣ, почитавшемся прежде гнѣздомъ лихорадки, эта болѣзнь, по замѣчанію шт. лек. Бунге, подтвержденному всѣмъ обществомъ кiev-

*) Другъ Здр. 1837 г. стр. 230 и 231.

скихъ врачей, со времени холеры, при тѣхъ же мѣстныхъ климатическихъ условіяхъ, измѣнила свой прежній упорный характеръ съ 1837 года, и сдѣлалась рѣдкою болѣзнію; съ этого времени Бунге лѣчитъ ее очищеніемъ желудочно-кишечнаго канала посредствомъ *слабительныхъ* или *рвотныхъ*, употребленіемъ *нашатыря съ рвотнымъ камнемъ* и *горькими травами*, такъ что рѣдко имѣетъ нужду прибѣгать къ хинину; лихорадка послѣ трехъ или четырехъ пароксизмовъ прекращается *).

Южно-крымскія перемежающіяся лихорадки неправильныя, непостоянныя и маскированныя, являющіяся подъ видомъ: 1) головной боли съ чувствительностію глазъ къ свѣту; 2) рвоты безъ предварительной тошноты и безъ боли подъ ложкою; 3) глазовоспаленія; 4) періодическихъ мѣстныхъ болей въ ногахъ, спинѣ, вискахъ, темени, бровяхъ и зубахъ; 5) періодическаго подиранія по кожѣ безъ послѣдующаго жара и пота съ непріятнымъ, иногда болѣзненнымъ, ощущеніемъ въ бокахъ, особенно въ лѣвомъ, съ потерю аппетита и натурального цвѣта въ лицѣ и съ синевою ногтей и губъ; 6) періодическаго припадка истерии (боли живота, жаръ, ознобъ, обмороки, безпамятство, бредъ, спячка); 7) расслабленія всего тѣла, причѣмъ человѣкъ, по видимому здоровый, не въ силахъ ни ходить, ни поднять руки безъ болей и болѣзненныхъ припадковъ, — излѣчиваются обыкновенно: прежде *рвотнымъ*, потомъ *хинною солью* въ увеличенныхъ приѣмахъ; простой народъ употребляетъ *меньшой золототысячникъ* и *полынъ*, изъ конхъ первые два употребляютъ въ крѣпкомъ водяномъ отварѣ отъ 2 до 5 стакановъ въ сутки и вызываютъ сильную рвоту и обильную испарину; послѣднія же въ водочномъ настоѣ. Кромѣ того пьютъ *воду сквозь чубукъ*, крѣпко закупоренный, отъ чего является рвота, смѣняющаяся поносомъ: средство непріятное, но довольно дѣйствительное. Во многихъ мѣстахъ удовлетворяютъ прихотливому лихорадочному аппетиту всѣмъ, чего бы ни потребовалъ желудокъ: рыбою свѣжею и соленою, молокомъ парнымъ и кислымъ, фруктами; вскорѣ послѣ этого возбуждается рвота, изгоняющая изъ желудка все съѣстное, огромное количество слизи и желчи, и нерѣдко наступаетъ благопріятный исходъ. Въ особенности въ большомъ употребленіи секретное средство, привезенное будто съ Кавказа, которое состоитъ въ слѣдующемъ: взять *чернаго перцу*, *мушкатнаго орѣха* и *крахмала* по чайной ложечкѣ, *железныхъ опилокъ* сколько можно захватить концомъ перочиннаго ножа, смѣшать и раздѣлить на три равныя части, дать за полчаса до приступа лихорадки, съ водою, одну часть. Одна предосторожность должна быть соблюдена при этомъ: не позволять больному уснуть. Средство это, по наблюденію Ялтинскаго уѣзднаго врача, оказалось дѣйствительно полезнымъ, замѣняющимъ вполне хинную соль **).

*) Др. Здр. 1841 г. № 31. стр. 244 и 245.

**) Др. Здр. 1851 г. № 46, стр. 204.

Лѣченіе послѣдственныхъ болѣзней отъ лихорадокъ требуетъ приглашенія врача. Послѣдствія лихорадокъ вообще суть: *ослабляющая лихорадка*, наипаче *желудочная* или *желчная*, *отекъ ногъ* или *водянки подкожная, брюшная, грудная*; *одышка, кашель, колика, желтуха, сухотка, чахотка, нервныя боли, надущая, сыпота, лихота*, но чаще всего *отвердніе, заваръ печени, селезенки*. Эти послѣдствія зависятъ отъ невозможности удалить причины лихорадки, отъ продолжительности, упорства лихорадки, позднago и недостаточнаго ея лѣченія и отъ другой болѣзни, находившейся у человѣка до лихорадки, но только развившейся послѣ нея въ полномъ своемъ видѣ. Онѣ лѣчатся впрочемъ и послѣ лихорадки такъ же, какъ и тогда, когда онѣ происходятъ отъ другихъ причинъ. Вообще противъ нихъ бываютъ полезны разрѣшающія, горькія и отчасти слабительныя средства: *одуванчикъ, осока, аиръ, цикорій, трилистникъ* (трефоль, вахта), *золототысячникъ, полынь*, солн: *нашатирь, уксусокислый поташъ*, составы *виннаго камня* (*Tartarus tartarisatus boraxatus solubilis*) *морковный, рудечный сокъ*; травы и корни употребляются въ видѣ отвара или наливки съ солями, полагая на $\frac{1}{2}$ фунта жидкости 1—2 золотника соли. При опухоли печени и особенно селезенки, а также при слабости больного, бываетъ очень полезна *хинная соль* въ увеличенномъ приемѣ (№ 188) т. е. $\frac{1}{4}$ золотн. на 14 порошковъ, 2—3 раза въ сутки, также *железные цвѣты нашатыря* (*Flores ammoniaci martiales*), или просто *железный, зеленый купоросъ*. Всѣ эти средства можно давать не иначе, какъ съ совѣта врача или подъ его надзоромъ.

Прим. Во всякомъ случаѣ при лѣченіи поселянъ рабочихъ, преимущественно подверженныхъ лихорадкѣ, какъ то: земледѣльцевъ, жнецовъ, косцовъ, охотниковъ, рыболововъ, банщиковъ, прачекъ, красильщиковъ, садовниковъ, огородниковъ, сѣятелей риса, чесальщиковъ и продавцовъ пеньки и льна, осушателей болотъ, кирпичниковъ, ткачей и ткачихъ, непременно нужно соображаться съ особыми для нихъ правилами, изложенными въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе лихорадокъ у дѣтей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ между жителями свирѣпствуютъ лихорадки, особенно въ весеннее и осеннее время, дѣти также во всякомъ ихъ возрастѣ часто страдаютъ ими, но какъ очень трудно вылѣчивать малютокъ, потому что трудно дать имъ хину или другое какое лѣкарство, которое они всегда находятъ непріятнымъ и не принимаютъ его ни за какія блага въ мірѣ, отъ чего и изнуряются иногда этою болѣзнію до того, что впадаютъ въ истощеніе и получаютъ водяную болѣзнь единственно отъ частыхъ возвратовъ лихорадки, — то считаю нужнымъ описать особо способъ пользованія ихъ въ такомъ случаѣ. Лѣченіе это, какъ и лѣченіе лихорадокъ у взрослыхъ, есть двойное, именно: лѣченіе во время приступа лихорадки и лѣченіе во время перемежки, т. е. между ея приступами.

Лѣченіе въ приступѣ лихорадки у дѣтей. Во время озноба больные вообще просятъ, чтобы ихъ какъ можно болѣе укутывали, дѣти же

въ особенности не могутъ выносить озноба: они плачутъ и кричатъ отъ него. Посему, чтобы поскорѣе нѣсколько согрѣть ихъ, хорошо давать имъ пить теплый, слабый чай, или теплый настой изъ ромашки, липовыхъ цвѣтковъ, бузины. Во время жара больные просятъ пить чего нибудь прохладительнаго, кисловатаго, тутъ приличны для младенцевъ: холодная чистая вода, клюквенный морсзъ, брусничный и яблочный квасъ, разведенные водою, бураковый разсолъ, легкій лимонадъ, сыворотка въ винѣ; можно также на полфунта сыворотки прибавить чайную ложечку спирта оленьяго рога. Во время пота больные обыкновенно ничего не просятъ и лежатъ спокойно: тутъ надо беречь ихъ только отъ простуды. Вообще же, въ продолженіе пароксизмовъ (приступовъ), не даютъ никакихъ противулихорадочныхъ средствъ.

Лѣченіе во время перемежки (между приступами лихорадки). Въ это время обыкновенно употребляются противулихорадочныя средства. Такъ какъ промежутки между приступами продолжаются не одинаково, то и лѣкарства даются различнымъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ лихорадкахъ промежутки очень коротки, а потому приемы лѣкарствъ слѣдуетъ учащать. Вообще въ теченіе промежутка между пароксизмами надобно умѣть дать столько лѣкарства, сколько необходимо для прекращенія болѣзни. Если лихорадочный приступъ возвратится, то въ послѣдующемъ промежуткѣ снова повторяется лѣкарство. Продолжать это, какъ и у взрослыхъ, до тѣхъ поръ, пока лихорадка совсѣмъ исчезнетъ.

Въ лихорадкѣ простой, т. е. когда дитя, кромѣ припадковъ, ей свойственныхъ, никакихъ другихъ не имѣетъ и въ промежутки приступовъ чувствуетъ себя почти здоровымъ, лѣченіе производится одними противулихорадочными средствами, которыя почти всегда и преобразуютъ ее. Въ такомъ случаѣ эти лѣкарства даются безъ пріуготовительнаго лѣченія. Изъ нихъ *хининная соль* есть самое лучшее средство.

Въ лихорадкѣ же сложной, т. е. когда, сверхъ припадковъ собственно лихорадочныхъ, есть еще признаки расстройства пищеваренія, какъ-то: горечь во рту, нечистый языкъ, лицо и бѣлки глазъ желтоватые, тошнота, позывъ на рвоту, рвота, поносъ, лѣченіе потребно напередъ пріуготовительное, какъ и у взрослыхъ, состоящее въ очищеніи желудочно-кишечнаго канала. Для этого точно также, какъ и у взрослыхъ, (см. выше), нужно дать *рвотное* изъ *рвотнаго корня* въ количествѣ $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ золотника за одинъ приемъ, смотря по возрасту ребенка. Послѣ рвоты надо успокоить желудокъ *молокомъ* изъ *миндалю*, или изъ *коноплянаго сѣмени*, или подслащеннымъ *отваромъ* изъ *линянаго сѣмени*, или же, взявъ стаканъ чистой *сахарной воды*, распустить въ ней ложечку магнезіи, нажать немного сока изъ лимона и давать дитяти этой смѣси по ложечкѣ; можно также употреблять *шипучіе порошки* (№ 11 и 12). Въ слѣдующемъ за этимъ промежуткѣ между приступами, особенно за часъ предъ наступленіемъ пароксизма, если все еще есть припадки засоренія желудка, дать снова рвотное, или употребить *слабительныя* средства изъ *ревеня съ магнезією* (№ 32) до тѣхъ

поръ, пока пройдутъ припадкн разстройства пищеваренія и установят-ся порядочныя испражненія низомъ. Какъ только наступитъ это и оста-нется простая лихорадка, начать употреблять противъ-лихорадочныя средства, изъ которыхъ главное есть *хинная соль*, которую не мо-жетъ замѣнить никакое другое средство; она особенно полезна для дѣ-тей, дѣйствуя на нихъ благотворно въ малыхъ приѣмахъ и не производи-никакихъ худыхъ послѣдствій. Въ селеніяхъ надо имѣть въ запасѣ хинную соль. Ее могутъ прописывать изъ аптекъ только врачи. Ес-дають или предъ самымъ приступомъ, или въ перемежку между при-ступами. Маленькимъ дѣтямъ довольно утромъ и вечеромъ давать по одному приѣму, именно по полуграну и меньше, взрослымъ дѣтямъ отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ грана, и повторять эти приѣмы чрезъ два часа. Такъ какъ хинная соль очень горька, и дѣти принимаютъ ее въ порошокъ, или въ микстурѣ, съ большимъ трудомъ, то можно къ хинной соли, смѣшан-ной съ сахаромъ, прибавлять еще нѣкоторое количество *макиши бѣ-лаго хлѣба*, такимъ образомъ, чтобы дитя могло съѣсть его и запить сахарною водою. За непмѣненіемъ этой соли, можно давать и *хинну съ лимоннымъ сиропомъ* и *мятною водою*, а для усиленія дѣйствія прибав-лять къ этой смѣси *галлерова элексира* 3, 4 капли (№ 197). Если ли-хорадка не пройдетъ отъ первыхъ приѣмовъ, то продолжать ихъ въ по-слѣдующихъ промежуткахъ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ прекратится болѣзнь. Но приѣмы должно тѣмъ болѣе уменьшать, или по крайней мѣрѣ рѣже давать, чѣмъ слабѣе становятся приступы. По прекращеніи ли-хорадки, иногда нужно продолжать въ теченіе одного промежутка хин-ную соль или хину, для предупрежденія возврата болѣзни. Но когда дитя никакъ не хочетъ брать лѣкарства или потому, что его рветъ при этомъ всякій разъ, или потому, что никакъ не можетъ принимать его, то дѣлается *промывательное* изъ *настоя ромашки*, въ кото-ромъ сперва растворяется хинная соль въ количествѣ 1, 2 и 3 гра-новъ, смотря по возрасту дитяти. Берется жидкости менѣе противъ обыкновеннаго клистира для того, чтобы онъ могъ держаться въ киш-кахъ. Ставить промывательное за часъ предъ пароксизмомъ. Повторять клистиры, пока прекратится болѣзнь. Предъ этимъ промывательнымъ полезно поставить *клистиръ* изъ *одной воды*, для предварительнаго очищенія кишекъ отъ нечистотъ. Можно также употреблять промыва-тельное изъ *хины*, показанное выше, для взрослыхъ людей (№ 198), только надо убавлять количество экстракта хины и лавдана соразмѣр-но возрасту и силамъ дѣтей. Въ подобныхъ случаяхъ очень полезно, во избѣжаніе внутреннихъ приѣмовъ, лѣчить лихорадку *накожною ме-тодою* употребленія лѣкарствъ. Для этого поставить *мушку*, величи-ною въ грошъ, въ томъ мѣстѣ живота, гдѣ предсердіе. Когда натянетъ пузырь, срѣзать кожуцу ножницами, и на обнаженную отъ нея поверх-ность кожи насыпать 1 или 2 грана *хинной соли*, смотря по возрасту дитяти, сверху налѣпить *липкій пластырь* и оставить его тутъ на нѣсколько дней. Сперва дѣлается жжение, скоро потомъ прекращаю-

щесся. Здѣсь входить въ тѣло соль такъ, какъ-бы она была принята внутрь. Для этой цѣли нѣкоторые врачи втираютъ въ обѣ подмышкн дитяти предъ каждымъ пароксизмомъ *мазь*, состоящую изъ *свиного жира* и *жиной соли*. *Черный перецъ*. При недостаткѣ хины и хинной соли даютъ глотать чернаго перца отъ 2, 4 и 7 цѣльныхъ зеренъ утромъ натощакъ, и продолжаютъ это всякій день до тѣхъ поръ, пока лихорадка отстанетъ. Въ упорныхъ лихорадкахъ можно давать чрезъ три часа по два или по три зерна. Перецъ употребляется тогда только, когда нѣтъ засоренія желудка, которое сперва уничтожить вышепоказаннымъ средствомъ.

Полыннъ назначается, какъ укрѣпляющее и противулихорадочное средство, но тогда только, когда употреблены другія лѣкарства безъ пользы; иногда лихорадка зависитъ отъ слабости пищеварительныхъ внутренностей. Дѣлаютъ изъ полыни настой или съ водою, или съ винограднымъ виномъ, и пьютъ предъ пароксизмомъ. Какъ противулихорадочное средство, употребляютъ съ большою пользою *полынное масло*, а въ простонародіи выжатый *сокъ* изъ *полыни*. *Чесночный и луковый сокъ* простой народъ даетъ съ водою передъ пароксизмомъ, но средство это дѣтямъ не годится. *Яичный бѣлокъ* даютъ предъ приступомъ, сбитый въ пѣну и соединенный съ пятью гранами порошка *корицы*. *Горькій миндаль*. Гуфеландъ очень совѣтуетъ, чтобы больной, въ простой лихорадкѣ, сѣдалъ передъ приступомъ одну или двѣ горькія миндальны. *Кофе* чашку сдѣлать обыкновеннымъ образомъ и, нажавъ туда нѣсколько *лимоннаго сока*, дать выпить передъ приступомъ и повторять такимъ образомъ, пока лихорадка отстанетъ: это средство полезно дѣтямъ не менѣе, какъ взрослымъ. Для предупрежденія возврата болѣзни надобно, чтобы дитя употребляло пищу хорошую, не обременяло ею своего слабаго еще желудка, въ особенности, чтобы не ѣло молочнаго, рыбнаго, раковъ, не спало на сырой землѣ, не находилось въ сыромъ и холодномъ жилищѣ, не купалось въ рѣкѣ, не подвергалось испугу, не училось много. Послѣ лихорадки дѣти не скоро возстановляютъ силы и совсемъ выздоравливаютъ. Если дитя слабо и часто подвергается разстройству пищеваренія, то употреблять средства, исправляющія пищеварительныя внутренности. Для укрѣпленія очень полезенъ въ малыхъ количествахъ *полынный настой*, равнымъ образомъ и растворъ одного грана полыннаго экстракта (съ конопляное зерно) въ стаканѣ перегнанной или отварной воды, который слѣдуетъ принимать утромъ и вечеромъ по чайной ложечкѣ и меньше, въ чашкѣ легкаго подслащеннаго настоя перечной мяты, причемъ слѣдуетъ заботиться, чтобы всякій день было у дитяти исправно на низъ.

Киргизы близъ Ново-Александровскаго укрѣпленія лѣчатъ перемежающіяся лихорадки слѣдующимъ образомъ: а) нюхаютъ дымъ перегигаемой камфоры; б) также носятъ еѣ у себя на шеѣ, завернувъ въ тряпку и разведя еѣ въ водѣ, принимаютъ по малой части внутрь; в) ходить и спать между верблюдами; г) кладутъ сонному больному на шею

мертвую, либо живую неядовитую змѣю; больной, проснувшись, пугается и оттого выздоравливаетъ; е) выводятъ больного изъ кибитки на степь, обертываютъ въ черную кошму, потомъ разводятъ въ трехъ мѣстахъ огонь, посыпаютъ на него соль, и подводя больного къ каждому изъ костровъ порознь, бьютъ его нагайками, спрашивая: продалъ ли онъ болѣзнь свою? продалъ, отвѣчаетъ больной, и сбросивъ съ себя кошму, кидаетъ её въ огонь, а товарищи преслѣдуютъ снова его нагайками до кибитки. Послѣ такого горячительнаго средства онъ, пропотѣвъ, скорѣе выздоравливаетъ. ф) Кормятъ больного чѣмъ либо съвернымъ, послѣ про это сказываютъ ему и съ нимъ дѣлается рвота, послѣ которой онъ тотчасъ выздоравливаетъ; г) при появленіи лихорадокъ у многихъ, киргизы тотчасъ перемѣняютъ кочевку и тѣмъ избавляются отъ повальной лихорадки *).

КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

СЛИЗЕТЕЧЕНІЯ.

О п р е д ѣ л е н і е. Слизетеченія суть лихорадочныя болѣзни, обнаруживающіяся совокупнымъ развитіемъ лихорадочныхъ припадковъ, увеличеннымъ слизеотдѣленіемъ изъ какой либо части системы слизистыхъ тканей (перепонѣ), и сопровождаемая, притомъ, болѣе или менѣ развитыми, не всегда явственными, нервными припадками.

Р а з д ѣ л е н і е. Вообще слизетеченія бываютъ *двухъ родовъ*: 1) изъ органовъ грудныхъ (воздухоносныхъ путей) и 2) низомъ. Въ первымъ принадлежатъ собственно *катарры: носовой, грудной*; а въ послѣднимъ наиболѣе случающееся слизетеченіе кишечное, преимущественно заднепроходной кишки, — *натужный поносъ*.

Катарръ носовой, или насморкъ.

О п р е д ѣ л е н і е. Насморкъ есть слизетеченіе изъ носовой полости, сопровождаемое тяжестью и болью головы, краснотой и слезливостію глазъ и, наконецъ, болѣшимъ или меньшимъ развитіемъ лихорадочныхъ припадковъ.

П р и з н а к и. Прежде всего нерасположеніе духа, тяжесть и боль головы, особенно въ передней ея части. Потомъ чувство ломоты въ разныхъ частяхъ тѣла, особенно въ конечностяхъ; потеря вкуса и аппетита, дыханіе чрезъ носъ трудное и непріятное; слизетеченіе изъ носовой полости, то малое и густое, то вдругъ очень обильное и жидкое. Лицо больного болѣе и болѣе надувается, особенно въ верхней части и около глазъ, которые краснѣютъ, блестятъ и слезятся. Дыханіе чрезъ

*) Б. Соголовъ. Др. Здр. 1845 г. № 19, стр. 145.

ность нерѣдко бывасть невозможнымъ, причемъ въ носу появляется нѣкоторое щекотаніе и вмѣстѣ чувство холода, тяжесть въ немъ и во всѣхъ близъ лежащихъ частяхъ, заваль въ поздрахъ, изъ которыхъ течетъ влажность свѣтлая и ѣдкая. Въ такомъ развитіи болѣзни продолжается обыкновенно одни, двое и трое сутокъ; а потомъ, или вдругъ исчезаетъ при наложеніи или мочевомъ отдѣленіи, или, мало по малу уменьшаясь, совершенно проходить.

Причины внутреннія (предрасполагающія): слизеніе тѣла вообще и излишнее развитіе слизистыхъ носовыхъ тканей, (перепонка) въ частности.

Причины внѣшнія (производящія): сырой холодъ: острые пары, соединенные съ угольною кислотою; послѣдшій выходъ изъ тепла на стужу, особенно простуда ногъ отъ промокнувшей обуви или хожденія босикомъ по сырой землѣ, мокрому, сырому полу комнаты и т. п. Въ первомъ случаѣ, при выходѣ изъ бани на сырой холодъ съ незакрытымъ лицомъ, подвержены бываютъ насморку особенно работающіе въ кузницахъ и на стеклянныхъ заводахъ, а въ послѣднемъ — рыболовы и поденщики, занимающіеся выгрузкою лѣса изъ воды. Вліяніе чемерицы, табака, у нюхальщиковъ тоже бываетъ причиною насморка. Кромѣ того банщики, прачки, чистодѣлы, хлѣбники или пекари хлѣба, торговцы и торговки, и портные преимущественно бываютъ подвержены этой болѣзни.

Сущность насморка состоитъ въ раздраженіи слизистой перепонки (ткани) носовой полости, въ приливѣ къ нимъ оттого слизистыхъ мокротъ, и истеченіи ихъ.

Распознаваніе легко.

Предсказаніе относительно жизни въ насморкѣ *не опасно*, а относительно продолжительности по особымъ случаямъ насморкѣ *иногда* бываетъ *упоренъ* и *продолжается* довольно *долго*. Эти особые случаи тѣ, гдѣ катарръ гигморовыхъ пещеръ и лобныхъ пазухъ переходитъ въ хроническое ревматическое состояніе.

Исходъ обыкновеннѣйшій *въ здоровье*, но при особенностяхъ сказанныхъ случаевъ и при недостаточномъ пособіи, болѣзнь, дѣлаясь хроническою, можетъ переходить въ *отолитиніе*, *полипозные наросты* и *изъявленіе*, при которомъ нерѣдко бываетъ изверженіе изъ носа мокроты густой, клейковатой и гнойвидной.

Лѣченіе діететическое насморка требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе себя отъ насморка избѣгать всѣхъ вышеупомянутыхъ причинъ производящихъ, особенно людямъ молодымъ, мокротнымъ обоюго пола, *избѣгать же крайностей теплоты и холода* есть одно только средство: *прохлаждаться* не иначе, какъ *постепенно*. Подверженные насморку напрасно думаютъ, что лучше всего держать имъ себя въ теплотѣ; это такая ошибка, которая подрываетъ ихъ здоровье. Этимъ только можно усилить въ себѣ расположеніе къ насморку и чрезъ то скорѣе получить его, а не избѣгнуть

его, и потому въ предохраненіе себя отъ насморка, напротивъ, должно познакомиться съ воздухомъ какъ можно покороче, исподволь и постепенно уменьшать мало по малу свое платье (т. е. изъ очень теплаго дѣлать менѣе теплое постепенно), избѣгая притомъ жилища въ жаркихъ покояхъ, наблюдать умѣренность въ тѣлодвиженіи, занятіяхъ и работахъ на открытомъ воздухѣ; а если отъ изнѣшества ихъ это очень разгорячился и вспотѣлъ, то не долженъ скидать съ себя платья, чтобы вдругъ прохладиться, и не пить холодную воду, равно и не бросаться въ нее для этого, но прохладжаться не иначе, какъ постепенно. Рыболовамъ, банщикамъ, прачкамъ, чистодѣламъ, хлѣбникамъ или пекарямъ хлѣба, торговцамъ или торговкамъ и портнымъ должно соблюдать особыя для нихъ правила, изложенныя въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Одержимый насморкомъ, по причинѣ простуды лица и особенно носовой полости, долженъ содержать себя во время болѣзни безвыходно въ теплой, сухой, свѣтлой комнатѣ, въ умѣренной температурѣ 14° до 16° Реом. не болѣе, а больной по причинѣ простуды ногъ долженъ сверхъ того наблюдать, чтобы ноги были всегда сухи, тепло обуты; для этого прежде надѣть на ноги нѣжные чулки, или портянки, а потомъ толстые шерстяные, если больной привыкъ ходить въ сапогахъ; въ противномъ случаѣ для обуви въ лапти, сверхъ обертокъ ногъ портянками, должно обернуть ихъ толстыми шерстяными очуками. 3) Пища непременно должно состоять изъ горячихъ кушаній, какъ то: привычныхъ щей, похлебокъ, бураковъ, жаренаго мяса подъ хрѣномъ и т. п. 4) Питье не должно быть холодное, потому что во всякомъ случаѣ оно не уничтожаетъ, а поддерживаетъ и усиливаетъ простуду, но болѣе тепловатое, подогрѣтое или долго стоявшее въ комнатѣ и остывшее. Постель не такъ нужна, какъ тѣлодвиженіе и занятіе чѣмъ либо на ногахъ, сидя и лежа въ комнатѣ; развѣ только послѣ бани, которая не менѣе помогаетъ бѣднѣму, какъ и богатому ванна, теплая постель на нѣсколько часовъ очень нужна и полезна для поддержанія испарины. У поселянъ вообще отъ простуды баня есть главное средство, которымъ они постоянно и вѣрно всегда излѣчиваются при первомъ занемоганіи, если только по выходѣ изъ нея бываютъ осторожны и нѣсколько времени послѣ того остаются въ теплѣ.

Лѣченіе существенное насморка должно имѣть цѣлью возстановить во всякомъ случаѣ мѣстную испарину и уничтожить мѣстный приливъ мокроты усиленнымъ испражненіемъ на низъ. Для этого въ первомъ случаѣ полезны: теплый чай изъ *малины, соломы, сънной трухи*, цвѣтовъ *липы, бузины* и т. п.; *натираніе* носа и лба *льдомъ* и *вымазываніе* ноздрей *масломъ, свѣжнимъ (свѣчнымъ) саломъ*; при сильномъ сухомъ насморкѣ, съ-болью во лбу, можно втягивать носомъ теплыя *пары* изъ *молока съ ромашкою, просвирками* и проч.; *тренинъ*, какъ вообще всего *тѣла, теплыми сухими вещами*, особенно *шерстяными* или *натианными уксуомъ съ виномъ*, такъ въ особенности ногъ для разгоряченія которыхъ, если они охолодѣли, должно употреблять.

сверхъ того, *ножныя ванны* простыя и со щелокомъ и солью (№№ 83, 84), *горчичники*, прикладываемые къ подошвамъ, пятамъ, на шею или за плечами (№№ 88, 89, 90). Въмѣсто ножныхъ ваннъ и горчичниковъ для разгоряченія ногъ помогаютъ и *сырые цвѣты*, посыпаемые на внутреннюю поверхность шерстяныхъ чулокъ, надѣваемыхъ непосредственно на ноги. Если есть запоръ, или хотя и бываетъ на низъ, но не достаточно, слѣдуетъ прежде всего усилить испражненія низомъ употребленіемъ внутрь разрѣшающихъ слабительныхъ, какъ-то: *огуречнаго разсола* съ масломъ и медомъ (№ 7), *толокна* съ медомъ и солью (№ 72) *коры крушины* (№ 74), *горькой соли* (№ 73) глауберовой одной и съ *нашатыремъ* (№№ 33, 34), *ревеня* одного или съ *кремортартаромъ* и *нашатыремъ* (№ 65). Въ случаѣ упорности болѣзни, когда она продолжается за 5, особенно за 12 дней, нужно особенно употребленіе *паровъ*, непосредственно дѣйствующихъ на пораженную часть. Пары эти могутъ быть изъ *простой воды*, но гораздо лучше изъ *молока* или изъ *мягчительныхъ травъ*, съ легкими *наркотическими*, какъ-то: *проскурнякомъ*, *ромашкой* и цвѣтамъ *мака*, либо листьями *бѣлены* (№ 199). На этотъ наборъ наливается кипятокъ и еще кипятится, и больной по вскипаченіи дышетъ такими парами 2—3 раза въ день и болѣе, смотря по обстоятельствамъ. Если парами неудобно дѣйствовать по причинѣ прилива крови къ головѣ, то вмѣсто паровъ употребляется *впрыскиванье* изъ настоя тѣхъ же травъ. Больной беретъ на руку теплую наливку и втягиваетъ въ носъ 2, 3, 4 раза въ день. Если болѣзнь застарѣла, то впрыскиваніе можно употреблять значительно долгое время и каждый разъ послѣ употребленія нужно *носъ закладывать* или *губкою*, или *корнѣю*, или *ветошкою*, для того чтобы не дышать чрезъ носъ, иначе болѣзнь будетъ ожесточаться, особенно если воздухъ сырой и прохладный. При употребленіи этихъ средствъ 2—3 раза самый упорный насморкъ проходитъ. Если болѣзнь перешла въ дѣйствительное отолѣніе, или полипозное состояніе, то совѣтовать обратиться къ врачу.

Д-ръ Вилліамъ предлагаетъ *воздержаніе отъ питья* какъ вѣрное средство отъ насморка, которое онъ испыталъ надъ собою и надъ своими пациентами. Сутки не должно ничего пить, а пищу употреблять сухую, мучную, зелень, бѣлыя рыбы, бѣлыя мяса, студень, сухіе плоды и подобныя питательныя вещества. Не надобно оставаться въ комнатѣ, но, выходя, одѣваться по теплѣ. Если въ первыя сутки болѣзнь не проходитъ, то продолжать это лѣченіе и на другія слѣдующія сутки, также ничего не пить. Онъ говоритъ, что рѣдко продолжается это лѣченіе болѣе двухъ сутокъ. Одна неприятность, бывающая къ концу двухъ дней воздержанія отъ питья, состоитъ въ томъ, что дѣлается легкая боль головы, усталость, обезсиленіе, но припадки эти уменьшаются покоемъ ночью, и исчезаютъ совершенно отъ двухъ чашекъ чая, выпиваемыхъ вечеромъ на третій день *).

*) Др. Здр. 1838 г. № 14. стр. 108.

Киргизы близъ Ново-Александровскаго укрѣпленія отъ насморка пьютъ горячій бульонъ изъ подъ баранины, называемый у нихъ щербомъ, съ нѣмецкимъ перцемъ, который покупаютъ они у торгующихъ около укрѣпленія астраханскихъ армянъ, и нюхаютъ при этомъ табакъ, смѣшанный съ тертымъ корнемъ вонючки (*assa foetida*), растущей по ихъ степяхъ въ изобиліи *).

Прим. При лѣченіи вышеупомянутыхъ рабочихъ поселянъ, какъ-то: рыболововъ, банщиковъ, прачекъ, чистодѣловъ, хлѣбниковъ или пекарей хлѣба, торговцовъ и торговекъ и портныхъ, въ особенности соображаться съ правилами, изложенными для нихъ въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Насморкъ у младенцевъ препятствуетъ имъ спать и очень беспокоитъ ихъ во время сосанія груди; онъ происходитъ у нихъ оттого, что держать ихъ въ чрезмѣрной теплотѣ, или когда колыбели (зыбелі) ихъ висятъ подлѣ дверей, или на сквозномъ вѣтрѣ. Для пользованія ихъ отъ насморка должно *уменьшить теплоту* въ комнатѣ до 16° и даже 14° по Реом., *зыбки отъ дверей и оконъ вышатъ подальше*, чтобы упоръ холоднаго воздуха, особенно сквознаго вѣтра, не могъ ни въ какомъ случаѣ вредить имъ, а лѣкарствомъ достаточнымъ для нихъ считается: держать младенца, одержимаго насморкомъ, надъ *паромъ теплой воды, молока, мягчительнаго набора* (№ 199) 2 и 3 раза въ сутки *натираютъ* ему носъ свѣжимъ масломъ коровьимъ, или *яичнымъ*, взятымъ изъ аптеки, *сажаютъ въ ванночку* изъ теплой воды съ *отрубями, растворомъ мыла*, особенно *казанскаго яичнаго*, небольшимъ количествомъ *вина простаго, либо уксуса*, если жаръ въ тѣлѣ замѣтенъ, каждыйдневно или черезъ день на 5—10 минутъ, и послѣ ванны тотчасъ обереть сухимъ полотенцемъ, надѣть чистое согрѣтое бѣлье и положить въ постельку или зыбку.

Катарръ грудной (грудной простудный кашель).

Опредѣленіе. Катарръ грудной есть частое изверженіе слизи изъ грудныхъ органовъ, сопровождаемое болѣе или менѣе сильнымъ кашлемъ, при ощущеніи или щекотанія и зуда, простирающихся по направленію дыхательнаго горла, или тяжести, зуда и нѣкотораго рода давленія въ легкихъ, которыя обыкновенно кажутся больному какъ бы раздавленными, или чѣмъ либо засыпанными, — въ сопровожденіи нерѣдко спазматическихъ припадковъ.

Раздѣленіе. Изъ этого видно, что катарръ грудной бываетъ двоякаго рода: А. *Горловой* и Б. *Легочный*. Легочный бываетъ простой и заразительный. Послѣдній имѣетъ два вида 1) *гриппъ*, 2) *коклюшъ*.

Признаки катарра дыхательнаго горла. Прежде всего нѣкоторое стѣсненіе въ дыхательномъ горлѣ, потомъ щекотаніе въ немъ, по

*) Зав. Врачъ Соколовъ. Др. Здр. 1845 г. № 19. стр. 147.

временамъ возвращающееся и возбуждающее обыкновенно кашель съ отдѣленіемъ мокроты, болѣе и болѣе увеличивающимся. Въ сильной степени болѣзни, если не будетъ подана врачебная помощь, раздраженіе и кашель очень усиливаются, такъ что больной, особенно въ ночное время, не имѣетъ минуты, свободной отъ кашля; отдѣленіе мокроты бывасть такъ обильно, что въ 2—3 часа больной наполняетъ ею цѣлую плевальницу. Мокрота очень густа, тягуча и надувается въ видѣ пузырей. Если и въ этомъ случаѣ не будетъ подана врачебная помощь, то мокрота мало по малу начинаетъ дѣлаться мутною, бѣловатою; сгущается и наконецъ принимаетъ видъ гнойной, а вмѣстѣ съ тѣмъ появляются: постоянное жженіе, боль въ горлѣ и припадки, свойственные изнурительной лихорадкѣ, которые, вмѣстѣ взятые, показываютъ присутствіе горловой чахотки, отъ которой больной оканчиваетъ жизнь въ совершенномъ изнуреніи. Таковы признаки высшаго жестокаго развитія катарра дыхательнаго горла.

Но если болѣзнь будетъ легка, или и сильна, но больной получить хорошее пособіе, то болѣзнь, по возстановленіи испарины, мало по малу утихаетъ, или же, при усилившемся отдѣленіи и испражненіи на низъ и мочею, болѣзнь вдругъ, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, совершенно прекращается, и здоровье больного возстановляется. Таково теченіе катарра дыхательнаго горла въ легкомъ его развитіи.

Если къ припадкамъ катарра дыхательнаго горла присоединяются припадки, свойственные жабѣ зѣва, т. е. боль при глотаніи и при самомъ кашлѣ, стѣсненіе въ зѣвѣ и затруднительное дыханіе, особенно чрезъ носъ, то теченіе катарра дыхательнаго горла будетъ несравненно болѣзненнѣе противъ обыкновеннаго.

П р и з н а к и катарра легочнаго простаго, будетъ ли онъ разсѣянный (спорадическій) или повсемѣстный (эпидемическій) при равныхъ условіяхъ относительно степени и силы причинъ производящихъ, бываютъ одинаковы. Такъ наприм. въ осеннее и зимнее время, если холодъ и сырость велики, то и катарръ тотъ и другой бываютъ сильны, въ лѣтнее время напротивъ; въ легчайшихъ случаяхъ онъ обнаруживается легкимъ кашлемъ съ небольшимъ изверженіемъ слизи и нѣкоторымъ ощущеніемъ раздраженія въ легкихъ, безъ развитія лихорадочныхъ припадковъ, причѣмъ болѣзнь продолжается не болѣе однихъ, а много трехъ сутокъ. Въ высшей степени развитія болѣзни сперва является, какъ лихорадочный предвѣстникъ, нерасположенность въ тѣлѣ и духѣ, дыханіе затрудняется, перхота и кашель, потомъ нерѣдко ознобъ, за нимъ жаръ, тяжелое дыханіе, сильный кашель съ увеличеннымъ изверженіемъ слизи; отдѣлительно-испражнительныя отправленія пріостанавливаются. Это продолжается отъ 3 до 12 дней. Послѣ того болѣзнь мало по малу, при возстановленіи отдѣлений и испражненій, начинаетъ проходить, и больные оправляются.

П р и ч и н ы, какъ внутреннія (предрасполагающія), такъ и внѣшнія (производящія), во всѣхъ видахъ груднаго катарра одинаковы съ

причинами катарра носовой полости (насморка). Вообще въ первомъ случаѣ причинами бываютъ: *ослизненіе, мокротность* тѣла, а въ послѣднемъ *простуда*, отъ остановленія испарины въ кожѣ, промоčenja ногъ, неосторожнаго глубокаго вдыханія холоднаго воздуха, послѣ бани или ванны, вспотѣнія и выхода изъ жаркой душевой комнаты на свѣжій холодный воздухъ. Люди блѣднорыые, золотушные, изнѣженные, блѣдно-одутлые, тучные, привыкшіе къ теплотѣ, теплой одеждѣ, сидячей жизни, пьющіе много и часто теплаго чаю, особенно расположены къ катарру, который у нихъ легко происходитъ отъ быстрой перемѣны теплоты на холодъ и обратно; отъ сквознаго вѣтра весной, осенью, въ холодныя лѣтнія ночи, отъ низменнаго, болотнаго мѣстопребыванія, отъ сырыхъ, теплыхъ, душныхъ избъ. Крестьяне всего чаще получаютъ катарръ зимою, когда они изъ теплой избы, или съ горячей печки, бани, вдругъ выбѣгаютъ въ однихъ рубахахъ, а часто босые и голые, на морозъ въ 15 градусовъ. Земледѣльцы, рыболовы, чистильщики колодезѣй и помойныхъ ямъ, пѣвцы, чтецы на распѣвъ (діаконы), проповѣдники и другія духовныя лица преимущественно бываютъ подвержены этой болѣзни.

Сущность. Сущность груднаго катарра состоитъ въ раздраженіи слизистой ткани (перепонки), выстилающей внутреннюю поверхность дыхательнаго горла (катарръ горловой) и вѣтвей его, раздѣляющихся въ существѣ легкихъ (катарръ легочный), въ приливъ къ ней слизистыхъ мокротъ, сопровождаемомъ, главнымъ образомъ, отдѣленіемъ и изверженіемъ изъ нея этихъ жидкостей при посредствѣ кашля.

Распознаваніе. Катарръ горловой отъ катарра легочнаго отличается мѣстомъ раздраженія и боли, которымъ въ горловомъ бываютъ: гортань и передняя часть шеи, а въ легочномъ — грудь; отъ горловой чахотки — тѣмъ, что въ катаррѣ дыхательнаго горла мокрота бываетъ прозрачная, слизистая, а въ чахоткѣ горловой представляютъ слизь блѣлую и гнойную. Катарръ легочный простой въ началѣ болѣзни сходствуетъ съ воспаленіемъ легкихъ, но чрезъ нѣсколько часовъ распознается удобно по свойству лихорадочныхъ припадковъ, раздраженію кровеносной системы и по сухому кашлю, свойственнымъ воспаленію легкихъ. Катарръ легочный простой отъ заразительнаго, особенно отъ коклюша, распознать довольно трудно, особенно въ первые дни болѣзни. Отличіе между ними только то, что коклюшъ и въ самомъ началѣ имѣетъ теченіе болѣе періодическое, нежели катарръ простой, и свойственъ дѣтямъ, а не взрослымъ. По заразительному свойству гриппа и коклюша, ихъ тоже трудно отличить отъ катарровъ, потому что иногда и эти, даже самый насморкъ, бываютъ прилипчивы. Слѣдовательно для отличія ихъ нужно брать всю сумму признаковъ тѣхъ и другихъ, или все теченіе каждой изъ этихъ болѣзней, и въ такомъ случаѣ разность можетъ руководить къ точному распознаванію той или другой болѣзни.

Предсказаніе въ грудномъ катаррѣ, какъ горловомъ, такъ и легочномъ, въ отношеніи опасности для жизни, при хорошихъ, благо-

пріятныхъ условіяхъ со стороны большаго и степени болѣзни, *хорошо и опасно*, но если условія будутъ противны, развитіе болѣзни сильное, тяжелое и при недостаткѣ врачебныхъ средствъ, — то предсказаніе можетъ быть сомнительнымъ и опаснымъ, такъ какъ тотъ и другой катарръ могутъ переходить въ другія болѣзни, болѣе важныя (см. исходы). Относительно продолжительности — болѣзнь въ большей части случаевъ, въ 8 изъ 10, оканчивается въ 10—5—2—1 день и очень *рѣдко продолжается до 2 недѣль*. Но если болѣзнь сильна, пособія нѣтъ, условія жизни неблагоприятны, воздухъ, которымъ дышетъ больной, сыръ и холоденъ, если пища острая, сырая, соленая, — то предсказаніе относительно продолжительности становится невыгоднымъ, и болѣзнь легко можетъ сдѣлаться хроническою, въ обонхъ видахъ груднаго катарра.

Исходы: въ *здоровье*, если катарръ легокъ, больной въ хорошихъ условіяхъ; въ другія болѣзни переходятъ катарры тяжелые, при дурныхъ условіяхъ, оставленные безъ лѣченія. Эти болѣзни суть: *горловая чахотка, чахотка легкихъ*.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. — 1) Въ предохраненіе себя отъ груднаго катарра, должно имѣть въ виду то же средство, какое описано въ соимянномъ лѣченіи катарра носовой полости (насморка), т. е. чтобъ *не простужаться*, надлежитъ очень нагрѣвшееся *тѣло прохлаждать* не иначе, какъ *исподволь и постепенно*. По этому поселяне въ холодное время, особенно зимою, въ началѣ весны и концѣ осени, изъ теплыхъ своихъ избъ или съ горячей печки, бани, не должны вдругъ выбѣгать въ однихъ рубахахъ, особенно босые и голые, на холодъ и морозъ, какъ это они часто дѣлаютъ, за что жестоко платятся страданіями, а нерѣдко и смертію*). Земледѣльцамъ, рыбакамъ, чистильщикамъ колодцевъ и помойныхъ ямъ, пѣвцамъ, чтецамъ на распѣвъ, проповѣдникамъ и другимъ духовнымъ лицамъ должно совѣтовать соблюдать сверхъ того особыя правила, изложенныя для нихъ въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Больные, одержимые груднымъ катарромъ, должны болѣе обыкновеннаго быть въ теплой, свѣтлой комнатѣ, лежать въ постели и стараться слегка вспотѣть, чего не трудно достигнуть употребленіемъ на ночь, или около

*) 1846 года въ мартѣ мѣсяцѣ, бывъ командированъ начальствомъ въ село Черемышево, (помѣщика Моисѣева), Лапшевскаго уѣзда, Казанской губерніи, для прекращенія эпидеміи, свирѣпствовавшей между тамошними жителями, я нашелъ, что они занемогали и страдали катарральною горячкою, болѣе отъ собственной ихъ неосторожности, чѣмъ отъ повѣтрія. Одинъ въ семействѣ занемогеть, а прочіе при уходѣ за нимъ ночью, вставая съ теплыхъ постелей, не одѣвшись и не обувшись, босые, въ однихъ рубашкахъ, изъ теплой избы выводятъ больного подъ руки на дворъ въ холодъ и морозъ, при побужденіи его помочиться или испражниться. Такимъ образомъ они вдругъ остываютъ, простужаются сами и ожесточаютъ болѣзнь въ больномъ, ибо и его, большую частію, выводятъ раздѣтымъ и босымъ. Отъ того цѣлыя семейства занемогали одно за другимъ и при такихъ дурныхъ условіяхъ многіе умирали отъ развивавшагося воспаленія легкихъ.

утра, нѣсколькихъ чашекъ чая изъ цвѣтовъ липовыхъ, мать-мачихи, буйвицы, сухой малины, шалфея, мяты, соломы, сѣнной трухи и т. п., или другаго какаго либо мокрото-жидительнаго напитка, напр. сбитня, отвара свеклы, рѣпы, моркови съ медомъ, даже теплой сыты. Нерѣдко однимъ этимъ способомъ въ одинъ день излѣчивается катарръ, который, еслибы пренебречь имъ и запустить, быть можетъ стоилъ бы жизни больному, или, по крайней мѣрѣ, продержалъ бы его въ постели долгое время. Примѣровъ тому мы видимъ много на рабочихъ людяхъ, живущихъ дневными трудами. Когда эти люди въ несчастію подвергаются грудному катарру и не имѣютъ возможности просидѣть дома въ теплѣ, одинъ или два дня, чтобы полѣчиться, то пренебреженная и запущенная ихъ болѣзнь принуждаетъ ихъ въ послѣдствіи оставаться дома на долгое время, и вмѣстѣ съ тѣмъ они дѣлаются неспособными къ тяжелымъ работамъ. Но этого мало: изъ числа тѣхъ работниковъ, которые, подвергшись грудному катарру, имѣютъ время на избавленіе себя отъ него, но пренебрегаютъ имъ, говоря: «что за важность, велика бѣда кашель, мы люди не нѣжные», продолжаютъ работать, пока ноги волочатъ, — погибаетъ большое количество людей отъ послѣдствій этой болѣзни, потому что кашель, какъ презрѣнный непріятель, усиливается отъ такихъ отсрочекъ и наконецъ дѣлается непобѣдимымъ. Одинъ врачъ спросилъ своего друга о здоровьѣ, и когда другъ его отвѣчалъ: «я слава Богу здоровъ, да только у меня кашель», врачъ сказалъ ему: «кашли убиваютъ людей болѣе, чѣмъ язва». Эта истина подтверждается наблюденіемъ надъ путешественниками, подвергшимися грудному кашлю, которые, при всемъ томъ, опасаясь потерять хотя одинъ только день, продолжаютъ путь даже въ самую жестокую погоду и чрезъ то подвергаютъ жизнь свою опасности. Однако слишкомъ не должно бояться кашля и заператься оттого въ очень теплый покой и пить обильно теплые напитки; это подастъ поводъ къ такому расслабленію твердыхъ частей тѣла, что послѣ трудно бываетъ возвратитъ имъ прежнюю упругость; словомъ: все излишнее вредно. По этому въ этой болѣзни, если только она и погода позволяютъ, *умѣренное тѣлодвиженіе* бываетъ нужно и полезно, наприм. прохаживаться, ѣздить верхомъ и въ экипажѣ; при этомъ отъ упора воздуха или вѣтра нужно закрывать ротъ платкомъ, или чѣмъ либо изъ одежды. Бываетъ, что упорный кашель, не уступавшій лѣкарствамъ, уступаетъ умѣренному тѣлодвиженію и діетѣ, соблюдаемымъ достаточное время. 3) *Диета* должна состоять въ уменьшеніи количества кушаній и воздержаніи отъ всякаго крѣпкаго напитка. Многіе покушаются вылѣчивать себя отъ кашля употребленіемъ опьяняющихъ напитковъ, но эта попытка слишкомъ отважна и неблагоприятна. Правда она можетъ иногда удался, внезапно возстановивъ испарину; но когда съ груднымъ кашлемъ соединена нѣкоторая степень воспаленія, что случается часто, то крѣпкіе и опьяняющее напитки не только не уменьшаютъ боли, но еще увеличатъ ее, и чрезъ то простой кашель можетъ превратиться въ воспалительную го-

рячку. Изъ кушаній, вмѣсто мяса, рыбы, яицъ, молока или другой питательной пищи, больной долженъ ѣсть одни только легенькія хлебки, телячьи и цыплячьи бульоны, разварной бѣлый хлѣбъ; кашицу и т. п., а пить только ячную воду, подслащенную медомъ, или настой съ мятою, или льнянымъ сѣменемъ, подслащенный висломятъ, клюквеннымъ сокомъ, или ячменный отваръ съ солощеннымъ сокомъ, либо соевъ рѣпы, моркови, свекловицы; — вина же и кофе употреблять не должно. При этомъ крестьяне, когда силы позволяютъ, должны, не отлагая, сходить въ хорошо-истопленную баню, попотѣть въ ней и обмытъ тѣло съ мыломъ; пораженныя болѣзнію мѣста (въ катаррѣ горловомъ всю переднюю часть или сверху до груди, а въ катаррѣ легочномъ и самую грудь), натереть рѣдкою, либо медомъ съ солью, или же перцовкою, виномъ съ камфорою, продажными бальзамами: майскимъ, сумахотвымъ, апольдекоюмъ, скипидаромъ, чистымъ березовымъ дегтемъ, крѣпкою водкою — въ пару, на полу, какъ они обыкновенно это дѣлаютъ въ подобныхъ случаяхъ, и напарить какъ вообще все тѣло, начиная съ ногъ до головы, такъ въ особенности намазанныя мѣста шеи и груди, — березовымъ, намыленнымъ вѣшникомъ, потомъ, обмывшись съ мыломъ начисто, обтереться и одѣться въ чистое, сухое бѣлье и теплую одежду и обувь и закутаться.

Лѣчение существенное въ грудномъ катаррѣ тогда обыкновенно бываетъ нужно, когда онъ не уступаетъ ни діететическимъ средствамъ, ни цѣлебной потогонной банѣ, или же когда больной вдругъ такъ ослабѣлъ отъ катарра, что не въ силахъ идти въ баню. Въ такомъ случаѣ, кромѣ *груднаго чая*, означеннаго въ предшествовавшемъ діететическомъ лѣченіи, есть другое спасительное и скорое средство освободиться отъ груднаго катарра, состоящее въ томъ, чтобы *вдыхать* въ себя *паръ теплой воды* или паръ теплаго *настоя* изъ вышеозначенныхъ *грудныхъ растений* съ прибавленіемъ къ нимъ *ромашки* (№ 199). Настой этотъ наливается на горячую сковороду, надъ которою надо держать голову, покрытую свернутою вдвое салфеткою, такъ чтобы весь паръ шелъ, какъ при насморгѣ, на лицо, или вдыхать въ себя паръ посредствомъ узкаго отверстія воронки, опрокинутой широкимъ отверстіемъ на горячую сковороду, по налитіи на нее означеннаго теплаго настоя. Внутрь давать *нашатырь съ кремортартаромъ* безъ ревеня, если бываетъ достаточно на низъ, въ противномъ случаѣ и съ *ревенемъ* (№ 65); либо, если жаръ бываетъ значителенъ, *нашатырь съ селитрою*, точно также составленный по равной части и въ такомъ же назначеніи приемовъ. Надежнымъ средствомъ для возстановленія испарины служить то, чтобы на ночь, ложась спать, *вымывать ноги и голени* больного *въ теплой водѣ*, (не теплѣе парнаго молока), но не горячей, которая будетъ вредна, а по вымытіи тотчасъ больному лечь въ постель. Не менѣе того полезно, вмѣсто обмыванія ногъ и голеней теплою водою, *опускать въ нее ноги* на нѣсколько времени (8—15 минутъ); потомъ, обтерши ихъ насухо, лечь въ постель. Послѣ испарины должно пере-

мѣнить бѣлье. Сверхъ того полезны: при боли въ горлѣ *полосканья* изъ *ромашки, шалфея, отрубей, льняного сѣмени съ молокомъ и медомъ*; при боли же въ горлѣ и груди — шею и грудь вымазать *саломъ*, или покрыть толстою (синою) бумагою, напитанною *масломъ*, либо посыпанною *стружками мыла*. Если за всѣмъ тѣмъ больной не имѣетъ облегченія, а лихорадочные признаки продолжаются, т. е. когда пульсъ силенъ и скоръ, башель жестокъ и боль въ головѣ велика, то, если больной молодъ, крѣпокъ и плотенъ, нужно допустить *открыть кровь* отъ 2 до 3 чайныхъ чашекъ. Но когда больной слабъ и тѣлосложенія хилаго, то кровопусканіе только продлитъ болѣзнь; особенно когда больной свободно отхаркиваетъ мокроту, оно бываетъ не только бесполезно, но и вредно, ибо уменьшаетъ мокротозарганіе, осаживая вообще стремленіе соковъ внизъ. Во всякомъ случаѣ, т. е. по открытіи прови, если болѣзнь все еще продолжается, или безъ кровопусканія изъ вены, въ катаррѣ горловомъ (при боли въ горлѣ) полезно припусканіе пиявокъ (6, 12) къ верхней, передней части шеи надъ кадыкомъ, подъ самымъ зѣвомъ и съ боковъ онаго внизъ, по направленію этого горла, — повторяемое иногда 2, 3 раза и болѣе, какъ скоро боль не исчезнетъ; въ катаррѣ легочномъ (при боли въ груди) — прикладываніе *горчичниковъ* (№№ 88, 89 и 90) къ груди, противъ того мѣста, гдѣ чувствуется боль, повторяемое 2, 3 раза и болѣе; втираніе *летучей мази* (№ 76); при- ставленіе *мушки* (№ 58). Но когда лихорадочныхъ признаковъ въ катаррѣ грудномъ незамѣтно, или они и были, но миновались, а остался грудной мокротный башель, то въ такомъ случаѣ средства противъ него слѣдуетъ употреблять, смотря по свойству отхаркиваемой мокроты (харкотины). Если харкотина густа и вязка, то нужны средства грудныя разбивательныя; *сиропъ*, дѣлаемый изъ равныхъ частей *кислаго* (брюквеннаго, брусничнаго, лимоннаго) *сока*, а за неимѣніемъ ихъ — *краснаго уксуса, леденца и меда* бываетъ очень полезенъ въ этомъ случаѣ. Больной можетъ принимать его по ложкѣ, когда захочетъ. *Растворъ аммоніаковой камеди въ ячномъ* отварѣ съ мятнымъ настоемъ (№ 115) еще бываетъ полезенъ; этого раствора надо давать больному по двѣ ложки три или четыре раза въ день, смотря по возрасту, тѣлосложенію и темпераменту его. Но когда мокрота (харкотина) бѣла, водяниста и безсвязна, то эти лѣкарства не только бесполезны, но могутъ быть вредными; тутъ нужны и полезны бываютъ средства *масляныя, слизистыя, усладительныя и боле-утолительныя*. Больной въ такомъ случаѣ долженъ пить *настой* изъ *шалфея, цвѣтковъ полевого мака, корня ржи или проскурнячнаго, или изъ листьевъ мать-мачихи*. Настой *солодкового корня*, либо собъ или экстрактъ его (*ложрица*), распушенный во вскипяченной водѣ (1 золотн. на чайную чашку), оказываетъ въ этомъ случаѣ отличную пользу. Его можно давать по чайной чашкѣ три или четыре раза въ день. Полезны бываютъ и *сырыя яйца* съ сахаромъ, *деревянное и льняное масло съ леденцомъ*; употребляютъ ихъ на тощій желудокъ: яйца по одному, а масло по сто-

ловой ложкѣ. Гораздо лучше дѣлають, когда изъ нѣсколькихъ яицъ употребляютъ одни выпущенные *бѣлки съ сахаромъ*, безъ желтковъ. Однако и напитокъ, дѣлаемый изъ желтковъ, называемый *гоголь-моголь* (съ сахаромъ и ромомъ), нерѣдко оказываетъ большую пользу въ этомъ лѣченіи. *Девичья кожа* (постила проскурнячнаго корня) и *бабья кожа* (постила солодкового корня) равнымъ образомъ *грудныя лепешки* и *сахаръ Бюргави*, приготовляемые въ аптекахъ, составляютъ въ этомъ случаѣ самыя пріятныя, деликатныя лѣкарства для молодыхъ, нѣжныхъ, богатыхъ дѣтей, дѣвицъ и женщинъ. Если мокрота при этомъ кашлѣ бываетъ, сверхъ того, остра и ѣдка, то больной долженъ безпрестанно держать во рту какія нибудь сладкія грудныя средства, даже нѣкоторыя изъ нихъ полезно жевать, какъ напр. солодовый корень, *ячмень съ сахаромъ*. Они, притупляя и обволаживая ѣдкость и остроту мокроты, утоляютъ кашель и чрезъ то облегчаютъ катарръ. Въ случаѣ же продолжительности катарра, когда кашель мокротный начнеть видимо переходить въ сухой и болѣе частый, потому что мокрота, вмѣсто того чтобы быть отхаркиваемою и извергаемою, падаетъ на легкія (чувство тяжести въ груди тяжелее, дыханіе труднѣе, нельзя вдохнуть въ себя поглубже воздухъ безъ кашля), въ такомъ случаѣ больной долженъ носить у себя на спинѣ между плечъ и лопатокъ *пластырь изъ черной смолы* (сапожный варъ), взятой съ мушкатный орѣхъ, разглаженной въ тоненькую пластинку на мягкой кожѣ, величиною съ ладонь, и повсемѣстно приложенной плотно къ тѣлу. Этотъ пластырь чрезъ каждые два или три дня снимается, вытирается и опять прилагывается; но каждыя двѣ недѣли надо возобновлять его, т. е. прилагать свѣжій. Когда пластырь этотъ, или черную смолу (варъ), соединяють *съ воскомъ*, то онъ бываетъ лучше и полезнѣе; а еще болѣе пользы, когда прибавлять къ нему часть *скипидара*, или *терпентиннаго масла*. Средство это есть одно изъ лучшихъ, простыхъ, дешевыхъ и спасительныхъ средствъ въ упорномъ продолжительномъ грудномъ катаррѣ, обнаруживающемся продолжительнымъ сухимъ кашлемъ съ тяжестью въ груди и невозможностію вдохнуть въ себя глубоко воздухъ безъ того, чтобы не закашляться. Оно дѣйствуетъ хотя медленно, но вѣрно и неизмѣнно. Одна невыгода отъ него та, что оно производитъ зудъ; и если зудъ этотъ бываетъ слишкомъ непріятенъ и нестерпимъ, то, снявши на время пластырь, должно зудящее мѣсто потереть сухимъ полотенцомъ, или помочить теплою водою и молокомъ. Переставая носить пластырь, надо соблюдать нѣкоторую предосторожность въ томъ, чтобы величину его время отъ времени уменьшать все менѣе и менѣе до величины монеты 3 копѣекъ, а совсѣмъ перестать носить не иначе, какъ въ теплую погоду или весною. Какъ ни хорошо это средство, однако оно только можетъ задерживать ходъ этой опасной болѣзни и облегчать страданія больного, а совершеннаго излѣченія отъ него одного ожидать никакъ не должно, и потому, совѣтуя употреблять его въ этомъ

крайнемъ случаѣ, надо вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтовать при первомъ удобномъ случаѣ обратиться къ пособію врача.

Въ Одессѣ осенью (въ ноябрѣ мѣсяцѣ) 1842 года грудной катарръ былъ господствующею болѣзнію. Успѣшное лѣченіе его состояло въ слѣдующемъ. При высшей степени пораженія слизистой оболочки вѣтвей дыхательнаго горла назначалось *кровопусканіе общее* или *мыстное* (пиявочное), смотря по возрасту и тѣлосложенію больного; *рвотный камень* и *нашатырь* возстановляли проходимость вѣтвей дыхательнаго горла, открывали потъ и поддерживали изверженіе мокротъ изъ дыхательнаго горла.

Примѣч. При лѣченіи земледѣльцевъ, рыболововъ, чистильщиковъ колодезевъ и помойныхъ ямъ, пѣвцовъ, чтецовъ, проповѣдниковъ, въ особенности должно соображаться съ правилами, изложенными для нихъ въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію, преимущественно относительно кровопусканія.

Гриппъ, (инфлюенца).

Опредѣленіе. Гриппъ есть слизеизверженіе изъ воздухоносныхъ путей, заразительное, эпидемическое, сопровождаемое кашлемъ, болѣе или менѣе сильнымъ, и спазматическими припадками, при ощущеніи тяжести, зуда и нѣкотораго рода давленія въ лёгкихъ.

Признаки у гриппа одинаковы съ признаками простаго легочнаго катарра, съ тою разницею, что въ гриппѣ у всѣхъ кашель бываетъ сильный.

Причины *предрасполагающія* общія съ другими слизетеченіями; а *производящія*: 1) особенное *состояніе атмосферы*, при которомъ гриппъ свирѣпствуетъ эпидемически (повально), и 2) *заразы*, доселѣ не опредѣленная.

Сущность также общая, съ тою только разницею, что въ гриппѣ извергаемая мокрота заразительна.

Распознаваніе гриппа отъ простаго легочнаго катарра такъ трудно, что доступно только врачамъ, признающимъ его: 1) по заразительности, 2) по распространенію его на неограниченное пространство, 3) по одинаковой жестокости во всѣ времена года, и 4) по безостановочному перемѣщенію его изъ одной страны въ другую.

Предсказаніе въ гриппѣ то же какъ и въ простомъ легочномъ катаррѣ; разница только въ томъ, что дѣти, подвергающіеся гриппу, гораздо труднѣе переносятъ его, нежели простой катарръ.

Исходы бываютъ *въ здоровье* у взрослыхъ скорѣе, нежели у дѣтей, а *въ смерть*, напротивъ.

Лѣченіе, какъ діететическое, такъ и существенное, одинаково съ лѣченіемъ простаго легочнаго катарра, только здѣсь требуются болѣе дѣятельныя средства и назначеніе ихъ необходимо; поэтому, какъ скоро начнеть обнаруживаться смертность между дѣтьми, повидимому отъ

простаго легочнаго катарра, должно совѣтовать просить врача для пособія въ этой болѣзни, которая, какъ рѣдко случающаяся, не подлежить здѣсь подробному описанію. Въ тому же инфлюенца, при соблюденіи діететическихъ правилъ, въ Россіи считается доброкачественною болѣзнію, за исключеніемъ Таврической губерніи, гдѣ она сопровождается большою смертностію, особенно между дѣтьми, и бываетъ злокачественна *).

Въ г. Охотскѣ и его окрестностяхъ инфлюенца (гриппъ) съ половины января до половины февраля 1833 года убійственно свирѣпствовала въ формѣ эпидемической катарральной горячки; не оставалось ни одного, кто бы не перенесъ ея въ болѣе или менѣе степени, и цѣлое народонаселеніе города представляло обширный лазаретъ. Причина такой жестокости болѣзни была климатическая. Морозы въ то время постоянно доходили до 30° по Реом. и выше, небо было чистое, ясное, вѣтеръ средней силы, рѣзкій, сѣверо-восточный. Долгое пребываніе на открытомъ воздухѣ было невыносимо, чистый наружный воздухъ вдыхался какъ нѣчто острое, жгучее и возбуждалъ кашель и одышку. До этого времени, равно и послѣ того, погода была теплѣе, вѣтеръ тише. Успѣшное лѣченіе врачей состояло въ слѣдующемъ. Въ началѣ болѣзни и при умѣренной степени ея *теплое содержаніе*, совершенный и долго соблюдаемый *покой*, *теплые водяные пары*, *лѣкарства слизистыя*, *противувоспалительныя*, *слабая діета* — приносили совершенную пользу. При сильныхъ мѣстныхъ воспаленіяхъ помогали многимъ обильныя *кровопусканія изъ руки*, нерѣдко повторяемыя, *мушки*; внутрь: средства противувоспалительныя. Число умершихъ, какъ полагалъ шт. лѣк. Рафановичъ, бывшій главнымъ дѣйствующимъ лицомъ противъ этой эпидеміи, приблизительно составляло седьмую часть всего числа заболѣвшихъ **).

Коклюшъ.

Опредѣленіе. Коклюшъ есть слизиизверженіе изъ воздухоносныхъ путей, заразительное, эпидемическое, сопровождаемое сильнымъ удушающимъ кашлемъ, которому предшествуетъ особеннаго рода звонкое дыханіе, похожее на крикъ или пѣніе молодого пѣтуха, причемъ нерѣдко происходитъ слизистая рвота.

Признаки. Приступы сильнаго кашля, состоящіе изъ рѣдкихъ, глубокихъ вдыханій, соединенныхъ со свистомъ, пронзительнымъ громкимъ визгомъ, на подобіе вышеупомянутаго пѣтушьаго крика, изъ короткихъ, но частыхъ и скорыхъ выдыханій; въ сильной степени, во время приступа, лицо краснѣетъ и синѣетъ, кровь приливаетъ къ головѣ, прорывается изъ носа и горла, дыханіе затрудняется и даже

*) Др. Зпр. 1837 г. № 14. стр. 106.

**) Др. Зпр. 1838 г. № 46. стр. 161 и 362.

прерывается на время до обморока. Приступъ продолжается 5—10—15 минутъ, возвращается опять чрезъ $\frac{1}{2}$ —1—2—4 часа, особенно когда дитя начинаетъ плакать, кричать, бѣгать, смѣяться; онъ бываетъ сильнѣе ночью и нерѣдко оканчивается рвотою; по окончаніи приступа больной кажется здоровымъ, но блѣденъ, съ припухшимъ лицомъ и слизистыми, красными глазами.

Коклюшъ есть дѣтская болѣзнь и случается разъ въ жизни. Въ немъ различаютъ *три періода*: первый *лихорадочный* періодъ, похожій на простой простудный кашель (продолжающійся 8—10 дней) съ лихорадкою, со свѣтлою, жидкою мокротою; въ этомъ періодѣ можетъ появиться воспаление легкихъ; второй *судорожный* періодъ (продолжающійся 3—4 и даже 12 недѣль); здѣсь кашель бываетъ явно судорожный, безъ лихорадки, достигаетъ высокой степени и такъ тянется нѣсколько недѣль; въ этомъ періодѣ начинаетъ извергаться мокрота густая, желто-бѣлая, иногда огромными кусками и съ полосками крови; въ третьемъ періодѣ кашель начинаетъ постепенно ослабѣвать въ числѣ и степени приступовъ и принимаетъ *свойство простаго простуднаго кашля*; у ребенка дѣлается сильный насморкъ, слезотеченіе; губы пухнутъ и краснѣютъ. Вообще, во всѣхъ этихъ періодахъ, коклюшъ, продолжаясь $1\frac{1}{2}$, иногда 3 и 4 мѣсяца, господствуетъ повально между дѣтьми всякаго возраста, какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ, и бываетъ заразительнаго свойства, особенно для дѣтей, не имѣвшихъ его въ жизни своей ни разу. Отъ сильнаго и продолжительнаго коклюша дитя худѣетъ, получаетъ изнуреніе, чахотку, грыжу, зобъ, искривленіе тѣла, расширеніе большихъ сосудовъ, водянку, завалы въ брюшѣ, воспаление легкихъ. Поэтому коклюшъ опасенъ по своимъ послѣдствіямъ; но во время приступовъ, даже повидимому страшныхъ, нѣтъ опасности для жизни дитяти.

Причины внутреннія (предрасполагающія) общія всѣмъ слизетеченіямъ; въ особенности же предрасполагаютъ къ этой болѣзни возрасты: дѣтскій и отроческій, въ которыхъ эта болѣзнь почти исключительно и бываетъ; рѣдко ею страдаютъ юноши, а въ старости и въ возмужаломъ возрастѣ она никогда не бываетъ.

Причины внѣшнія (производящія) состоятъ въ особенной заразѣ, которая первоначально происходитъ въ воздухѣ, а потомъ сообщается отъ дѣтей родителямъ, нянькамъ и замѣчается *повально*, т. е. разомъ оказывается на многихъ дѣтяхъ и, появившись въ какомъ либо домѣ, перебираетъ всѣхъ дѣтей, распространяется на дѣтей сосѣднихъ домовъ, какъ цѣлаго города, такъ и селеній, и обнаруживается въ разныхъ уѣздахъ и губерніяхъ.

Сущность коклюша состоитъ въ раздраженіи слизистой тѣани (оболочки), выступающей воздухоносные пути, съ раздраженіемъ при томъ грудныхъ нервовъ, особенно легочныхъ.

Распознаваніе. Болѣзнь эта сходна: 1) *съ гриппомъ*, 2) *съ кашлемъ взрослыхъ людей*, такъ называемымъ желудочнымъ. Отъ

гриппа отличается тѣмъ, что гриппъ поражаетъ взрослыхъ, а коклюшь свойственъ дѣтямъ, отрокамъ, рѣдко юношамъ, и что гриппъ никогда не продолжается постоянно такъ долго, (6 недѣль) какъ коклюшь. Отъ кашля желудочнаго коклюшь отличается тѣмъ, что имъ поражаются дѣти, что онъ заразителенъ и есть болѣзнь повальная (эпидемическая); напротивъ того, желудочный кашель поражаетъ пожилыхъ, есть болѣзнь не заразительная и разсѣянная (спорадическая).

Предсказаніе относительно *опасности* жизни почти всегда *хорошо*; коклюшь самъ по себѣ почти никогда не бываетъ смертеленъ, а если иногда и бываетъ, то производя или ударъ, или сильныя неукротимыя носовыя и легочныя кровотечения въ самомъ приступѣ. Относительно *продолжительности* предсказаніе *не совсѣмъ выгодно*, потому что болѣзнь обыкновенно продолжается не менѣе 6 недѣль. Однакожь безъ врачебнаго пособія она можетъ продолжаться и долѣе, такъ что нѣкоторые дѣти кашляютъ по году, только кашель дѣлается уже не такъ силенъ, какъ въ приступахъ коклюша.

Исходы. Въ здоровье переходитъ постепенно при хорошихъ жизненныхъ условіяхъ и при правильномъ пособіи. *Въ другія болѣзни:* въ застарѣлый катарральный кашель, довольно частое затвердѣніе легкихъ, въ ударъ съ послѣдующимъ за тѣмъ параличемъ и въ грудную водянку. *Въ смерть* переходитъ отъ удара или отъ сильныхъ неукротимыхъ кровотеченій, что рѣдко случается.

Лѣчение діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Какъ скоро замѣченъ будетъ коклюшь, хотя у нѣкоторыхъ дѣтей въ селеніи, то должно совѣтовать всѣмъ родителямъ *оберегать* своихъ здоровыхъ дѣтей отъ сообщенія съ страждущими. 2) Сверхъ того, въ предохраненіе отъ коклюша младенцевъ, которымъ онъ всего болѣе угрожаетъ, многіе совѣтуютъ *прививаніе* предохранительной оспы (вакцины). Струве и Освальдъ совѣтуютъ прививать вакцину даже во время самого кашля, увѣряя, что онъ чрезъ то уменьшается и облегчается; а докторъ Адамъ утверждаетъ, что кашель прекращается чрезъ нѣсколько дней, какъ только начнутъ созрѣвать оспенные прыщи. Докторъ Везенеръ велитъ давать дѣтямъ, для предохраненія ихъ отъ кашля, *белладонну*, употребляя её, какъ въ скарлатинѣ. Эгенштетъ предложилъ первый, для предохраненія дитяти отъ коклюша, носить подъ ложечкою *смѣсь* изъ полуграна *искусъ*, скрупула *сахару* напитааннаго *коричневымъ масломъ*, завернутую въ восковую бамагу и обшитую сверху тафтою. Хотя нѣкоторые изъ дѣтей, носившихъ *искусъ*, получили коклюшь, однако кашель у нихъ бывалъ слабѣе обыкновеннаго. Мюрбекъ совѣтуетъ носить на груди, близъ ложечки, *мѣшечекъ*, наполненный *сырыми цвѣтами съ искусомъ*. Предохраняетъ тоже въ этомъ случаѣ сухая, утюгомъ разглаженная *шкурка выхухолы*, которую должно дѣтямъ носить на груди и противъ ложечки въ видѣ нагрудника во все продолженіе времени, пока господствуетъ въ странѣ коклюшь. 3) Имѣя въ виду первымъ врачебнымъ средствомъ

противъ коклюша *цѣлбное усиліе природы*, которая почти всегда одна преодолѣваетъ эту мучительную болѣзнь, надлежитъ страждущимъ коклюшемъ дѣтямъ предпринимать *тѣлодвиженія* столько, сколько позволятъ имъ силы; а младенцевъ въ коклюшѣ надобно выносить каждый день *на вольный воздухъ*. Тѣмъ и другимъ надлежитъ еще *вымывать* въ теплой водѣ *руки и ноги*; это омовеніе особеннымъ образомъ содѣйствуетъ уменьшенію коклюша. 4) *Пища* для больныхъ должна быть *тонкая, малопитательная*, способствующая испражненію низомъ и всѣмъ прочимъ отдѣленіямъ и испражненіямъ, какъ то: водяные супы, приготовленные съ крупами, особенно съ ячною и овсяною; къ супамъ съ пользою прибавляется морковь, рѣпа, петрушка, пастернакъ, спаржа, печеная рѣпа съ умѣреннымъ количествомъ прованскаго или сливочнаго масла. 5) *Питьемъ* самымъ лучшимъ можетъ быть чистая свѣжая, ключевая *вода*, но очень полезно давать пить *настоя* полевой *мяты иссопа*, подслащенный медомъ, патокою или леденцемъ. Съ пользою даютъ пить и *сыворотку съ виномъ*. 6) Во время приступовъ кашля нужно смотрѣть, чтобы дитя не упало и не ушиблось (оно по инстинкту при началѣ кашля и само старается ухватиться за стулъ, столъ, скамью, опереться объ стѣну и пр.), *поддерживать ему голову*, заставлятъ *выплевывать мокроту*, взять его на руки и дать ему время *отдохнуть* отъ утомленія.

Лѣченіе существенное. Желая лѣчить правильно коклюшъ, надобно знать, въ какомъ періодѣ находится этотъ кашель у ребенка. Но лучше оставить его безъ лѣкарствъ при одномъ діететическомъ содержаніи, если нѣтъ опасныхъ припадковъ ни во время приступа кашля, ни по окончаніи его, требующихъ скорой врачебной помощи, какъ то: сильныхъ приливовъ крови къ головѣ, сильнаго кровотечения изъ носа, кровохарканія, сильной боли въ груди, признаковъ воспаленія легкихъ, запора на низъ или поноса, крайняго истощенія тѣла и упадка силъ. Во всѣхъ послѣднихъ случаяхъ должно совѣтовать, чтобы родители страждущихъ дѣтей приглашали врача, за неимѣніемъ же его по близости въ лѣченіи должно имѣть цѣлію: 1) уменьшить силу приступа, 2) сократить продолженіе болѣзни и 3) уничтожить опасные припадки, случайно бывающіе въ коклюшѣ.

Въ первомъ (катарральномъ) періодѣ, т. е. въ первые десять дней, когда дитя имѣетъ кашель еще простудный, лѣченіе ограничивается тѣмъ, чтобы давать ребенку наливки въ видѣ *чая* изъ легкихъ потогонныхъ средствъ, изъ *липоваго цвѣта*, цвѣтовъ алтея (*проскурняка*, *просвинокъ*), *царскаго скипетра*, *бузины*, и т. п., а для содѣйствія испражненію низомъ (особенно въ случаѣ запора) даются *отвары: пырейнаго корня, мыльной травы*, или отваръ *одуванчиковъ* (№№ 1, 3, 4), уменьшая приемы ихъ, смотря по возрасту, вмѣсто стагана по рюмкѣ и по полрюмкѣ, или по двѣ столовыя ложки — *младенцамъ*. Кромѣ того полезно давать отваръ изъ *мяянаго съмени съ патокою*, и, когда есть притомъ лихорадочные припадки, прибавлять на два ста-

бана этого отвара чайную ложечку *селитры*: давать каждые два часа по столовой ложкѣ. Грудь мазать теплымъ *деревяннымъ масломъ*, подошвы ногъ *свѣчнымъ саломъ*, смѣшаннымъ съ *сокомъ чеснока*. Бормить дитя молочною кашкой и питье давать не холодное. Притомъ стараться, чтобы не было запора на низъ; поэтому, если неудобны вышесозначенные отвары пырея, одуванчиковъ и мыльнянки, полезно маленькимъ дѣтямъ давать отъ времени до времени легкое *слабительное* изъ *ревеннаго сиропа* (№ 176), по одной или по двѣ чайныхъ ложечки два или три раза въ день, смотря по обстоятельствамъ, до желаемого дѣйствія. Если испражнения на низъ свободны, то по совѣту профессора Дядьковского, въ началѣ достаточно одного *сурьмяннаго вина* (№ 175), котораго дѣтямъ 1, 2, 3 лѣтъ дается отъ 1 до 4 капель 5—6 разъ въ день, въ легкомъ *бузинномъ чаѣ*; болѣе же взрослымъ, 17—18 лѣтъ, отъ 5—10 капель. Д-ръ Бледау совѣтуетъ давать въ этомъ періодѣ болѣзни *сонъ*, выжатый изъ черныхъ лѣсныхъ улитокъ (*слизней*; сонъ этотъ подсластить и употреблять чайными ложечками. Озіандеръ совѣтуетъ дѣлать *отваръ* изъ *садовыхъ улитокъ съ пивомъ*; подсластить и давать чайными ложечками. Грудь, шею и подъ мышками натирать топленнымъ *свинымъ саломъ*, взятымъ изъ брюха свиньи и смѣшаннымъ съ толченымъ *чеснокомъ*.

Во второмъ періодѣ — судорожномъ, когда коблюшъ разовьется въ полной его силѣ, д-ръ Грумъ совѣтуетъ только *стру* въ малыхъ приемахъ. Для этого составить сѣрный порошокъ изъ сѣрныхъ цвѣтовъ съ сахаромъ (№ 200) и давать его два раза въ день по четверти чайной ложечки съ молокомъ. Бромъ того, по совѣту англійскихъ врачей, втирать въ грудь понемногу жидкаго *скипидарнаго масла* до тѣхъ поръ, пока сдѣлается краснота. Это средство хорошо замѣняетъ другія раздражающія лѣкарства. Буханъ предлагаетъ, какъ превосходное лѣкарство, *чесночную мазь*, (взять чесноку, истолочь съ равнымъ количествомъ сала), которою натираются подошвы ногъ два или три раза въ день. Но наилучшій способъ употреблять ее, говоритъ онъ, состоитъ въ томъ, чтобы разгладить ее на тряпицѣ и приложить на подобіе пластыря, который смѣнять новымъ такимъ же пластыремъ каждый вечеръ и утро, ибо чеснокъ скоро теряетъ свою силу. Не нужно употреблять этой мази, когда больной разгоряченъ, или имѣетъ расположеніе къ лихорадкѣ, потому что она усилитъ эти припадки. Девесъ совѣтуетъ: 7 лѣтнему ребенку давать утромъ и вечеромъ ѣсть третью долю *головки чеснока* и втирать въ спину жидкую мазь, приготовленную изъ *сока*, выжатаго изъ *чеснока*. Д-ръ Грумъ совѣтуетъ класть на грудь *мыло*, намазанное на ветошку. У насъ, въ простонародіи, употребляютъ въ коблюшѣ слѣдующее средство: берутъ *толченаго чеснока*, намазываютъ его на тряпочку и кладутъ на грудь; въ то же время берутъ другую тряпочку, намазываютъ ее *дегтемъ* и кладутъ на спину между лопатками. По увѣренію простаго класса людей, средство это всегда превосходно помогало, особенно если прибѣгали къ нему въ самомъ началѣ болѣзни.

При чрезмѣрномъ, судорожномъ страданіи, полезно давать *сиропъ*, сдѣланный изъ *благотворнаго мака*. Буханъ первымъ и необходимымъ средствомъ считаетъ давать въ этомъ случаѣ десять капель, а когда больной на постели или во время кашля, пятнадцать, двадцать, двадцать пять капель шафранной настойки опиѣ (*лаванда*), болѣе или менѣе, смотря по обстоятельствамъ. При сильномъ накопленіи въ груди и желудкѣ слизи, которая по большому количеству своему угрожаетъ задушеніемъ, равнымъ образомъ при позывѣ къ рвотѣ и во время рвоты, необходимо иногда дать *рвотное* изъ *рвотнаго корня*, настоять $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{3}$ золотника корня ипекакуаны въ фунтѣ горячей воды, прибавить небольшое количество молока и сахара, давать пить по маленькой чайной ложечкѣ чрезъ каждыя $\frac{1}{4}$ часа, или чрезъ каждыя 10 минутъ, до достаточнаго дѣйствія, пока очистится желудокъ, который бываетъ въ этомъ случаѣ засоренъ вязкими мокротами; а если больной подверженъ запору, — то лучше дать рвотное изъ *рвотнаго камня* въ растворѣ (№№ 174, 184). Эти рвотныя кромѣ того производятъ испарину и другія отдѣленія, а потому могутъ быть по времени повторяемы, смотря по напряженности припадковъ и упорности болѣзни, однако такъ, чтобы они не были очень сильны; легкія рвотныя, часто повторяемыя, не такъ опасны, но бываютъ дѣйствительно сильнѣйшихъ. Когда больного рветъ, то для содѣйствія рвотѣ нерѣдко бываетъ достаточно одного *теплаго ромашковаго настоя*, который давать въ это время пить по немногу для усиленія рвоты. При сильномъ напорѣ крови къ головѣ, употреблять *ножныя ванны съ горчицею* (№ 84), или приставить *горчичники* къ икрамъ, подошвамъ ногъ, къ груди, къ затылку, до произведенія красноты (№№ 88, 89, 90), или же обкладывать ноги фланелью, онучею, обмоченною въ теплой *смѣси* изъ *воды и уксуса*. По вечерамъ натирать ноги разрѣзаннымъ *лукомъ*, или *саломъ*, смѣшаннымъ съ *камфорою*. Чрезъ каждыя два или три дня ставить на ночь, передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, *ноги въ теплую воду* на 8—10 минутъ, а *пластырь* изъ *бургундской смолы* (сапожный варъ) съ небольшимъ количествомъ *воска* и *скипидара*, хорошо намазанный и разглаженный на кожѣ, величиною въ ладонь руки, приложенный между плечъ (лопатокъ), къ спинѣ, носить во все продолженіе болѣзни. Его надо каждый день утромъ снимать, вытирать и опять прикладывать, а черезъ трое сутокъ и болѣе, когда онъ самъ будетъ отваливаться, перемѣнять на свѣжій. Въ послѣднее время судорожнаго кашля, когда нѣтъ ни малѣйшихъ лихорадочныхъ припадковъ, и въ тѣлѣ нѣтъ нигдѣ никакого воспаления, никакихъ признаковъ напора крови къ головѣ, либо воспалительнаго состоянія груди, — полезна *белладона*. Врачи часто прописываютъ этотъ корень въ видѣ порошка на самый меньшій приемъ по $\frac{1}{16}$, а на самый большой по $\frac{1}{3}$ доли грана. Въ первомъ случаѣ порошокъ изъ 1 грана белладоны (№ 180), должно быть 16-ть, а въ послѣднемъ 8; принимать по порошку, высыпанному на языкъ больного, два или три раза въ день; а листьевъ белладоны прописываютъ 4—5 гранъ, ко-

торые наливаются рюмкою горячей воды и настаиваются; процеженную жидкость даютъ чрезъ каждыя два часа по чайной ложечкѣ. Д-ръ Слонейскій-Михайловскій предлагаетъ слѣдующій полезный способъ лѣченія кашля простаго и коклюшнаго: какъ только коклюшь начнетъ показываться у дитяти, давать ему, въ продолженіе дня разъ или два, ложку чайную или десертную, смотря по возрасту, *кастороваго* (блещевичнаго, пальмоваго) масла, или за недостаткомъ его, въ бѣльшей порціи, *прованскаго, деревяннаго, маковаго, льнянаго*, (строго наблюдать, чтобы масла были самыя свѣжія), для того, чтобы дитя слегка послабило. Къ ночи поставить ручки и ножки дитяти въ *теплую воду* (на 5 или на 10 минутъ), къ которой вездѣ и всегда можно прибавить горсти двѣ или три *поваренной соли* и тарелку *древесной* золы, а если есть, то еще горсть или двѣ обыкновенной *горчицы*, истертой въ порошокъ. Передъ укладываніемъ ребенка спать, вытереть ему грудь, шею и спинку теплымъ растопленнымъ свѣчнымъ саломъ, а подошвы ногъ тѣмъ же саломъ, смѣшаннымъ съ небольшимъ количествомъ испеченнаго чесноку или дегтю. Все это, смотря по упорности болѣзни, можетъ быть повторяемо нѣсколько дней сряду, или черезъ день. При этомъ лучше всего давать внутрь, отъ начала почти до окончанія болѣзни, слѣдующій *сиропъ*: взять двѣ, три или и болѣе, полныя щепоти цѣльнаго *льнянаго сѣмени*, положить въ какой-нибудь сосудъ (но только не въ мѣдный или не вылуженный), и, накрывъ сосудъ, дать настояться $\frac{1}{4}$ часа или 20 минутъ, отчего образуется слизистый, прозрачный настой, въ который, по процеженіи его, положить произвольное количество, сколько понадобится для вкуса, сахару, меду или патоки, потомъ не долго кипятить, вылить въ миску, и простудивъ, снять плавающую на поверхности отвара бѣлую плесень, подобную слизи. Приготовленный такимъ образомъ сиропъ давать больному и какъ лѣкарство, и какъ питье. При недостаткѣ же сахара, меда, патоки, можетъ быть употребляема съ такою же пользою *наливка изъ льняныхъ сѣмянъ*, приготовленная вмѣстѣ съ *солодковымъ корнемъ*. Въ случаѣ, если нельзя достать льнянаго сѣмени, замѣнять его крупными, хорошо высѣянными *пшеничными отрубями*, изъ которыхъ приготовить не густой, слизистый отваръ; отваръ этотъ процѣдить и смѣшать съ тѣми же сладкими веществами, вскипятить все это еще разъ, простудить и употреблять такъ же, какъ сиропъ изъ льняныхъ сѣмянъ. Но когда означенныя сладкія вещества нужно замѣнить солодковымъ корнемъ, то онъ прибавляется къ декокту уже подъ конецъ кипѣнія, и послѣ того уже немного настаивается вмѣстѣ съ декоктомъ.

Когда раздраженіе пройдетъ, т. е. когда приступы судорожнаго кашля сдѣлаются рѣже и короче, когда отдѣленіе густой слизи, которую дѣти, большею частію, проглатываютъ, станетъ совершаться удобнѣе, — то, оставивъ всѣ снаружи употребляемыя отвлекающія средства, продолжать тотъ же слизистый сиропъ. Сверхъ того давать по временамъ легкое слабительное, лучше касторовое, или дру-

гое какое либо, масло. Кромѣ всего этого употреблять еще слѣдующій кофе: взять произвольное количество чистыхъ цѣльныхъ *льняныхъ семянъ*, поджарить ихъ, или обжечь на обыкновенной севородѣ, простудить, смолоть или истолочь, и сварить съ водою точно такъ, какъ варится обыкновенный кофе. Вообще на чайную чашку кипятку берется одна чайная ложечка порошка изъ льняного кофе. Сваренный кофе процѣдить, подсластить и употреблять два, три и даже четыре раза въ сутки. Маленькимъ дѣтямъ давать по нѣскольбу чайныхъ ложечекъ, болѣе взрослымъ по $\frac{1}{4}$ чайной чашки, или по рюмкѣ, а тѣмъ, которыя еще старше, по $\frac{1}{2}$ чайной чашки. При употребленіи этого средства, очень часто, въ продолженіе не многихъ дней, кашлюшъ проходитъ совершенно; однакожъ оно должно быть продолжаемо, хотя и въ меньшемъ количествѣ, еще нѣсколько дней. Иногда судорожный кашель перестаетъ и остается только простой кашель, болѣе или менѣе безпokoяющій малютку; непрерывное хрипѣніе въ горлѣ и груди и не совершенно свободное дыханіе, впрочемъ безъ лихорадки, явно обнаруживаютъ, что у больного есть накопленіе слизи въ желудкѣ. Въ этомъ случаѣ д-ръ Грумъ совѣтуетъ давать ребенку, кромѣ вышеописаннаго кофе, слѣдующій *сиропъ*: взять произвольное количество мелко изрѣзаннаго *трипчатого лука*, положить его въ небольшой муравленный горшокъ съ крышкою и прибавить къ луку такое же количество сахара, меда, либо патоки, замазать горшокъ и поставить въ вольный духъ печи, гдѣ и оставить его, пока лукъ совершенно упрѣетъ; потомъ смѣшанную массу прожать сѣвзозъ чистую ветошку или полотенце, и принимать по половинѣ чайной ложечки, или по цѣлой, нѣсколько разъ въ день (отъ 4-хъ до 6-ти и болѣе). Иногда, вмѣсто сыраго лука, берутъ лукъ хорошо испеченный и смѣшиваютъ, черезъ треніе или толченіе, съ однимъ изъ упомянутыхъ сладкихъ веществъ; приготовленный такимъ образомъ сиропъ употреблять, какъ сказано выше. — Послѣдній этотъ сиропъ не такъ противенъ на вкусъ, какъ первый, а потому маленькія дѣти принимаютъ его охотнѣе.

Въ третьемъ періодѣ (выздоровливанія) не нужно никакого лѣченія; но если кашель протянется очень долго за три мѣсяца, если притомъ его приступы періодически ожесточаются, напр. черезъ день, то можно дать дитяти *хинную соль* въ порошкахъ (№ 195) 2—3 раза въ сутки съ сахарною водою. Если въ этомъ періодѣ выхаживается много слизи, то надобно давать *студень* изъ *исландскаго мoha съ козьимъ*, гдѣ можно, *ослинымъ, кобылымъ молокомъ, съ кумысомъ* (въ степяхъ); кофе изъ *дубовыхъ желудей*; если можно, непременно перевезти дитя въ другое жилище, или по крайней мѣрѣ почаще и подольше доставлять ему случай гулять на открытомъ воздухѣ, въ гористомъ сухомъ мѣстѣ.

Натужный (кровавый) поносъ.

Определение. Натужный или кровавый поносъ есть слизи-бро-

вянистое испражненіе низомъ, сопутствуемое жиленьями и понужденіями на низъ, нерѣдко сопровождаемое сильною лихорадкою.

Раздѣленіе. Видоизмѣненія натужнаго поноса: 1) *частный* или спорадическій, 2) *появляющийся* или эпидемическій. Последний бываетъ простой и заразительный.

Признаки частнаго (спорадическаго) поноса. Обильное, какъ въ простомъ поносѣ, съ тупою болью и ломомъ въ проходѣ, испражненіе на низъ съ послѣдующимъ за нимъ очень частымъ (до 50—100 разъ въ сутки) только понужденіемъ къ испражненію, сопровождаемымъ жиленьями и натугами, причемъ обнаруживаются испражненія слизистыя, похожія на сырой яичный бѣлокъ съ непріятнымъ запахомъ, какъ бы отъ сыраго мяса.—Потомъ въ крестцѣ и заднемъ проходѣ чувствуется жженіе; испражняемая слизь окрашивается кровію, и краска эта наконецъ представляется красною, на подобіе густаго сока, выжатого изъ сыраго мяса. Появляется лихорадочный періодъ жара, аппетитъ уменьшается, дѣлается жажда, чувство ломоты въ поясницѣ и въ бедрахъ, слабость и изнеможеніе силъ. Въ такомъ состояніи болѣзнь продолжается отъ 2 до 5, а иногда до 7 сутокъ; послѣ того, при появленіи обильнаго пота и осадки въ мочѣ, болѣзнь постепенно начинаетъ уменьшаться, и больные къ 10 или 12 днямъ, мало по малу, оправляются. Въ легчайшихъ случаяхъ болѣзнь оканчивается въ 3—5 и много въ 7 дней.

Признаки натужнаго эпидемическаго поноса. Прежде появляется лихорадочное состояніе: ознобъ, а потомъ жаръ; нерѣдко вдругъ появляется рвота, а за рвотою поносъ; лихорадочный жаръ въ тѣлѣ увеличивается. При этомъ, если поносъ не заразительный, то лихорадка, совершивъ свое теченіе въ періодъ жара въ продолженіе 3—5 и много 12 дней, мало по малу, при большихъ или меньшихъ критическихъ испражненіяхъ, начинаетъ ослабѣвать, и больной или медленно, или скоро поправляется. Но если натужный поносъ будетъ заразительный, то появившееся и продолжавшееся нѣскольکو дней, 3—5, горячечное состояніе нерѣдко нечувствительно переходитъ въ состояніе или нервно-гнилостное, или гнилостно-нервное. При этомъ переходѣ больные впадаютъ въ безчувствіе. Испражненія, до того слизистокровяныя, дѣлаются мало по малу жидкими, вонючими, темноватыми, съ примѣсью нерѣдко крови; въ жесточайшихъ случаяхъ появляется и чистая кровь, похожая на кровь, испражняемую въ черной немочи. Если въ этомъ состояніи ни натура, ни искусство не помогаютъ,—то больные, мало по малу, истощаются и умираютъ. Въ противномъ случаѣ, если и натура силится преодолѣть болѣзнь, и искусство подаетъ надлежащую помощь, то какъ общее горячечно-гнилостное состояніе, такъ и мѣстные признаки натужнаго поноса мало по малу начинаютъ уменьшаться, и больные или къ 14, что бываетъ очень рѣдко, или къ 17 и къ 21 дню и позже поправляются, а иногда поправленіе достигается не прежде, какъ по прошествіи 6 недѣль и болѣе.

Причины внутреннія (предрасполагающія): брюшное полнокровіе, почечуиный приливъ, разлитіе желчи отъ сгорченій, испуга, трудное прорѣзываніе зубовъ и дѣтскій возрастъ. Въ этой болѣзни расположены люди возмужалые, желчные (холеричи) и особенно геморродалисты и дѣти.

Причины вѣшнія (производящія): сырой холодъ, слѣдующій за сильнымъ жаромъ; такимъ образомъ главная причина есть *простуда*, остановка испарины въ кожѣ, а потому бровавый поносъ появляется наичаще и притомъ повально въ разныхъ мѣстахъ и на многихъ людяхъ тогда, когда происходитъ быстрая и частая перемена температуры въ воздухѣ, и притомъ между тѣмъ классомъ людей, который по роду жизни и занятію наиболѣе подвергается этой переменѣ температуры, т. е. въ концѣ іюля, въ августѣ и сентябрѣ, когда жаркіе дни смѣняются сырыми, холодными ночами, и когда рабочій классъ людей большую часть времени проводитъ въ полѣ. Въ это время часто случается видѣть, что цѣлыя семейства и деревни поселянъ занемогаютъ натушнымъ поносомъ, и полевые работы останавливаются. По этой же причинѣ натушный поносъ бываетъ всего чаще ревматическій и желчный, такъ какъ дневной жаръ дѣйствуетъ на печень, а ночной холодъ на кожу. Въ высшей степени болѣзни, особенно при множествѣ больныхъ въ одномъ мѣстѣ, этотъ поносъ дѣлается заразительнымъ чрезъ кишечныя испражненія. *Зараза* эта такъ сильно дѣйствуетъ, что здоровому стоитъ только прикоснуться къ замаранной испражненіями одеждѣ больного, или сходить на судно, бывшее въ употребленіи у больного, и тотчасъ у него также развивается натушный поносъ. Въ деревняхъ, расположенныхъ на низкихъ мѣстахъ, около болотъ, у стоячихъ водъ, поносъ появляется постоянно каждое лѣто вмѣстѣ съ переменяющею лихорадкою отъ *болотныхъ земныхъ испареній*. Бромѣ того всѣ *неудобоваримыя вещества*, какъ-то: острая испорченная пища (сырая, испорченная бѣлужина, копченныя колбасы, сыр), разные незрѣлыя ягоды, сладкіе не спѣлые плоды, не выброженное кислое питье, въ излпшнемъ количествѣ употребляемыя всякаго рода сырыя овощи, особенно не созрѣлыя. Изъ рабочихъ поселянъ земледѣльцы и осушатели болотъ преимущественно бываютъ подвержены этой болѣзни.

Сущность натушнаго поноса состоитъ въ раздраженіи слизистой тѣани (оболочки) желудочно-кишечнаго канала, преимущественно прямой заднепроходной кишки, съ переполненіемъ кровеносныхъ ея сосудовъ кровію до того, что стѣны ея, опухая и толстѣя, прижимаются другъ къ другу и возбуждаютъ безпрестанный позывъ къ испражненію, причемъ однако выходитъ только немного слизи и крови, какъ слѣдствіе натугъ больного и полнокровія, но нечистоты изъ верхняго конца кишекъ не могутъ пройти чрезъ опухшую прямую кишку, которой каналъ стѣсненъ опухшими ея оболочками. Въ натушномъ заразительномъ поносѣ къ сущности его присоединяется еще сопутствующая горячка.

Распознавание. Натужный поносъ *сходствуетъ*: 1) съ *простымъ поносомъ*, но отличается отъ него: а) натугою — *жилениемъ*, болью особаго рода въ поясницѣ и бедрахъ, которой въ простомъ поносѣ не бываетъ; б) тѣмъ, что въ простомъ поносѣ испражнения низомъ состоятъ изъ дѣйствительныхъ испражнений, между тѣмъ какъ въ натужномъ они состоятъ изъ слизи, болѣе или менѣе окрашенной кровію; и с) тѣмъ еще, что простой поносъ никогда не бываетъ заразительнъ, а натужный, напротивъ, часто; 2) съ *геморридальнымъ жилениемъ*, отъ котораго отличается: а) тѣмъ, что оно сопровождается собственно геморридальнымъ состояніемъ, и, по мѣрѣ усиленія и уменьшенія онаго, то усиливается, то уменьшается и появляется періодически; б) тѣмъ, что геморридальное жиленье не бываетъ повальнымъ (эпидемическимъ), а частнымъ, свойственнымъ только людямъ геморридальнымъ; с) при геморое не обнаруживаются тѣ явственныя лихорадочныя состоянія, которыя присоединяются къ натужному поносу. Кромѣ того еще не лишнее присоединить, что въ дальнѣйшихъ періодахъ натужнаго поноса повальнаго, особенно заразительнаго, очень легко можно смѣшать его съ *горячками нервно-гнилостными*. Отличается же онъ отъ нихъ тѣмъ, что горячка, какъ болѣзнь первоначальная, начинается своими признаками, признаками своей особенной формы.

Предсказаніе вообще въ натужномъ поносѣ различно, по различію его видоизмѣненій. Въ натужномъ поносѣ *частномъ* (спорадическомъ) предсказаніе, въ отношеніи какъ опасности для жизни, такъ и продолжительности болѣзни, всегда *хорошо*, разумѣется при благопріятныхъ жизненныхъ условіяхъ. Напротивъ того, въ *повальномъ* натужномъ поносѣ, особенно *заразительномъ*, предсказаніе въ обоихъ отношеніяхъ дѣлается нерѣдко *сомнительнымъ* и даже *дурнымъ*. Сомнительнымъ бываетъ и при хорошихъ врачебныхъ пособіяхъ, и при хорошихъ жизненныхъ условіяхъ, если болѣзнь будетъ сильна; дурнымъ же, если жизненныя условія будутъ не хороши и самыя врачебныя пособія не будутъ поданы во время. Кромѣ того разница въ предсказаніи относительно опасности для жизни зависитъ и отъ того, въ какомъ возрастѣ находится больной, особливо принимая въ расчетъ два возраста; дѣтскій и взрослый. При надлежащихъ пособіяхъ натужный поносъ гораздо менѣе опасенъ для дѣтей, нежели для взрослыхъ, такъ что если будутъ страдать натужнымъ поносомъ по 100 человѣкъ того и другаго возраста, то при пособіи изъ дѣтей умираютъ 2—3 и много 5 человѣкъ, между тѣмъ, какъ изъ взрослыхъ умираютъ 15, 20 человѣкъ; а если нѣтъ пособій ни тѣмъ, ни другимъ, то изъ дѣтей умираютъ до половины, а изъ взрослыхъ, исключая старческаго возраста, 20—30 человѣкъ. Натужный поносъ вообще бываетъ пагубенъ старикамъ, людямъ нѣжнымъ, женщинамъ въ родахъ и тѣмъ, кого ломота, скорбуть или другая какая либо продолжительная болѣзнь привела въ ослабленіе. Въ частности же почитаются въ этой болѣзни: а) *худыми признаками*: 1) рвота и икота, потому что онѣ служатъ

знаменателемъ воспаленія въ желудкѣ: 2) зеленый, темный, черный цвѣтъ кала больного, или очень вонючій, смердящій, гнилой запахъ его: потому что такой калъ показываетъ болѣзнь гнилаго свойства: в) *опасными признаками*: когда больные, получивъ промывательное, непосредственно и скоро извергаютъ его вонъ, и когда задній проходъ такъ сжать, что нельзя пропустить чрезъ него промывательное; с) *смертельными признаками*: слабость пульса, холодность конечностей (рукъ и ногъ), трудное глотаніе и судороги, которыя служатъ знакомъ близкой смерти.

Исходы. Въ *здоровье* переходить постепеннымъ уменьшеніемъ припадковъ. Въ *другія болѣзни*: 1) хроническое ослабленіе или всего желудочно-кишечнаго канала, или одного кишечнаго, выражающееся наклонностію къ худому пищеваренію, вѣтрамъ и простымъ поносамъ: 2) въ мѣсныя отолстѣнія кишекъ, обнаруживающіяся часто возвращающимися мѣстными болями въ животѣ и наклонностію къ запорамъ: 3) иногда въ общее изнуреніе, сопровождаемое слабостью силъ, недостаточнымъ питаніемъ и наклонностію къ медленной или изнурительной лихорадкѣ. Въ *смерть* точно также какъ гнилостныя горячки.

Лѣченіе діететическое въ натужномъ поносѣ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни нужно знать, какимъ образомъ можно *предотвратить появленіе* натужнаго (кроваваго) *поноса* въ лѣтнее время между рабочими людьми. Этого можно достигнуть главнымъ тѣмъ, чтобы защитить ихъ отъ двухъ крайностей температуры: дневнаго зноя и ночнаго холода. Для этого не надобно днемъ работать до изнеможенія и до проливнаго пота, работать въ бѣлой, а не цвѣтной рубашкѣ, покрывать голову соломенною шапкою, бѣлымъ платкомъ; ѣсть три раза въ день, но не объѣдаться: при разгоряченномъ тѣлѣ и проливномъ потѣ не пить воды, особенно ключевой, холодной, а дать водѣ постоять въ сосудѣ на солнцѣ; послѣ работы отдыхать въ тѣни, подъ кустами, возами, сѣномъ, снопами. наметомъ изъ одежды, растянутого на кольяхъ; работать дружно, но равномерно, не усиленно, не торопливо, какъ то дѣлаютъ иногда работники, стараясь догнать или опередить другъ друга. Еще болѣе нужно быть осторожнымъ ночью и защищаться отъ сырости и холода. Здѣсь надобно соблюдать слѣдующія предосторожности: ночуя въ полѣ, особенно при рѣкѣ, болотѣ, надобно развести огонь на всю ночь и ложиться спать вокругъ костра, ногами къ огню; на животъ надѣвать шерстяной поясъ, шерстяной набрюшникъ, или другимъ способомъ обутывать животъ, ложиться, если можно, не на голой землѣ, а на соломѣ. сѣнѣ, на возу; если же этого сдѣлать нельзя, то для ночлега на землѣ избирать пригорокъ, песчаное мѣсто, постилатъ на немъ солому, сухое сѣно, войлоки, рогожки, циновки; умѣренно поужинавъ, ложиться спать не на спинѣ, а еще менѣе на брюхѣ, но на боку, и притомъ сначала лѣвомъ, а потомъ уже поворачиваться и на правый бокъ; укрываться плотно чѣмъ либо суконымъ, шерстянымъ, или тулупомъ; если случится ночью продрогнуть, то встать, походить скоро до тѣхъ поръ, пока не

пройdetъ ознобъ и не нагрѣется тѣло, выпить кружку или стаканъ теплой воды, настоящей на соломѣ, либо сѣнѣ; для этого на огонь должно имѣть въ запасѣ горшокъ, котель съ водою и соломою, либо свѣжимъ отборнымъ сѣномъ. Кромѣ того должно воздерживаться отъ пищи неудобоваримой, острой, испорченной, разныхъ незрѣлыхъ ягодъ и неспѣлыхъ плодовъ и проч. Люди, подверженные этой болѣзни и геморою, а особенно дѣти, должны быть предохраняемы соблюденіемъ этихъ предосторожностей. Земледѣльцамъ и осушателямъ болотъ совѣтовать соблюдать сверхъ того и тѣ правила, какія изложены для нихъ въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Одержимыхъ этою болѣзнію должно содержать въ теплѣ (16° — 18° по Р.), опрятности и чистотѣ; для этого нужно часто перемѣнять на нихъ бѣлье. Калъ, тотчасъ послѣ ихъ испражнянія, выносить вонъ и глубоко зарывать въ землю; воздухъ въ покоехъ освѣжать напрыскиваніемъ вездѣ уксусомъ и частымъ окуриваніемъ, наливая понемногу уксуса на раскаленный кирпичъ. Это правило съ особенною строгостію нужно выполнять въ заразительномъ повальномъ натужномъ поносѣ. 3) Для пищи назначается тонкій супъ на водѣ изъ крупъ овсяныхъ, перловыхъ и т. п. Яблоки вареные въ молокѣ, хлѣбныя похлебки и особенно бульоны изъ студенистыхъ животныхъ частей, приготовленныхъ такимъ образомъ: взявъ баранью голову и ноги, покрытыя кожей, опалить находящуюся на нихъ шерсть огнемъ, или раскаленнымъ желѣзомъ; потомъ варить эти части до тѣхъ поръ, пока бульонъ загустѣетъ; наконецъ, прибавивъ немного корицы или мускатнаго цвѣта для пріятнаго вкуса, употреблять три или четыре раза въ день по одной чайной чашкѣ, съ малымъ количествомъ сухарей или гренковъ. Эти бульоны обыкновенно служатъ и пищею, и превосходнымъ лѣкарствомъ для больного. Были примѣры, что многіе, безполезно испытавъ большую часть другихъ лѣкарствъ, были излѣчены такими бульонами отъ натужнаго поноса. По недостатку бульоновъ есть другой родъ пищи въ родѣ *кашки*, составляемой слѣдующимъ образомъ: взявъ пять или шесть горстей наилучшихъ *отрубей*, завязать ихъ въ узелъ и варить въ достаточномъ количествѣ воды въ продолженіе 6-ти или 7-ми часовъ до тѣхъ поръ, пока онѣ получаютъ твердость сухаго крахмала. Когда эти отруби будутъ находиться въ такомъ состояніи, то натереть ихъ двѣ или три ложки въ достаточное количество свѣжаго молока, смѣшаннаго съ водою, и варить до тѣхъ поръ, пока составъ этотъ будетъ похожъ на нѣкоторый родъ каши, которую можно сдѣлать пріятною для вкуса или посредствомъ сахара, или съ помощью корицы и проч. Эта кашка должна составлять обыкновенное кушанье больного. Ее считаютъ лучшимъ готовить такъ: взявъ одинъ или два фунта самыхъ лучшихъ отрубей, завязать ихъ въ узелъ полотенца какъ можно туже; потомъ, обмочивъ этотъ узелъ въ водѣ, обсыпать его снаружи новыми отрубями; это дѣйствіе повторять до тѣхъ поръ, пока около узла сдѣлается корка, чтобы воспрепятствовать чрезъ то водѣ входить во внутренность узла, когда его начнутъ варить;

надлежитъ до тѣхъ поръ, пока отруби, внутри находящіяся узла, будутъ сухи и тверды. Наконецъ слѣдуетъ ихъ растолочь и, смѣшавъ съ молокомъ и водою до густоты кашки, употреблять, какъ пищу; мяса же и рыба запрещаются. Въ натужномъ поносѣ гнилостнаго свойства надлежитъ позволять ѣсть большую часть добробачественныхъ плодовъ, хорошо созрѣвшихъ, каковы: яблоки, виноградъ, земляника, смородина и проч., вареные и сырые, съ молокомъ и безъ молока, какъ больному будетъ угодно, но не въ излишество, а умѣренно, два и три раза въ день. 4) *Для питья* приличнѣйшими напитками могутъ быть: простая теплая вода, и вода, въ которую нѣсколько разъ обмочено было раскаленное желѣзо, *отваръ* перловыхъ или ячннхъ крупъ; легкій отваръ *корня проскурняка* (алтейный), *льняныхъ сѣмянъ*, *настой* или *наливка ромашковыхъ цвѣтовъ* и процеженная сыворотка. 5) Сверхъ того полезно больному, для возбужденія испарины, *носить* подъ рубашкою фланелевый или суконный *набрюшникъ*, либо на всей половинѣ тѣла шерстяную фуфайку, которую снимать по выздоровленіи отъ болѣзни не иначе какъ въ теплую погоду. 6) *Въ заразительномъ* натужномъ поносѣ строго *запретить* ходить на одно судно или нужное мѣсто для испражненія здоровымъ съ больнымъ; равно и не касаться первымъ къ вещамъ, замараннымъ испражненіями послѣднихъ. *Ухаживающіе* за больнымъ должны въ такомъ случаѣ, при вынашиваніи судна, или перемѣнѣ замараннаго бѣлья и постели, немедленно *вымывать* и *насухо вытирать* себѣ *руки уксусомъ*. 7) Въ случаѣ продолжительности болѣзни и перехода ея въ гнилостное состояніе всачески *ободрять* больного надеждою на выздоровленіе, для поддержанія силъ его со стороны бодрости духа.

Лѣченіе существенное натужнаго поноса различно по разности его видоизмѣненій. Въ частномъ (спорадическомъ) натужномъ поносѣ, въ легкой его степени, достаточно бываетъ одного діететическаго лѣченія, при которомъ больные, въ теченіе двухъ, много пяти дней, выздоравливаютъ, особенно при употребленіи: 1) *промывательныхъ* по утру и вечеромъ, состоящихъ или изъ вышеписанныхъ пищевыхъ студенистыхъ бульоновъ и крахмальной изъ отрубей кашки, или изъ отваровъ: мелкой высушенной гречневой муки, (при чемъ нужна вода самая чистая, мягкая, либо сильный кипятокъ), ячннхъ, овсяныхъ, перловыхъ крупъ, алтейнаго (проскурнячнаго) корня, льняныхъ сѣмянъ и т. п.; 2) *бани*, или ванны, которыя бываютъ очень полезны, производя испарину; 3) тепловатаго *тренія* тѣла *водою* и *уксусомъ* для той же цѣли и 4) *потогоннаго чая* изъ цвѣтовъ липы, бузины, сухой малины и т. п. Но если болѣзнь сильна, не уступаетъ этимъ средствамъ, а болѣе ожесточается, особенно если кровяная примѣсь въ испражненіяхъ увеличивается и въ тоже время горячка видимо ожесточается, — въ такомъ случаѣ полезно *приспособленіе пиявокъ*, какъ къ нижней части живота и поясницѣ, такъ еще болѣе къ заднему проходу отъ 6 до 12 и даже 24, смотря по возрасту, тѣлосложенію и полнокровію больного. Если

при этомъ больной чувствуетъ боли въ животѣ, то полезно приклады-
вать къ животу *горчичники* (№№ 88, 89, 90) до появленія на кожѣ
подъ ними красноты, а потомъ *отирать* въ это мѣсто живота простое
масло, либо вскипяченное съ бѣленою, льняное, деревянное масло, и
дѣлать *мягчительныя припарки* на животъ изъ *сынной тины* (№ 121),
льнянаго сѣмени (№ 23), каши гречневой, полбенной, пшенной, молочной.
Д-ръ Чаруковскій совѣтуетъ въ началѣ поноса, когда нѣтъ еще при-
знаковъ воспаления, а одно раздраженіе въ животѣ, и когда притомъ за-
мѣчаются желчныя припадки (горечь, тошнота, желтизна, тоска и проч.)
давать *рвотное* изъ *ипекакуаны*, а потомъ *слабительное*; Буханъ же
считаетъ необходимо нужнымъ во всякомъ случаѣ начинать лѣчение на-
тужнаго поноса очищеніемъ первыхъ путей, въ слѣдствіе чего совѣ-
туетъ давать больному приемъ ипекакуаны, дѣйствию которой надо вспомо-
жествовать, запивая ее легкимъ настоемъ ромашковыхъ цвѣтовъ.

Сильныя рвотныя здѣсь не требуются; $\frac{1}{4}$ золотника ипекакуаны
достаточно давать на приемъ взрослому человѣку, а дѣтямъ $\frac{1}{8}$ ч. золот-
ника черезъ каждую $\frac{1}{4}$ часа, или черезъ 10 минутъ, до дѣйствія, а на
другой день послѣ рвотнаго должно дать $\frac{1}{2}$ золотника *рвения* съ водою.
Этотъ приемъ должно повторять раза два или три черезъ каждыя два
дня по одному. Потомъ, сряду нѣсколько дней, должно давать маленькіе
приемы ипекакуаны, какъ то: по два или по три грана (величина грана
равняется зерну коноплянаго сѣмени), въ ложкѣ сиропа или сахарной
воды, либо патоки, съ прибавленіемъ 10-ти капель шафранной настойки
опія (*лавданг*). Этихъ средствъ бываетъ, обыкновенно, достаточно для
излѣченія этой болѣзни, при пособіи діететическихъ правилъ. Штабъ-
лѣкаръ Мечъ въ Смоленскѣ, гдѣ натужный (кровоавый) поносъ ежегодно
обнаруживается въ теченіе лѣта и осени, наблюдалъ, что *хинная соль*
излѣчиваетъ его, (какъ скоро онъ бываетъ періодически, т. е. съ пере-
межками, какъ лихорадка), принимая ее въ порошкахъ (№№ 194, 195)
черезъ два часа по одному во время перемежки, или въ растворѣ
(№ 196) *) Полковой д-ръ Шейблеръ имѣлъ случай вылѣчить натуж-
ный кровавый поносъ очень скоро древеснымъ углемъ, когда другія
средства нисколько не помогали. Онъ давалъ порошокъ липоваго угля
черезъ каждые 2—3 часа по 2 грана, въ постепенно увеличенномъ
приемѣ (гранъ равняется величинѣ зерна коноплянаго сѣмени) **).

Въ натужномъ повальномъ поносѣ, если разомъ занемогаетъ много
людей, должно немедленно пригласить врача, а до прибытія его, пока
поносъ не перешелъ въ гнилостное состояніе, въ гнилостно-нервную,
или нервно-гнилостную горячку, должно употреблять то же лѣченіе и
тѣ же средства, какъ и въ частномъ натужномъ поносѣ; при переходѣ
же въ вышеозначенныя болѣзни полезно натирать тѣло больного виномъ
съ уксусомъ и употреблять то же лѣченіе, какъ діететическое, такъ и

*) Др. Здр. 1846 г. № 7. стр. 50.

**) Др. Здр. № 35 стр. 284.

существенное, какое описано въ горячках: нервно-гнилостной и гнилостно-нервной (см. выше о горячках нервной и гнилой).

Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Бѣлевскаго уѣзда, Тульской губерніи, въ началѣ іюля 1841 года, повальный натушный поносъ воспалительнаго свойства, легко переходившій въ гнилостный (тифозный), свирѣпствовалъ сильно и сопровождался значительною смертію. Причиной его было не столько употребленіе въ пищу грубыхъ и неудобоваримыхъ веществъ, сколько особенное состояніе атмосферы. По бѣдности крестьянъ уѣздный шт. лѣк. Щеголдинъ лѣчилъ съ величайшимъ успѣхомъ эту болѣзнь при приличномъ діететическомъ содержаніи, слѣдующими простыми домашними средствами: наливая три четверти обыкновенной рюмки *деревяннаго*, а за непущеніемъ его и *постнаго масла*, остальную четверть рюмки добавлялъ простымъ *пшнымъ виномъ*, и давалъ пить больному по три раза въ день, одну рюмку поутру, другую передъ обѣдомъ, а третью на ночь; сверхъ того, для растиранія живота, въ которомъ больные чувствовали рѣзъ, употреблялъ *мазь изъ масла бѣлены*, имъ самимъ приготовляемой изъ черной бѣлены, растущей тамъ въ большомъ количествѣ. Въ рѣдкихъ случаяхъ доводилось ему прибавлять къ упомянутой смѣси въ рюмку по 8 капель простой *опійной настойки* *).

Прим. При лѣченіи рабочихъ поселянъ, какъ то: земледѣльцевъ, осушателей болотъ и др., въ особенности должно соображаться съ правилами, изложенными для нихъ въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе натушнаго поноса частнаго у дѣтей одинаково съ лѣченіемъ его у взрослыхъ; разница состоитъ въ уменьшеніи пріемовъ лѣкарствъ и выборѣ тѣхъ изъ нихъ, которыя для нихъ болѣе могутъ быть сносны и доступны, но натушный повальный поносъ для нихъ опасенъ, и въ немъ преимущественно должно совѣтовать просить врача для врачебной помощи, а до прибытія его строго соблюдать правила діететическаго лѣченія; въ случаѣ же если поносу не сопутствуетъ горячка, можно употребить для лѣченія, по совѣту д-ра Грума, *сымена жгучей крапивы*. Взрослымъ дѣтямъ давать этихъ сѣмянъ въ порошокъ съ медомъ, поутру, въ полдень и вечеромъ, по десертной ложкѣ, а малолѣтнимъ по чайной; при этомъ еще давать дѣтямъ ѣсть *супъ*, сдѣланный изъ *поджаренной ржаной муки*. Въ кровавомъ поносѣ съ рвотою у дѣтей, даютъ, смотря по возрасту, разъ, два, а рѣже три раза въ день, на кончикѣ столоваго ножа и даже по чайной ложечкѣ *сажи*, наскребленной со стѣнъ черной избы и смѣшанной съ *медомъ*, сахаромъ, или молокомъ; кромѣ того совѣтуютъ, какъ самое вѣрное средство, противъ кроваваго поноса отъ прорѣзыванья зубовъ у дѣтей, давать нѣсколько разъ въ день по чайной ложечкѣ *прованскаго масла съ сахаромъ*, но если зубы не прорѣзываются и нервного раздраженія нисколько въ

*) Др. Здр. 1842 г. № 30. стр. 236.

тѣлѣ не примѣтно, то вѣрнымъ средствомъ въ этомъ поносѣ считаютъ *смыть* изъ двухъ столовыхъ ложекъ самаго свѣжаго *яичнаго желтка*, двухъ столовыхъ ложекъ *прованскаго масла*, и четырехъ столовыхъ ложекъ самой лучшей *французской водки*, принимать каждый часъ по чайной ложечкѣ. Врачъ Ф. Скорульскій, во время свирѣпствованія повального поноса, всегда оканчивавшагося натужнымъ и болѣе всего поражавшаго дѣтей во многихъ деревняхъ Себежскаго уѣзда Витебской губерніи въ 1844 году, практически наблюдалъ, что брѣпкій *отваръ* коры *черемухи* былъ единственнымъ и неоцѣненнымъ средствомъ, спасшимъ многихъ отъ неминуемой смерти *). Докторъ Шрейберъ предлагаетъ лѣчить натужный (кровоавый) и повальный поносъ частный, эпидемически господствующій въ лѣтнее время во многихъ городахъ, селеніяхъ и деревняхъ, между трудящимися поселянами, давно испытаннымъ имъ простымъ подручнымъ средствомъ — *куриными яйцами*, которыхъ давать больному по 2 черезъ два часа, такъ чтобы онъ съѣлъ въ день 12 штукъ, *затывая* самымъ легкимъ *настоямъ мяты*. На другой день столько же. На 3 и 4 день четыре раза по два яйца (черезъ три часа), а на 5 и 6-й день только по 2 утромъ и вечеромъ. Вотъ все лѣченіе, пріятное, очень полезное, дешевое и подъ рукою у каждаго бѣдняка (пріемъ одинъ для дѣтей и для взрослыхъ **). Гильдебрантъ совѣтуетъ противу кроваваго поноса, особенно у дѣтей, *промывательное* изъ рюмки какаго нибудь *мягчительнаго* или *слизистаго отвара* (льна-наго сѣмени) и *яичнаго желтка*, соединенныхъ другъ съ другомъ въ надлежащемъ количествѣ. Если промывательное не задерживается въ кишкахъ, то употребляютъ его въ меньшемъ количествѣ. Д-ръ Зейдель убѣжденъ въ цѣлебномъ дѣйствіи *ягодъ черники* въ натужномъ повальномъ поносѣ. Взявъ фунтъ сухихъ ягодъ, варить ихъ полчаса съ такимъ количествомъ воды, чтобы вышелъ фунтъ процеженной жидкости, принимать по половинѣ чайной чашки и продолжать лѣкарство, пока прекратится поносъ. Полезнѣе иногда поджарить ягоды, потомъ превратить ихъ въ порошокъ, и принимать его по золотнику черезъ каждые два или три часа. При этомъ должно замѣтить, что чернику слѣдуетъ употреблять тогда уже, когда нѣтъ сильной боли въ животѣ и припадковъ горячки. Въ южныхъ губерніяхъ Россіи въ лѣтнее время, болѣе по причинѣ пресыщенія фруктами, около двухъ третей дѣтей умираютъ отъ натужнаго кроваваго поноса. Самый надежнѣйшій способъ лѣченія этой болѣзни, предлагаемый шт. лѣк. Дмитревскимъ, состоитъ въ употребленіи *рвотныхъ*, въ упорныхъ случаяхъ повторяемыхъ; теплыхъ *ароматическихъ ваннъ*; *яичныхъ съ опіемъ промывательныхъ*, *пластыря шибгаузенскаго съ гальбановымъ* на животъ, вмѣсто припарокъ, для ношенія во все время болѣзни, — и питье изъ *сахарной воды*. Изъ тысячи случаевъ, иногда самыхъ отчаянныхъ, онъ не имѣлъ ни

*) Др. Здр. 1845 г. № 3, стр. 19.

**) Др. Здр. 1845 г. № 35, стр. 243.

одного смертельнаго при этомъ способѣ лѣченія, тогда какъ въ то же время умирали десятками дѣти, которыхъ родители, по своему корыстолюбію или невѣжеству, оставляли безъ всякой помощи, или обращались къ шарлатанству *).

Киргизы въ натужномъ кровавомъ поносѣ пьютъ по нѣскольгу разъ въ день растопленное *коровье масло*, или *баранье курдючное сало* **).

СОСТАВНЫЯ ЛѢКАРСТВА.

№ 1. *Отваръ корня одуванчика.*

Взять: корня одуванчика 6 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою и, процѣживая, употреблять теплый по стакану 4 раза въ день (утромъ, за часъ и за два до обѣда, въ вечерню и на ночь, ложась спать).

№ 2. *Отваръ корня цикорея.*

Взять: корня цикорея 6 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, размѣшавъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою, и процѣживая, употреблять теплый по стакану 4 раза въ день, подобно предыдущему.

№ 3. *Отваръ корня пырея.*

Взять: корня пырея 7 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день, подобно предыдущимъ.

№ 4. *Отваръ корня мыльнянки.*

Взять: корня мыльнянки 6 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и процѣживая употребляютъ по стакану 4 раза въ день, подобно предыдущимъ.

№ 5. *Отваръ репейнаго корня.*

Взять: репейнаго корня 5 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день, подобно предыдущимъ.

№ 6. *Отваръ стеблей паслена.*

Взять: стеблей паслена 4 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день, подобно предыдущимъ.

№ 7. *Слабительное изъ огуречнаго разсола.*

Взять: огуречнаго рассола 1 стаканъ, коноплянаго масла, 2 стол. ложки, меда одну ложку, соединивъ все, смѣшивая вмѣстѣ, принять

*) Др. Здр. 1845 г. № 45, стр. 355, 356 и 357. Бахмутъ, Екатеринославской губерніи.

**) Др. Здр. 1845 г. № 19, стр. 148.

за разъ. Если въ тотъ день не послабитъ, то на другой день повторить, либо повторить черезъ 4—6 часовъ, какъ скоро предстоитъ надобность въ скоромъ очищеніи испражнительнаго канала.

№ 8. *Слабительное изъ магнезіи.*

Взять: магнезіи половину столовой ложки, воды отварной рюмку, смѣшавъ, принимать 2—4 раза въ день.

№ 9. *Прохлаждающее слабительное изъ кремортартара.*

Взять: кремортартара чайную ложечку, воды отварной рюмку, смѣшавъ, давать 2—4 раза въ день.

№ 10. *Слабительное изъ кремортартара съ магнезією.*

Взять: магнезіи полчайной ложечки, кремортартара чайную ложечку, воды отварной стаканъ, соединивъ все, смѣшавъ вмѣстѣ, употреблять 2—4 раза въ день, или см. № 63.

№ 11. *Шипучіе содовые порошки.*

Взять: шипучей (углекислой) соды $\frac{1}{3}$ золотн., сдѣлать тапнхъ порошковъ, сколько нужно.

№ 12. Взять: кислоты кремортартарной $\frac{1}{3}$ золотн. сдѣлать тапнхъ порошковъ, сколько нужно. Распустивъ въ водѣ этотъ и предшествовавшій порошокъ порознь, соединить потомъ оба раствора вмѣстѣ, отчего происходитъ кипѣніе. Принимать во время послѣдняго, или послѣ, 2—4 раза въ день.

№ 13. *Сѣрный цвѣтъ въ растворѣ.*

Взять: сѣрнаго цвѣта полчайной ложечкѣ, воды отварной полрюмки, соединивъ, помѣшавъ все вмѣстѣ, давать 2—4 раза въ день.

№ 14. *Сѣрный порошокъ съ магнезією и кремортартаромъ.*

Взять: углекислой магнезіи, сѣрнаго цвѣту, по 4 золотн., кремортартара 7 золотн., смѣшать. Принимать 2—4 раза въ день по полной чайной ложечкѣ съ водою.

№ 15. *Чай изъ мяты.*

Взять: травы мяты щепоть, положивъ въ чайникъ, налить изъ самовара вскипѣвшей ключевой воды 2 стакана, давъ настояться, употреблять, какъ чай. Или:

№ 16. Взять: мятной травы горсть, положивъ въ муравленный горшокъ, налить свѣжей ключевой воды полштофа, вскипятить, процѣживая, употреблять, какъ чай, утромъ и вечеромъ съ сахаромъ, медомъ и безо всего.

№ 17. *Отваръ пырея съ мятою.*

Взять: корня пырея 6 золотн., мятной травы 3 золотн., воды ключевой полштофа, смѣшавъ, вскипятить въ муравленномъ горшкѣ и, процѣдивъ, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 18. *Отваръ корня одуванчика съ мятою.*

Взять: корня одуванчика 6 золотн., мятной травы 3 золотн., ключевой воды полштофа, вскипятить въ муравленномъ горшкѣ, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 19. *Отваръ цикорный съ мятою.*

Взять: корня цикорнаго 6 золотн., мятной травы 3 золотн., воды ключевой полштофа, вскипятить все вмѣстѣ, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 20. *Отваръ корня мыльнянки съ мятою.*

Взять: корня мыльнянки 6 золотн., мятной травы 4 золотн., воды ключевой полштофа, вскипятить все въ муравленомъ горшкѣ, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 21. Взять: корня *лопуха* 6 золотн., мятной травы 3 золотн., воды ключевой полштофа, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 22. Взять: *стеблей паслена* 4 золотн., мятной травы 3 золотн., воды ключевой полштофа, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 23. *Мягчительная припарка изъ льнянаго сѣмени.*

Взять: истолченаго льнянаго сѣмени 1 фунтъ, горячей воды, или лучше молоба, столько, сколько понадобится при смѣшеніи до густоты каши, потомъ, намазывая на ветошку теплое, прикладывать, остывшую припарку перемѣнять на такую же теплую и такимъ образомъ припаривать больное мѣсто по нѣскольку разъ въ день.

№ 24. *Медовая лепешка.*

Взять: хлѣбнаго тѣста, или муки, щепоть, меду столовую ложку, смѣшавъ, стереть въ одну массу и прикладывать къ больному мѣсту, оставляя на немъ до совершеннаго созрѣнія и вскрытія нарыва.

№ 25. *Припарка изъ печенаго лука.*

Взять: луковницу испечь. Разнимая слой ея, или размѣшавъ всю и протиревъ сѣвозъ рѣшето, прикладывать къ больному мѣсту, въ первомъ случаѣ слоевыми листками, а въ послѣднемъ протертою лучною массою, такъ чтобы больное мѣсто совсѣмъ покрывалось.

№ 26. *Мягчительная припарка изъ бѣлаго хлѣба.*

Взять: мякиша бѣлаго хлѣба, сколько нужно, молока достаточное количество, чтобы сварить до густоты каши, и теплый прикладывать къ больному мѣсту.

№ 27. *Мягчительная припарка льнянаго сѣмени съ ромашкою.*

Взять: льнянаго сѣмени 1 фунтъ, цвѣтовъ ромашки $\frac{1}{2}$ фунта, смѣшавъ, истолочь, потомъ, наливъ кипятку, сколько нужно, для густоты каши, помѣшивая безпрестанно, поступать также, какъ и съ припаркою изъ одного льнянаго сѣмени № 23.

№ 28. *Мягчительная припарка льнянаго сѣмени съ шафраномъ.*

Взять: льнянаго сѣмени 1 фунтъ, шафрану 1 золотн., смѣшавъ, истолочь вмѣстѣ, потомъ, наливъ кипятку, сколько нужно, для густоты каши, при безпрестанномъ помѣшиваніи, поступать, какъ съ припаркою изъ одного льнянаго сѣмени № 23.

№ 29. *Спускъ или чератъ.*

Взять: масла деревяннаго, или коноплянаго, либо свѣжаго (не со-

ленаго) топленого свиного, или бараньяго сала столовую ложку, воску (бѣлаго или желтаго) 4 золотн., смѣшавъ вмѣстѣ, поддержать на легкомъ огнѣ, пока воскъ распустится, потомъ, помѣшивая, дать простыть. Намазывая на ветошку, либо на корпию, прикладывать къ больному мѣсту.

№ 30. *Отваръ мыльнянки съ александрійскимъ листомъ, мятою и горькою солью.*

Взять: корня мыльнянки 2 золотн., воды ключевой 2 стакана, вскипятить вмѣстѣ, прибавить подъ конецъ александрійскаго листу безъ жилочекъ 1 золотн., простой мяты $1\frac{1}{2}$ золотн., и давъ постоять 10—20 минутъ, слить и прибавить англійской (глауберовой, горькой) соли 4 золотн., сахару 1 золотн., принимать черезъ $1\frac{1}{2}$ часа по 2 ложки, до дѣйствія.

№ 31. *Слабительный порошокъ ревеня.*

Взять: корня ревеню, стертаго въ порошокъ, $1\frac{1}{2}$ золотн. и принять въ мятномъ или ромашковомъ настоѣ, запивая имъ. Черезъ 4 часа повторить, если дѣйствія не будетъ.

№ 32. *Слабительные порошки ревеня съ магнезією.*

Взять: корня ревеня $1\frac{1}{2}$ золотн. магнезию $1\frac{1}{2}$ золотн. смѣшавъ вмѣстѣ и раздѣливъ на 6 равныхъ порошковъ, принимать черезъ часъ по порошокъ до дѣйствія, съ мятнымъ, или ромашковымъ настоемъ.

№ 33. *Слабительное горькой соли съ нашатыремъ.*

Взять: горькой (англійской, глауберовой) соли 3 золотн., нашатыря 1 золотн., смѣшавъ вмѣстѣ, принимать по чайной ложечкѣ въ настоѣ мяты, или укропа, или аниса, запивая имъ черезъ два часа до дѣйствія.

№ 34. *Слабительное изъ одной горькой соли.*

Взять: горькой (глауберовой) соли чайную ложечку, принять въ настоѣ мяты, или укропа, или аниса, запивая онымъ.

№ 35. *Отваръ валеріаны съ пасленомъ.*

Взять: корня валеріаны 5 золотн., стеблей паслена 3 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 36. *Тинктура (капли) валеріаны.*

Взять: корня валеріаны 1 золотн., виннаго спирта 7 золотн., соединивъ, настоять въ легкой теплотѣ 8—12 дней и, процѣдивъ, употреблять съ отварною водою 15—30 капель черезъ часъ.

№ 37. *Отваръ змѣевики.*

Взять: корня змѣевики 7 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 38. *Отваръ змѣевики съ валеріаною.*

Взять: корня змѣевики 4 золотн., корня валеріаны 3 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 39. *Отваръ корня змѣвика съ мятою.*

Взять: корня змѣвика 6 золотн., мяты простой 3 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ всё вмѣстѣ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 40. *Отваръ змѣвика съ валеріаною и мятою.*

Взять: корня змѣвика 4 золотн., корня валеріаны 2 золотн., мяты простой 3 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ все вмѣстѣ, вскипятить и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 41. *Настой баранника.*

Взять: цвѣтовъ баранника одну щепоть, воды отварной горячей 2 стакана, соединивъ, дать настояться въ чайникѣ и, процѣживая, употреблять по рюмкѣ черезъ $1\frac{1}{2}$ часа.

№ 42. *Настой баранника съ змѣвикомъ.*

Взять: цвѣтовъ баранника, корня змѣвика, по 1 золотн., воды отварной горячей 2 стакана, соединивъ, дать настояться въ чайникѣ на камфоркѣ самовара и, процѣдивъ, употреблять по рюмкѣ черезъ $1\frac{1}{2}$ часа.

№ 43. *Отваръ ивы.*

Взять: коры ивы 4 золотн., воды ключевой 6 стакановъ ($\frac{1}{2}$ штофа), соединивъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 44. *Отваръ коры ивы съ камфорою.*

Взять: коры ивы 4 золотн., воды ключевой полштофа, соединивъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ, потомъ, процѣдивъ, дать остыть. Далѣе, распустивъ въ полрюмкѣ простаго вина $\frac{1}{4}$ золотн. камфоры, присоединить къ отвару и употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день.

№ 45. *Отваръ дубовой коры.*

Взять: дубовой коры 4 золотн., воды ключевой полштофа, соединивъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣдивъ, употреблять по 4 раза въ день.

№ 46. *Отваръ дубовой коры съ камфорою.*

Взять: коры дубовой 4 золотн., воды ключевой полштофа, соединивъ вмѣстѣ, отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣдивъ, дать остыть; потомъ, распустивъ въ полрюмкѣ вина камфоры $\frac{1}{4}$ золотн., присоединить къ процѣженному и остывшему отвару и употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день.

№ 47. *Отваръ хины.*

Взять: коры хинной (перувианской) 5 золотн., воды ключевой 5 стакановъ, смѣшавъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣдивъ, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 48. *Отваръ хины съ камфорою.*

Взять: хинной (перувианской) коры 5 золотн., воды ключевой 5 стакановъ, смѣшавъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ, процѣдить и дать остыть, потомъ, растворивъ въ полрюмкѣ простаго вина камфоры $\frac{1}{4}$ золотн., прибавить къ отвару и употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день.

№ 49. *Отваръ хины съ гофмановыми каплями.*

Взять: хинной корки 5 золотн., воды ключевой 5 стакановъ, смѣшавъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ, процѣдить и дать остыть; потомъ къ процѣженному и остывшему отвару прибавивъ гофмановыхъ капель полчайной ложечки, употреблять по стакану 4 раза въ день.

№ 50. *Отваръ хины съ камфорой и гофмановыми каплями.*

Взять: хинной коры 5 золотн., воды ключевой 5 стакановъ, смѣшать, отварить въ муравленомъ горшкѣ, процѣдивъ, дать остыть, потомъ, распустивъ въ полрюмкѣ простаго вина камфоры $\frac{1}{4}$ золотн., и прибавивъ къ этому гофмановыхъ капель полчайной ложечки, присоединить къ отвару и употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день.

№ 51. *Гофмановы капли.*

Взять: гофманскихъ капель изъ аптеки по рецепту, сколько будетъ нужно, и употреблять 5—10—15 капель съ водою, либо на сахарѣ черезъ часъ.

№ 52. *Камфорное вино.*

Взять: камфоры $\frac{1}{4}$ золотн., вина простаго хлѣбнаго стаканъ, распустить первую въ послѣднемъ и давать черезъ часъ по чайной ложечкѣ въ отварной водѣ.

№ 53. *Сборъ травъ для ароматической ванны.*

Взять: ромашки простой 1 фунтъ, душицы, верхушекъ полыни по $\frac{1}{4}$ фунта, настоявъ все вмѣстѣ въ горячей водѣ, употребить для ванны.

№ 54. *Ароматическая припарка.*

Взять: цвѣтовъ простой ромашки $\frac{1}{2}$ фунта, бузины, верхушекъ душицы, толченаго льнянаго сѣмени по $\frac{1}{4}$ фунта, верхушекъ донника $\frac{1}{3}$ фунта, истолочь все въ порошокъ для приготовленія мокрой припарки, подобно какъ изъ льнянаго сѣмени № 23.

№ 55. *Ароматическая болеутоляющая припарка.*

Взять: цвѣтовъ простой ромашки, листьевъ зори, верхушекъ донника, цвѣтовъ бузины по $\frac{1}{3}$ фунта, цвѣтовъ маха 7—14 золотн., все истолочь вмѣстѣ и употреблять для припарки, подобно какъ изъ льнянаго сѣмени № 23.

№ 56. *Противуишностная, ароматическая припарка.*

Взять: цвѣтовъ простой ромашки, верхушекъ бѣдровой, или перечной мяты, или душицы, или божьяго деревца, или полыни по $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ фунта; порошка корки ивовой, или дубовой, или хинной 7—20 золотн. истолочь въ порошокъ и употреблять для припарки, подобно какъ изъ льнянаго сѣмени № 23.

№ 57. *Возбуждающая и очищающая присыпка.*

Взять: порошка угля $\frac{1}{4}$ фунта, сабура 3 золотн., камфоры 3 зол., стереть все вмѣстѣ въ мельчайшій порошокъ и употреблять для присыпки.

№ 58. *Нарывной пластырь (мушка).*

Взять: мѣлкого пластыря достаточное количество, намазать на ветошку, величиною отъ пятака до ладони руки, смотря по возрасту

больного и сплѣ болѣзни, посыпать порошкомъ шанскыхъ мушекъ и, смочивъ нѣсколько комфарнымъ спиртомъ, или виномъ (№ 52), приложить куда слѣдуетъ для произведенія нарывнаго пузыря, который надо прорѣзавъ въ разныхъ мѣстахъ для выпущенія накопившейся мокроты, прикладывать спускъ (№ 29), либо милотный пластырь.

№ 59. *Разбивающая припарка.*

Взять: корня бахтовника 1 фунтъ, льнянаго сѣмени $1\frac{1}{2}$ фунта, мелко истолочь вмѣстѣ и, разваривъ съ горячею водою до густоты каши, прикладывать на ветошкѣ къ больному мѣсту, оставляя на немъ до чувствительнаго охлажденія, потомъ переменить остывшую припарку на другую горячую и продолжать такимъ образомъ по нѣскольку разъ въ день.

№ 60. *Успокоивающая припарка.*

Взять: листьевъ табака 2 золотн., ромашки простой 7 золотн., стереть вмѣстѣ въ порошокъ, потомъ, наливая при помѣшиваніи до густоты каши кинятку, употреблять для припарки на больное мѣсто.

№ 61. *Припарка изъ табаку и луку.*

Взять: листьевъ табака 8 золотн., печенаго или сыраго лука 4 золотн., стереть вмѣстѣ въ порошокъ и, наливая при помѣшиваніи кинятку до густоты каши, употреблять вмѣсто припарки.

№ 62. *Ривероо питье.*

Взять: поташной, или содовой, углекислой соли 1 золот. распустить въ достаточномъ количествѣ краснаго уксуса, котораго прибавлять понемногу, пока кончится шипѣніе, при помѣшиваніи раствора и, процѣдивъ, употреблять, какъ сказано.

№ 63. *Порошокъ изъ кремортартара съ магнезією.*

Взять: кремортартара 2 золотника, магнезіи 1 золотн., стереть тщательно вмѣстѣ и давать по чайной ложечкѣ съ водою 2—4 раза въ день.

№ 64. *Прохлаждающій слабительный порошокъ.*

Взять: тертаго ревеня и кремортартара по 2 золотн., магнезіи 1 золотн., соединить тщательно вмѣстѣ и давать по чайной ложечкѣ съ водою 2—4 разъ въ день, или:

№ 65. Взять: нашатыря и кремортартара по $1\frac{1}{2}$ зол., тертаго ревеня 1 золотн., тщательно смѣшавъ, употреблять по чайной ложечкѣ 2—4 раза въ день съ водою до дѣйствія.

№ 66. Взять: мятныхъ капель потребное количество и употреблять 5—10—15 капель въ рюмкѣ воды черезъ часъ и два.

№ 67. Взять: корня дягиля 7 золотн., воды ключевой 6 стагановъ, уваривъ въ муравленомъ горшкѣ, процѣживая, употреблять по стагану 4 раза въ день.

№ 68. Взять: цвѣтовъ липовыхъ, либо ромашковыхъ, либо бузиновыхъ, либо всѣхъ поровну насыпать въ тонкій мѣшечекъ, и приложивъ къ больному мѣсту, держать на немъ.

№ 69. *Разрывающій ароматическій мѣшечекъ.*

Взять: травъ мяты, полыни, богородской, верхушебъ душицы, цвѣтовъ баранника, порознь или всѣхъ вмѣстѣ по равному количеству, искрошивъ помелче и смѣшавъ тщательно вмѣстѣ, насыпать въ тонкій мѣшечекъ и класть на больное мѣсто.

№ 70. *Дегтярная вода.*

Взять: чистаго дегтю одну часть, холодной, ключевой воды 3—4 части, соединивъ вмѣстѣ, прежде помѣшивать, потомъ дать отстояться въ деревянномъ сосудѣ въ теченіе 1—2 сутокъ; наконецъ, снявъ плавающую плѣву дегтя, процѣживая, слить воду и хранить для употребленія.

№ 71. *Камфорное масло.*

Взять: камфоры $\frac{1}{4}$ золотника, масла деревяннаго 7 золотн. смѣшавъ вмѣстѣ, дать постоять въ легкой теплотѣ въ заткнутомъ пузырькѣ для распушенія камфоры.

№ 72. *Слабительное изъ толочна.*

Взять: толочна три столовыя ложки, меду двѣ столовыя ложки, соли поваренной 1 столовую ложку, смѣшавъ тщательно всё вмѣстѣ, принять за разъ внутрь для очищенія испражнительнаго канала.

№ 73. *Слабительное изъ горькой соли.*

Взять: горькой соли потребное количество и употреблять по чайной ложечкѣ въ отварной водѣ для очищенія испражнительнаго канала, повторяя пріёмъ черезъ 4 часа до дѣйствія, если его еще не будетъ.

№ 74. *Слабительное изъ коры крушины.*

Взять: сухой коры крушины 4—7 золотн., воды ключевой 1 фунтъ, или 4 чайныхъ чашки, положивъ въ муравленный горшокъ, отварить, чтобы около половины укипѣло, потомъ, процѣдивъ, употреблять черезъ 3 часа по столовой ложкѣ до дѣйствія. *Д-ръ Маркусъ *)* или:

№ 75. Взять: сухой коры крушины 4—7 золотниковъ, воды ключевой 1 фунтъ, или 4 чайныхъ чашки, отваривъ до половиннаго укипѣнія, процѣдить, и распустивъ въ отварѣ 1 золотникъ горькой соли, употреблять черезъ 3 часа по столовой ложкѣ до дѣйствія такого же, какъ въ предшествовавшемъ, или:

Взять: высушенной старой корки крушины $10\frac{1}{2}$ золот. померанцевыхъ корокъ 2 золотн. (изрѣзанныхъ), смѣшавъ, уварить въ 2 бутылкахъ воды въ продолженіе 2 часовъ до 1 бутылки процѣженнаго отвара, который настаивать на 3 или 4 золотн. изрѣзанныхъ померанцевыхъ корокъ и 3 золотн. истолченныхъ тминныхъ сѣмянъ. Въ этомъ отварѣ, смотря по обстоятельствамъ, можно растворять 7—10 золотн. горькой соли. При геморональныхъ страданіяхъ прибавлять къ отвару крушинной корки вмѣсто померанцевыхъ корокъ 14 золотн. тысячелистника и 3 золотн. тминныхъ сѣмянъ. Назначать больному выпить полную чайную (разумѣется процѣженную) чашку этого отвара вечеромъ. На другой день утромъ оказываются, обыкновенно, 2 или 3 ка-

*) Др. Здр. 1850 г. № 37 стр. 293.

шевидныя испражненія низомъ. Если этого не будетъ, то должно повторить тотъ же приёмъ въ 11 часовъ. У кого кишечный каналъ слабъ, раздражителенъ, склоненъ къ поносу, тотъ долженъ начинать употребленіе этого лѣкарства малыми приёмами. При брюшныхъ болѣзняхъ должно продолжать употребленіе этого отвара крушинной корки отъ 3 до 6 недѣль, а при привычныхъ запорахъ на низъ должно назначить большимъ принимать нѣсколько разъ въ недѣлю по чашкѣ отвара. Замѣчено, что этотъ отваръ, будучи сберегаемъ въ хорошо закупоренныхъ глиняныхъ кувшинахъ, довольно долго не теряетъ своей дѣйственности *).

№ 76. *Летучая нашатырная мазь.*

Взять: деревяннаго масла 2 части, нашатырнаго спирту 1 часть, смѣшавъ, употреблять снаружи для втиранія въ больное мѣсто отъ 2 до 6 разъ въ день по чайной ложечкѣ до суха.

№ 77. *Летучая мазь нашатырно-камфорная.*

Взять: камфоры $\frac{1}{2}$ золотника, растворить въ рюмкѣ подогрѣтаго деревяннаго масла, прибавить нашатырнаго спирту полрюмки и, взболтавъ, употреблять снаружи для втиранія въ больное мѣсто отъ 2 до 6 разъ въ день по чайной ложечкѣ.

№ 78. *Мазь съ надощникомъ.*

Взять: надощника или бодяги $\frac{1}{4}$ золотника, масла деревяннаго или коровьяго рюмку, мыла крошеннаго столовую ложку, стереть все тщательно вмѣстѣ и употреблять снаружи для втиранія въ больное мѣсто по $\frac{1}{4}$ чайной ложечки 4—6 разъ въ день.

№ 79. *Аутенритова нарывная мазь.*

Взять: рвотнаго камня 1—2 золотника, свинаго топленнаго сала 7 золотн. стереть тщательно вмѣстѣ, употреблять снаружи, какъ сказано, для произведенія сыпи.

№ 80. *Мягчительно-раздражающая припарка.*

Взять: истолченнаго льнянаго сѣмени полфунта, горчицы 7 золотниковъ, сваривъ вмѣстѣ съ водою или молокомъ до размазни, прикладывать постоянно теплую къ больному мѣсту.

№ 81. *Мягчительная, раздражающая и болеутоляющая припарка.*

Взять: истолченнаго льнянаго сѣмени $\frac{1}{2}$ фунта, маковыхъ цвѣтовъ $\frac{1}{4}$ фунта, горчицы 7 золотн., сваривъ все вмѣстѣ съ водою или молокомъ до размазни, прикладывать постоянно теплую къ больному мѣсту.

№ 82. *Успокоивающая, болеутоляющая мазь.*

Взять: камфорнаго масла (№ 71) полрюмки, масла бѣлены столовую ложку, смѣшавъ, употреблять для втиранія въ больное мѣсто 2—6 разъ въ день.

№ 83. *Ножная щелочная ванна.*

Взять: щелоку теплаго ведра, погрузивъ въ него ноги, держать въ немъ ихъ $\frac{1}{4}$ часа, убутовавшись до головы.

*) Др. Здр. 1844 г. № 31 стр. 243.

№ 84. *Ножная горчично-соленая ванна.*

Взять: теплой воды ведро, распустить въ ней соли 1 фунтъ и прибавить горчицы $\frac{1}{4}$ фун. потомъ, опустивъ въ неё обѣ ноги, держать до тѣхъ поръ, пока будетъ сжиганіе и краснота въ подошвахъ и голеняхъ.

№ 85. *Потогонный чай.*

Взять: цвѣтовъ липовыхъ, или ромашковыхъ, или бузиновыхъ, или сухой малины, или травы шалфея, богородской, буйвицы и т. п., порознь которой нибудь изъ нихъ, или изъ общаго смѣшенія ихъ всѣхъ, или нѣкоторыхъ изъ нихъ, горсть, положить въ чайникъ, налить изъ самовара вскипѣвшей ключевой воды 2 стакана, давъ настояться, употребить, какъ чай. За неимѣніемъ же самовара дѣлать этотъ чай такъ же, какъ и чай изъ мяты въ № 16.

№ 86. *Селитряный порошокъ.*

Взять: селитры 1 золотн., вишневаго сухаго клея 2 золотн., смѣшавъ, стереть вмѣстѣ, или мелко истолочь и просѣять въ мелкій порошокъ, который употребить по $\frac{1}{4}$ золотн. 4 раза въ день.

№ 87. *Растительное молоко (эмульсія) съ селитрою.*

Взять: растительнаго молока, или сока изъ сѣмянъ конопли, мака, сладкаго миндаля 2 рюмки, распустить въ немъ 3 золотн. селитры, и смѣшавъ съ двумя стаканами отварной воды, употребить по рюмкѣ черезъ 2 часа.

№ 88. *Горчичникъ.*

Взять: горчицы, хлѣбнаго тѣста или мякиша чернаго хлѣба по равному количеству, стереть вмѣстѣ съ уксусомъ до размазни и употребить снаружи для произведенія красноты, или:

№ 89. Взять: горчицы затертой, какъ обыкновенно готовятъ её къ столу, сколько понадобится, намазать на ветошку, и покрывъ чѣмъ нибудь тонкимъ, приложить, или:

№ 90. Взять: горчицы истолченной одну часть, ржаной муки половины; уксуса столько, чтобы по смѣшеніи вышло тѣсто, которымъ, намазавъ тряпочку, величиною для взрослыхъ въ ладонь руки, а для дѣтей въ пятакъ, или десятипальчикъ, приложить куда слѣдуетъ, до произведенія на божи красноты, — на $\frac{1}{2}$ часа и не болѣе, какъ на 20 минутъ, или:

Взять: мякиша искрошеннаго бѣлаго хлѣба 28 золотн., истолченнаго горчичнаго сѣмени 14 золотн., уксуса столько, сколько понадобится, чтобы по стираниіи всего вмѣстѣ вышелъ пластырь.

№ 91. *Хръновникъ.*

Взять: хрѣна натертаго сколько понадобится, смѣшать его съ уксусомъ до размазни и прикладывать къ извѣстному мѣсту на ветошкѣ для той же цѣли.

№ 92. *Отваръ конскаго щавеля.*

Взять: корня конскаго щавеля 7 золотн., воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употребить по стакану 4 раза въ день.

№ 93. *Прохлаждающая, противувоспалительная примочка.*

Взять: селитры $\frac{1}{4}$ фун., нашатыря 20 золотн., воды ключевой полштофа, смѣшивая, растворить то и другое въ водѣ и употреблять для примочки. *Грумз.*

№ 94. *Прохлаждающая и болеутоляющая примочка.*

Взять: уксуса 2 стакана, мятной воды столовую ложку, либо мятного чая одинъ стаканъ, камфоры $\frac{1}{2}$ золотн. Смѣшавъ всё, слегка подогрѣть и употреблять для примочки.

№ 95. *Промывательное.*

Взять: овсянаго отвара 1—3 стакана, меду отъ 1 до 3 столовыхъ ложекъ, масла деревяннаго или льнянаго, либо коноплянаго 2—6 столовыхъ ложекъ, смѣшавъ, подогрѣть и употреблять для промывательнаго, въ которому для усиленія послабляющаго дѣйствія прибавляется поллота до лота мыла, или поваренной, либо горькой соли; а для усиленія прохлаждающаго дѣйствія прибавляется ренскій уксусъ отъ 1 до 3 столовыхъ ложекъ. *Грумз.*

№ 96. *Ножная ванна уксусная.*

Взять: брѣзнаго уксуса 1 часть, теплой воды 5 частей, смѣшать и употреблять для ножной ванны. *Грумз.*

№ 97. *Прохлаждающая, слабительная смѣсь.*

Взять: отвара изъ чернослива $\frac{1}{2}$ фунта, селитры $\frac{1}{2}$ золотн., сахара или меда, либо патоки столовую ложку и, смѣшавъ вмѣстѣ, давать черезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложки, либо по рюмкѣ, смотря по возрасту больнаго, или:

№ 98. Взять: черники (изюму) 7 золотн., воды ключевой 1 фунтъ, смѣшавъ, вскипятить и процѣдить; потомъ, прибавивъ ползолотника, или золотникъ, смотря по возрасту больнаго, селитры и 2 золотн. меда, давать по 2 столовыхъ ложки, либо по рюмкѣ черезъ 2 часа. Эта смѣсь сильнѣе слабить, чѣмъ прежняя, или:

№ 99. Взять: чернослива 7 золотн., кремортартара 2 золотн., воды ключевой 1 фунтъ, смѣшавъ, сваривъ и процѣдивъ, прибавить ползолотника или золотникъ, смотря по надобности, селитры, столовую ложку патоки, либо меда, и давать по 2 столовыхъ ложки черезъ 2 часа, либо по рюмкѣ. Эта смѣсь еще сильнѣе слабить, чѣмъ предшествовавшія, или:

№ 100. Взять: сыворотки 1 фунтъ, растворить въ ней селитры 1 золотн.; потомъ, прибавивъ меда, либо патоки столовую ложку, давать также, какъ и предшествовавшія, для употребленія. *Грумз.*

№ 101. *Мягчительное масляное слабительное.*

Взять: прованскаго, или деревяннаго, или миндалянаго, а лучше кастороваго масла столовую ложку, растереть съ яичнымъ желткомъ и смѣшать съ полуторыми чашками либо сахарной воды, либо сыты; давать черезъ два часа по столовой ложкѣ для испражненія низомъ.

№ 102. *Мягчительное полосканье.*

Взять: настоя изъ липовыхъ цвѣтовъ, или отвара изъ яичныхъ

крупъ, или изъ льнянаго сѣмени $\frac{1}{2}$ фун., уксуса столовую ложку, патоки $1\frac{1}{2}$ столовыхъ ложки, смѣшавъ все употреблять для полосканія во рту.

№ 103. Вязущее прохладжающее полосканье.

Взять: квасцовъ $1\frac{1}{2}$ золотн., меда $\frac{1}{4}$ фунта, воды 1 фунтъ, смѣшавъ, употреблять для полосканья во рту. *Грумъ. Или:*

№ 104. Взять: настоя изъ сушеныхъ лепестковъ красной розы $\frac{3}{4}$ фунта, квасцовъ 1 золотн., меду 10 золотн., смѣшавъ, употреблять для полосканья во рту, или:

№ 105. Взять: листьевъ шалфея 7 золотн., бѣлаго вина $\frac{3}{4}$ фунта, настоявъ въ тепломъ мѣстѣ въ теченіе часа, къ процеженной жидкости прибавить квасцовъ 1 золотн., розоваго меда или патоки столовую ложку, смѣшавъ, употреблять для полосканья.

№ 106. Мягчительно-раздражающая припарка.

Взять: льнянаго истолченнаго сѣмени 1 фунтъ, домашняго простаго мыла $\frac{1}{4}$ фунта, молока сколько понадобится, чтобы сварить до густоты размазни, и употреблять для припарки.

№ 107. Мягчительное полосканье.

Взять: льняныхъ сѣмянъ и винныхъ ягодъ по 4 золот., меда двѣ столовыя ложки, ключевой воды полштофа, смѣшавъ, вскипятить, отваръ процедить и употреблять для полосканья.

№ 108. Селитряная смѣсь.

Взять: льняныхъ сѣмянъ 7 золотн., воды ключевой бутылку, патоки 2 рюмки, смѣшавъ, вскипятить, и въ процеженномъ отварѣ растворивъ 1 золотн. селитры, употреблять черезъ часъ по столовой ложкѣ.

№ 109. Разрѣшающее полосканье.

Взять: цвѣтовъ ромашки 2 золотн., листьевъ шалфея 5 золотн., воды ключевой $\frac{1}{2}$ штофа, смѣшавъ, отварить, къ процеженной жидкости прибавить буры 1 золотн. и употреблять для полосканья.

№ 110. Разрѣшающіе и успокоивающіе пары.

Взять: цвѣтовъ простой ромашки $\frac{1}{4}$ фунта, хмѣлевыхъ шишекъ 7 золотн., воды ключевой $\frac{1}{2}$ штофа, отваривъ, употреблять для паровъ.

№ 111. Грудныя пары для вдыханія.

Взять: уксуса $\frac{1}{4}$ штофа, мирры истолченной 4 золотн., меда $\frac{1}{2}$ фунт. смѣшавъ все вмѣстѣ, вливать понемногу въ узкое отверстіе опрокинутой воронки на раскаленный кирпичъ для вдыханія больнымъ паровъ.

№ 112. Домашнее рвотное.

Взять: коноплянаго, или льнянаго, свѣжаго масла столовую ложку, простой соли полложки, тепловатой воды шесть ложекъ; смѣшать и давать чрезъ каждыя полчаса отъ 2 чайныхъ до столовой ложки, пока произойдетъ рвота. *Д-ръ Грумъ.*

№ 113. Общее разрѣшающее питье.

Взять: ячменя очищеннаго 7 золотн., воды ключевой $1\frac{1}{2}$ полштофа, смѣшавъ, варить до тѣхъ поръ, пока останется третья часть, процедивъ

прибавить меда, сколько понадобится, смотря по вкусу больного, и давать ему для питья. или:

№ 114. Взять: винныхъ ягодъ, либо изюма, очищенного ячменя по 4 золотн. воды ключевой $1\frac{1}{2}$ полштофа, смѣшавъ, уварить до третьей части. Къ процеженной жидкости прибавить меда, сколько понадобится, смотря по вкусу больного, и давать ему для питья.

№ 115. *Растворъ аммоніаковой камеди.*

Взять: аммоніаковой камеди 2 золотн., растереть совершенно въ ступкѣ, потомъ влить, помѣшивая, $\frac{1}{4}$ фунта ячнаго отвара, пока камедь совсѣмъ распустится. Можно прибавить стаканъ простой мятной воды, либо чая изъ мяты, и употреблять, какъ будетъ нужно.

№ 116. *Раздражающая обвертка.*

Взять: сукно или ветошь надлежащей величины, смочить крѣпко настоеннымъ на стручковомъ перцѣ, либо на хрѣнѣ и горчицѣ, либо на шпанскихъ мушкахъ, виномъ и обернуть ноги; эту обвертку держать на нихъ до красноты на кожѣ.

№ 117. *Тинктура шпанскихъ мушекъ.*

Взять: шпанскихъ мушекъ истолченныхъ 7 золотн., пѣннаго простаго вина 1 фунтъ, настоявъ въ легкой теплотѣ въ теченіе 4-хъ сутокъ, процедить чрезъ бумагу и держать для наружнаго употребленія.

№ 118. *Слабительное alexandрійскаго листа.*

Взять: alexandрійскаго листа 7 золотн., воды ключевой $\frac{1}{4}$ штофа, смѣшавъ, отварить, и процедивъ, давать по чайной чашкѣ черезъ часъ до тѣхъ поръ, пока начнетъ слабить. (см. № 185).

№ 119. *Отваръ сенег.*

Взять: корня сенег. истоднаго 7 золотн., воды ключевой $1\frac{1}{2}$ фунта, варить вмѣстѣ до тѣхъ поръ, пока останется только фунтъ; потомъ, процедивъ, давать по рюмкѣ отъ 3 до 4 и болѣе разъ въ день, ежели желудокъ можетъ перенести.

№ 120. *Порошки свинцоваго сахара.*

Взять: свинцоваго сахару 1 гранъ (количество, равное коноплянному зерну), вишневаго клея, или аравійской камеди 2 золотн.; стереть первое со всею массою послѣдняго, прибавляя онаго постепенно болѣе и болѣе, хорошенько, раздѣлить на 12 равныхъ частей и давать по порошокъ черезъ три часа съ водою.

№ 121. *Грудная смягчительная смѣсь.*

Взять: процеженного густаго отвара льнянаго сѣмени штофъ, солодковаго корня 7 золотн., аниса $1\frac{1}{2}$ золотн., меду 1 фунтъ, смѣшавъ все вмѣстѣ, сварить въ вольномъ духу и, процедивъ, давать больному по стакану четыре раза въ день.

№ 122. *Припарка сынной трухи.*

Взять: сынной трухи, сколько понадобится, заварить ее, какъ обыкновенно завариваютъ, въ чугунѣ съ водою, потомъ, вынимая ее и выжимая нѣсколько, чтобы вода изъ нея не текла, теплую прикладывать

къ больному мѣсту, остывшую перемѣнять на другую теплую и такимъ образомъ продолжать дѣлать по нѣскольку разъ въ день.

№ 123. Летучая мазь оленьяго рога.

Взять: деревяннаго, или сладко-миндальнаго масла 4 стол. ложки, спирта оленьяго рога 2 столов. ложки, налить то и другое въ бутылку и взбалтывать до тѣхъ поръ, пока обѣ эти жидкости смѣшаются между собою совершенно.

№ 124. Камфорный порошокъ.

Взять: камфоры тертой 1 гранъ (количество, равное зерну коноплянаго сѣмени), либо два; селитры $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ золотн., все стереть вмѣстѣ и употребить внутрь съ водою, или питьемъ, или см. № 134.

№ 125. Отваръ солодковаго корня.

Взять: солодковаго корня 7 золотн., воды ключевой $1\frac{1}{2}$ штофа, отваривъ, процѣдить и употреблять по стакану черезъ 2 часа.

№ 126. Кислая успокоивающія капли.

Взять: галлерова элексира десертную ложку, горько-миндальной или лавровишневой воды чайную ложечку, смѣшавъ вмѣстѣ, давать отъ 10—15 капель въ полномъ стаканѣ ключевой воды 2—6 разъ въ день.

№ 127. Отваръ чистотѣла.

Взять: корня чистотѣла 7 золотн., воды ключевой 7 стакановъ, смѣшавъ, отварить въ вольной печи, чтобы хорошенько упрѣлъ, потомъ процѣдивъ, употреблять по стакану 4 раза въ сутки.

№ 128. Прохлаждающее слабительное огуречнаго разсола.

Взять: огуречнаго разсола рюмку, очищеннаго, свѣжаго, неплеслага меда 2 золотн., смѣшавъ дать выпить.

№ 129. Прохлаждающее слабительное квасное.

Взять: квасу одну рюмку, соли повареной $1\frac{1}{2}$ золотн., меду 2 золотн., смѣшавъ вмѣстѣ, дать выпить, повторяя приемъ черезъ каждые полчаса.

№ 130. Слизистое питье.

Взять: питье изъ ячменя одного (№ 113), либо съ вишневыми ягодами, или изюмомъ (№ 114), прибавить къ нему процѣженнаго раствора вишневаго клея, или аравійской камеди до 7 золотн. въ горячей водѣ, и давать внутрь для питья.

№ 131. Слизистая эмульсія.

Взять: очищеннаго отъ шелухи сладкаго миндаля 7 золотн. вишневаго клея или аравійской камеди тоже 7 золотн., воды ключевой полштофа, истолочь и стереть все вмѣстѣ, прибавляя воды по немногу, наконецъ, процѣдивъ все, принимать по чайной чашкѣ.

№ 132. Отваръ салапа.

Взять: корня салапа 1 золотн., воды ключевой $1\frac{1}{2}$ штофа, смѣшавъ и уваривъ до половины, процѣдить и употреблять.

№ 133. Селитряная смѣсь.

Взять: овса и изюма или коринокъ по 20 золотн., воды ключевой штофъ; отваривъ, процѣдить, и распустивъ 2 золотн., давать по чайной чашкѣ 4 раза въ день.

№ 134. *Камфорный порошок.*

Взять: камфоры два грана (количество, равное двумъ боноплянымъ зернамъ), селитры и сахара по $\frac{1}{2}$ золотн., стереть вмѣстѣ, дать принять въ одинъ пріемъ съ водою 2—4 разъ въ день.

№ 135. *Растительное молоко съ камфорою.*

Взять: камфоры $\frac{1}{4}$ золотн., распустить въ полштофъ растительнаго, процеженнаго маковаго молока и давать больному по рюмкѣ черезъ часъ и два.

№ 136. *Растительное маковое молоко съ нашатыремъ.*

Взять: нашатыря 1 золотн., маковаго растительнаго процеженнаго молока полштофа, смѣшавъ вмѣстѣ, взбалтывая, давать больному по рюмкѣ черезъ часъ и два.

№ 137. *Доверовы порошки.*

Взять: доверова порошка изъ аптеки 1 золотн., стереть тщательно вмѣстѣ съ золотникомъ сахара и, раздѣливъ на 12-ть равныхъ поршковъ, давать по одному съ водою 4 раза въ день.

№ 138. *Прохлаждающая слабительная смѣсь.*

Взять: плодовъ тамариндъ и отборной манны по $3\frac{1}{2}$ золотн. глауберовой соли 7 золотн. сварить въ фунтѣ воды, процедить и прибавить малиноваго сиропу 7 золотн. Принимать черезъ 1—2 часа по 2 столовой ложкѣ. *Д-ръ Чаруковский.*

№ 139. *Слабительная вѣнская смѣсь.*

Взять: александрійскаго листа 2 золотн., отборной малины, плодовъ тамариндъ по $3\frac{1}{2}$ золотн., сѣмянъ укропа 1 золотн., рѣчной, ключевой воды $2\frac{1}{2}$ стакана, сварить, процедить и къ отвару до 2 стакановъ прибавить малиноваго сиропу 7 золотн., принимать черезъ 2 часа по 2 столов. ложкѣ, пока не прослабитъ низомъ; или же разомъ принять половину, и если черезъ 2—3 часа не послабитъ, то принять и другую половину.

№ 140. *Мягчительное прохлаждающее полосканье.*

Взять: наливки цвѣтовъ бузины или ромашки 1 фун., нашатыря или селитры 1—2 драхмы, меду съ уксусомъ стаканъ, смѣшавъ, теплымъ полоскать горло и впрыскивать въ ротъ. *Д-ръ Чаруковский, или:*

№ 141. Взять: шалфея, цвѣтовъ бузины по $3\frac{1}{2}$ золотн., всенятивъ въ двухъ фунтахъ воды, процедить и прибавить настойки аниса 7 золотн., квасцовъ 3 золотн., холоднымъ полоскать ротъ.

№ 142. *Смѣсь, отдѣляющая харкотину.*

Взять: отвара просвирнаго корня $1\frac{1}{2}$ стакана, селитры и нашатыря по 1 золотн., собу лавричнаго 3 золотн. принимать черезъ 1—2 часа по столовой ложкѣ. *Д-ръ Чаруковский.*

№ 143. *Противувоспалительная смѣсь.*

Взять: рвотнаго камня 3 грана (гранъ величиною равенъ зерну боноплянаго сѣмени), селитры 2 золот., ключевой воды стаканъ, сиропа просвирнаго и солодковаго корня по 7 золотн. смѣшать и принимать черезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложкѣ. Послѣ первыхъ пріемовъ можетъ

стоппить и даже вырвать, но потомъ этого ужъ не бываетъ. *Д-ръ Ча-руковский.*

№ 144. *Прохлаждающая селитряная смѣсь.*

Взять: селитры 1—2 золотн., отвара воды 1—1½ стакана, уксуса 1—2 столовыя ложки, малиноваго сиропа полрюмки, смѣшавъ, принимать черезъ часъ по столовой ложкѣ.

№ 145. *Наружный раздражающій бальзамъ.*

а) Сильный (кислота и масло поровну); б) слабый *).

Взять: сѣрной цѣльной кислоты, льнянаго или деревяннаго масла поровну, смѣшавъ вмѣстѣ въ стеклянномъ сосудѣ, невзбалтывая, хранить для употребленія, плотно закупоривши. Ысточкою или перомъ должно намазывать его на страдающемъ мѣстѣ одинъ разъ въ сутки, и каждый разъ послѣ намазыванія черезъ ¼ часа покрывать ветошкою, сложенною вчетверо. Если намазываемое мѣсто будетъ очень чувствительно и болѣзненно, то намазываніе можно производить черезъ сутки, двое и болѣе до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ боль **).

№ 146. *Камфорное мыло.*

Взять: домашняго бѣлаго мыла 1¼ фун., ключевой воды ¾ фун., соединивъ, варить на тихомъ огнѣ до густоты постилы, потомъ, прибавивъ прованскаго масла 14 золотн. на такомъ же огнѣ переварить, потомъ, снявъ съ огня, дать остыть; наконецъ, взявъ 14 золотн. камфоры, распустивъ ее въ 7 золотникахъ прованскаго масла, присоединить къ сваренному и остывшему мылу и хранить для обмыванія пораженныхъ ревматизмомъ частей по 2 раза въ день, переходя постепенно отъ тепловатой воды до холодной, понижая каждый день температуру ея на градусъ ниже и ниже.

№ 147. *Кровочистительный декоктъ (отваръ).*

Взять: хмѣлевыхъ, сухихъ, искрошенныхъ кореньевъ пригоршней пять, ключевой воды ведро, смѣшавъ вмѣстѣ въ муравленомъ горшкѣ, должно замазать крышку тѣстомъ, поставить въ печь послѣ топки и на ночь. На другой день, отрывъ горшокъ, какъ скоро замѣтно будетъ, что воды убыло, то должно слить въ другой горшокъ поменьше прежняго со всею гущею, и, замазавъ крышку также тѣстомъ, поставить въ печь послѣ топки и на ночь; на третій день взять горшокъ еще поменьше прежняго, слить въ него одну жидкость и, поставивъ на ночь также въ печь, вынуть поутру для употребленія внутрь теплымъ стаканомъ по два, каждое утро и каждый вечеръ. Этотъ декоктъ совершенно замѣняетъ сарсапелъ, какъ дорогую траву, которой отваръ готовится точно такимъ же образомъ, или:

№ 148. *Взять черемуховой, сухой, искрошенной коры 8—14 зол. воды ключевой 2 фун. или 8 чайныхъ чашекъ, положивъ въ муравленный горшокъ съ замазанною тѣстомъ крышкою, отварить въ печи, по-*

*) Въ слабомъ 1 часть кислоты 2 части масла.

**) Др. 3д. 1848 г. № 2 стр. 13.

ставивъ въ нее на ночь послѣ топки, чтобы около половины упрѣло. потомъ, вынувъ и процѣдивъ, употреблять теплый по стакану четыре раза въ день.

№ 149. Простонародная магчительная мазь.

Взять: свѣчнаго хорошаго сала 3 части, крупчатной муки или брахмала 1 часть, размявши хорошенько напередъ сало, смѣшать то и другое вмѣстѣ въ тарелкѣ и употреблять, какъ спускъ (№ 29).

№ 150. Простонародная раздражающая мазь.

Взять: мыла и свѣчнаго сала по равной части, размявши ложкою, составляютъ мазь и употребляютъ при медленномъ назрѣваніи нарывовъ и въ ногтядѣ.

№ 151. Простонародная мягчительная припарка.

Взять: сырую, свѣжую, заячью кожу, распариваютъ съ безволосной стороны въ горячемъ молокѣ или въ горячихъ пивныхъ дрожжахъ, потомъ прикладываютъ къ болящимъ нарывамъ, а за неизмѣненіемъ этого средства берутъ чесаный ленъ, или кудель, намазываютъ простымъ мыломъ и прикладываютъ къ нарывамъ.

№ 152. Глазная, укрѣпляющая вода пленка.

Взять: бѣлаго купороса 12 гранъ (гранъ равняется зерну коноплянаго сѣмени), розовой воды полфунта. Распустить и процѣдить для промыванія глазъ.

№ 153. Глазные капли Левинсона.

Взять: бѣлаго купороса 12 гранъ, воды липовыхъ цвѣтовъ 14 золотниковъ, распустивъ и процѣдивъ, впускать по одной каплѣ утромъ и вечеромъ.

№ 154. Глазной линиментъ Трекурта.

Взять: бѣлаго купороса въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 золотника, два яичныхъ бѣлка, стереть хорошенько вмѣстѣ въ одну массу. При воспаленіи соединительной плевы и накопленіи матеріи на поверхности роговой оболочки производится намазываніе глаза кисточкою.

№ 155. Глазная примочка Веллера.

Взять: бѣлаго купороса 2 грана, розовой воды стаканъ, слизи аравійской бамеди, или вишневаго клея $\frac{1}{2}$ золотника, этою жидкостью промываются глаза при гнойномъ ихъ воспаленіи у новорожденныхъ дѣтей.

№ 156. Глазная мазь пленка.

Взять: бѣлаго купороса $\frac{1}{4}$ золотн., не соленого, боровьяго масла рюмку, стереть вмѣстѣ. Эта мазь впускается въ глазъ, величиною въ булавоочную головку два раза въ день.

№ 157. Глазной линиментъ Губфланда.

Взять: крутосвареное свѣжее яйцо, очистить его отъ скорлупы и разрѣзать по длинѣ, вынуть изъ него желтокъ, и въ обѣ половины разрѣзаннаго бѣлка высыпать двѣ чайныхъ ложки бѣлаго купороса, стертаго въ порошокъ; потомъ, сложивъ обѣ половины бѣлка, слѣдуетъ хорошо обвязать ниткою и оставить такъ до тѣхъ поръ, пока купоросъ

совершенно распустится: тогда образовавшийся сокъ слегка выжать изъ бѣлка и хранить для употребленія. Въ оспенномъ воспаленіи глазъ, по подсыхнутіи струпуевъ, производится омоченіе вѣкъ этимъ сокомъ.

№ 158. Глазная вода Рихтера.

Взять: бѣлаго купороса 1 грань, перегнанной воды двѣ столовыя ложки, или полрюмки, смѣшать. При зудѣ и жарѣ вѣкъ, также при слабости соединительной плѣвы отъ предшествовавшего воспаленія, при гнойномъ истеченіи изъ глазъ и потемненіи роговой оболочки, производится омоченіе глазъ отъ 3 до 4 разъ въ сутки.

№ 159. Глазная вода Сандерса.

Взять: бѣлаго купороса 1 грань, перегонной воды полрюмки, или двѣ столовыя ложки, смѣшать. Въ воспаленіи глазъ у новорожденныхъ дѣтей обмываются глаза два и болѣе разъ въ сутки.

№ 160. Глазная вода итальянская.

Взять: свѣжее круто свареное яйцо, — разрѣзать его по длинѣ на двѣ равныя части, посыпать ту и другую долю одною чайною ложкою въ порошокъ стертаго бѣлаго (цинковаго) купороса. Обѣ половинки яйца сложивъ вмѣстѣ, обвязать яйцо плотно ниткою и опустить его въ большой стаканъ рѣчной воды (емкостью въ три чайныя чашки). По прошествіи сутокъ спокойнаго стоянія въ обыкновенной температурѣ, вода сливается въ другой сосудъ и хранится для употребленія. Эта вода, частію впускается въ глазъ отъ 1 до 3 капель, три или четыре раза въ сутки, частію же ею производится омоченіе глазъ два раза въ день, во всѣхъ тѣхъ глазныхъ болѣзняхъ, которыя выше исчислены.

№ 161. Глазные капли неогіанта Моллера.

Взять: бѣлаго (цинковаго) купороса 4 грана, распустить въ полрюмкѣ рѣчной воды и употребляютъ. Онѣ впускаются въ глазъ отъ 2 до 3 капель въ хроническомъ воспаленіи соединительной оболочки глазъ.

№ 162. Глазные капли купца Арешикова.

Взять: бѣлаго купороса $\frac{1}{4}$ золотн., распустить въ трехъ рюмкахъ ($1\frac{1}{2}$ стакана) ключевой воды. По три капли впускаются въ глазъ отъ 3 до 4 разъ въ сутки.

№ 163. Глазные капли купца Трофимова.

Взять: синяго купороса $\frac{1}{8}$ золотн., распустить въ столовой ложкѣ воды, прибавить всецѣпчанаго хорошаго меда и сахарнаго сиропа по золотнику и смѣшать. Отъ 1 до 2 капель впускаются въ глазъ два раза и болѣе въ сутки въ хроническомъ воспаленіи соединительной оболочки вѣкъ и другихъ выше сего изложенныхъ болѣзняхъ.

№ 164. Глазная, домашняя примочка лично-квасцовая.

Взять: яичныхъ бѣлковъ 5, взбивать ихъ обыкновеннымъ образомъ, пока они не обратятся въ пѣну, потомъ, взявъ квасцовъ около $\frac{1}{2}$ золотн., или величиною въ обыкновенный орѣхъ, и пятую часть мѣлу противъ квасцовъ, стереть все вмѣстѣ въ порошокъ въ стеклянной или фаянсовой ступкѣ, либо въ глиняной муравленой чашкѣ; — когда всё это будетъ готово, смѣшать съ упомянутыми бѣлками и вторично

растирать до тѣхъ поръ, пока всё это смѣшается. Въ этомъ растворѣ намочить лоскутъ холста, свернутый вчетверо, и прикладывать его къ больнымъ глазамъ, увязать рачительно бинтомъ оставить холстъ на глазахъ до тѣхъ поръ пока онъ совершенно высохнетъ; когда же холстъ высохъ, то, снявъ перевязку, промыть глаза холодною водою и продолжать прикладывать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока боль и краснота въ глазахъ уничтожатся.

№ 165. Березовый сиропъ.

Взять: свѣжаго березоваго сока, сколько угодно, выпарить его въ вылуженной мѣдной посудѣ, или въ прочномъ муравленомъ горшкѣ съ крышкою, до густоты сиропа, снимая при этомъ образующуюся на немъ пѣну; потомъ процѣдить, очистить посредствомъ яичныхъ бѣлковъ и хранить на холодѣ въ хорошо закупоренныхъ стеблянныхъ сосудахъ для употребленія.

№ 166. Березовая мазь.

Взять: березовыхъ истолченныхъ листьевъ одну часть и двѣ части жира, стереть хорошенько вмѣстѣ и употреблять снаружи во всѣхъ на-кожныхъ болѣзняхъ. Или: (см. № 267).

№ 167. Березовая дегтярная мазь.

Взять: чистаго березоваго дегтя, березовыхъ листьевъ и жира по равной части и стереть всё вмѣстѣ.

№ 168. Глазная примочка профессора Буяльскаго.

Взять: черемуховой, перегнанной изъ цвѣтовъ, воды $1\frac{1}{2}$ фун.; бѣлаго (цинковаго) купороса столько, сколько потянутъ шесть зеренъ, круглаго русскаго перца (6—9 гранъ), камфорнаго спирта двѣ чайныя ложечки; или же камфоры 2—3 грана (количество, равняющееся 2—3 зернамъ коноплянаго сѣмени), растворенной съ вишневымъ клеємъ. Смѣшавъ всё вмѣстѣ, примачивать глаза и вокругъ глазъ обмывать каждыи день, утромъ и вечеромъ. Двоеная перегнанная вода черемуховая, которая прочтѣе и долѣе хранится, будетъ вдвое сильнѣе первой, и потому для употребленія надобно разводить ее всегда по поламъ чистою водою *).

№ 169. Порошки синяго купороса.

Взять: синяго купороса (мѣднаго) 2 до 3 грана, количествомъ съ 2 до 3 зеренъ коноплянаго сѣмени. Молочнаго сахара $1\frac{1}{2}$ золотн., стереть вмѣстѣ и раздѣлить на 4 равныя порошка; давать черезъ каждыя 10 минутъ больному дитяти по порошокъ съ водою, или безъ оной, всыпая ему на языкъ, пока послѣдуетъ рвота (груднымъ дѣтямъ по половинѣ порошка **).

№ 170. Медокъ изъ буры отъ молочницы.

Взять: буры золотникъ, растворить въ полрюмкѣ розоваго или простаго, вскипяченнаго, очищеннаго меда, либо патоки, и мазать поча-

*) Др. 3др. 1849 г. № 17. стр. 130.

**) Др. 3др. 1849 г. № 44. стр. 219.

ще висточкою, мягкою изъ корпін или перышкомъ молочную сыпь до тѣхъ поръ, пока не очистится. Или:

№ 171. *Медокъ изъ бѣлаго купороса отъ молочницы.*

Взять: бѣлаго купороса 4 грана (количествомъ въ 4 конопляныхъ зерна), распустить въ полрюмкѣ розоваго или простаго вскипяченаго очищеннаго меда, либо патоки, и чаще слегка помазывать мягкою изъ корпін висточкою или перышкомъ молочную сыпь во рту до тѣхъ поръ, пока не очистится, но такъ чтобы дитя не глотало эту мазь.

№ 172. *Порошки изъ ревеня съ магнезією.*

Взять: ревеню 6 гранъ, бѣлой магнезіи $1\frac{1}{2}$ золот. истолочь мелко и смѣшать вмѣстѣ, потомъ раздѣлить на шесть равныхъ частей (пріемовъ). Давать по одному порошокъ чрезъ каждые 4 или 5 часовъ, пока не станетъ дѣйствовать, либо въ дѣтской пищѣ, либо въ сиропѣ.

№ 173. *Медокъ изъ буры съ квасцами.*

Взять: меда вскипяченаго и очищеннаго отъ пѣны полрюмки, буры 1 золотн., пережженныхъ квасцовъ ползолотника, розовой воды чайную ложечку, смѣшать вмѣстѣ.

№ 174. *Рвотное для дѣтей.*

Взять: рвотной соли (рвотнаго камня) одинъ гранъ (съ конопляное зерно), простой воды полторы рюмки; распустивъ соль въ водѣ, прибавить немного сиропа или сахара, и давать по чайной ложечкѣ чрезъ каждую четверть часа до дѣйствія.

№ 175. *Сурьмяное (Гуксгамово) вино.*

Взять: рвотной соли (рвотнаго камня) $1\frac{1}{4}$ золотн., бѣлаго, винограднаго (сантуринскаго) вина $3\frac{1}{2}$ рюмки, смѣшать вмѣстѣ.

№ 176. *Ревенный простой сиропъ.*

Взять: ревеню тертаго 7 золотн., простаго вина 3 стакана, смѣшавъ, дать хорошенько настояться въ легкой теплотѣ, въ закупоренной стеклянной посудѣ отъ 6 до 8 дней; потомъ, процѣдивъ и распустивъ въ этой ревенной настойкѣ бѣлаго сахара отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 фунтовъ, варить на легкомъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока сдѣлается сиропъ.

№ 177. *Прохлаждающее и укрѣпляющее питье.*

Взять: блючевой воды бутылку, хорошаго вина $1\frac{1}{2}$ стакана, лимоннаго сока изъ одного лимона, сахару $\frac{1}{2}$ фунта. Смѣшавъ все вмѣстѣ, сварить до пѣны, потомъ употреблять для питья.

№ 178. *Кислое питье изъ кремортартара.*

Взять: виннаго камня (кремортартара) $3\frac{1}{2}$ золот., воды рѣчной штофъ, варить въ глиняномъ горшкѣ, пока не растворится порошокъ, потомъ прибавить одинъ лимонъ, изрѣзанный въ куски и сахару $\frac{1}{2}$ фунта, процѣдить и употреблять для питья. *Д-ръ Чаруковский.*

№ 179. *Ароматическая, поташно-соленая ванна.*

Взять: поташу $\frac{1}{4}$ фунта, поваренной соли 1 фун., развести въ теплой водѣ и влить въ ванну, въ которую прибавить $\frac{1}{4}$ фунта полыни, или божьяго дерева, или $\frac{1}{2}$ фунта душицы.

№ 180. Порошки изъ белладоны.

Взять: порошка корня белладоны 1 гранъ (съ зерно коноплянаго сѣмени), сахара $\frac{1}{4}$ золотн., стереть, сколько возможно тщательно, въстѣ и раздѣлить на столько порошковъ, сколько будетъ нужно, смотря по количеству приѣма. Если нужно дать $\frac{1}{10}$ ч. грана белладоны, то раздѣлить на 10-ть порошковъ; если понадобится дать $\frac{1}{4}$ ч. грана белладоны, то раздѣлить на 4 равныхъ порошка и т. д.

№ 181. Порошокъ селитры съ кремортартаромъ.

Взять: селитры $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ ч. золотн., кремортартара $\frac{1}{4}$ золотн., сахара $\frac{1}{2}$ золотн. стереть въ порошокъ и принимать по одному такому порошку черезъ 1—2 часа.

№ 182. Мягчительно-прохлаждающій народный составъ.

Взять: глины сырой мягкой, мякиша чернаго хлѣба по $\frac{1}{2}$ фунту, укусу краснаго $\frac{1}{4}$ фунта, яичныхъ бѣлковъ 10 штукъ, горчицы 2 столовые ложки, тертой моркови сколько понадобится для того, чтобы при стираниіи всего вмѣстѣ вышла густая масса въ родѣ мягкаго пластыря. Намазывая подогрѣтый составъ этотъ на ветошку, прикладывать къ бокамъ груди и живота, и въ случаѣ перемѣнять на свѣжій.

№ 183. Хинный, холодный, водяной настой.

Взять: наилучшей, истолченной хины 7 золотн., положить въ бутылку, налить на верхъ фунтъ холодной воды, заткнуть и настаивать 6 или 8 дней на холодѣ, взбалтывая ее почаще; потомъ слить потихоньку и хранить для употребленія.

№ 184. Рвотное въ растворѣ.

Взять: отварной воды стаканъ, рвотнаго камня 4 грана (количество, равное 4-мъ зернамъ коноплянаго сѣмени), смѣшать и принимать чрезъ 5—10 минутъ взрослымъ по столовой, а дѣтямъ по чайной ложкѣ до дѣйствія. Это рвотное, кромѣ рвоты, часто слабятъ низомъ и можетъ замѣнить слабительное.

№ 185. Противогнилостная смесь хины.

Взять: лучшей хины 7 золотн., лучшей корицы 1 золотн., краснаго вина 1 фунтъ, смѣшавъ, сварить и, процѣдивъ, прибавить галлерова элексира 40 капель. Употреблять по 2 ложки черезъ 2 часа.

№ 186. Слабительное александрийскаго листа съ черносливомъ.

Взять: александрийскаго листа 2 золотн., чернослива до $\frac{1}{4}$ фунта. настаивать въ двухъ фунтахъ кипятка черезъ два часа, процѣдить и давать часъ отъ часу выпивать по рюмкѣ до дѣйствія.

№ 187. Хлориновая вода.

Взять: хлорпновой воды 4—7 золотн. (смотря по возврату и степени болѣзни), отварной воды 2 стакана, малиноваго сиропа 7 золотн., или полрюмки, смѣшать и принимать черезъ 2 часа по 1—2 столовой ложки. Д-ръ Чаруковский.

№ 188. Отваръ мѣла.

Взять: мѣла самаго чистаго въ порошокъ 14 золотн., вишневаго клея, или аравійской камеди $3\frac{1}{2}$ золотн., воды простой $1\frac{1}{2}$ бутылки.

смѣшавъ, варить до тѣхъ поръ, пока останется не больше одной бутылки; *Буханг.*

№ 189. Порошки хинной соли.

Взять: хинной соли $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ золотн., сахара въ порошокъ 2 золотн., стереть хорошенько вмѣстѣ и, раздѣливъ на 14-ть равныхъ порошковъ, давать по одному съ водою.

№ 190. Порошокъ хины съ нашатыремъ.

Взять: красной хины въ порошокъ $\frac{1}{4}$ золотн., нашатыря $\frac{1}{8}$ золотн., соединивъ, стирая вмѣстѣ, принимать въ рюмкѣ воды, кваса, винограднаго вина, ромашковаго настоя, овсянаго, ячнаго отвара.

№ 191. Порошки хинной соли съ нашатыремъ.

Взять: хинной соли $\frac{1}{8}$ золотн., нашатыря и сахара по золотн., стереть вмѣстѣ и, раздѣливъ на 14 равныхъ порошковъ, принимать по одному, какъ и предшествовавшій.

№ 192. Порошки хины съ ревенемъ.

Взять: хины красной 7 золотн., ревеня тертаго 1 золотн., стереть вмѣстѣ и раздѣлить на 12 равныхъ порошковъ, принимать по одному, какъ и предшествовавшій.

№ 193. Порошки хины съ имбиремъ, бѣлою корицею и т. п.

Взять: красной хины 7 золотн., имбиря тертаго, или бѣлой корицы, либо корня серпентаріи (змѣевника) и т. п. 1 золотн., стереть вмѣстѣ и раздѣливъ на 12 равныхъ порошковъ, принимать по одному, какъ предшествовавшій.

№ 194. Порошокъ хины съ кремортартаромъ.

Взять: хины красной 7 золотн., кремортартара 2 золотн., смѣшать вмѣстѣ и принимать по чайной ложечкѣ съ водою черезъ 2 часа во время перемежки и лихорадочнаго жара.

№ 195. Порошки хинной соли съ опіемъ.

Взять: хинной соли $\frac{1}{4}$ золотн., чистаго опія $\frac{1}{8}$ золотн., сахара въ порошокъ 2 золотн., стереть все вмѣстѣ и, раздѣливъ на 14 равныхъ порошковъ, принимать по одному съ водою.

№ 196. Порошки изъ опія.

Взять: чистаго опія $\frac{1}{8}$ золотн., сахара въ порошокъ 1 золотн., стереть вмѣстѣ, раздѣлить на 7 равныхъ порошковъ и принимать по одному съ водою.

№ 197. Порошки хинной соли для дѣтей.

Взять хинной соли 3 грана (количество, равное 3-мъ зернамъ коноплянаго сѣмени), сахара въ порошокъ 2 золотн., стереть вмѣстѣ и, раздѣливъ на 12 или 8 равныхъ порошковъ, принимать черезъ 2 часа по порошокъ съ сахарною водою.

№ 198. Растворъ хинной соли.

Взять: хинной соли 4 грана, коричневой воды, или настоя рюмку, смѣшать и принимать четыре раза въ день по чайной или десертной ложкѣ, запивая тотчасъ сахарною водою. *Д-ръ Грумъ.*

№ 199. *Хинная дѣтская микстура.*

Взять: красной хины въ порошокъ 1 золотн., лимоннаго сиропа полрюмки (7 золотн.), мятной воды рюмку, всыпавъ хину въ ступку, или въ другой какой сосудъ, смѣшавъ хорошенъко пестиломъ или ложкою съ нѣсколькими каплями сиропа, прибавлять, мало по малу, остальной сиропъ при помѣшиваніи и, соединивъ наконецъ съ мятною водою, давать дѣтямъ по чайной ложечкѣ черезъ каждыи часъ. Для большей силы можно принимать 3—4 капли галлерова элексира въ микстуру.
Буханг.

№ 200. *Мазь хинной соли для дѣтей.*

Взять: хинной соли 2 или 5 гранъ, свиного жира 2 золотн., стереть хорошенъко вмѣстѣ и втирать въ обѣ подмышки дитяти прелѣ каждымъ пароксизмомъ, до тѣхъ поръ, пока отстанеть лихорадка.

№ 201. *Противулихорадочное промывательное изъ хины.*

Взять: хиннаго экстракта $3\frac{1}{2}$ золотн., развести въ стаканѣ горячей воды, прибавить масла сладкаго миндаля столовую ложку, лавдана (шафранной настойки опія) 6—8 капель и употреблять для промыванія черезъ каждые 4 часа, болѣе или менѣе, смотря по свойству лихорадки.

№ 202. *Наборз для паровъ.*

Взять: листьевъ ружи или проскурняка $9\frac{1}{2}$ золотн., маковыхъ цвѣтовъ 2 золотн., либо вмѣсто послѣднихъ взять листьевъ бѣлены (блеены) 1 золотн., смѣшать для употребленія паровъ. *Пр. Дядьковский.*

№ 203. *Сѣрный порошокъ.*

Взять: сѣрныхъ цвѣтовъ 2 золотн., сахара въ порошокъ 4 золотн., стереть вмѣстѣ и употреблять, какъ сказано. *Д-ръ Грумъ.*

№ 204. *Средство отъ запоя.*

Взять: рвотнаго камня $\frac{1}{2}$ золотн., растворить въ рюмкѣ воды; потомъ, взявъ столовую ложку этого раствора, прибавить къ полустифу любимаго больнымъ напитка для его употребленія. Повторять и давать во время запоя это средство до тѣхъ поръ, покуда больной получитъ отвращеніе отъ вина при посредствѣ, большею частію, рвоты.

№ 205. *Прохлаждающій, успокоивающій волненіе крови порошокъ.*

Взять: селитры $\frac{1}{2}$ золотн., бремортартара $\frac{1}{4}$ золотн., наперсточной травы $\frac{1}{2}$ —1 гранъ (съ $\frac{1}{2}$ —1 конопляное зерно), стереть все вмѣстѣ въ порошокъ и принимать съ водою черезъ 2—3—4 часа по порошокъ. Этотъ порошокъ полезенъ при біеніи и трепетаніи сердца. *Д-ръ Чаруковский.*

№ 206. *Противуцынготное полосканье.*

Взять: отвара дубовой коры или корня айра 1 фунтъ, квасцовъ 1—2 золотн., хрѣновой водки, или спирта ложечной травы рюмку, либо стаканъ, смѣшавъ, полоскать почаще ротъ.

№ 207. *Квасцовая вяжущая сыворотка.*

Взять: коровьяго молока $1\frac{1}{2}$ фунта, квасцовъ 2 золотн., варить,

пока створожится молоко, процѣдить и прибавить вишневаго или коричневаго спирта 2 столовыя ложки. Принимать по полчащѣ чайной чрезъ 1—2 часа. *Д-ръ Чаруковский.*

№ 208. *Розовая приправа или консерва.*

Взять: махровыхъ красныхъ розановъ 1 фунтъ, очистить стебельки отъ каждаго изъ нихъ лепестка или листка, растереть въ песту, прибавить, глядя по немногу, 2 фунта чистаго сахара истертаго въ порошокъ и хранить для употребленія. Точно также приготавливаются консервы изъ цвѣтовъ розмаринныхъ, помынныхъ и др.

№ 209. *Сѣрный, противу-геморoidalный порошокъ.*

Взять: кремортартара 7 золотн., сѣрныхъ цвѣтовъ $3\frac{1}{2}$ золотн., магнезию 2 золотн., смѣшать и принимать 1—2 раза въ день по чайной ложкѣ въ теченіе 1—2 недѣль такъ, чтобы въ сутки слабило 2 раза.

№ 210. *Мягчительная лепешка.*

Взять: яичныхъ, свѣжихъ желтковъ 2 столовыя ложки, чистаго меда 1 столовую ложку, поваренной соли $\frac{1}{2}$ золотн., пшеничной муки сколько понадобится для составленія лепешки. Приблadyвать въ больнымъ желѣзамъ съ цѣлью нагноенія. *Проф. Дядьковский.*

№ 211. *Сѣрная простая мазь.*

Взять: очищенной простой сѣры въ порошокъ 2 части, свиного сала 8 частей, растопить въ горшкѣ на огнѣ, мѣшая, пока не простынетъ. Втирать въ чесоточныя мѣста ввечеру по чайной ложкѣ и болѣе.

№ 212. *Сѣрная сложная мазь.*

Взять: сѣрныхъ цвѣтовъ 14 золотн., нашатыря 2 золотн., коровьяго масла 28 золотн., смѣшать все вмѣстѣ хорошенько и прибавить третью часть лимонной кислоты для отнятія отъ мази непріятнаго запаха. Взявъ кусочекъ этой мази, величиною съ мушкетный орѣхъ, натирать имъ каждую больную часть, когда больной въ постели, и натираніе это повторять 2 или 3 раза въ недѣлю.

№ 213. *Сѣрная вода.*

Взять: сѣрной печенки отъ $3\frac{1}{2}$ до 7-ми золотн., горячей воды 1—2 фунта. Растворивъ первую въ послѣдней, процѣдить и обмывать чесоточныя мѣста.

№ 214. *Сѣрное мыло.*

Взять: очищенной сѣры въ порошокъ и мыла по равной части, хорошенько смѣшать въ муравленомъ горшкѣ въ сплошную массу и дать ей форму мыла. *Д-ръ Чаруковский.*

№ 215. *Поташный щелокъ (щелокъ мыльниковъ, щелокъ кали).*

Взять: негашеной извести 14 золотн., поташа 7 золотн., смѣшать и оставить, пока сдѣлается изъ этой смѣси щелокъ, потомъ, процѣдивъ, или пропустивъ его рачительно, употреблять. Если эти два вещества не скоро распускаются, то можно прибавить къ нимъ немного воды. Приемъ отъ 30-ти до 40 капель и болѣе, по мѣрѣ того какъ желудокъ больного будетъ къ нему привыкать (отъ каменной болѣзни).